

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Nicorette Microtab 2 mg resoribletti, kieLEN alle nikotiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tästä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkienkilokunta ovat neuvoneet sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilokunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännny lääkärin puoleen, jos et kykene pystymään tupakoimattomana 6 kuukauden Nicorette Microtab -hoidon jälkeen.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Nicorette Microtab on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nicorette Microtabia
3. Miten Nicorette Microtabia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Nicorette Microtabin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Nicorette Microtab on ja mihin sitä käytetään

Nicorette Microtab kuuluu lääkeaineryhmään, jonka valmisteet helpottavat tupakoinnin lopettamista.

Nicorette Microtabin sisältämä nikotiini lievittää nikotiinhimoa ja vieroitusoireita, kun lopetat tupakoinnin, ja estää siten tupakoinnin uudelleen aloittamista. Nicorette Microtab on tarkoitettu tupakoitsijoille, jotka ovat motivoituneita lopettamaan tupakoinnin.

Kun elimistösi ei yhtäkkiä enää saakaan nikotiinia tupakasta, seurauksena on erilaisia epämiellyttäviä tuntemuksia, joita kutsutaan vieroitusoireiksi. Nicorette Microtab estää tai ainakin vähentää tällaisia epämiellyttäviä tuntemuksia, koska Nicorette Microtabista elimistösi saa edelleen hieman nikotiinia hetken aikaa.

Neuvonta ja tuki parantavat onnistumisen mahdollisuutta.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nicorette Microtabia

Älä käytä Nicorette Microtabia, jos

- olet **allerginen** nikotiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- olet alle 12-vuotias
- et ole koskaan tupakoinut.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Nicorette Microtabia, jos sinulla on

- ollut hiljattain (kuluneen 3 kuukauden aikana) **sydäninfarkti** tai **aivohalvaus**
- **rasitusrintakipuja** (epävakaa angina pectoris) tai levossa ilmaantuvaa rintakipua
- **sydänsairaus**, joka vaikuttaa sydämen lyöntihetyteen tai rytmiiin
- hoitamaton **verenpainetauti**

- joskus ilmennyt **allerginen reaktio**, johon on liittynyt huulten, kasvojen ja nielun turvotusta (angioedeema) tai kutiavaa ihottumaa (nokkosihottuma). Nikotiinikorvaushoitto voi joskus laukaista tällaisen reaktion.
- vaikea tai keskivaikea **maksasairaus**
- vaikea **munuaissairaus**
- **diabetes**
- **kilpirauhasen liikatoiminta**
- **lisämunuaisytimeen** kasvain (feokromosytooma)
- **maha- tai pohjukaissuolihaava**
- **ruokatorvitulehdus.**

12–17 -vuotiaat nuoret saavat käyttää Nicorette Microtabia vain terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. Nicorette Microtab ei sovi **tupakoimattomille** henkilöille.

Lopeta tupakointi kokonaan Nicorette Microtab -hoidon aikana.

Aikuiselle sopiva annos voi aiheuttaa lapselle vakavan myrkytyksen tai johtaa jopa tämän kuolemaan. Siksi Nicorette Microtab -resorbletit on ehdottomasti säilytettävä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Muut lääke valmis teet ja Nicorette Microtab

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

- **teofylliiniä** astmaan
- **takriinia** Alzheimerin tautiin
- **klotsapiinia** skitsofrenian
- **ropinirolia** Parkinsonin tautiin.

Raskaus, imetyks ja hedelmällisyys

On erittäin tärkeää lopettaa tupakointi raskausaikana, koska tupakointi voi heikentää lapsesi kasvua. Se voi aiheuttaa myös lapsen syntymisen ennenaikeisesti tai jopa kuolleena. Parasta olisi lopettaa tupakointi ilman nikotiinia sisältäviä lääkevalmisteita. Jos et onnistu, käytä Nicorette Microtabia vasta, kun olet keskustellut terveydenhoidon ammattilaisen kanssa.

Vältä Nicorette Microtabin käyttöä imetysaikana, koska nikotiini kulkeutuu äidinmaitoon ja saattaa vaikuttaa lapseesi. Jos lääkäriksi on suositellut sinulle Nicorette Microtabin käyttöä imetysaikana, ota resorbletti heti imettämisen jälkeen, muttaei imettämistä edeltävien kahden tunnin aikana.

Tupakointi lisää hedelmättömyyden riskiä naisilla ja miehillä. Nikotiinin vaikutuksia hedelmällisyteen ei tunneta.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Vaikutuksia ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole todettu.

3. Miten Nicorette Microtabia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkienkilökunta on määritellyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus riippuu siitä, kuinka voimakas nikotiiniriippuvuutesi on.

Hoidon alussa voit ottaa 1 resorbletin 1–2 tunnin välein. Useimmiten 8–12 resorblettia vuorokaudessa on riittävä määrä.

Jos nikotiiniriippuvuutesi on voimakas tai jos poltat yli 20 savuketta/päivä, aloita 2 resorbletilla 1–2 tunnin välein. Ota enintään 30 resorblettia vuorokaudessa.

Nicorette Microtab on resoribletti (kielenalustabletti), eli se pannaan kielen alle.

Pane resoribletti kielen alle, ja anna syljen hajottaa se hitaasti. Tämä vie noin puoli tuntia. Älä pureskele tai niele resoriblettia. Jos kuitenkin vahingossa nielaiset resoribletin, myrkytysriski on pieni.

Käyttöohjeet



1. Ota pyöreä läpipainoliuska pakkauksestaan.
2. Avaa annostelija ja aseta pyöreä läpipainoliuska annostelijaan siten, että resoribletit ovat ylöspäin.



3. Sulje annostelija ja varmista, että kansi on kunnolla kiinni.
4. Käännä läpipainoliuskaa sormellasi nuolen suuntaan, kunnes kuulet ja/tai tunnet naksahduksen.
5. Varmista, että läpipainoliuskassa oleva kolo on annostelijan kolmiomerkin kohdalla.
6. Resoribletti on nyt oikeassa asennossa ja voit painaa sen irti läpipainoliuskasta.



7. Paina resoribletti irti ja pane se kielen alle.
8. Annostelee seuraava resoribletti toistamalla vaiheet kohdasta 4 eteenpäin.

Nicorette Microtabia ei saa pureskella eikä niellä.

Hoidon kesto on yksilöllinen.

Hoidon tulisi kestää noin 2–3 kuukautta. Pienennä tämän jälkeen nikotiiniannosta vähitellen.

Lopeta hoito, kun käytät enää 1–2 resoriblettia vuorokaudessa.

Säännöllisen Nicorette Microtab -hoidon enimmäiskestoksi suositellaan tavallisesti 6 kuukautta. Joskus hoitoa on ehkä jatkettava pitempään, jotta vältytään tupakoiminnan uudelleen aloittamiselta. Säilytä jäljelle jäyneet resoribletit, koska halu tupakoida voi herätä yhtäkkiä uudestaan.

Jos käytät enemmän Nicorette Microtabia kuin sinun pitäisi

Voit saada liikaa nikotiinia elimistöösi, jos tupakoit ja käytät Nicorette Microtabia samanaikaisesti.

Jos lapsi on ottanut Nicorette Microtabia tai olet itse ottanut sitä liikaa, ota **heti** yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Aikuiselle sopiva annos voi aiheuttaa **lapselle** vakavan myrkytyksen tai johtaa jopa **kuolemaan**.

Yliannostuksen oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, lisääntynyt syljeneritys, vatsakivut, ripuli, hikoilu, päänsärky, heitehuimaus, kuulohäiriöt ja voimakas heikkouden tunne. Suressa yliannostuksessa voi lisäksi ilmetä verenpaineen laskua, pulssin heikkenemistä ja epäsäännöllisyyttä, hengitysvaikeuksia, syvä uupumusta, verenkiuron romahtamista ja kouristuksia.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkien henkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan nütä saa.

Nicorette Microtab voi aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin muussa muodossa käytetty nikotiini. Haittavaikutukset ovat yleensä annoksesta riippuvaisia.

Tupakoiminnin lopeuttamisen liittyvät haittavaikutukset (vieroitusoireet)

Jotkut tupakoinnin lopettamisen yhteydessä ilmenevät haittavaikutukset voivat olla vähentyneestä nikotiinin saannista johtuvia vieroitusoireita:

- ärtynesiysyys, aggressiivisuus, kärsimättömyys, turhautuneisuus
- ahdistuneisuus, levottomuus, keskittymisvaikeudet
- yöheräily, unihäiriöt
- lisääntynyt ruokahalu, painon nousu
- alakuloisuus
- tupakanhimo (nikotiinihimo)
- sydämen sykkeen hidastuminen
- verenvuoto ikenistä tai suun haavaumat
- huimaus, heikko olo
- yskä, kurkkukipu, tukkoinen tai vuotava nenä
- ummetus.

Haittavaikutukset

Lopeta Nicorette Microtabin käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraavia vakavia harvinaisia haittavaikutuksia (angioedeeman merkejä):

- kasvojen, kielen tai nielun turpoaminen
- nielemisvaikeudet
- nokkosihottuma ja hengitysvaikeudet.

Hyvin yleiset (yli 1 käyttäjällä 10:stä): Yskä, päänsärky, hikka, pahoinvointi, nielun ärsytys.

Yleiset (alle 1 käyttäjällä 10:sta): Paikalliset vaikutukset, kuten polttava tunne, tulehdus suussa, makuaistin muutokset, suun kuivuminen, lisääntynyt syljen eritys, ruoansulatushäiriö, vatsakipu tai -vaivat, oksentelu, ilmavaivat, ripuli, väsymys, yliherkkyyys (allergia).

Melko harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 100:sta): Nenäoireet, kuten tukkisuus ja aivastelu, hengityksen vinkuminen (bronkospasmi), tunne että hengitys on tavallista työlämpää (hengenahdistus), kurkun kuristaminen, punastuminen, pistely, lisääntynyt hikoilu, suun oireet, kuten pistely suussa, kielen tulehdus, suun haavaumat, suun limakalvojen variot, äänen muutokset, kipu suussa tai nielussa ja röyhtäily, sydämentykytys (epätavallinen tietoisuus sydämen lyönneistä), nopea sydämen syke, korkea verenpainе, ihottuma ja/tai ihon kutina (pruritus, nokkosihottuma), epänormaalit unet, rintakipu tai -vaivat, voimattomuus, huonovointisuus, epänormaali sydämen syke, vertavuotavat ikenet, vuotava nenä.

Harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 1 000:sta): Nielemisvaikeus, suun heikentynyt tunto, yökkäily.

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin): Näön hämärtyminen, lisääntynyt kynnelvuoto, kurkun kuivuminen, maha-suolikanavan vaivat, kipu huulissa, ihon punoitus, allergiset reaktiot mukaan lukien kasvojen ja suun turvotus (angioedeema tai anafylaksi).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkienkilokunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkauselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55, 00034 Fimea

5. Nicorette Microtabin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkaussessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärään jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkausen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nicorette Microtab sisältää

- Vaikuttava aine on nikotiini. Yksi resoribletti sisältää 2 mg nikotiinia nikotiinibeetadeksinä.
- Muut aineet ovat: beetadeksi, krospovidoni, magnesiumstearaatti, kolloidinen vedetön piidioksidi.

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai lähes valkoinen, litteä, pyöreä tabletti, jonka halkaisija on 6 mm. Tabletin toiselle puolelle on kaiverrettu 'NIC' ja toiselle puolelle '2'.

Pakkauskoot:

30 tai 105 resoriblettia läpipainoliuskassa. Pakaus sisältää annostelijan.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, Vaisalantie 2, 02130 Espoo

Valmistaja

McNeil AB, Norrbroplatsen 2, SE-251 09 Helsingborg, Ruotsi

Tämä pakkaus seloste on tarkistettu viimeksi 15.12.2015

Bipacksedel: Information till användaren

Nicorette Microtab 2 mg resoriblett, sublingual nikotin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte kan sluta röka efter 6 månaders behandling med Nicorette Microtab.

I den här bipacksedelen finns information om följande:

1. Vad Nicorette Microtab är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Nicorette Microtab
3. Hur du använder Nicorette Microtab
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nicorette Microtab skall förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nicorette Microtab är och vad det används för

Nicorette Microtab tillhör en grupp läkemedel som används för att hjälpa dig att sluta röka.

Nikotinet i Nicorette Microtab lindrar nikotinbegär och abstinensbesvär när du slutar röka och motverkar därigenom återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta.

När du plötsligt slutar tillföra kroppen nikotin via tobak drabbas du av olika former av obehag, s.k. abstinensbesvär. Med hjälp av Nicorette Microtab kan du förhindra eller åtmistna minskat dessa obehag genom att du fortsätter tillföra kroppen en liten mängd nikotin under en övergångsperiod.

Råd och stöd ökar chansen att lyckas.

2. Vad du behöver veta innan du använder Nicorette Microtab

Använd inte Nicorette Microtab om du

- är **allergisk** mot nikotin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- är under 12 år
- inte rökt tidigare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Nicorette Microtab om du har:

- nyligen (inom 3 månader) har haft **hjärtinfarkt** eller **stroke**
- **brösts märta** (instabil angina) eller bröstsmärta i vila
- **hjärtsjukdom** som påverkar hjärtfrekvensen eller hjärtrytmen
- obehandlad **högt blodtryck**
- någon gång haft **allergiska reaktioner** i form av svullnad av läppar, ansikte och svalg (angioödem) eller kliande hudutslag (nässelslutsLAG). Nikotinersättningsterapi kan ibland utlösa denna typ av reaktion.
- svår eller måttlig **leversjukdom**
- svår **njursjukdom**

- **diabetes**
- överaktiv **sköldkörtel**
- tumor i **binjuren** (feokromocytom)
- **mag- eller tolvfingertarmssår**
- **inflammation i matstrupen.**

Ungdomar i åldern **12–17 år** skall endast använda Nicorette Microtab efter hälsovårdspersonalens rekommendation. Nicorette Microtab skall inte användas av **icke-rökare**.

Du bör upphöra helt med rökningen under behandlingen med Nicorette Microtab.

En normal dos för vuxna kan allvarligt förgifta eller till och med döda ett barn. Det är därför viktigt att du alltid förvarar Nicorette Microtab resoribletter utom syn- och räckhåll för barn.

Andra läkemedel och Nicorette Microtab

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du tar läkemedel som innehåller:

- **teofyllin** för astma
- **takrin** för Alzheimers sjukdom
- **klozapin** för schizofreni
- **ropinirol** för Parkinsons sjukdom.

Graviditet, amning och fertilitet

Det är mycket viktigt att sluta röka under graviditeten eftersom rökning kan försämra fostrets tillväxt. Rökning kan också leda till förtidig födsel eller till och med dödfödsel. Bäst är att sluta röka utan att använda läkemedel som innehåller nikotin. Om du inte klarar av detta, skall du rådfråga hälsovårdspersonalen innan du använder Nicorette Microtab.

Nicorette Microtab skall undvikas under amning eftersom nikotin överförs i bröstmjölken och kan påverka ditt barn. Om du ammar och läkaren har rekommenderat dig att använda Nicorette Microtab, skall du ta resoribletten genast efter amning, inte inom två timmar före amning.

Rökning ökar risken av infertilitet med kvinnor och män. Effekterna av nikotin på fertilitet är okända.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil eller sköta maskiner har observerats.

3. Hur du använder Nicorette Microtab

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringen skall väljas med utgångspunkt från ditt nikotinberoende.

I början av behandlingen kan 1 resoriblett tas varje till varannan timme. I de flesta fall är 8–12 resoribletter per dag tillräckligt.

Vid högt nikotinberoende eller om du röker mer än 20 cigaretter per dag börja med 2 resoribletter varje till varannan timme. Högst 30 resoribletter per dag bör användas.

Nicorette Microtab skall användas sublingualt, vilket betyder att resoribletten skall placeras under tungan.

Placera resoribletten under tungan och låt den långsamt smälta med hjälp av saliven. Detta tar cirka en halvtimme. Tugga eller svälj inte resoribletten. Faran för förgiftning är emellertid liten om man skulle råka svälja ned resoribletten.

Bruksanvisning



1. Tag ur den runda blisterkartan ur förpackningen.
2. Öppna doseringsasken och placera den runda blisterkartan i doseringsasken med resoribletternas synliga.



3. Stäng doseringsasken och se till att locket stängs ordentligt.
4. Vrid blisterkartan i pilens riktning, till dess att ett klick hörs och/eller känns.
5. Se till att jacketet i blisterkartan befinner sig mitt för trekanten på doseringsasken.
6. Detta betyder att en resoriblett ligger i korrekt läge för att tryckas ut.



7. Tryck ut en resoriblett och placera den under tungan.
8. För frammatning till nästa resoriblett repetera instruktionerna från punkt 4.

Nicorette Microtab skall inte tuggas eller sväljas.

Behandlingstiden är individuell.

Behandlingen bör pågå cirka 2–3 månader. Därefter minskas nikotindosen successivt.

Behandlingen bör avslutas när dosen minskat till 1–2 resoribletter per dag.

Regelbunden användning av Nicorette Microtab längre än 6 månader rekommenderas normalt inte. I vissa fall kan längre behandlingstid vara nödvändig för att undvika återfall till rökning. Överblivna resoribletter bör sparas, eftersom rökbegär plötsligt kan uppkomma.

Om du har använt för stor mängd av Nicorette Microtab

Overdosering med nikotin kan förekomma om du röker samtidigt som du använder Nicorette Microtab.

Om ett barn har tagit Nicorette Microtab eller om du har tagit en för stor mängd av Nicorette Microtab kontakta **omedelbart** läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning. En normal dos för vuxna kan orsaka hos **barn** en allvarlig förgiftning och leda även till **dödsfall**.

Symptom på överdosering är illamående, kräkningar, ökad salivutsöndring, buksmärter, diarré, svettning, huvudvärk, yrsel, hörselförändringar och stark svaghetskänsla. Vid höga doser kan dessutom förekomma sänkning av blodtryck, försvagad och oregelbunden puls, andningssvårigheter, svår utmattning, cirkulatorisk kollaps och kramper.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonalen.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Nicorette Microtab kan orsaka samma biverkningar som andra former av nikotin. Biverkningarna är i regel dosberoende.

Biverkningar som beror på rökstopp (abstinensbesvär)

Vissa av de biverkningar som du upplever när du slutar röka kan vara abstinensbesvär, som uppkommer på grund av minskat nikotinintag:

- irritation, aggression, otålighet, frustration
- ångest, rastlöshet, nedsatt koncentrationsförmåga
- uppvaknande på närtiderna, sömnsvårigheter
- ökad aptit, viktökning
- nedstämdhet
- röksug (nikotinbegär)
- sänkt hjärtfrekvens
- blödningar i tandköttet eller sår i munnen
- yrsel, svaghetskänsla
- hosta, halsont, nästäppa, rinnande näsa
- förstopning.

Biverkningar

Sluta använda Nicorette Microtab och kontakta omedelbart läkare om följande allvarliga sällsynta biverkningar förekommer (symptom på angioödem):

- svullnad av ansiktet, tunga eller svalg
- svårigheter att svälja
- nässelutslag och andningssvårigheter.

Mycket vanliga (hos fler än 1 användare av 10): Hosta, huvudvärk, hicka, illamående, irritation i halsen.

Vanliga (hos färre än 1 användare av 10): Lokala effekter såsom brännande känsla, inflammation i munnen, förändrad smakupplevelse, muntrörelser, ökad salivutsöndring, magsmältningsbesvär, smärta eller obehag i magen, kräkningar, väderspänning, diarré, trötthet, överkänslighet (allergi).

Mindre vanliga (hos färre än 1 användare av 100): Näsbesvär så som nästäppa och nysning, pipande andning (bronkospasm), andningssvårigheter (dyspné), trånghetskänsla i halsen, rodnad, stickning, ökad svettning, besvär i munnen såsom stickning i munnen, inflammation av tunga, sår i munnen, skador av slemhinnorna i munnen, förändrad röst, smärta i munnen eller halsen och rapning, hjärtklappning (en avvikande upplevelse av dina hjärtslag), snabb puls, högt blodtryck, hudutslag och/eller klåda (pruritus, nässelutslag), onormala drömmar, smärta eller obehag i bröstet, matthet, sjukdomskänsla, onormal hjärtrytm, blödande tandkött, rinnande näsa.

Sällsynta (hos färre än 1 användare av 1 000): Svårt att svälja, nedsatt känslighet i munnen, kvälvning.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Dimsyn, ökad tårproduktion (lakrimation), svalgtrörelser, besvär i magtarmkanalen, smärta på läpparna, rodnad i huden, allergisk reaktion inklusive svullnad i ansikte och mun (angioödem och allergisk chock).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55, 00034 Fimea

5. Hur Nicorette Microtab skall förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Nicorette Microtab innehåller

- Den aktiva substansen är nikotin. En resoriblett innehåller 2 mg nikotin i form av nikotinbetadex.
- Övriga innehållsämnen är: betadex, krospovidon, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita till nästan vita, plana, runda, diameter 6 mm, märkta "NIC" på ena sidan och "2" på motstående sida.

Förpackningsstorlekar:

30 eller 105 resoribletter i blisterförpackning med en doseringsask.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, Vaisalavägen 2, 02130 Esbo

Tillverkare

McNeil AB, Norrbroplatsen 2, SE-251 09 Helsingborg, Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast 15.12.2015