

Pakkausseloste: Tie toa käyttäjälle

Acriseu 8 mg / 60 mg kapseli, kova

akrivastiini 8 mg ja pseudoefedriinihydrokloridi 60 mg

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käytämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännny lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
- Tämä lääke on määritty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkienkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Acriseu on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Acriseu-kapseleita
3. Miten Acriseu-kapseleita käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Acriseu-kapseleiden säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Acriseu on ja mihin sitä käytetään

Acriseu-kapseleiden teho perustuu kahden lääkeaineen yhteisvaikutukseen: akrivastiinin, joka on nopeavaikuttainen uuden polven antihistamiini, ja pseudoefedriinin, joka vähentää limakalvojen turvotusta.

Acriseu-kapseleita käytetään allergisen nuhan hoitoon.

Akrivastiinia ja pseudoefedriinihydrokloridia, joita Acriseu sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Acriseu-kapseleita

Älä käytä Acriseu-kapseleita,

- jos olet allerginen akrivastiinille, pseudoefedriinille, triproloidiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista: vaikea sepelvaltimotauti, vaikea verenpainetauti, keskivaika tai vaikea munuaisten vajaatoiminta, kilpirauhasen liikatoiminta, vaikeita sydämen rytmihäiriöitä, virtsaumpi tai kohonnut silmänpaine.
- jos sinulla on ollut aivohalvaus tai riskitekijöitä, jotka voisivat lisätä verenvuotohalvauksen vaaraa.
- jos käytät tai olet käyttänyt ns. MAO:n estäjiä kahden edeltävän viikon aikana.
- jos käytät jo jotain muuta nenän tukkoisuutta vähentävää lääkettä joko suun tai nenän kautta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Acriseu-kapseleita,

- jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista: kohonnut verenpaine, sydänsairaus, diabetes,

kilpirauhasen liikatoiminta, sydämen rytmihäiriötä, kohonnut silmänpaine, suurentunut eturauhanen tai lisämunuaisytimen tai sympaattisen hermoston kasvain, jonka oireita ovat äkilliset verenpaineekohtaukset tai pysyvämpi verenpaineen nousu (feokromosytooma).

- jos sinulla on tai on ollut aivoverisuonisairaus tai riskisi saada se on suuri.
- lopeta tämän lääkevalmisteen käyttö ja käänny lääkärin puoleen välittömästi, jos saat äkillisen vaikean päänsäryyn, pahoinvointia, oksentelua tai näköhäiriötä.
- jos käytät tiettyjä lääkeaineita, ks. kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Acriseu”.
- Acriseu-kapselissa oleva pseudoefedriini antaa positiivisen tuloksen urheilijoiden doping-testissä.
- jos olet menossa allergiateestiin, lopeta Acriseu-kapseleiden käyttö 2 vuorokautta ennen allergiatestausta.
- jos olet yli 60-vuotias, jolloin lääkäri saattaa haluta seurata vointiasi säännöllisesti.
- jos olet menossa nukutuksen vaativaan leikkaukseen, kerro hoitavalle lääkärille Acriseu-hoidostasi. Lääkäri voi joutua keskeyttämään Acriseu-hidon.

Acriseu-valmisten käytön yhteydessä saattaa esiintyä äkillistä vatsakipua tai peräsuolen verenvuotoa paksusuolitulehdusen (iskeeminen kolitti) vuoksi. Jos sinulla ilmenee näitä ruoansulatuskanavan oireita, lopeta Acriseu-valmisten käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai hakeudu terveydenhoitojaksikköön. Katso kohta 4.

Acriseu-valmisten käytön yhteydessä voi ilmetä näköhermon verenkierron heikkenemistä. Jos näkökyysi häviää äkillisesti, lopeta Acriseu-valmisten ottaminen ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai hakeudu lääkärinhoitoon. Ks. kohta 4.

Lapset

Ei alle 12-vuotiaalle lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Acriseu

Kerro lääkärille tai apteekkienhenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Käytä Acriseu-kapseleita varoen, jos käytät

- verenpainelääkeitä (esim. bretylium, betanidiini, guanetidiini, debrisoikiini, metylylidopa ja alfa- ja beetasalpaajat)
- nenän tukkisuutta vähentäviä valmisteita (esim. fenyylipropanolamiini, fenyyliefrioni, ksyloometatsoliini, oksimetatsoliini)
- trisykliciä masennuslääkeitä
- ns. MAO:n estäjiä (masennuksen ja Parkinsonin taudin hoitoon)
- oksatsolidinoni-ryhmän antibiootteja (esim. linetsolidi)
- ruokalahua hillitseviä lääkeitä
- amfetamiinin kaltaisia keskushermostoa piristäviä aineita (psykostimulantteja)
- verisuonia supistavia lääkeitä (esim. bromokriptiini, pergolidi, lisuridi, kabergoliini, ergotamiini tai dihydroergotamiini)
- digitalista
- mahahapollääkeitä (antasideja tai protonipumpun estäjiä) tai kaolinia.

Acriseu alkoholin kanssa

Alkoholi voi muuttaa lääkkeen vaikutuksia joillakin yksilöillä. Vältä runsasta alkoholin käyttöä, kuten yleensäkin, lääkityksen yhteydessä.

Raskaus, imetyks ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Acriseu-valmisten vaikutuksista ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkimustietoa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioda, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana.

Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseleoste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Acriseu-kapseli sisältää laktoosia (sokerityyppi) ja sodiumia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol sodiumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan "sodiumiton".

3. Miten Acriseu-kapseleita käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määränyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille ja yli 12-vuotiaille on 1 kapseli tarvittaessa enintään 3 kertaa vuorokaudessa. Kapselit otetaan suun kautta.

Hoitoajan tulee olla mahdollisimman lyhyt ja hoito tulee lopettaa, kun oireet ovat hävinneet. On suositeltavaa rajoittaa hoito noin 10 päivään.

Käyttö lapsille

Ei alle 12-vuotiaalle lapsille.

Jos otat enemmän Acriseu-kapseleita kuin sinun pitäisi

Acriseu-kapseleiden yliannostus saattaa aiheuttaa ärtymisyyttä, rauhattomuutta, vapinaa, kouristelua, sydämentykyksiä, verenpaineen nousua ja virtsaamisvaikeuksia.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Acriseu-kapselin

Jos unohdat ottaa kapselin, ota se heti kun muistat asian. Älä otta kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kapselin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla kymmenestä)

- uneliaisuus.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta)

- suun kuivuminen, pahoinvoindi, oksentelu
- heitehuimaus; hermostuneisuus; unihäiriöt, mukaan lukien unettomuus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta)

- yliherkkyyssreaktiot ihottumasta anafylaksiaan
- kiihtyneisyys, rauhattomuus, hallusinaatiot
- äkillinen yleistynyt märkäraakkulainen ihottuma (turvonnut punainen ihoalue, jossa on runsaasti pieniä rakkuloita), allerginen ihotulehdus, ihottuma

- virtsaamisvaikeudet, virtsaumpi
- aivojen takaosan encefalopatiaoireyhtymä (posterior reversible encephalopathy eli PRES) ja ohimenevä aivojen vasokonstriktio-oireyhtymä (reversible cerebral vasoconstriction syndrome eli RCVS). Oireita voivat olla päänsärky, sekavuus, kouristuskohtaukset ja/tai näköhäiriöt.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta)

- sydämen tiheälyöntisyys, sydämentykytys
- verenpaineen nousu.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyyden arviointiin)

- ahdistuneisuus
- päänsärky, vapina
- riittämättömästä verenkierrosta johtuva paksusuolitulehdus (iskeeminen kolitti).
- heikentynyt näköhermon verenkierto (iskeeminen optikusneuropatia)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Acrise u-kapseleiden säilyttäminen

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Acrise u-kapselit sisältävät

- Vaikuttavat aineet: akrivastiinia 8 mg ja pseudofedriinihydrokloridia 60 mg (vastaten 49,2 mg pseudofedriiniä) yhdessä kapselissa.
- Muut aineet: laktosimonohydraatti, natriumtärkellysglykolaatti, magnesiumstearaatti, liivate, titaanidioksidi (E 171).

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkaukoot

Valkea, kova gelatiinikapseli. Kapselin koko on noin 16 x 6 mm.

24, 48 ja 96 kapselia läpipainopakkauksessa (PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkaus).

Kaikkia pakkaukokoja ei välittämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

DK-5260 Odense S

Tanska

Valmistaja

ExtractumPharma Co. Ltd.

IV. körzet 6

6413 Kunfehértó

Unkari

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

info@orifarm.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01.06.2021

Bipacksedel: Information till användare n

Acriseu 8 mg / 60 mg kapsel, hård

akrivastin 8 mg och pseudoefedrinhydroklorid 60 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I den här bipackse del finns information om följande :

1. Vad Acriseu är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Acriseu
3. Hur du använder Acriseu
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Acriseu ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Acriseu är och vad det används för

Effekten av Acriseu kapslar baserar sig på samverkan av två läkemedel: akrivastin, som är ett snabbverkande antihistamin av en ny generation, och pseudoefedrin, som minskar på svullnaden i slemhinnorna.

Acriseu kapslar används vid behandling av allergisk snuva.

Akrivastin och pseudoefedrinhydroklorid som finns i Acriseu kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Acriseu

Använd inte Acriseu kapslar

- om du är allergisk mot akrivastin, pseudoefedrin, triprolidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har någon av de följande sjukdomarna: svår kranskärlssjukdom, svår blodtryckssjukdom, moderat eller svårt nedsatt njurfunktion, överaktiv sköldkörtel, svåra hjärtrytmstörningar, urinstopp eller ökat tryck i ögat.
- om du har haft slaganfall eller riskfaktorer som kunde öka risken att få slaganfall pga. hjärnbödning.
- om du använder eller har använt s.k. MAO-hämmare under de föregående två veckorna.
- om du redan använder något annat läkemedel mot tilläppt näsa, antingen via munnen eller via näsan.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Acriseu.

- om du har någon av de följande sjukdomarna: förhöjt blodtryck, hjärtsjukdom, diabetes, överaktiv sköldkörtel, hjärtrytmstörningar, ökat tryck i ögat, förstorad prostata eller en tumör i binjuremärgen eller det sympatiska nervsystemet med symtom på plötsliga

- blodtrycksfluktuationer eller en mer hållande förhöjning av blodtrycket (feokromocytom).
- om du har eller har haft en sjukdom i hjärnans blodkärl (cerebrovaskulär sjukdom) eller löper hög risk att få en sådan sjukdom.
- sluta använda detta läkemedel och kontakta genast läkare om du får plötslig svår huvudvärk, illamående, kräkningar eller synstörningar.
- om du använder vissa läkemedel, se avsnitt ”Andra läkemedel och Acriseu”.
- pseudoefedrinet i Acriseu kapslar ger positivt utslag i idrottarnas doping-test.
- avsluta behandlingen med Acriseu kapslar 2 dygn före planerat allergitest.
- om du är över 60 år, kan din läkare vila kontrollera dig regelbundet.
- om du ska genomgå en operation som kräver anestesi, berätta för den vårdande läkaren om din Acriseu behandling. Läkaren måste kanske avbryta Acriseu behandlingen.

Plötslig buksmärta eller ändtarmsblödning kan förekomma med Acriseu, på grund av inflammation i tjocktarmen (ischemisk kolit). Sluta ta Acriseu om du upplever dessa symtom från magtarmkanalen och kontakta omedelbart läkare eller uppsök sjukvård. Se avsnitt 4.

En minskning av blodflödet till synnerven kan förekomma med Acriseu. Om du upplever plötslig synförlust ska du sluta ta Acriseu och kontakta din läkare eller söka vård omedelbart. Se avsnitt 4.

Barn

Ej för barn under 12 år.

Andra läkemedel och Acriseu

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Använd Acriseu kapslar med försiktighet om du använder

- blodtryckssänkande läkemedel (t.ex. bretylium, betanidin, guanetidin, debrisoquin, metyldopa och alfa- och betablockerare)
- läkemedel mot tilläppt näsa (t.ex. fenylpropanolamin, fenylefrin, xylometazolin, oximetazolin)
- tricykliska antidepressiva
- s.k. MAO-hämmare (mot depression och Parkinsons sjukdom)
- antibiotika av typ oxazolidinon (t.ex. linezolid)
- aptithämmande läkemedel
- amfetaminliknande CNS stimulerande läkemedel (psykostimulantia)
- läkemedel som sammandrar blodkärl (t.ex. bromokriptin, pergolid, lisurid, kabergolin, ergotamin eller dihydroergotamin)
- ~~digitalis~~
- magsyrenedsättande läkemedel (antasider eller protonpumps hämmare) eller kaolin.

Acriseu med alkohol

Alkohol kan förändra effekten av läkemedlet hos några individer. Såsom i allmänhet under medicinering, bör rikligt alkoholbruk undvikas.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Det finns ingen data beträffande fertilitet hos mänskliga och behandling med Acriseu.

Körförstående och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förstående i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Acrise u kapslar innehåller laktos (en sockerart) och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

3. Hur du använder Acrise u

Använd ~~alltid~~ detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år är 1 kapsel vid behov, högst 3 kapslar om dygnet. Kapslarna ska tas via munnen (oralt).

Behandlingstiden ska vara så kort som möjligt och behandlingen ska avbrytas när symptommen har försvunnit. Det rekommenderas att begränsa behandlingen till cirka 10 dagar.

Användning för barn

Ej för barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Acrise u kapslar

Överdosering av Acriseu kapslar kan orsaka irritation, orolighet, skakning, kramper, hjärtskakningar, förhöjt blodtryck och svårigheter att urinera.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Acrise u kapseln

Om du glömmer att ta kapseln, ta den så snart du kommer ihåg. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)
- sömnighet.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- munorrhett, illamående, kräkningar
- svindel, nervositet, sömnstörningar inklusive sömnlöshet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

- överkänslighetsreaktioner från utslag till anafylaxi
- upphetsning, rastlöshet, hallucinationer
- akut generaliserad pustulos hudutslag (rött, svullet område med många små varblåsor), allergisk hudinflammation, hudutslag
- svårigheter att urinera, urinstopp
- posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES) och reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom (RCVS). Symtomen kan vara huvudvärk, förvirring, kramper och/eller visuella störningar.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

- för snabb hjärtrytm, hjärtklappning
- förhöjt blodtryck.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

- ångest
- huvudvärk, tremor
- inflammation av tjocktarmen på grund av otillräcklig blodtillförsel (ischemisk kolit).
- minskat blodflöde till synnerven (ischemisk optikusneuropati)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Acriseu ska förvaras

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningsinnehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna i en kapsel är akrivastin 8 mg och pseudoefedrinhydroklorid 60 mg (motsvarande 49,2 mg pseudoefedrin).
- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

En vit, hård gelatinkapsel. Kapselns storlek är cirka 16 x 6 mm.

24, 48 och 96 kapslar i blister (PVC/PVDC/aluminium blistersförpackningar).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

Tillverkare
ExtractumPharma Co. Ltd.
IV. körzet 6
6413 Kunfehértó
Ungern

Denna bipacks edel ändrade senast 01.06.2021