

Pakkausseloste: Tie toa käyttäjälle

Casodex® 150 mg tabletti, kalvopäälysteinen bikalutamidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännny lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Casodex 150 mg on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Casodex 150 mg tabletteja
3. Miten Casodex 150 mg tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Casodex 150 mg tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Casodex 150 mg on ja mihin sitä käytetään

Casodex 150 mg tabletteja käytetään eturauhassyövän hoitoon.

Eturauhassyövän kasvu on riippuvaltaa mm. miessukuhormoneista, androgeeneista. Casodex on ns. antiandrogeeni, joka estää luonnollisen androgeenin syöpäkasvaimen kasvua edistävän vaikutuksen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Casodex 150 mg tabletteja

Älä käytä Casodex 150 mg tabletteja

- jos olet allerginen bikalutamidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos olet nainen tai lapsi
- jos käytät lääkeitä, jotka sisältävät terfenadiinia tai astemitsolia (allergialääkkeitä) tai sisapridia (ruoansulatushäiriöiden tai näristyksen hoitoon tarkoitettu lääke).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Casodex 150 mg tabletteja:

- jos sinulla on jokin sydän- tai verisuonisairaus, kuten sydämen rytmihäiriö (arytmia), tai sinua hoidetaan lääkkeillä sen takia. Sydämen rytmihäiriön riski voi kasvaa kun käytetään Casodexia.
- jos sinulla on jokin maksasairaus
- jos sinulla on diabetes (voi vaikuttaa veren sokeripitoisuuteen)
- jos käytät muita lääkeitä, erityisesti jos käytät verenohennislääkkeitä tai lääkeitä, jotka estävät verta hyytymästä
- jos käytät Casodex-valmistetta, sinun ja/tai kumppanisi on käytettävä raskauden ehkäisyä Casodex-hoidon aikana ja 130 vuorokautta hoidon päättymisen jälkeen. Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on kysymyksiä raskauden ehkäisystä.

Muut lääkevalmisteet ja Casodex

Casodexin ja tiettyjen muiden lääkkeiden samanaikainen käyttö voi vaikuttaa hoidon tehoon. Kerro lääkärille tai apteekkikenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkeitä, myös lääkeitä, joita lääkäri ei ole määränyt. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät

- verenohennuslääkeitä, kuten varfariinia
- siklosporiinia
- kalsiumnestäjiä (sydän- ja verenpainelääkeitä)
- simetidiiniä (mahahaavalääke)
- ketokonatsolia (sieni-infektiolääke).

Casodexilla voi olla yhteisvaikutuksia joidenkin sydämen rytmihäiriön hoitoon käytettyjen lääkkeiden kanssa (esim. kinidiini, prokaiamiidi, amiodaroni ja sotaloli) tai lisätä riskiä sydämen rytmihäiriöön kun sitä käytetään joidenkin muiden lääkkeiden kanssa (esim. metadoni (käytetään kivun lievityksen ja huumeriippuvuuden katkaisuhoitoon), moksifloksasiini (antibiootti), psykkisten sairauksien hoitoon käytettäväät psykoosilääkeet).

Casodex ruoan ja juoman kanssa

Casodex tabletteja voi ottaa ruoan ja juoman kanssa.

Raskaus, imetyks ja hedelmällisyys

Naisten ei tule käyttää Casodexia, eikä sitä saa antaa raskaana oleville tai imettäville naisille.

Casodex saattaa vaikuttaa miesten hedelmällisyyteen. Tämä vaikutus on mahdollisesti palautuva.

Ajamineen ja koneiden käyttö

On epätodennäköistä, että Casodex vaikuttaa kykyisi ajaa autoa tai käyttää koneita. Jotkut potilaat voivat tilapäisesti tuntea uneliaisuutta. Tällaisissa tapauksissa ota yhteyttä lääkäriin.

Casodex sisältää laktoosia

Casodex sisältää laktoosia (maitosokeria). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokerointoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Täydellinen apuaineeluettelo ks. kohta 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa.

Casodex sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten Casodex 150 mg tabletteja käytetään

Käytä tästä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määränyt. Tarkista ohjeet lääkärliltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavallinen annos on yksi tabletti kerran päivässä. Lue pakkauksen ohjelipuke.

Tabletit niellään kokonaисina nesteen kera. Pyri ottamaan lääkkeesi suunnilleen samaan aikaan joka päivä. Älä lopeta lääkkeen käyttöä, vaikka tuntisit olosi terveeksi, ellei lääkäri tähän kehota.

Jos otat enemmän Casodexia kuin sinun pitäisi

- Jos olet ottanut liian suuren annoksen, ota yhteys lääkäriin, lähimpään sairaalaan tai Myrkystytietokeskukseen, puhelin 0800 147 111.
- Yliannostustapauksessa annetaan oireiden mukainen hoito.

Jos unohdat ottaa Casodexia

- Jos unohdat ottaa päiväännes, älä ota sitä muistaessasi, vaan odota seuraavaan lääkkeenottokertaan
- Älä otta kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota yhteys lääkärin tai sairaalaan **välittömästi**, jos koet jotakin seuraavista haittavaikutuksista:

- vakava hengitysvaiseus, johon mahdollisesti liittyy kuumetta ja yskää. Jotkut potilaat voivat sairastua interstitiaalikeuhkokuumuuksi kutsuttuun keuhkotulehduseen
- voimakasta kutinaa (johon liittyy rakkuloita) tai kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotus, jotka aiheuttavat nielemisvaikeuksia
- verivirtsaisuus
- vatsakivut
- ihmisen ja silmien keltaisuus (keltatauti).

Ota yhteys lääkärin, jos sinulla on esiintynyt seuraavia haittavaikutuksia tai jos sinulla on muita ongelmia lääkyksen kanssa.

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä):

- ihottuma
- rintojen arkuus, rintojen suurentuminen
- voimattomuus.

Yleiset (1–10 potilaalla sadasta):

- anemia
- ruokahalun heikkeneminen (anoreksia)
- seksuaalisen halun ja kyyvyn väheneminen, masennus
- heitehuimaus, uneliaisuus
- kuumat aallot
- vatsakivut, ummetus, ruokailunjälkeiset vatsavaivat, ilmavaivat, pahoinvoiointi
- muuttuneet maksa-arvot, ihmisen ja silmien keltaisuus (keltatauti)
- hiusten ja karvojen lähtö tai uudelleen kasvu, ihmisen kuivuminen, kutina
- verivirtsaisuus
- impotenssi
- rintakivut, turvotus
- painonrousu.

Melko harvinaiset (1-10 potilaalla tuhannesta):

- yliherkkyyssreaktiot kuten kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotus, nokkosihottuma
- keuhkotulehdus (interstitiaalikeuhkokume).

Harvinainen (1-10 potilaalla kymmenestä tuhannesta):

- maksan vajaatoiminta
- ihmisen lisääntynyt herkkyyys auringonvalolle.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

- muutokset EKG:ssä (QT-ajan pidentyminen).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienhenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivuston: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

5. Casodex 150 mg tabletien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä pakkaussessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Casodex 150 mg tabletit sisältävät

- Vaikuttava aine on bikalutamidi. Yksi Casodex 150 mg tabletti sisältää 150 mg bikalutamidia.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), povidoni, magnesiumstearaatti, hypromelloosi, makrogoli 300 ja titaanidioksiidi (väriaine E171).

Lääkevalmisten kuvaus ja pakauskoot

Valkoinen, pyöreä, kupera, kalvopäällysteinen tabletti, merkintä 150 mg / Casodex logo.

Pakauskoot: 28 (kalenteripakaus) ja 30 tablettia läpipainopakkaukset.

Kaikkia pakauskokoa ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvanhaltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals, 149 boulevard Bataille de Stalingrad, 69100 Villeurbanne, Ranska

Valmistaja: AstraZeneca AB, Södertälje, Ruotsi tai Corden Pharma GmbH, Plankstadt, Saksa

Tämä pakaus seloste on tarkistettu viimeksi 01.12.2021

Bipacksedel: Information till användaren

Casodex® 150 mg, tablett, filmdrage rad

bikalutamid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipackse del finns information om:

1. Vad Casodex 150 mg är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Casodex 150 mg tablett
3. Hur du använder Casodex 150 mg tablett
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Casodex 150 mg tablett ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Casodex 150 mg är och vad det används för

Casodex 150 mg tablett används för behandling av prostatacancer.

För prostatatumörers tillväxt behövs bl.a. stimulering av manliga könshormoner (androgener). Casodex är en så kallad antiandrogener och förhindrar den stimulering, som utövas av naturligt androgen.

2. Vad du behöver veta innan du tar Casodex 150 mg tablett

Använd inte Casodex 150 mg tablett

- om du är allergisk mot bikalutamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du är kvinna eller barn
- om du tar läkemedel som innehåller terfenadin eller astemizol (antiallergika), cisaprid (läkemedel mot matsmältningsproblem eller halsbränna).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Casodex 150 mg tablett:

- om du har någon hjärtkärlsjukdom inklusive hjärtrytmrubbningar (arytmia), eller om du tar medicin mot detta. Risken för att drabbas av hjärtrytmrubbningar kan vara förhöjd när man använder Casodex.
- om du har någon sjukdom som påverkar levern
- om du har diabetes (kan påverka mängden glukos i blodet)
- om du använder andra läkemedel. Tala om för läkare särskilt om du använder blodförtunnande läkemedel eller läkemedel som förhindrar blodet att koagulera
- om du tar Casodex, måste du och/eller din partner använda preventivmedel under behandling med Casodex och 130 dagar efter avslutad behandling. Tala med läkare om du har några frågor om preventivmedel.

Andra läkemedel och Casodex

Effekten av behandlingen kan påverkas om Casodex och vissa andra mediciner tas samtidigt. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är speciellt viktigt om du tar

- blodförtunnande läkemedel, t.ex. warfarin
- ciklosporin
- kalciumantagonister (läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdom)
- cimetidin (läkemedel mot magsår)
- ketokonazol (läkemedel mot svampinfektion).

Casodex kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det används tillsammans med andra läkemedel (t.ex. metadon (används mot smärta och vid behandling av drogberoende), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika (används mot allvarlig psykisk sjukdom)).

Casodex med mat och dryck

Casodex tablett kan tas med mat och dryck.

Graviditet, amning och fertilitet

Casodex ska inte användas av kvinnor och får inte ges till kvinnor som är gravida eller ammar.

Casodex kan ha en effekt på manlig fertilitet. Denna effekt är eventuellt reversibel.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte sannolikt att Casodex påverkar din körförmåga eller förmåga att använda maskiner. Vissa patienter kan tillfälligtvis uppleva sömnighet. Om det inträffar, rådgör med läkare.

Casodex innehåller laktos

Casodex innehåller laktos som är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. För komplett lista över innehållsämnen se avsnitt 6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar.

Casodex innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

3. Hur du använder Casodex 150 mg tablett

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är en tablett per dag. Läs etiketten som finns på förpackningen.

Tabletterna bör sväljas hela, tillsammans med vätska. Försök att ta dina mediciner vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Sluta inte ta din medicin, även om du känner dig bra, såvitt du inte uppmanas direkt av din läkare att sluta.

Om du har tagit för stor mängd av Casodex

- Om du tagit alltför stor dos, kontakta läkare, närmaste sjukhus eller Giftinformationscentralen, tel. 0800 147 111.
- Vid överdosering är behandlingen symptomatiskt.

Om du har glömt att ta Casodex

- Om du glömmer en dos, tag den då inte när du kommer ihåg detta utan vänta till nästa ordinarie doseringstillfälle.
- Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta din läkare eller uppsök medicinsk vård **omödelbart** om du upplever någon av följande biverkningar:

- allvarliga andningssvårigheter, möjligt med hosta eller feber. Vissa patienter kan drabbas av en typ av lunginflammation som kallas interstitiell lungsjukdom
- allvarlig klåda (med blåsor) eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg som kan orsaka svårigheter av svälja
- blod i urinen
- magsmärta
- gulaktig färg på huden och i ögonen (gulsot).

Tala om för din läkare om du har haft några av följande biverkningar eller andra problem med din medicin.

Mycket vanliga (fler än 1 av 10 patienter):

- hudutslag
- ömhet i brösten, bröstförstoring
- kraftlöshet.

Vanliga (1-10 patienter av hundra):

- anemi
- minskad aptit (anorexi)
- nedsatt sexuell lust och förmåga, depression
- yrsel, sömnighet
- värmevallningar
- magsmärter, förstopning, magbesvär efter måltiden, gasbildning, illamående
- förändrade levervärdens, gulfärgad hud eller ögon (gulsot)
- hårväfall eller ökad hårväxt, torr hud, klåda
- blod i urinen
- impotens
- smärta i bröstkorgen, svullnad
- viktökning.

Mindre vanliga (1-10 patienter av tusen):

- överkänslighetsreaktioner såsom svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, nässelutslag
- lungsjukdom (interstitiell lunginflammation).

Sällsynta (1-10 patienter av tiotusen):

- leversvikt
- hudens ökade känslighet mot solljus.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

- förändringar (QT-förlängning) i EKG (elektrokardiogram).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55,
00034 FIMEA

5. Hur Casodex 150 mg tabletter ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är bikalutamid. En Casodex 150 mg tablett innehåller 150 mg bikalutamid.
- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, natriumstarkelseglykolat (typ A), povidon, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 300 och titandioxid (färgämne E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund, konvex, filmdragerad tablett, som är märkt med 150 mg / Casodex logo.

Förpackningsstorlekar: 28 (kalenderförpackning) och 30 tablett i blisterförpackningar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals, 149 boulevard Bataille de Stalingrad, 69100 Villeurbanne, Frankrike

Tillverkare: AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige eller Corden Pharma GmbH, Plankstadt, Tyskland

Den här bipacksedeln ändrades senast 01.12.2021