

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 8 mg/12,5 mg tabletit

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 16 mg/12,5 mg tabletit

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 32 mg/12,5 mg tabletit

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 32 mg/25 mg tabletit

kandesartaanisileksitiili/hydrokloritiatsidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävästä, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Katso kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten on ja mielin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tabletteja
3. Miten Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten on ja mielin sitä käytetään

Sinulle määrityn lääkkeen nimi on Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten. Sitä käytetään aikuispolilaisten kohonneen verenpaineen (hypertension) hoitoon. Se sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, kandesartaanisileksitiiliä ja hydrokloritiatsidia. Ne vaikuttavat yhdessä alentaen verenpainetta:

- Kandesartaanisileksitiili kuuluu ns. angiotensiini II -reseptorin salpaajiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Se rentouttaa ja laajentaa verisuonia. Tämä auttaa alentamaan verenpainetta.
- Hydrokloritiatsidi kuuluu diureeteiksi eli nesteenpoistolääkkeiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Se auttaa kehoa poistamaan nestettä ja suoloja, esimerkiksi natriumia, lisäämällä niiden erityistä virtsaan. Tämä auttaa alentamaan verenpainetta.

Lääkäri voi määrätkin sinulle Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-valmistetta, jos verenpainettasi ei ole saatu hyväksi hoitotasapainoon pelkällä kandesartaanisileksitiilillä tai hydrokloritiatsidilla.

Kandesartaanisileksitiilia ja hydrokloritiatsidia, jota Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tabletteja

Älä käytä Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten:

- jos olet allerginen kandesartaanisileksitiilille tai hydrokloritiatsidille tai jollekin muulle tämän lääkkeen sisältämälle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

- jos olet allerginen sulfonamidilääkkeille. Jos et ole varma, koskeko tämä sinua, keskustele asiasta lääkärin kanssa.
- jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta. (Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tablettien käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana, ks. kohta Raskaus)
- jos sinulla on vakavia munuaisongelmia
- jos sinulla on vakava maksasairaus tai sappitietukos (sappinesteen vapautuminen sappirakosta heikentynyt).
- jos sinulla on jatkuvasti alhaiset veren kaliumtasot
- jos sinulla on jatkuvasti korkeat veren kalsiumtasot
- jos sinulla on jokus ollut kihti.
- jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä.

Jos et ole varma, koskeko jokin yllä mainituista sinua, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkienkilökunnalta ennen Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tablettien käyttöä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin käytät

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten

- jos sinulla on diabetes
- jos sinulla on sydän-, maksa- tai munuaisongelmia
- jos sinulle on äskettäin tehty munuaisensiitto
- jos oksentelet tai sinulla on hiljattain ollut voimakkaita oksennuskohtauksia tai sinulla on ripuli
- jos sinulla on Connin oireyhtymäksi kutsuttu lisämunuaisen sairaus (jota kutsutaan myös primaariseksi hyperaldosteronismiksi)
- jos sinulla jokus on ollut sairaus nimeltä systeeminen lupus erythematosus (SLE)
- jos sinulla on alhainen verenpaine
- jos sinulla on aiemmin ollut aivohalvaus
- jos sinulla on ollut allergia tai astma.
- jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
 - ACE:n estääjä (esimerkiksi enalapriili, lisinopriili, ramipriili), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia
 - aliskireeni
- jos sinulla on ollut ihosyöpä tai jos sinulle kehittyy yllättävä ihmutoutos hoidon aikana. Hydroklooritiatsidilla annettava hoito, etenkin sen pitkäaikainen käyttö suurilla annoksilla, saattaa suurentaa tietytyyppisten iho- ja huulisyöpien (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä) riskiä. Suojaa ihosi auringonvalolta ja UV-säteiltä, kun käytät Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-valmistetta.
- jos sinulla on näön heikkenemistä tai silmäkipua. Nämä voivat olla oireita nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effusio) tai lisääntyneestä silmänpaineesta ja voivat ilmetä tunneista viikkoihin Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten ottamisen jälkeen. Tämä voi hoitamatta johtaa pysyvään näkökyvyn menetykseen. Riski saattaa olla suurennut, jos sinulla on aiemmin ollut penisilliini- tai sulfonamidiallergia.
- jos sinulla on aiemmin ollut hengitysvaikeuksia tai keuhko-ongelmia (esimerkiksi tulehdus tai nesteen kertyminen keuhkoihin) hydroklooritiatsidin saannin jälkeen. Jos sinulle kehittyy vaikea hengenahdistus tai hengitysvaikeuksia Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten -valmisteen ottamisen jälkeen, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla ilmenee vatsakipua, pahoinvointia, oksentelua tai ripulia Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten ottamisen jälkeen. Lääkäri päättää hoidon jatkamisesta. Älä lopeta Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten ottamista oma-aloitteisesti.

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesit toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyytiin (esim. kaliumin) määräin säännöllisesti.

Katso myös kohdassa "Älä käytä Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tabletteja" olevat tiedot.

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tabletteja ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen käytettyä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapselleesi (ks. kohta Raskaus).

Lääkärisi voi pyytää sinut vastaanotolle useammin ja tehdä joitakin lisätutkimuksia, jos sinulla on jokin edellä mainituista sairauksista.

Jos olet menossa leikkaukseen, kerro lääkärille tai hammaslääkärille, että käytät Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten, sillä Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten voi aiheuttaa verenpaineen laskun, jos sitä käytetään yhdessä joidenkin anestesia-aineiden kanssa.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten voi lisätä ihmisen herkkyyttä auringonvalolle.

Lapset ja nuoret

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tablettien käytöstä alle 18-vuotiaalle lapsille ei ole kokemusta, siksi sitä ei pidä antaa lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten

Kerro lääkärille tai apteekkikenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä. Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten voi muuttaa muiden lääkevalmisteiden vaikutusta, ja muut lääkevalmisteet voivat muuttaa Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten -tablettien vaikutusta. Jos käytät tiettyjä lääkkeitä, lääkäri saattaa tehdä verikokeita aika ajoin.

Kerro lääkärille erityisesti, jos käytät joitain seuraavista lääkkeistä:

- muut verenpainetta alentavat lääkkeet, mukaan lukien beetasalpaajat, aliskireeniä sisältävät lääkevalmisteet, diatsoksiidi ja angiotensiinikonverteerasiin eli ACE:n estäjät kuten enalapriili, kaptopriili, lisinopriili tai ramipriili
- ei-steroidaaliset tulehduskipulääkkeet (NSAID-lääkkeet eli lääkkeet, jotka lievittävät kipua ja tulehdusta) kuten ibuprofeeni, naprokseeni, diklofenaakki, selekoksibi tai etorikoksibi
- asetyylisalisyylihappo (jos otat yli 3 grammaa vuorokaudessa) (lääke, joka lievittää kipua ja tulehdusta)
- kaliumlisät tai kaliumia sisältävät suolan korvikkeet (lääkkeet, jotka nostavat veren kalumpitoisuutta)
- kalsium- tai D-vitamiinilisät
- kolesterolia alentavat lääkkeet kutenコレストロリーオリ、コレストロリーマイニ
- diabeteslääkkeet (tabletit ja insuliini)
- sydämen rytmia säätelyvät lääkkeet (rytmihäiriölääkkeet) kuten digoksiini ja beetasalpaajat
- lääkkeet, joiden vaikuttuksen veren kalumpitoisuus voi vaikuttaa, kuten tietty psykoosilääkkeet
- hepariini (verenohennuslääke)
- nesteenpoistotabletit (diureetit)
- laksatiivit (ulostuslääkkeet)
- penisilliini tai kotrimoksatsoli (trimetopriimi/sulfametoksatsoli) (antibiootteja)
- amfoterisiini (sieni-infektioiden hoitoon käytetty lääke)
- litium (mielenterveysongelmien hoitoon käytetty lääke)
- steroidit, kuten prednisoloni
- aivolisäkehormoni (ACTH)
- syöpälääkkeet
- amantadiini (Parkinsonin taudin tai vaikeiden virusinfektioiden hoitoon tarkoitettu lääke)
- barbituraatit (rahuhoittava lääke, jota käytetään myös epilepsian hoitoon)
- karbenoksoloni (ruokatorven sairauksien tai suun haavaumien hoitoon käytetty lääke)
- antikolinergiset aineet, kuten atropiini ja biperideeni
- siklosporiini (elinsiirtojen yhteydessä käytetty lääke siirteen hyljinnän ehkäisyyn)
- muut lääkkeet, jotka voivat voimistaa verenpainetta alentavaa vaikutusta, esim. baklofeeni (spastisuutta vähentävä lääke), amifostiini (syöpälääke) ja tiettyt psykoosilääkkeet.

Lääkäri voi joutua muuttamaan annostasi ja/tai tekemään joitain muita varotoimenpiteitä:

- jos otat ACE-estäjää tai aliskireeniä (katso myös tietoa kohdasta ”Älä käytä Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten” ja ”Varoitukset ja varotoimet”).

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten ruuan ja juoman kanssa

- Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tabletit voidaan ottaa ruuan kanssa tai sellaisenaan.
- Kun sinulle määritään Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten, keskustele lääkärin kanssa alkoholin käytöstä. Alkoholi voi saada sinut tuntemaan pyöritystä tai huimausta.

Raskaus ja imetyks

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana ([tai saatat tulla raskaaksi](#)). Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tablettien käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasti raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tablettien sijasta. Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tabletteja ei suositella käytettäväksi raskauden aikana ja sitä ei saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapselleesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Imetyks

Kerro lääkärille jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-lääkkeen käyttöä ei suositella imettäville äideille ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Joillakin ihmisillä voi esiintyä väsymystä tai huimausta Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-valmisten käytön aikana. Jos näin tapahtuu, älä aja ajoneuvoa tai käytä työkaluja tai koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioda, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tabletit sisältävät laktoosia

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tabletit sisältävät laktoosia (maitosokeria). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkäri kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tabletteja käytetään

Ota tästä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määränyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

On tärkeää, että otat Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten -tablettisi joka päivä.

- Suositeltu Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa.
- Niele tabletti kokonaisena veden kanssa.
- Pyri ottamaan tabletti aina samaan aikaan päivästä. Näin lääkkeen oton muistaminen on helpompaa.

Jos otat enemmän Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähjeiden saamiseksi.

Jos unohtat ottaa Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Ota seuraava annos normaalisti.

Jos lopetat Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-valmisteen käytön

Jos lopetat Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tablettien käytön, verenpaineesi saattaa jälleen nousta. Älä tämän vuoksi lopeta lääkkeen käyttöä ilman, että keskustelet siitä ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on lisää kysyttävää tästä lääkkeestä, käänny lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. On tärkeää, että tiedät millaisia nämä haittavaikutukset voivat olla. Jotkin Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-valmisteen aiheuttamat haittavaikutukset johtuvat kandesartaanisileksitiilistä ja jotkut taas hydroklooritiatsidista.

Lopeta Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tablettien käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista allergisista oireista:

- hengitysvaikeudet, joihin voi liittyä kasvojen, hулten, kielen ja/tai kurkun turvotusta
- kasvojen, hулten, kielen ja/tai kurkun turpoaminen, mikä voi aiheuttaa nielemisvaikeuksia
- vaikea ihon kutina (ja kohoumat).

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten voi aiheuttaa veren valkosolujen määrän alenemista. Tällöin vastustuskykysi tulehuksia vastaan voi alentua, ja sinulla voi esiintyä väsymystä, jokin tulehdus tai kuumetta. Jos niitä esiintyy, ota yhteys lääkäriin. Lääkäri saattaa aika ajoin tehdä verikokeita, joilla voidaan selvittää, vaikuttaako Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten veren soluihin (agranulosytoosi).

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

- muutokset verikokeiden tuloksissa:
 - veren natriumpitoisuuden aleneminen. Vaikeissa tapauksissa voi esiintyä heikkoutta, voimattomuutta ja lihaskramppuja
 - kohonnut tai laskenut veren kaliumpitoisuus, etenkin jos sinulla jo on munuaisongelmia tai sydämen vajaatoiminta. Vaikeissa tapauksissa voi esiintyä väsymystä, heikkoutta, epäsäännöllistä sydämen rytmää tai pistelyä.
 - veren kolesteroli-, sokeri- tai virtsahappopitoisuuden kohoaminen
- sokeria virtsassa
- heite- tai kiertohuimaus tai heikotus
- päänsärky
- hengitystieinfektio.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

- alhainen verenpaine. Se voi aiheuttaa heikkouden tunnetta tai huimausta.
- ruokahaluttomuus, ripuli, ummetus, mahan ärsytyks
- ihottuma, nokkosihottuma (urtikaria), valoherkkyyshottuma

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta)

- keltatauti (ihon tai silmänvalkuisten kellastuminen). Jos tästä esiintyy, ota välittömästi yhteys lääkäriin
- vaikutukset munuaisten toimintaan etenkin, jos sinulla ennestään on jo munuaisongelmia tai sydämen vajaatoiminta

- univaikeudet, masennus, levottomuuus
- pistely tai kihelmointi käissä tai jaloissa
- hetkellinen näön sumentuminen
- epäsäännöllinen sydämen rytmı
- hengitysvaikeudet (mukaan lukien keuhkotulehdus ja nesteen kertyminen keuhkoihin)
- kuume
- haimatulehdus (aiheuttaa kohtalaista tai voimakasta vatsakipua)
- lihaskrampit
- verisuonten vaurioituminen, mikä näkyy punaisina tai sinipunaisina pisteinä iholla
- veren punasolujen, valkosolujen tai verihiutaleiden määärän aleneminen. Saatat havaita väsymystä, infektioita, kuumetta tai mustelmataipumusta Saatat havaita väsymystä, infektioita, kuumetta tai mustelmataipumusta.
- nopeasti kehittyvä vaikea ihottuma, johon liittyy ihan hilseilyä tai rakkulointia sekä mahdollisesti suun rakkulointia

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

- kasvojen, hulten, kielen ja/tai kurkun turpoaminen
- kutina
- selkä-, lihas- tai nivelkivut
- muutokset maksan toiminnassa, mukaan lukien maksatulehdus (hepatiitti). Saatat havaita väsymystä, ihan ja silmänvalkuisten kellaristumista ja flunssan kaltaisia oireita
- yskä
- pahoinvoiointi
- akuutti hengitysvaikeus (merkkejä ovat voimakas hengenahdistus, kuume, heikotus ja sekavuus)
- suoliston angioedeema: suoliston turvotus, johon liittyviä oireita ovat vatsakipu, pahoinvoiointi, oksentelu ja ripuli.

Tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

- äkillinen likinäköisyys
- näön heikkeneminen tai kipu silmissä korkean silmänpaineen takia (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effusio) tai akutista ahdaskulmaglaukoomasta)
- iho- ja huulisyöpä (ei melanoomatyypin ihosyöpä)
- systeeminen ja ihan lupus erythematosus (allerginen sairaus, joka aiheuttaa kuumetta, nivelkipua, ihottumaa, johon voi liittyy ihan punoitusta, rakkuloita, hilseilyä ja kiinteältä tuntuvia läiskiä).

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä ulkopakkauksessa ja läpipainolevyissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei edellytä erityisiä säilytysolosuhteita.

Tablettipurkki:

Säilyvyys avaamisen jälkeen: 6 kuukautta

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Nämä menetellä suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten sisältää

- Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 8 mg/12,5 mg: Vaikuttavat aineet ovat kandesartaanisileksitiili ja hydroklooritiatsidi. Yksi tabletti sisältää 8 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.
- Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 16 mg/12,5 mg: Vaikuttavat aineet ovat kandesartaanisileksitiili ja hydroklooritiatsidi. Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.
- Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 32 mg/12,5 mg: Vaikuttavat aineet ovat kandesartaanisileksitiili ja hydroklooritiatsidi. Yksi tabletti sisältää 32 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.
- Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 32 mg/25 mg: Vaikuttavat aineet ovat kandesartaanisileksitiili ja hydroklooritiatsidi. Yksi tabletti sisältää 32 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 25 mg hydroklooritiatsidia.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, hydroksipropyyliselluloosa, kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti ja trietyylisitraatti

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkauskoot

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 8 mg/12,5 mg -tabletit ovat valkoisia, pyöreitä ja kaksoiskuperia, ja niiden toisella puolella on jakouurre. Jakourteen puoleisella sivulla on lisäksi merkintä CH8.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 16 mg/12,5 mg -tabletit ovat valkoisia, pyöreitä ja kaksoiskuperia, ja niiden toisella puolella on jakouurre. Jakourteen puoleisella sivulla on lisäksi merkintä CH16.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 32 mg/12,5 mg -tabletit ovat valkoisia, soikeita ja kaksoiskuperia ja kooltaan 12 mm x 7 mm. Niiden molemmilla puolilla on jakouurre ja yhdellä puolella merkintä 32/12.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 32 mg/25 mg -tabletit ovat valkoisia, soikeita ja kaksoiskuperia ja kooltaan 12 mm x 7 mm. Niiden molemmilla puolilla on jakouurre ja yhdellä puolella merkintä 32/25).

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten on saatavana läpipainopakkauksissa tai tablettipurkeissa, joissa on joko lapsiturvallinen kuivausainetta (pioksidigeeliä) sisältävä kierrekorkki tai kuivausainetta (pioksidigeeliä) sisältävä kierrekorkki.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 8 mg/12,5 mg ja 16 mg/12,5 mg -tabletit:

Pakkauskoot: 7, 14, 28, 30, 56, 70, 90, 98 ja 100 tablettia läpipainopakkauksessa.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 32 mg/12,5 mg ja 32 mg/25 mg -tabletit:

Pakkauskoot:

Läpipainopakkaus: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100 tablettia.

Tablettipurkki: 30, 90, 250 tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Holsten Pharma GmbH
Hahnstr. 31-35
60528 Frankfurt am Main
Saksa

Valmistajat
Siegfried Malta Ltd.
HHF070 Hal Far Industrial Estate
Postilokero 14
BBG 3000 Hal Far
Malta

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.12.2024

Bipacksedel: Information till användaren

**Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 8 mg/12,5 mg tablett
Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 16 mg/12,5 mg tablett
Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 32 mg/12,5 mg tablett
Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 32 mg/25 mg tablett**

kandesartancilexetil/hydroklortiazid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten
3. Hur du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten är och vad det används för

Ditt läkemedel heter Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten tabletter. Det används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) hos vuxna patienter. Det innehåller två aktiva ingredienser: kandesartancilexetil och hydroklortiazid. De samarbetar för att sänka ditt blodtryck.

- Kandesartancilexetil tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-receptorkräver. Det får dina blodkärl att slappna av och vidgas. Detta sänker ditt blodtryck.
- Hydroklortiazid tillhör en grupp läkemedel som kallas diuretika (urindrivande medel). Det hjälper din kropp att göra sig av med vatten och salter, som natrium, i urinen. Detta sänker ditt blodtryck.

Din läkare kan skriva ut Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten om ditt blodtryck inte har reglerats tillräckligt med enbart kandesartancilexetil eller hydroklortiazid.

Kandesartancilexetil och hydroklortiazid som finns i Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdsmedarbetare om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten

Använd inte Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten

- om du är allergisk mot kandesartancilexetil eller hydroklortiazid eller något annat innehållsmärke i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du är allergisk mot läkemedel som innehåller sulfonamid. Om du känner dig osäker om detta gäller dig ska du tala med din läkare.
- om du är gravid sedan mer än tre månader (även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten, se Graviditet och amning).
- om du har allvarliga njurproblem.
- om du har en allvarlig leversjukdom eller gallvägshinder (ett tillstånd då gallan har svårt att komma ut ur gallblåsan).
- om du har ihållande låg mängd av kalium i blodet.
- om du har ihållande hög mängd av kalcium i blodet.
- om du någonsin har haft gikt.
- om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

Om du känner dig osäker på om något av ovanstående stämmer in på dig, ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten

- om du har diabetes.
- om du har hjärt-, lever- eller njurproblem.
- om du nyligen har genomgått en njurtransplantation.
- om du kräks, nyligen haft svåra kräkningar eller har diarré.
- om du har en sjukdom i binjurens som heter Conns syndrom (även kallad primär hyperaldosteronism).
- om du någon gång har haft en sjukdom som kallas systemisk lupus erythematosus (SLE).
- om du har lågt blodtryck.
- om du någon gång har drabbats av slaganfall.
- om du någon gång har haft allergi eller astma.
- om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:
 - en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.
 - aliskiren
- om du har haft hudcancer eller om du får en oförutsedd hudförändring under behandlingen. Behandling med hydroklorotiazid, särskilt långvarig användning med höga doser, kan öka risken för vissa typer av hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer). Skydda din hud från exponering för solljus och UV-strålar medan du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten.
- om du får nedsatt syn eller ögonsmärta. Detta kan vara symptom på vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller en ökning av trycket i ögat och kan ske inom timmar till veckor efter att du tagit Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten. Om det inte behandlas kan det leda till permanent förlust av synen. Risken att drabbas av detta kan vara större om du tidigare har varit allergisk mot penicillin eller sulfonamid.
- om du tidigare har fått andnings- eller lungproblem (inklusive inflammation eller vätska i lungorna) efter intag av hydroklortiazid. Om du får svår andnöd eller svåra andningsproblem efter att du har tagit Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten ska du omedelbart söka vård.

Tala med läkare om du upplever magsmärta, illamående, kräkningar eller diarré efter att ha tagit Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten. Din läkare kommer att ta beslut om fortsatt behandling. Sluta inte att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten på eget beväg.

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Använd inte Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten”.

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.

Det kan hända att din läkare vill träffa dig oftare och ta en del prover om du har något av dessa tillstånd.

Tala om för din läkare eller tandläkare att du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten om du ska genomgå någon typ av operation. Anledningen är att Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten i kombination med vissa narkos- eller bedövningsmedel kan orsaka ett blodtrycksfall.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten kan göra att huden blir känsligare för solljus.

Barn och ungdomar

Det finns ingen erfarenhet av att använda Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten till barn (under 18 års ålder). Därför ska Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten inte ges till barn.

Andra läkemedel och Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar, och vissa andra läkemedel kan påverka Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten. Om du använder vissa andra läkemedel kan din läkare behöva ta blodprov emellanåt.

Speciellt ska du berätta för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

- andra läkemedel, som hjälper till att sänka blodtrycket, inklusive betablockerare, aliskireninnehållande läkemedel, diazoxid och ACE-hämmare som enalapril, kaptopril, lisinopril eller ramipril
- icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat) som ibuprofen, naproxen, diklofenak, selecoxib eller etoricoxib (läkemedel som lindrar smärta och inflammation)
- acetylsalicylsyra (om du tar mer än 3 g om dagen) (ett läkemedel som lindrar smärta och inflammation)
- kaliumtillskott eller saltersättningsmedel som innehåller kalium (läkemedel som ökar mängden kalium i blodet)
- kalcium- eller D-vitamintillskott
- läkemedel som sänker kolesterolvärdet, som kolestipol eller kolestyramin
- läkemedel mot diabetes (tablett(er) eller insulin)
- läkemedel för att kontrollera hjärtrytmen (antiarytmiska medel) som digoxin och betablockerare
- läkemedel som kan påverkas av kaliumhalten i blodet, som vissa antipsykotiska läkemedel
- heparin (ett blodförtunnande läkemedel)
- vätskedrivande medel (diuretika)
- laxermedel
- penicillin eller trimetoprim/sulfametoxyzol (en kombination av antibiotika).
- amfotericin (mot svampinfektioner)
- litium (ett läkemedel mot psykiska sjukdomar)
- steroider som prednisolon
- hypofyshormon ACTH
- läkemedel mot cancer
- amantadin (mot Parkinsons sjukdom eller mot allvarliga virusinfektioner)
- barbiturater (en typ av lugnande medel som även används mot epilepsi)
- karbenoxolon (mot sjukdom i matstrupen eller sår i munnen)
- antikolinerga medel som atropin och biperiden
- cyklosporin, ett läkemedel som används när man transplanterar organ för att förhindra att organet stöts bort
- andra läkemedel som kan förstärka den blodtryckssänkande effekten, som baklofen (ett läkemedel som lindrar spasticitet (muskelkramper)), amifostin (mot cancer) och vissa antipsykotiska läkemedel

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

- om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Använd inte Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten” och ”Varningar och försiktighet”)

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten med mat och dryck

- Du kan ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten med eller utan mat.
- När du har ordinerats Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten, ska du diskutera med din läkare innan du dricker alkohol. Alkohol kan göra att du känner dig svag eller yr.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Du måste meddela din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten bör inte användas under graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.

Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten rekommenderas inte till ammande mödrar, och din läkare kan välja ett annat läkemedel åt dig om du vill amma.

Körförstående och användning av maskiner

Vissa män kan känna trötthet eller yrsel när de tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten. Om detta sker ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten innehåller laktos

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten innehåller laktos som är en sorts socker. Om din läkare har sagt till dig att du inte tål vissa sockerarter, måste du prata med läkaren innan du tar detta läkemedel.

3. Hur du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Det är viktigt att du fortsätter att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten varje dag.

- Rekommenderad dos av Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten är en tablett en gång dagligen.
- Svälj tabletten hel tillsammans med vatten.
- Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. På så sätt blir det lättare att komma ihåg att ta den.

Om du har tagit för stor mängd av Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinfomationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten

Ta inte dubbeldos för att kompensera för den glömda dosen. Ta nästa dos som normalt.

Om du slutar att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten

Om du slutar att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten kan ditt blodtryck stiga igen. Sluta därför inte att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten utan att först tala med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du känner till vad det kan vara för biverkningar. Vissa av biverkningarna av Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten orsakas av kandesartancilexetil och vissa av hydroklortiazid.

Sluta att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten och sök genast läkare om du får någon av följande allergiska reaktioner:

- andningssvårigheter med eller utan svullnad i ansikte, på läppar, på tunga och/eller svalg
- svullnad i ansikte, på läppar, på tunga och/eller svalg, som kan ge svårighet att svälja
- svår hudklåda (med upphöjda utslag)

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten kan orsaka en minskning av vita blodkroppar. Din motståndskraft mot infektioner kan försämras och du kan känna trötthet, få en infektion eller feber. Om det händer ska du kontakta din läkare. Eventuellt tar din läkare blodprov emellanåt för att kontrollera om Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten har haft någon påverkan på ditt blod (agranulocytos).

Andra eventuella biverkningar är följande:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

- förändrade resultat av vissa blodprover:
 - minskad mängd natrium i blodet. Om minskningen är kraftig kan du känna av svaghet, energilöshet eller muskelkramper.
 - ökad eller minskad mängd kalium i blodet, speciellt om du redan har njurproblem eller hjärtsvikt. Om förändringen är kraftig kan du känna av trötthet, svaghet, oregelbundna hjärtslag eller stickningar och domningar i huden.
 - en ökad mängd kolesterol, socker eller urinsyra i blodet
- socker i urinen
- känsla av yrsel eller svaghet
- huvudvärk
- luftvägsinfektion.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

- lågt blodtryck. Det kan göra att du känner dig svag eller yr.
- aptitlöshet, diarré, förstopning, irritation i magsäcken
- hudutslag, kliande knotriga utslag (nässelutslag), utslag som beror på känslighet för solljus

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

- gulsort (gulfärgning av huden och ögonvitorna). Om du får detta ska du genast kontakta din läkare.
- påverkan på njurfunktionen, speciellt om du har njurproblem eller hjärtsvikt
- sömnsvårigheter, depression, rastlöshet

- stickningar eller pirningar i armar eller ben
- dimsyn under kort tid
- onormal hjärtrytm
- andningssvårigheter (inklusive lunginflammation och vätska i lungorna)
- feber
- inflammation i bukspottkörteln. Det ger en måttlig till svår smärta i magen.
- muskelkramper
- skador på blodkärl, som ger röda eller lila prickar i huden
- minskning i antalet röda eller vita blodkroppar eller blodplättar. Du kan då märka trötthet, infektion, feber eller att du lätt får blåmärken.
- kraftiga utslag som utvecklas snabbt, med blåsor och hudavflagnings och eventuellt blåsor i munnen

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

- svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg
- klåda
- smärta i rygg, leder eller muskler
- förändrad leverfunktion, inklusive inflammation i levern (hepatit). Du kan märka av trötthet, gulfärgning av hud och ögonvitor och influensaliknande symtom.
- hosta
- illamående
- akut andnödssyndrom (tecken på detta är svår andnöd, feber, svaghet och förvirring)
- intestinalt angioödem: svullnad i tarmen med symtom som magsmärta, illamående, kräkningar och diarré.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

- plötslig närsynthet
- systemisk och kutan lupus erythematosus (allergiskt tillstånd som orsakar feber, ledsmärta, hudutslag som kan innefatta rodnad, blåsbildning, fjällning och knölar).
- nedsatt syn eller smärta i ögonen på grund av högt tryck (möjligt tecken på vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller akut trångvinkelglaukom)
- hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt, webbplats: www.fimea.fi eller Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsrådet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Tablettburk:

Hållbarhet efter öppnande: 6 månader

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 8 mg/12,5 mg: De aktiva substanserna är kandesartancilexetil och hydroklortiazid. En tablett innehåller 8 mg kandesartancilexetil och 12,5 mg hydroklortiazid.
- Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 16 mg/12,5 mg: De aktiva substanserna är kandesartancilexetil och hydroklortiazid. En tablett innehåller 16 mg kandesartancilexetil och 12,5 mg hydroklortiazid.
- Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 32 mg/12,5 mg: De aktiva substanserna är kandesartancilexetil och hydroklortiazid. Varje tablett innehåller 32 mg kandesartancilexetil och 12,5 mg hydroklortiazid.
- Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 32 mg/25 mg: De aktiva substanserna är kandesartancilexetil och hydroklortiazid. Varje tablett innehåller 32 mg kandesartancilexetil och 25 mg hydroklortiazid.
- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, hydroxipropylcellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat och trietylcitrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 8 mg/12,5 mg tabletter är vita, runda, bikonvexa och försedda med brytskåra på tabletternas ena sida. Tabletterna är märkta med CH8 på den sida av tabletterna där brytskåran finns.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 16 mg/12,5 mg tabletter är vita, runda, bikonvexa och försedda med brytskåra på tabletternas ena sida. Tabletterna är märkta med CH16 på den sida av tabletterna där brytskåran finns.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 32 mg/12,5 mg tabletter är vita, ovala, bikonvexa, 12 mm x 7 mm, och försedda med brytskåra på båda sidorna samt märkningen 32/12 på tabletternas ena sida.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 32 mg/25 mg tabletter är vita, ovala, bikonvexa, 12 mm x 7 mm, och försedda med brytskåra på båda sidorna samt märkningen 32/25 på tabletternas ena sida.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten finns i blisterförpackningar eller tablettburkar med eller utan barnsäkra skruvlock med kiselgel som torkmedel.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 8 mg/12,5 mg och 16 mg/12,5 mg tablett:

Förpackningsstorlekar: 7, 14, 28, 30, 56, 70, 90, 98 och 100 tablett i blisterförpackning.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Holsten 32 mg/12,5 mg och 32 mg/25 mg tablett:

Förpackningsstorlekar:

Blisterförpackning: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100 tablett.

Tablettburk: 30, 90, 250 tablett

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Holsten Pharma GmbH

Hahnstr. 31-35

60528 Frankfurt am Main

Tyskland

Tillverkare

Siegfried Malta Ltd.

HHF070 Hal Far Industrial Estate

BBG 3000 Hal Far

Malta

Denna bipacksedel ändrades senast den 10.12.2024