

Pakkaus seloste: Tie toa potilaalle

Asacol 500 mg peräpuikko

mesalatsiini

Lue tämä pakkaus seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkaus seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävästä, käännystä lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkaus selosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkaus selosteessa kerrotaan:

1. Mitä Asacol on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Asacolia
3. Miten Asacolia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Asacolin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Asacol on ja mihin sitä käytetään

Asacol sisältää vaikuttavana aineena mesalatsiinia, anti-inflammatorista lääkettä, jota käytetään peräsuolen tulehuksen hoitoon ja uusiutumisen ehkäisyyn.

Haavainen peräsuolitulehdus on sairaus, jossa suolenpinta on tulehtunut (punoittava ja turvonnut). Asacol vaikuttaa paikallisesti tulehduskohdassa (paksusuolella ja peräsuolella), missä se vähentää tulehdusta. Asacol-valmistetta voidaan myös käyttää haavaisen paksusuolitulehuksen uusiutumisen ehkäisyyn.

Mesalatsiinia, jota Asacol sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkaus selosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa, ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Asacolia

Älä käytä Asacolia

- jos olet allerginen mesalatsiimille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos olet allerginen salisylaateille
- jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta
- jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta.

Varoitukset ja varotoimet

- Kerro lääkärille, jos sinulla on joskus ollut munuaissairausrasia, tai jos sinulla on mahahaava tai pohjukaissuolihaava. Tämä on erityisen tärkeää, jos olet iäkäs.
- Jos sinulla on ollut sydämen yliherkkyyssreaktioita (myokardiitti, perikardiitti). Älä käytä Asacol-hoitoa, jos olet saanut aiemmin yliherkkyysoireita mesalatsiinista.

- Jos sinulla on keuhkosairauksia, esim. astma, lääkäri saattaa tarkistaa keuhkojesi toiminnan määräajoin.
- Jos olet yliherkkä (allerginen) sulfasalatsiinille (toinen lääke, jota käytetään haavaiseen suolitulehdukseen ja Crohnin tautiin), Asacol-hoito voidaan aloittaa vain lääkärin tarkassa valvonnassa. Hoito täytyy lopettaa heti, jos saat sellaisia oireita kuin kouristuksia, vatsakipua, kuumetta, vaikaa pääsärkyä tai ihottumaa.
- Kun alat käyttää tätä lääkettä, lääkäri teettää määräajoin verikokeita seuratakseen, että munuaisten toiminta ja verikokeet ovat normaalileita.
- Hyvin harvinaisia, vakavia verisolujen tuotannon häiriöitä on raportoitu Asacol-käytön yhteydessä. Lisäverikokeet ovat tarpeen, jos ilmaantuu merkkejä verisolujen tuotannon häiriöstä, esimerkiksi selittämätöntä verenvuotoa, mustelmaherkkyyttä ja ihmalaista verenvuotoa, violetinvärisiä pisteitä tai laikkuja ihmolla, punasolujen vähenemistä, pitkittynyttä kuumeilua ja kurkkukipua.
- Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat mesalatsiinia, jos olet aiemmin saanut vaikean ihottuman tai jos sinulla on esiintynyt ihmisen kesimistä, rakkuloita ja/tai suun haavaumia mesalatsiinin käytön jälkeen.

Mesalatsiinhoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia ihmreaktioita, mukaan lukien yleisoireista eosinofiliistä oireyhtymää, Stevens-Johnsonin oireyhtymää ja toksista epidermaalista nekrolyysiä. Lopeta mesalatsiini käyttö ja hakeudu lääkärin välittömästi, jos huomaat mitä tahansa oireita, jotka liittyvät kohdassa 4 kuvattuihin vakaviin ihmreaktioihin.

Munuaiskiviä voi muodostua mesalatsiinin käytön yhteydessä. Oireita voivat olla kipu vatsan sivuilla ja veri virtsassa. Muista juoda riittävä määärä nestettä mesalatsiinhoidon aikana.

Mesalatsiini voi aiheuttaa virtsan väryäytymisen punaruskeaksi, kun se on ollut kontaktissa natriumhypokloriittiä sisältävän valkaisevan puhdistusaineen kanssa WC-pyyssä. Tämä johtuu mesalatsiinin ja valkaisuaineen välisestä kemiallisesta reaktiosta ja on harmitonta.

Lapset ja nuoret

Asacolin tehosta lasten hoidossa on vähän kokemusta ja vain niukasti tutkittua tietoa.

Muut lääkkeet ja Asacol

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkeitä, kuten

- lääkeitä, jotka heikentävät immuunivastetta (esim. atsatiopriini, 6-merkaptopuriini tai tioguanioni)
- lääkeitä, jotka ehkäisevät verenhyytymistä (antikoagulantit, esim. varfariini).

Raskaus, imetyks ja hemmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Asacolilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Jos kuitenkin havaitset vaikuttuksia, älä aja tai käytä koneita.

3. Miten Asacolia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määränyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri määrää sinulle sopivan annoksen.

Suositeltu annos

Aikuiset (mukaan lukien vanhukset)

Sairauden aktiivinen vaihe: yksi peräpuikko 2–3 kertaa vuorokaudessa.
Ylläpitohoitot: yksi peräpuikko 1–2 kertaa vuorokaudessa.

Käyttö lapsille ja nuorille

Lasten hoidosta on vähän kokemusta ja vain niukasti tutkittua tietoa.

Ohjeet asianmukaista käyttöä varten

1. Pese kädet.
2. Poista muovinen kuori peräpuikon ympäriltä.
3. Asetu makaamaan kyljellesi ja vedä polvet koukkuun. Työnnä peräpuikko mahdollisimman syvälle kapeampi pää edellä. Pyöreä pää helpottaa peräsuoleen laittamista ja ärsyttää siten peräaukkoa vähemmän.
4. Suorista jalat ja ole makuuasennossa useita minuutteja.

Lääkkeen tulisi pysyä suolessa mahdollisimman kauan, jotta se voisi vaikuttaa parhaiten. Pyri siksi välttämään ulostamista mahdollisimman kauan, mieluiten kahdeksan tunnin ajan lääkkeen annostelusta.

Jos käytät enemmän Asacolia kuin sinun pitäisi

Älä ylitä lääkärin sinulle määräämää annosta.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen yleiset oireet ovat:

- runsas hikoilu
- oksentelu
- nopea hengitys
- pyörtymisen tunne tai huimaus.

Jos olet niellyt Asacol-peräpuikkoja vahingossa

Juo runsaasti vettä ja kerro välittömästi lääkäriille tai mene sairaalan päivystykseen. Ota peräpuikkopakkaus mukaasi.

Jos unohdat käyttää Asacolia

Jos unohdat ottaa lääkeannoksen oikeaan aikaan, ota seuraava annos normaalina ottoajankohtana. Älä otta kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Asacolin käytön

Käytä Asacol-peräpuikkoja niin kauan kuin lääkäri on määrännyt. Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin muutat annosta tai lopetat hoidon.

Jos koet, että Asacol-peräpuikkojen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, keskustele siitä lääkäriin tai apteekkikenkilökunnan kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkäriin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Elinspesifisiä haittavaikutuksia sydämeen, keuhkoihin, maksaan, munuaisiin, haimaan, ihoon ja ihonalaiseen kudokseen on raportoitu.

Lopeta mesalatsiinin käyttämisen ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulla ilme nee jokin seuraavista oireista:

- Punoittavat läiskät keholla (maalitaulun näköiset tai rengasmaiset läiskät, joiden keskellä saattaa olla rakkuloita); ihan kesiminen, haavaumat suussa, nielussa, nenässä, sukkuolielmissä ja silmissä, laajalle levinyt ihottuma, kuume ja imusolmukkeiden suurentuminen. Näitä vakavia ihottumia edeltää usein kuume ja/tai flunssan kaltaiset oireet.
- Jos sinulle ilmaantuu selittämättömiä mustelmia (ilman vammoja), ihonalista verenvuotoa, violetteja pilkkuja tai laikkuja ihan alla, anemiaa (väsymystä; heikkoutta; kalpeutta, erityisesti huulissa, kynsissä ja silmälauomien sisäpuolella), kuumetta (korkea kehon lämpötila), kurkkukipua tai epätavallista verenvuotoa (esim. nenäverenvuotoa).

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu seuraavin esiintymistiheyksin:

Harvinaiset:

- päänsärky
- huimaus
- sydänlihastulehdus, johon liittyy rintakipua ja sydämentykytystä
- ripuli; vatsakipu; kaasunmuodostusta (ilmavaivat); epämukava tunne vatsassa, mihin liittyy pahoinvohtia ja oksentelua
- ihan epänormaalilta herkkä reagointi auringonvaloon ja ultraviolettivaloon (valoherkkyyys).

Hyvin harvinaiset:

- voimakas kaikkien verisolujen määränpieneminen (pansytopenia), joka voi aiheuttaa heikkoutta, mustelmia tai lisätä infektoriskiä
- verihuutaleiden määränpieneminen (trombosytopenia), joka voi lisätä verenvuotoriskiä
- allergiset reaktiot, kuten ihottuma ja ihottuman puhkeaminen
- kuume, jota esiintyy lääkkeen käytön aikana mutta joka häviää, kun lääkkeen käyttö lopetetaan (lääkekuumuus)
- immuuni-järjestelmän sairaus, joka voi vaikuttaa elimiin ja niveliin
- haavainen paksusuolitulehdus koko paksusuoleissa
- pistely, tunnottomuus, epänormaalit tuntemukset, heikkous ja polttava kipu käsivarsissa, jaloissa tai käsissä (perifeerinen neuropatia)
- keuhkosairaus (keuhkokudoksen arpeutuminen, allerginen reaktio) johtuen hengitysvaikeuksiin tai hengityksen vinkumiseen ja nesteen kertymiseen keuhkoihin
- haimatulehdus, johon liittyy kipua ylävatsassa ja selässä ja pahoinvohtia
- poikkeavat maksakokeiden tulokset; maksatulehdus, johon liittyy flunssankaltaisia oireita ja keltaisuutta
- hiustenlähtö
- lihas- ja nivelkipu
- munuaissairaus (kuten munuaisten tulehdus ja arpeutuminen), munuaisten vajaatoiminta
- palautuva siittiötötannon heikkeneminen.

Tuntematon:

- paikallinen reaktio
- munuaiskivet ja niihin liittyvä munuaiskipu (ks. myös kohta 2)
- intoleranssireaktiot, mukaan lukien oireiden taustalla olevan sairauden oireiden lisääntyminen
- keuhkoja ympäröivien ja rintaontelon limakalvojen tulehdus.

Haittavaikutusten arvointi perustuu seuraaviin esiintymistilheyksiin:
Harvinainen: voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 1 000:sta
Hyvin harvinainen: voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10 000:sta
Tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä arvointiin

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkien henkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkauselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Asacolin säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.
Ei lasten ulottuville ja näkyville.

Älä käytä tästä lääketä pakkaussessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”Käyt. viim.” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Asacol sisältää

- Vaikuttava aine on mesalatsiini. Yksi peräpuikko sisältää 500 mg mesalatsiinia.
- Muu aine on kovarasva.

Lääkevalmisten kuvaus ja pakauskoko (-koot)

Vaaleanruskea torpedonmallinen peräpuikko, jonka paino on noin 3 g.
Pakkauksessa on 60 peräpuikkoa.

Myyntiluvan haltija

Tillotts Pharma AB, Gustavslundsvägen 135, SE-167 51 Bromma, Ruotsi.
Yhteydenotot sähköpostitse: nordicinfo@tilotts.se

Valmistaja

Farmaea (Groupe Fareva), 10 Rue Bouché Thomas, FR-49 000 Angers, Ranska

Tämä pakkauseloste on tarkistettu viimeksi 25.05.2023

Bipacksedel: Information till användare n

Asacol 500 mg suppositorier

mesalazin

Läs nog i genom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läke medel. Den inne håller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I den nna bipackse del finns information om följande:

1. Vad Asacol är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Asacol
3. Hur du använder Asacol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Asacol ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Asacol är och vad det används för

Asacol innehåller den aktiva substansen mesalazin, ett anti-inflammatoriskt läkemedel som används för behandling och förebyggande av återfall av ulcerös kolit i ändtarmen.

Ulcerös kolit i ändtarmen är en sjukdom i ändtarmen i vilken tarmväggen blir infammerad (röd och svullen). Asacol verkar lokalt vid inflammationsstället (tjocktarm och ändtarm) där det minskar inflammationen. Suppositorierna kan även användas för att förebygga återfall av ulcerös kolit i ändtarmen.

Mesalazin som finns i Asacol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Asacol

Använd inte Asacol

- om du är allergisk mot mesalazin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du är allergisk mot salicylater
- om du har svåra problem med njurarna
- om du har svåra problem med levern.

Varngar och försiktighet

- Tala om för din läkare om du någon gång har haft problem med dina njurar eller om du har magsår eller sår i tolvfingertarmen (duodenum). Detta är särskilt viktigt om du är äldre.
- Om du någon gång har haft överkänslighetsreaktioner i hjärtat (myokardit, perikardit). Asacol ska inte användas av patienter som tidigare har haft dessa symtom med mesalazin.

- Om du har lungproblem t.ex. astma kan din läkare vilja kontrollera din andning regelbundet.
- Om du är överkänslig (allergisk) mot sulfasalazin (ett annat läkemedel som används för att behandla ulcerös kolit och Crohns sjukdom) ska Asacol-behandling endast påbörjas under noggrann medicinsk övervakning. Behandlingen måste omedelbart avbrytas om akuta intoleranssymtom, som kramper i buken, akut buksmärta, feber, svår huvudvärk eller utslag, uppkommer.
- När du börjar använda suppositorierna kan din läkare då och då ta blodprover för att se om blodvärdens och njurfunktion är normala.
- Mycket sällsynta allvarliga störningar i produktionen av blodkroppar har rapporterats under behandling med Asacol. Ytterligare blodprover kan behövas vid tecken på störningar i produktionen av blodkroppar såsom oförklarliga blödningar, blåmärken, blödning under huden, blåröda utslag under huden, blodbrist, ihållande feber eller ont i halsen.
- Tala med läkare innan du använder mesalazin om du någonsin har utvecklat allvarliga hudutslag eller hudfjällning, blåsbildning och/eller sår i munnen efter att du använt mesalazin.

Allvarliga hudreaktioner, som läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxic epidermal nekroly (TEN), har rapporterats i samband med mesalazinbehandling. Sluta använda mesalazin och uppsök omedelbart sjukvård om du får något av de symtom på dessa allvarliga hudreaktioner som beskrivs i avsnitt 4.

Njurstenar kan bildas vid användning av mesalazin. Symtomen kan bland annat vara smärta i sidorna av buken och blod i urinen. Se till att dricka tillräckligt med vätska under behandlingen med mesalazin.

Mesalazin kan orsaka rödbrun missfärgning av urinen efter kontakt med natriumhypokloritblekmedel i toalettvattnet. Det beror på en kemisk reaktion mellan mesalazin och blekmedlet som är ofarlig.

Barn och ungdomar

Det finns lite erfarenhet och endast begränsad dokumentation på effekten av Asacol hos barn.

Andra läkemedel och Asacol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel såsom:

- läkemedel som minskar aktiviteten hos immunsystemet (t.ex. azatioprin, 6-merkaptopurin eller tioguanin)
- läkemedel som förhindrar uppkomsten av blodproppar (antikoagulantia, t.ex. warfarin).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförstående och användning av maskiner

Asacol har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner, men om du ändå påverkas på något sätt ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.

3. Hur du använder Asacol

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare avgör vilken dosering som passar dig bäst.

Rekommenderad dos

Vuxna (inklusive äldre)

Akut skov: 1 suppositorium 2–3 gånger per dygn.

Underhållsbehandling: 1 suppositorium 1–2 gånger per dygn.

Användning för barn och ungdomar

Det finns lite erfarenhet och bara begränsad dokumentation för effekt hos barn.

Anvisningar för korrekt användning

1. Tvätta dina händer.
2. Avlägsna plasthöljet kring suppositoriet.
3. Ligg på sidan och dra upp knäna. För in suppositoriet in i ändtarmen så långt det går, med den spetsiga änden först. Den rundade änden kommer då att passa väl i ändtarmsöppningen och onödig irritation undviks.
4. Räta ut benen och ligg kvar under några minuter.

För att läkemedlet skall verka på bästa möjliga sätt, bör du undvika att tömma tarmen så länge som möjligt efter införandet, helst i 8 timmar efter att du använt läkemedlet.

Om du har använt för stor mängd av Asacol

Använd inte en större dos än din läkare har ordinerat.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Allmänna symtom av överdosering är:

- kraftig svettning
- kräkningar
- snabb andning
- svindel eller yrsel.

Om du har svalt Asacol suppositorier av misstag

Drick mycket vatten och tala omedelbart om för läkare eller sjukhusmottagning. Ta med dig förpackningen med suppositorierna.

Om du glömt att ta Asacol

Om du glömmer att ta din dos i tid, ta nästa dos vid normal tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Asacol

Använd Asacol suppositorier så länge som din läkare har bestämt. Rådfråga din läkare innan du ändrar eller avslutar din behandling.

Om du tycker att effekten av Asacol suppositorier är för stark eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Organspecifika biverkningar som påverkar hjärta, lungor, lever, njurar, bukspottskörtel, hud och subkutan vävnad har rapporterats.

Sluta använda mesalazin och uppsök omedelbart sjukvård om du får något av följande symtom:

- rödaktiga, ej upphöjda, fläckar på bålen som liknar måltavlor eller är runda, ofta med blåsor i mitten, fjällande hud, sår i munnen, svalget, näsan, på könsorganen och i ögonen, utbredda utslag, feber och förstorade lymfkörtlar. Dessa allvarliga hudutslag kan föregås av feber och influensaliknande symtom.
- Du utvecklar oförklarliga blåmärken (utan skada), blödning under huden, lila prickar eller fläckar under huden, anemi (känner dig trött, svag och är blek framför allt om läppar, naglar och på insidan av ögonlocken), feber (hög kroppstemperatur), halsont eller ovanliga blödningar (t.ex. näsblod).

Biverkningar har rapporterats i följande frekvenser:

Sällsynta:

- huvudvärk
- yrsel
- inflammation i hjärtat med symtom som bröstsmärta eller hjärtklappning
- diarré, magsmärta, gasbildning (flatulens), känsla av obehag i magen med illamående och kräkningar
- ökad hudkänslighet för solljus och ultraviolett ljus (fotosensitivitet).

Mycket sällsynta:

- kraftig minskning av mängderna av alla blodkroppar (pancytopeni), vilket kan orsaka svaghet, blåmärken eller öka infektionsrisken
- minskat antal blodplättar (trombocytopeni), vilket ökar risken för blödning
- allergiska reaktioner såsom klåda och utbrytande av hudutslag
- feber som uppstår när man tar läkemedlet och som försvinner när man slutar att ta läkemedlet (läkemedelsutlöst feber)
- sjukdomar i immunsystemet som kan involvera organ och leder
- ulcerös kolit i hela tjoctarmen
- stickningar, känslolöshet, onormala sinnesförmimmelser, svaghetskänsla och brännade smärta i armarna, benen eller händerna (perifer neuropati)
- lungsjukdom (ärrbildning i lungvävnad, allergiska reaktioner) vilket kan ge svårigheter att andas eller väsande andning och vätskeansamling i lungorna
- inflammation i bukspottkörteln (förknippas med smärta i övre delen av buken och ryggen samt illamående)
- avvikande resultat i leverfunktionstester, hepatit (inflammation i levern som ger upphov till förkylningsliknande symtom och guldot)
- hårvälfall
- muskel- och ledvärk
- njurbesvär (såsom inflammation och ärrbildning i njurarna), njursvikt
- övergående minskning av spermieproduktionen.

Ingen känd frekvens:

- lokal reaktion
- njurstener och smärta från njurarna (se även avsnitt 2)
- intoleransreaktioner som inkluderar en ökning av symtom av den underliggande sjukdomen
- inflammation i slemhinnan som omger lungorna och brösthålan.

Utvärdering av biverkningarna baseras på följande frekvenser:

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Asacol ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är mesalazin. Ett suppositorium innehåller 500 mg mesalazin.
- Övrigt innehållsämne är hårdfett.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ljusbruna torpedformade suppositorier, vikt ca 3 g.

60 suppositorier per förpackning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Tillotts Pharma AB, Gustavslundsvägen 135, SE-167 51 Bromma, Sverige

Kontakt per e-post: nordicinfo@tillotts.com

Tillverkare

FarMEA (Groupe Fareva), 10 Rue Bouché Thomas, FR-49 000 Angers, Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast 25.05.2023