

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum)

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Canodermia huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lieviy.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Canoderm on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Canodermia
3. Miten Canodermia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Canodermin säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ CANODERM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Canoderm-emulsiovoiteen ihoa pehmentävä voidepohja sisältää 5 % karbamidia. Karbamidilla on vettä sitova ominaisuus, joka edistää kuivan ihon normalisoitumista.

Canoderm-emulsiovoidetta käytetään eri syistä johtuvan kuivan ihon kosteuttamiseen ja atooppisen ihottuman uusiutumisen estämiseen.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT CANODERMIA

Älä käytä Canodermia

- jos olet allerginen (yliherkkä) karbamidille tai Canodermin jollekin muulle aineelle

Ole erityisen varovainen Canodermin suhteen:

- Vältä tuotteen joutumista silmiin, sieraimiin, korviin, avohaavoihin tai limakalvoille

Raskaus ja imetys

Canoderm-emulsiovoidetta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Canoderm ei vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Tärkeää tietoa Canodermin sisältämistä aineista

Canoderm sisältää etyyli- ja metyyliiparahydroksibensoattia joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Canoderm sisältää setostearyylialkoholia joka voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Canoderm sisältää propyleeniglykolia joka voi aiheuttaa ihoärsytystä.

3. MITEN CANODERMIA KÄYTETÄÄN

Eri syistä johtuvan kuivan ihon kosteuttaminen:

Emulsioidetta sivellään iholle tarpeen mukaan, mielellään useita kertoja päivässä ja aina sen jälkeen kun iho on ollut kosketuksissa veden kanssa. Sivele iholle niin paljon emulsioidetta, kuin ihoon imeytyy, ilman että iho tuntuu tahmealta.

Atooppisen ihottuman uusiutumisen estäminen:

Sivele iholle vähintään kaksi kertaa päivässä ja mielellään sen jälkeen, kun iho on ollut kosketuksissa veden kanssa.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Canodermkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. *Yleinen (>1/100, <1/10)*. Emulsiovoide voi aiheuttaa paikallista kirvelyä ja lämmön tunnetta. Kasvot ovat erityisen herkkä.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkäriillesi tai apteekkiin.

5. CANODERMIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Canoderm sisältää

- Vaikuttava aine on karbamidi 50 mg/g.
- Muut aineet ovat keskipitkäketjuiset triglyseridit, setostearyylialkoholi, polysorbaatti 60, hydrattu rapsiöljy, propyleeniglykoli, karbomeeri, dimetikoni, kiinteä paraffiini, glyserolipolymetakrylaatti, etyyli parahydroksibentsoaatti (E 214), metyyli parahydroksibentsoaatti (E 218), natriumlaktaattiliuos, maitohappo, glyseryylistearaatti, polyoksyetyleenistearaatti ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkausko (pakkaus koot)

Lääkevalmisteen kuvaus: Valkoinen, emulsiovoide.

Pakkausko:

Muoviputki (polyeteeni), jossa on kierrekorkki, 30 g.

Muoviputki (polyeteeni), jossa on auki napsautettava korkki, 100 g.

Muoviputki (polyeteeni), jossa on auki napsautettava korkki, 210 g.

Muovipurkki (polypropeeni) jossa on pumppumekanismi, 380 g.

Muovipurkki (polypropeeni) jossa on pumppumekanismi, 500 g.

Muovipurkki (polypropeeni), täyttöpakkaus pumppumekanismilla varustetulle muovipurkille, 500 g.

Kaikkia pakkauskoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

ACO Hud Nordic AB, Box 622, SE-194 26 Upplands Väsby, Ruotsi

Valmistaja:

Bioglan AB, Malmö, Ruotsi

Medgenix Benelux NV, Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem, Belgia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Suomi

ACO Pharma Oy
PL 92
02601 Espoo

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi
05.10.2018

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Canoderm 5 % kräm Karbamid (ureum)

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Canoderm måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Canoderm är och vad det används för
2. Innan du använder Canoderm
3. Hur du använder Canoderm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Canoderm ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD CANODERM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Canoderm är en vit mjukgörande kräm som innehåller 5 % karbamid. Karbamid har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.

Canoderm används för fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst och för att förebygga återfall av atopiskt eksem.

2. INNAN DU ANVÄNDER CANODERM

Använd inte Canoderm

- om du är allergisk (överkänslig) mot karbamid eller något av övriga innehållsämnen i Canoderm

Var särskilt försiktig med Canoderm

- Undvik att smörja kräm i ögon, näsa, öron, öppna sår eller på slemhinnor.

Graviditet och amning

Canoderm kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Canoderm påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Canoderm

Canoderm kräm innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Canoderm kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Canoderm kräm innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.

3. HUR DU ANVÄNDER CANODERM

Fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst:

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten.

Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

Förebyggande av återfall av atopiskt eksem:

Krämen smörjes in minst två gånger dagligen samt helst efter kontakt med vatten.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Canoderm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. *Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):* Krämen kan ge lokal övergående sveda och värmekänsla. Ansiktet är särskilt känsligt.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR CANODERM SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är karbamid 50 mg/g.
- Övriga innehållsämnen är medellångkedjiga triglycerider, polysorbit 60, cetostearylalkohol, hydrerad rapsolja, propylenglykol, karbomer, dimetikon, fast paraffin, glycerolpolymetakrylat, etylparahydroxibensoat (E 214), metylparahydroxibensoat (E 218), natriumlaktatlösning, mjölksyra, glycerylstearat, polyoxyetylenstearat, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: Vit kräm

Förpackningsstorlekar:

Plasttub (polyeten), 30 g, med skruvlock.

Plasttub (polyeten), 100 g, med snäpplock.

Plasttub (polyeten), 210 g, med snäpplock.

Plastburk (polypropen) med pump, 380 g.

Plastburk (polypropen) med pump, 500 g.

Plastburk (polypropen), refillburk till plastburk med pump, 500 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ACO Hud Nordic AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby

Tillverkare:

Bioglan AB, Malmö, Sverige

Medgenix Benelux NV, Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem, Belgien

Finland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

ACO Pharma Oy

PB 92

02601 Esbo

Denna bipacksedel godkändes senast
05.10.2018