

## **Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle**

### **Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteiset tabletit** setiritsiinidihydrokloridi

Yli 30 tabletin pakkauskoot on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteamien allergisten oireiden hoitoon. Ilman lääkärin tekemiä tutkimuksia ja diagnoosia valmistetta ei tule käyttää pidempiä jaksoja. On tärkeää, että lääkäri varmistaa oikean diagnoosin ja pitkäaikaisen setiritsiinilääkityksen tarpeen. Näin vältetään muiden kuin allergisten oireiden turha hoito antihistamiinilääkkeellä.

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai niin kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännä lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

#### **Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Cetirizin-ratiopharm on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Cetirizin-ratiopharmia
3. Miten Cetirizin-ratiopharmia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Cetirizin-ratiopharmin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Cetirizin-ratiopharm on ja mihin sitä käytetään**

Cetirizin-ratiopharm tablettien vaikuttava aine on setiritsiinidihydrokloridi.

Cetirizin-ratiopharm on allergialääke.

Cetirizin-ratiopharm on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 6-vuotiaiden lasten

- kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyvien nenä- ja silmäoireiden hoitoon
- pitkäaikaisen nokkosihottuman (kroonisen idiopaattisen urtikarian) hoitoon.

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Cetirizin-ratiopharmia**

##### **Älä käytä Cetirizin-ratiopharmia, jos**

- sinulla on vaikea munuaissairaus (vaikea munuaisten vajaatoiminta ja kreatiniinipuhdistuma on alle 10 ml/min)
- olet allerginen setiritsiinille, tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6), hydroksitsiinille tai piperatsiinijohdoksille (tämän lääkevalmisteen vaikuttavan aineen sukulaisaineille).

#### **Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Cetirizin-ratiopharm -lääkettä.

Jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta, kysy neuvoa lääkäriltä ja ota tarvittaessa pienempi annos. Lääkäri määrää sinulle uuden annostuksen.

Kysy neuvoja lääkäriltä myös, jos sinulla on virtsaamisvaikeuksia (esim. selkäydinvamman tai eturauhaseen tai virtsarakkoon liittyvän vaivan vuoksi).

Jos sairastat epilepsiaa tai sinulla on alttius saada kouristuksia, ota yhteyttä lääkäriin saadaksesi neuvoja.

Alkoholin (pitoisuus veressä 0,5 promillea (g/l), mikä vastaa yhtä viinilasillista) ja suositusannoksina käytettävän setiritsiinin välillä ei ole havaittu kliinisesti merkitseviä yhteisvaikutuksia. Suositusannoksia suurempien setiritsiiniannosten ja alkoholin yhteiskäytön turvallisuudesta ei kuitenkaan ole tietoja saatavana. Siksi alkoholin samanaikaista käyttöä Cetirizin-ratiopharm tablettien kanssa suositellaan välttämään, kuten muidenkin antihistamiinien käytön yhteydessä.

Jos sinulle suunnitellaan allergiatestin tekemistä, kysy lääkäriltä, onko sinun lopetettava Cetirizin-ratiopharm tablettien käyttö jo muutamaa päivää ennen testin tekemistä. Tämä lääke saattaa vaikuttaa allergiatestin tuloksiin.

### **Muut lääkevalmisteet ja Cetirizin-ratiopharm**

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Setiritsiinin ominaisuuksien perusteella muiden lääkeaineiden kanssa ei odoteta esiintyvän yhteisvaikutuksia.

### **Cetirizin-ratiopharm ruuan ja juoman kanssa**

Ruoka ei vaikuta merkitsevästi setiritsiinin imeytymiseen.

### **Raskaus ja imetys**

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

#### Raskaus

Cetirizin-ratiopharm tablettien käyttöä on vältettävä raskauden aikana. Raskaana olevalle naiselle vahingossa annettu lääke ei todennäköisesti aiheuta sikiölle haitallisia vaikutuksia. Raskauden aikana tätä lääkevalmistetta tulisi kuitenkin käyttää vain tarvittaessa ja lääkärin kanssa käydyän keskustelun jälkeen.

#### Imetys

Setiritsiini erittyy ihmisen rintamaitoon, joten älä käytä Cetirizin-ratiopharm tabletteja imetyksen aikana keskustelematta etukäteen asiasta lääkärin kanssa.

### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Kliiniset tutkimukset eivät ole viitanneet siihen, että valmiste heikentäisi huomiokykyä, vireystilaa tai ajokykyä, kun Cetirizin-ratiopharm tabletteja käytetään suositeltuina annoksina.

Seuraa tarkoin, miten elimistösi reagoi ottamaasi Cetirizin-ratiopharm tablettiin, jos aiot ajaa, ryhtyä vaaraa mahdollisesti aiheuttaviin toimiin tai käyttää koneita. Älä ylitä suositeltuja annoksia.

### **Cetirizin-ratiopharm sisältää laktoosia**

Cetirizin-ratiopharm tabletit sisältävät laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

## **3. Miten Cetirizin-ratiopharmia käytetään**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

### **Miten ja milloin Cetirizin-ratiopharm tabletteja otetaan?**

Noudata seuraavia ohjeita, ellei lääkäri ole antanut sinulle muunlaisia annostusohjeita. Noudata annettuja ohjeita, sillä muuten lääke ei välttämättä saavuta täyttä tehoa.  
Tablettien nielemisen yhteydessä on juotava lasillinen nestettä.

*Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret:*

10 mg (1 tabletti) kerran vuorokaudessa.

*6–12-vuotiaat lapset:*

5 mg (½ tablettia) kaksi kertaa vuorokaudessa.

*Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat:*

Keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoitoon suositellaan 5 mg kerran vuorokaudessa.

Jos sinulla on jokin vakava munuaissairaus, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan saadaksesi tietoa sinulle sopivasta annoksesta.

Jos lapsellasi on jokin munuaissairaus, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan saadaksesi tietoa lapsellesi sopivasta annoksesta.

Jos Cetirizin-ratiopharm tablettien vaikutus on mielestäsi liian heikko tai liian voimakas, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Jos oireet eivät helpota kolmen (3) päivän kuluessa lääkityksen aloittamisesta, ota yhteyttä lääkäriin.

*Hoidon kesto:*

Hoidon kesto riippuu oireidesi luonteesta, kestosta ja etenemisestä. Kysy apteekista neuvoa.

### **Jos otat enemmän Cetirizin-ratiopharmia kuin sinun pitäisi**

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannoksen ottamisen jälkeen seuraavassa mainittuja haittavaikutuksia saattaa esiintyä tavallista voimakkaampana. Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu: sekavuus, ripuli, huimaus, väsymys, päänsärky, huonovointisuus, silmien mustuaisten laajeneminen, kutina, levottomuus, lääkkeen rauhoittava vaikutus, uneliaisuus, tokkuraisuus, poikkeavan nopea sydämensyke, vapina ja virtsaumpi.

### **Jos unohdat ottaa Cetirizin-ratiopharmia**

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

### **Jos lopetat Cetirizin-ratiopharmin käytön**

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

**Seuraavat haittavaikutukset ovat harvinaisia tai hyvin harvinaisia. Jos kuitenkin huomaat niitä, lopeta tämän lääkevalmisteen käyttö ja keskustele heti lääkärin kanssa:**

- allergiset reaktiot, myös vaikeat reaktiot ja angioedeema (vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen tai kurkun turpoamista).

Tällaiset allergiset reaktiot voivat ilmetä pian lääkkeen ensimmäisen ottokerran jälkeen tai vasta myöhemmin.

*Yleiset haittavaikutukset* (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä):

- uneliaisuus
- huimaus, päänsärky
- nielutulehdus, nuha (lapsilla)
- ripuli, pahoinvointi, suun kuivuminen
- uupumus.

*Melko harvinaiset haittavaikutukset* (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 100:sta):

- levottomuus
- harhatuntemukset (parestesiat)
- vatsakipu
- kutina (kutiava iho), ihottuma
- voimattomuus (äärimmäinen uupumus), huonovointisuus.

*Harvinaiset haittavaikutukset* (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 1000:sta):

- allergiset reaktiot, joista osa voi olla vaikeita (hyvin harvinaista)
- masennus, aistiharhat, aggressiivisuus, sekavuus, unettomuus
- kouristukset
- sydämen tiheälyöntisyys
- poikkeava maksan toiminta
- urtikaria (nokkosihottuma)
- turvotus
- painonnousu.

*Hyvin harvinaiset haittavaikutukset* (enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10000:sta):

- verihutaleiden vähyys (trombosytopenia)
- nykimishäiriö ("elohiiri")
- pyörtyminen, pakkoliikkeet, lihasjänteys-häiriö (pitkittyneet epänormaalit lihassupistukset), vapina, makuhäiriö
- näön hämärtyminen, silmien mukautumishäiriöt (kohdistusvaikeudet), silmien hallitsematon kierto- liike
- vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen ja kurkun turpoamista (angioedeema), lääkeihottuma
- poikkeavuudet virtsatessa (yökastelu, kipu virtsatessa ja/tai virtsaamisen vaikeutuminen).

*Haittavaikutukset, joiden yleisyys on tuntematon* (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

- lisääntynyt ruokahalu
- itsemurha-ajatukset (toistuvat itsemurha-ajatukset tai itsemurhaan liittyvät päänäpintymät)
- muistinmenetyt, muistihäiriöt
- pyöritys (pyörivä tai huojuva tunne)
- virtsaumpi (kyvyttömyys tyhjentää rakko kokonaan).

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea  
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri  
PL 55  
00034 Fimea

## **5. Cetirizin-ratiopharmin säilyttäminen**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim. / EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

### **Mitä Cetirizin-ratiopharm sisältää**

Vaikuttava aine on setiritsiinihydrokloridi. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg setiritsiinihydrokloridia.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, titaanidioksidi (E 171), hypromelloosi 5cP (E 464) ja makrogoli 400.

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoost**

Tabletit ovat valkoisia, pyöreitä ja niiden toisella puolella on jakouurre.

Tabletit on pakattu läpipainolevyihin, jotka koostuvat PVC/PVDC- ja alumiinikerroksista.

7, 10, 20, 30, 50, 90 ja 100 tablettia läpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

### **Myyntiluvan haltija**

ratiopharm GmbH, Ulm, Saksa

### **Valmistaja**

Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

ratiopharm Oy, PL 67, 02631 Espoo

Puh: 020-180 5900

**Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 12.12.2016**

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmdragerade tabletter** cetirizindihydroklorid

Förpackningsstorlekar med över 30 tabletter är avsedda för behandling av allergiska symtom som tidigare konstaterats av läkare. Utan läkarundersökningar och –diagnos får preparatet inte användas i långa perioder. Det är viktigt att en läkare fastställer rätt diagnos och behovet av en långvarig cetirizinbehandling. På detta sätt undviks situationer där allergimedieiner används i onödan för behandling av symtom som felaktigt antas bero på allergi.

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Cetirizin-ratiopharm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cetirizin-ratiopharm
3. Hur du använder Cetirizin-ratiopharm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cetirizin-ratiopharm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Cetirizin-ratiopharm är och vad det används för**

Den aktiva ingrediensen i Cetirizin-ratiopharm 10 mg tabletter är cetirizindihydroklorid. Cetirizin-ratiopharm är ett läkemedel mot allergi.

Till vuxna och barn från 6 år används Cetirizin-ratiopharm för

- att lindra näs- och ögonsymtom i samband med säsongsbunden och kronisk rinit (allergisk snuva)
- lindring av kroniska nässelutslag (kronisk idiopatisk urtikaria).

#### **2. Vad du behöver veta innan du använder Cetirizin-ratiopharm**

**Använd inte Cetirizin-ratiopharm, om**

- du har någon svår njursjukdom (allvarligt nedsatt njurfunktion med en kreatininclearance på under 10 ml/min)
- du är allergisk mot cetirizin, något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), hydroxizin eller piperazinderivat (närbesläktade aktiva substanser i andra läkemedel).

### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cetirizin-ratiopharm.

Om du har nedsatt njurfunktion ska du rådgöra med läkare. Dosen kan behöva justeras. Den nya dosen bestäms av läkaren.

Om du har svårigheter att urinera (t.ex. på grund av ryggmärgsskada, problem med prostatan eller urinblåsan) ska du vända dig till läkare för närmare råd.

Om du har epilepsi eller riskerar att få kramper ska du rådgöra med läkare.

Inga kliniskt sett betydande samverkningar har konstaterats mellan alkohol (vid 0,5 promille (g/l) i blodet, vilket motsvarar ett glas vin) och cetirizin vid rekommenderade doser. Säkerhetsdata gällande samtidig användning av alkohol och cetirizindoser som överskrider de rekommenderade doserna saknas dock. Precis som i samband med bruk av alla andra antihistaminer bör därför samtidig konsumtion av alkohol helst undvikas.

Om du ska genomgå ett allergitest, ska du fråga läkaren om du måste avbryta behandlingen med cetirizin några dagar före själva testet. Detta läkemedel kan påverka resultatet av allergitestet.

### **Andra läkemedel och Cetirizin-ratiopharm**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

På basen av cetirizins egenskaper förväntas ingen påverkan på eller av andra läkemedel.

### **Cetirizin-ratiopharm med mat och dryck**

Absorptionen av cetirizin påverkas inte nämnvärt av föda.

### **Graviditet och amning**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

#### Graviditet

Cetirizin-ratiopharm ska inte användas av gravida kvinnor. Oavsiktlig användning av läkemedlet hos gravida kvinnor orsakar sannolikt ingen skada på fostret. Detta läkemedel ska endast användas vid behov och efter diskussion med läkare.

#### Amning

Cetirizin utsöndras i bröstmjölk. Du ska därför inte använda Cetirizin-ratiopharm under amning utan att först ha talat med läkare.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Kliniska studier har inte visat att Cetirizin-ratiopharm skulle försämra uppmärksamheten, vaksamheten eller körförmågan vid rekommenderade doser.

Iaktta noga hur du reagerar på ett intag av Cetirizin-ratiopharm om du tänkt framföra motorfordon, delta i möjligen riskfyllda aktiviteter eller använda maskiner under behandlingen. Överskrid inte den rekommenderade dosen.

### **Cetirizin-ratiopharm innehåller laktos**

Cetirizin-ratiopharm tablettorna innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

## **3. Hur du använder Cetirizin-ratiopharm**

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **Hur och när ska man ta Cetirizin-ratiopharm?**

Dessa riktlinjer gäller såvida inte läkaren har gett dig andra instruktioner om hur du ska använda Cetirizin-ratiopharm. Följ dessa instruktioner, annars har kanske Cetirizin-ratiopharm inte full effekt.

Tabletterna ska sväljas hela med ett glas vätska.

*Vuxna och ungdomar över 12 år:*

10 mg en gång dagligen som 1 tablett.

*Barn mellan 6 och 12 år:*

5 mg två gånger dagligen (tas som ½ tablett 2 gånger dagligen).

*Patienter med nedsatt njurfunktion:*

Rekommenderad dos till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion är 5 mg en gång dagligen.

Om du har någon svår njursjukdom bör du kontakta läkare eller apotekspersonal för att få din dos justerad enligt behov.

Om ditt barn har något njurbesvär ska du kontakta läkare eller apotekspersonal, som kan justera dosen så att den passar ditt barns tillstånd och behov.

Om du upplever att effekten av Cetirizin-ratiopharm är för svag eller för stark ska du kontakta läkare.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

*Behandlingstid:*

Behandlingstiden beror på typ, varaktighet och orsak till dina besvär. Rådfråga apoteket.

### **Om du har tagit för stor mängd av Cetirizin-ratiopharm**

Om du fått i dig en alltför stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Efter en överdos kan följande biverkningar uppträda med ökad intensitet: Biverkningar som förvirring, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, pupillvidgning, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnhet, känsla av omtöckning, onormalt hög hjärtfrekvens, darrningar och svårigheter att kasta vatten (urinstämna) har rapporterats.

### **Om du har glömt att ta Cetirizin-ratiopharm**

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

### **Om du slutar att använda Cetirizin-ratiopharm**

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.



**Följande biverkningar är sällsynta eller mycket sällsynta, men om du observerar dessa biverkningar ska du genast sluta ta detta läkemedel och kontakta läkare:**

- allergiska reaktioner, som också kan vara allvarliga, samt angioödem (allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad i ansiktet eller i svalget).

Denna typ av allergiska reaktioner kan uppkomma strax efter den första dosen av detta läkemedel, men också först i ett senare skede av behandlingen.

*Vanliga biverkningar* (förekommer hos högst 1 användare av 10):

- sömnhet
- svindel, huvudvärk
- svalginflammation, snuva (hos barn)
- diarré, illamående, muntorrhet
- utmattning.

*Mindre vanliga biverkningar* (förekommer hos högst 1 användare av 100):

- rastlöshet
- känselhallucinationer (parestesier)
- buksmärtor
- klåda (kliande hy), eksem
- kraftlöshet (extrem trötthet), sjukdomskänsla.

*Sällsynta biverkningar* (förekommer hos högst 1 användare av 1 000):

- allergiska reaktioner, som kan vara allvarliga (mycket sällsynt)
- depression, hallucinationer, aggressivitet, förvirring, sömnlöshet
- kramper
- snabb hjärtrytm
- onormal leverfunktion
- urtikaria (nässelutslag)
- svullnad
- viktökning.

*Mycket sällsynta biverkningar* (förekommer hos högst 1 användare av 10 000):

- lågt antal blodplättar (trombocytopeni)
- ofrivilliga ryckningar (tics)
- svimning, tvångsrörelser, rubbningar i muskeltonus (förlängda onormala muskelsammandragningar), darrningar/skakningar, avvikelser i smaksinnet
- dimsyn, ackommodationsstörningar i ögat (svårigheter att fokusera blicken), ofrivilliga cirklande ögonrörelser
- allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad i ansikte och svalg (angioödem), läkemedelsutslag
- onormal urinavgång (sängvätning, smärtsam urinering och/eller svårigheter att urinera).

*Biverkningar utan någon känd frekvens* (förekomst kan inte beräknas från tillgängliga data)

- ökad aptit
- självmordstankar (upprepade funderingar eller tvångstankar gällande självmord)
- minnesförlust, försämring av minnet
- yrsel (känsla av svajande eller snurrande rörelse)
- urinstämna (oförmåga att tömma urinblåsan ordentligt).

**Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

## **5. Hur Cetirizin-ratiopharm ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen efter ”Utg. dat.” och på blisterkortet efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Vad innehåller Cetirizin-ratiopharm**

Den aktiva substansen är cetirizindihydroklorid. Varje filmdragerade tablett innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, titandioxid (E 171), hypromellos 5cP (E 464) och makrogol 400.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Tabletterna är vita, runda och har en brytskåra på den ena sidan.

Tabletterna är förpackade i tryckblisterkort bestående av lager av PVC/PVDC och aluminium.

7, 10, 20, 30, 50, 90 och 100 tabletter i blisterförpackning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### **Innehavare av godkännande för försäljning**

ratiopharm GmbH, Ulm, Tyskland

### **Tillverkare**

Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

ratiopharm Oy, PB 67, 02631 Esbo

Tel: 020-180 5900

**Denna bipacksedel ändrades senast den 12.12.2016**