

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Moviprep jauhe oraaliliuosta varten

makrogoli 3350, natriumsulfaatti (vedetön), natriumkloridi, kaliumkloridi, askorbiinihappo, natriumaskorbaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tästä lääketä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri tai apteekkienkilökunta on neuvonut.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Moviprep on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Moviprep-valmistetta
3. Miten Moviprep-valmistetta otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Moviprep-valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Moviprep on ja mihin sitä käytetään

Moviprep on sitruunanmakuinen ulostuslääke, joka on pakattu neljään annospussiin. Näistä kaksi on isoja annospusseja (annospussi A) ja kaksi on pieniä annospusseja (annospussi B). Yhden hoitokerran aikana käytetään pakkauksen kaikki annospussit.

Moviprep on tarkoitettu aikuisille suoliston tyhjentämiseen valmistauduttaessa tutkimustoimenpiteeseen.

Moviprep vaikuttaa tyhjentämällä suolen sisällön, joten ulosteesi muuttuu vetiseksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Moviprep-valmistetta

Älä ota Moviprep-valmistetta:

- jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos sinulla on suolentukkeuma
- jos suolesi seinämässä on reikä
- jos mahasi tyhjentyminen on häiriintynyt
- jos suolesi toiminta on lamaantunut (voi ilmetä usein vatsaontelon leikkauksen jälkeen)
- jos sinulla on fenylyliketonuria, joka on perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei kykene pilkkomaan tiettyjä aminohippoja. Moviprep sisältää fenyylialaniinin lähteitä.
- jos elimistösi ei tuota riittävästi glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasia
- jos sinulla on toksinen megakoolon (vakava paksusuolen tulehdus).

Varoitukset ja varotoimet

Sinun on kiinnitettävä eritystä huomiota kohdassa 4 lueteltuihin haittavaikutuksiin, jos terveytesi on heikko tai sinulla on vakava sairaus. Jos asia huolestuttaa sinua, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin otat Moviprep-valmistetta:

- jos nielty juoma tai ruoka tai mahahapot pyrkivät nousemaan mahalaukusta ruokatorveen tai jos sinulla on nielemisvaikeuksia (katso myös Moviprep ruuan ja juoman kanssa)
- jos sinulla on munuaissairaus
- sinulla on sydämen toiminnanvajaus, vaikeita munuaisongelmia tai otat verenpainelääkkeitä
- jos sinulla on sydämen vajaatoiminta tai sydänsairaus, mukaan lukien korkea verenpaine, epäsäännöllinen sydämensyke tai sydämentykytystä
- jos sinulla on kilpirauhassairaus
- jos sinulla on nestehukka
- jos sinulla on tulehuksellisen suolistosairauden (Crohnin taudin tai haavaisen koliitin) äkillinen pahaneminen
- sinulla on epilepsia tai sinulla on ollut kouristuskohtauksia.

Moviprep-valmistetta ei pidä antaa ilman lääkärin valvontaa potilaalle, jonka tajunnantaso on alentunut.

Jos sinulle ilmaantuu äkillistä vatsakipua tai verenvuotoa peräsuolesta, kun olet ottanut Moviprep-valmistetta suolen tyhjentämistä varten, ota heti yhteyttä lääkäriin tai hakeudu välittömästi hoitoon.

Jos sinulla ilmenee (veristä) oksentelua, jota seuraa äkillinen rinta-, kaula- tai vatsakipu, nielemisvaikeuksia tai hengitysvaikeuksia Moviprep-valmisteen käytön aikana, lopeta lääkkeen ottaminen ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Lapset ja nuoret

Alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret eivät saa käyttää Moviprep-valmistetta.

Muut lääkevalmisteet ja Moviprep

Kerro lääkäriille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käytänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät suun kautta muita lääkkeitä (esim. ehkäisytabletteja), niitä ei pidä ottaa tuntia ennen Moviprep-valmisteen ottamista, sen ottamisen aikana tai tunti sen ottamisen jälkeen, koska ne voivat muutoin huuhtoutua pois ruoansulatuskanavasta eikä niiden vaikutus ole tällöin riittävä.

Jos käytät suun kautta otettavia ehkäisyvalmisteita, saatat joutua käyttämään muita ehkäisymuotoja (esim. kondomia) raskauden ehkäisemiseksi.

Moviprep ruuan ja juoman kanssa

Älä syö kiinteää ruokaa hoidon aloittamisen jälkeen ennen kuin toimenpide on tehty.

Jos sinun on sakeutettava nesteitä ennen kuin voit niellä niitä turvallisesti, on huomattava, että Moviprep -valmiste saattaa estää sakeuttamisaineen vaikutuksen.

Juo runsaasti nesteitä, kun käytät Moviprep-valmistetta. Moviprep-liuos ei täytä normaalina nesteen tarvetta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Moviprep-valmisten käytöstä raskauden ja imetyksen aikana ei ole tietoa, minkä vuoksi sitä tulee käyttää tällaisessa tilanteessa vain, jos lääkäri katsoo sen välttämättömäksi. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäristä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Moviprep ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Moviprep sisältää natriumia, kaliumia ja fenyylialaniinin lähteet

Tämä lääkevalmiste sisältää 8,4 g natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per hoitokerta (hoitokerta käsittää 2 litraa Moviprep-valmistetta). Tämä vastaa 420 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausinnoksesta aikuiselle. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, on otettava tämä huomioon. Vain osa natriumista (enintään 2,6 g per hoitokerta) imeytyy.

Tämä lääkevalmiste sisältää kaliumia 1,1 g per hoitokerta (hoitokerta käsittää 2 litraa Moviprep-valmistetta). Potilaiden, joilla on munuaisten vajaatoiminta tai ruokavalion kaliumrajoitus, on otettava tämä huomioon.

Moviprep sisältää aspartaamia, joka on fenyylialaniinin lähde. Voi olla haitallinen henkilölle, joilla on fenylyliketonuria.

3. Miten Moviprep-valmistetta otetaan

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkienkilökunta on määränyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 2 litraa liuosta, joka on valmistettu käyttövalmiiksi seuraavasti:

Pakaus sisältää kaksi läpinäkyvää pussia, jotka sisältävät yhden annospussiparin: annospussit A ja B. Yhden annospussiparin (A ja B) jauheet liuotetaan veteen niin, että saadaan yksi litra liuosta. Pakaus riittää kahteen litraan Moviprep-liuosta.

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen Moviprep-valmisteen ottamista. Sinun tulee tietää:

- milloin Moviprep-valmistetta otetaan
- miten Moviprep-liuos valmistetaan
- miten Moviprep-valmistetta otetaan
- millaisia vaikutuksia voi odottaa hoidosta.

Milloin Moviprep-valmistetta otetaan

Ota tästä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määränyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma. Moviprep-hoito on otettava kokonaisuudessaan ennen tutkimusta.

Tämä hoito voidaan toteuttaa joko jaettuna annoksina tai kerta-annoksena seuraavasti:

Toimenpiteet, joissa sinut nukutetaan (käytetään yleisanestesiaa):

1. Jaetut annokset: yksi litra Moviprep-liuosta tutkimusta edeltäväänä iltana ja yksi litra Moviprep-liuosta varhain tutkimuspäivän aamuna. Moviprep-liuos ja kaikki muut kirkkaat nesteet on oltava juotuina vähintään kaksi tuntia ennen tutkimuksen aloitusta.
2. Kerta-annos: kaksi litraa Moviprep-liuosta tutkimusta edeltäväänä iltana tai kaksi litraa Moviprep-liuosta tutkimuspäivän aamuna. Moviprep-liuos ja kaikki muut kirkkaat nesteet on oltava juotuina vähintään kaksi tuntia ennen tutkimuksen aloitusta.

Toimenpiteet, joissa sinua ei nukuteta (ei käytetä yleisanestesiaa):


1. Jaetut annokset: yksi litra Moviprep-liuosta tutkimusta edeltäväänä iltana ja yksi litra Moviprep-liuosta varhain tutkimuspäivän aamuna. Moviprep-liuos ja kaikki muut kirkkaat nesteet on oltava juotuina vähintään yksi tunti ennen tutkimuksen aloitusta.

2. Kerta-annos: kaksi litraa Moviprep-liuosta tutkimusta edeltävänä iltana tai kaksi litraa Moviprep-liuosta tutkimuspäivän aamuna. Moviprep-liuos on oltava juotuna vähintään kaksi tuntia ennen tutkimuksen aloitusta. Kaikki muut kirkkaat nesteet on oltava juotuina vähintään yksi tunti ennen tutkimuksen aloitusta.

Tärkeää! Älä syö kiinteää ruokaa Moviprep-valmisteen käytön aloittamisen jälkeen ennen kuin toimenpide on tehty.

Miten Moviprep-liuos valmistetaan

- Avaa toinen läpinäkyvä pussi ja ota siitä annospussit A ja B.
- Kaada sekä annospussi A:n että annospussi B:n sisältö litran mitta-astiaan.
- Lisää vettä mitta-astiaan yhden litran merkkiin asti ja sekoita, kunnes jauhe on liuennut kokonaan ja Moviprep-liuos on kirkasta tai hieman sameaa. Tämä vie korkeintaan 5 minuuttia.



Miten Moviprep-valmistetta otetaan

Juo ensimmäinen litra Moviprep-liuosta 1-2 tunnin kuluessa. Yritä juoda lasillinen liuosta aina 10-15 minuutin välein.

Kun litra liuosta on juotu, valmista ja juo toinen litra jäljellä olevista annospusseista A ja B valmistettua Moviprep-liuosta.

Hoidon aikana suositellaan juotavaksi lisäksi litra *kirkasta* nestettä voimakkaan janon ja nestehukan välttämiseksi. Sopivia juomia ovat vesi, kirkas keitto, hedelmämehu (*ilman hedelmälihaa*), virvoitusjuomat, tee tai kahvi (*ilman maitoa*). Näitä juomia voit juoda, kunnes tutkimukseen on vähintään kaksi tuntia, jos sinut nukutetaan, tai vähintään yksi tunti, jos sinua ei nukuteta.

Millaisia vaikuttuksia voit odottaa hoidosta

Kun aloitat Moviprep-liuoksen juomisen, on tärkeää, että olet WC:n läheisyydessä. Ulosteesi muuttuvat jossakin vaiheessa vetisiksi. Tämä on täysin normaalista ja osoittaa, että Moviprep-liuos vaikuttaa. Ulostaminen loppuu, kun kaikki liuos on juotu.

Näitä ohjeita noudattamalla suolesi puhdistuu, mikä auttaa toimenpiteen onnistumista. Varaa liuoksen juomisen jälkeen riittävästi aikaa päästääksesi paikkaan, jossa paksusuoli tähystetään.

Jos otat enemmän Moviprep-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos otat enemmän Moviprep-liuosta kuin sinun pitäisi, sinulla saattaa esiintyä voimakasta ripulia, joka voi johtaa nestehukkaan. Juo runsaita määriä nestettä, etenkin hedelmämehua. Jos asia huolestuttaa sinua, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Jos unohdat ottaa Moviprep-valmistetta

Jos unohdat ottaa Moviprep-liuosta, ota annos niin pian kuin huomaat unohtaneesi ottaa sitä. Jos sinun olisi pitänyt ottaa liuosta jo useita tunteja aiemmin, kysy neuvoa lääkäristä tai apteekista. Kun otat Moviprep-valmisteen jaettuina annoksina, on tärkeää, että olet juonut koko Moviprep-liuosmäärän vähintään yksi tunti ennen tutkimusta (jos sinua ei nukuteta) tai vähintään kaksi tuntia ennen tutkimusta (jos sinut nukutetaan). Kun otat Moviprep-valmisteen kerta-annoksesta tutkimuspäivän aamuna, on tärkeää, että olet juonut koko Moviprep-liuosmäärän vähintään kaksi tuntia ennen tutkimusta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ripuli on Moviprep-valmisteen normaali vaikutus.

Lopeta valmisten käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmenee jokin seuraavista haittavaikutuksista:

- ihottumaa tai kutinaa
- kasvojen, nilkojen tai muiden kehonosien turvotusta
- sydämentykyystä
- erittäin voimakasta väsymystä
- hengenahdistusta.

Kaikki edellä mainitut oireet ovat merkkejä vakavasta allergisesta reaktiosta.

Lopeta Moviprep-valmisten käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos havaitset seuraavia haittavaikutuksia:

- kouristuskohtaus.

Jos ulostamistarvetta ei ilmene kuuden tunnin kuluessa Moviprep-valmisten ottamisesta, lopeta liuoksen juominen ja ota heti yhteyttä lääkäriin.

Muita haittavaikutuksia ovat:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattaa ilmetä yli 1 käyttäjällä kymmenestä):
vatsakipu, vatsan pingottuneisuus, väsymys, yleinen huonovointisuus, peräaukon arkuus, pahoinvointi ja kuume.

Yleiset haittavaikutukset (saattaa ilmetä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä):
nälän tunne, univaikeudet, huimaus, päänsärky, oksentelu, ruoansulatusvaivat, jano ja vilunväristykset.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa ilmetä enintään 1 käyttäjällä sadasta):
epämiellyttävä olo, nielemisvaikeudet ja muutokset maksan toimintakokeissa.

Seuraavia haittavaikutuksia on joskus havaittu, mutta ei tiedetä, kuinka usein niitä esiintyy, koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin: ilmavaivat, tilapäinen verenpaineen kohoaminen, epäsäännöllinen sydämensyke tai sydämentykytys, nestehukka, oksettava olo, oksentelun aiheuttama ruokatorven repeämä, hyvin alhaiset, kouristuksia aiheuttavat natriumarvot ja muutokset veren elektrolyytipitoisuksissa: alentunut bikarbonaatipitoisuus, kohonnut tai alentunut kalsiumpitoisuus, kohonnut tai alentunut kloridipitoisuus, alentunut fosfaattipitoisuus. Veren kalium- ja natriumpitoisuudet saattavat myös alentua.

Nämä haittavaikutukset esiintyvät tavallisesti vain Moviprep-hoidon aikana. Jos ne kuitenkin jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin.

Allergiset reaktiot saattavat aiheuttaa ihottumaa, kutinaa, ihmisen punoitusta tai nokkosihottumaa, käsienväritystä, jalkojen tai nilkojen turvotusta, päänsärkyä, sydämentykyystä ja hengenahdistusta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkienhenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Moviprep-valmisten säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Huomaa, että eri annospusseissa ei vältämättä ole samaa viimeistä käyttöpäivämäärää. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Kun Moviprep-jauhe on liuotettu veteen, liuos voidaan säilyttää (peitetynä) alle 25 °C. Liuos voidaan myös säilyttää jäällykissä (2-8 °C). Käytövalmis liuos on käytettävä 24 tunnin kuluessa.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Moviprep sisältää

Annospussi A:n sisältämät vaikuttavat aineet ovat:

makrogoli (tunnetaan myös polyetyleeniglykolina)	3350	100 g
natriumsulfaatti, vedetön		7,500 g
natriumkloridi		2,691 g
kaliumkloridi		1,015 g

Annospussi B:n sisältämät vaikuttavat aineet ovat:

askorbiinihappo	4,700 g
natriumaskorbaatti	5,900 g

Kun kumpikin annospussi on sekoitettu litraan vettä, liuoksen elektrolyyyttisältö on seuraava:

natriumia	181,6 mmol/l (josta imetyy enintään 56,2 mmol)
kloridia	59,8 mmol/l
sulfaattia	52,8 mmol/l
kaliumia	14,2 mmol/l
askorbaattia	56,5 mmol/l

Muut aineet ovat:

situuna-aromi (sisältää maltodekstriiniä, sitraalia, sitruunaöljyä, limettiöljyä, ksantaanikumia, E-vitamiinia) sekä makeutusaineina aspartaami (E 951) ja asesulfaamikalium (E 950). Katso lisätietoja kohdasta 2.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Pakaus sisältää kaksi läpinäkyvää pussia, joissa kummassakin on annospussipari: annospussi A ja annospussi B. Annospussipari (yksi annospussi A ja yksi annospussi B) liuotetaan yhteen litraan vettä.

Moviprep jauhe oraaliliuosta varten -valmiste on saatavilla 1, 10, 40, 80, 160 ja 320 hoitokerran pakkauksina ja 40 hoitokerran sairaalapakkauksina.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Norgine B.V.
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Alankomaat.

Valmistaja:

Norgine Limited, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan CF82 8SJ, Iso-Britannia
tai
Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Alankomaat
tai
Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, 263 35 Höganäs, Ruotsi
tai
Sophartex, 21 rue du Pressoir 28500 Vernouillet Ranska.

Tällä lääkkeellä on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluviin jäsenvaltioihin ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Pohjois-Irlannissa) seuraavilla kauppanimillä:

MOVIPREP: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Tsekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Islanti, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

MOVPREP: Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.12.2024

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille:

Moviprep-valmistetta on annettava varoen heikkokuntoisille potilaille tai potilaille, joilla on vakava klininen toiminnanvajaus, kuten:

- heikentynyt nieluheiaste tai vaara mahalaukun tai ylemmän mahasuolikanavan sisällön joutumisesta keuhkoihin (aspiraatio-tai regurgitaatiotaipumus)
- alentunut tajunnantaso
- vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min)
- sydämen vajaatoiminta (NYHA-luokka III tai IV)
- rytmihäiriöriski, kuten potilailla, jotka saavat hoitoa sydän- ja verisuonitaudin vuoksi tai joilla on kilpirauhassairaus
- nestehukka
- vaikea akuutti tulehdusellinen suolistotauti.

Nestehukka ja elektrolyyttitasapainon muutokset on hoidettava ennen Moviprep-valmisteen käyttöä.

Potilaita, joiden tajunnantaso on alentunut tai joilla mahalaukun tai ylemmän mahasuolikanavan sisältöä voi joutua keuhkoihin, on seurattava tarkoin annon aikana etenkin, jos anto tapahtuu nenä-mahaletkun kautta.

Moviprep-valmistetta ei saa antaa tajuttomille potilaille.

Bipacksedel: Information till användaren

Moviprep pulver för oral lösning

makrogol 3350, natriumsulfat (vattenfritt), natriumklorid, kaliumklorid, askorbinsyra, natriumaskorbat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Moviprep är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Moviprep
3. Hur du tar Moviprep
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Moviprep ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Moviprep är och vad det används för

Moviprep är ett laxermedel med citronsmak. Pulvret är fördelat på 4 dospåsar. Två av dessa är stora dospåsar (dospåse A) och två är små dospåsar (dospåse B). Du ska använda alla påsar i förpackningen under en behandling.

Moviprep är ett läkemedel avsett för vuxna som används för tömning av tarmen vid förberedelse inför en undersökning.

Moviprep verkar genom att tömma innehållet i tarmarna, och därfor blir din avföring vattnig.

2. Vad du behöver veta innan du tar Moviprep

Använd inte Moviprep:

- om du är allergisk mot de aktiva substanserna eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har tarmstopp
- om du har hål i tarmväggen
- om du har störningar i tömningen av magen
- om din tarmfunktion är förlamad (kan ofta förekomma efter en operation i bukhålan)
- om du har fenylketonuri, som är en ärflig sjukdom där kroppen inte kan omsätta en speciell aminosyra. Moviprep innehåller en källa till fenylalanin (aspartam)
- om din kropp inte producerar tillräckligt med glukos-6-fosfodehydrogenas
- om du lider av toxisk megakolon (en allvarlig typ av inflammation i tjocktarmen).

Varningar och försiktighet

Du bör fästa särskild uppmärksamhet vid biverkningarna som uppräknas i avsnitt 4 om din hälsa är svag eller om du lider av någon allvarlig sjukdom. Kontakta läkare eller apotekspersonal om saken bekymrar dig.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Moviprep:

- om nedsvald mat eller dryck eller magsyror stiger upp från magsäcken till matstrupen, eller om du har problem att svälja (se också Moviprep med mat och dryck)
- om du har en njursjukdom
- har hjärtsvikt, allvarliga njurproblem eller tar blodtrycksmedicin
- om du har hjärtsvikt eller hjärtsjukdom, inklusive högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm eller hjärtklappningar
- om du har en sköldkörtelsjukdom
- om du har vätskebrist
- om du har inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom eller ulcerös kolit) som plötsligt försämras
- har epilepsi eller har haft krampanfall.

Moviprep ska inte ges till en patient, som har nedsatt medvetandegrad, utan övervakning av läkare.

Om du upplever plötslig buksmärta eller ändtarmsblödning medan du tar Moviprep för tarmrengöring ska du omedelbart kontakta läkare eller uppsöka sjukvård.

Om du får (blod)kräkningar åtföljt av plötslig bröst-, nack- eller buksmärta, svårigheter att svälja eller andningssvårigheter när du tar Moviprep ska du sluta ta läkemedlet och omedelbart kontakta din läkare.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år får inte använda Moviprep.

Andra läkemedel och Moviprep

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om du använder andra läkemedel som tas via munnen (t.ex. p-piller) ska du inte ta dem en timme före eller en timme efter intag av Moviprep eller medan du tar Moviprep, för annars kan de sköljas bort från matsmältningskanalen och då är deras effekt inte tillräcklig.

Om du använder preventivmedel som tas via munnen, kan du behöva använda andra former av prevention (t.ex. kondom) för att förhindra graviditet.

Moviprep med mat och dryck

Ät inte fast föda efter att behandlingen inletts tills ingreppet är utfört.

Om du behöver förtjocka vätskor för att kunna svälja dem säkert, kan Moviprep motverka effekten av förtjockningsmedlet.

Drick rikligt med vätska när du använder Moviprep. Moviprep-lösningen tillgodosser inte det normala vätskebehovet.

Graviditet, amning och fertilitet

Eftersom information gällande användning av Moviprep under graviditet och amning saknas bör preparatet användas i dessa fall endast om läkaren anser det nödvändigt. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Moviprep påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Moviprep innehåller natrium, kalium och en fenylalaninkälla

Detta läkemedel innehåller 8,4 g natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per behandling (behandlingen består av 2 liter Moviprep). Detta motsvarar 420 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats natriumfattig kost. Endast en andel (högst 2,6 g per behandling) natrium absorberas.

Detta läkemedel innehåller 1,1 g kalium per behandling. (En behandling består av 2 liter Moviprep). Detta bör beaktas av patienter med nedsatt njurfunktion eller patienter som står på en kost med kontrollerat kaliumintag.

Moviprep innehåller aspartam som är en källa till fenylalanin. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.

3. Hur du tar Moviprep

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 2 liter lösning som bereds på följande sätt:

Förpackningen innehåller 2 genomskinliga påsar som innehåller två dospåsar: dospåse A och dospåse B. En uppsättning av ett par dospåsar (A och B) ska lösas upp i vatten för att få en liter lösning. Förpackningen räcker därmed till 2 liter Moviprep-lösning.

Innan du tar Moviprep ska du läsa igenom följande instruktioner. Du ska veta:

- när du ska ta Moviprep
- hur Moviprep-lösningen ska beredas
- hur Moviprep ska intas
- hurdana verkningar du kan vänta dig att behandlingen har.

När ska du ta Moviprep

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare om du är osäker. Behandlingen med Moviprep ska vara avslutad innan undersökningen.

Denna behandling kan ges antingen som uppdelade doser eller som engångsdos på följande sätt:

För ett ingrepp som görs under narkos (under generell anestesi)

1. Uppdelade doser: en liter Moviprep-lösning på kvällen före undersökningen och en liter Moviprep-lösning tidigt på morgonen på undersökningsdagen. Intaget av Moviprep-lösning eller vilken som helst klar vätska ska stoppas minst två timmar före undersökningen påbörjas.
2. Engångsdos: två liter Moviprep-lösning på kvällen före undersökningen eller två liter Moviprep-lösning på morgonen på undersökningsdagen. Intaget av Moviprep-lösning eller vilken som helst klar vätska ska stoppas minst två timmar före undersökningen påbörjas.

För ett ingrepp som görs utan narkos (utan generell anestesi)


1. Uppdelade doser: en liter Moviprep-lösning på kvällen före undersökningen och en liter Moviprep-lösning tidigt på morgonen på undersökningsdagen. Intaget av Moviprep-lösning eller vilken som helst klar vätska ska stoppas minst en timme före undersökningen påbörjas.

- Engångsdos: två liter Moviprep-lösning på kvällen före undersökningen eller två liter Moviprep-lösning på morgonen på undersökningsdagen. Intaget av Moviprep-lösning ska stoppas minst två timmar före undersökningen påbörjas. Intaget av vilken som helst klar vätska ska stoppas minst en timme före undersökningen påbörjas.

Obs! Ät ingen fast föda från tidpunkten då du börjar använda Moviprep till dess att undersökningen är avslutad.

Hur Moviprep-lösningen ska beredas

- Öppna den ena genomskinliga påsen och ta ut dospåse A och B.
- Häll ut innehållet i både dospåse A och B i ett kärl som rymmer en liter.
- Tillsätt vatten upp till 1-litersmärket och rör om tills allt pulver har lösts upp och Moviprep-lösningen är klar eller lite grumlig. Detta tar högst 5 minuter.



Hur Moviprep ska intas

Drick den första litern av Moviprep-lösningen inom 1-2 timmar. Försök dricka ett glas lösning med 10-15 minuters mellanrum.

När du har druckit upp den första litern lösning, gör i ordning och drick den andra litern av Moviprep-lösningen som du bereder av innehållet i de återstående dospåsarna A och B.

Under behandlingen ska du dricka ytterligare 1 liter *klar* vätska för att undvika kraftig törst och vätskebrist. Vatten, klar soppa, fruktjuice (*utan fruktkött*), läskedryck, te eller kaffe (*utan mjölk*) är lämpliga drycker. Dessa drycker kan tas senast två timmar före undersökningen om du ska sövas, eller en timme före undersökningen om du inte ska sövas.

Hurdana verkningar du kan vänta dig av behandlingen

När du börjar dricka Moviprep-lösningen är det viktigt att du håller dig i närheten av en toalett. Förr eller senare kommer du att börja få vattnig avföring. Detta är helt normal och visar att Moviprep fungerar. Avföringen kommer att upphöra när du har druckit upp all lösning.

Om du följer dessa instruktioner kommer din tarm att vara ren vilket underlättar undersökningen och gör att den lyckas bättre. Reservera tillräckligt med tid efter att du har druckit lösningen för resan till platsen där undersökningen ska genomföras.

Om du har använt för stor mängd av Moviprep

Om du har fått i dig för stor mängd Moviprep-lösning kan du få svår diarré som kan orsaka vätskebrist. Drick rikliga mängder vätska, särskilt fruktjuice. Om saken bekymrar dig, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att använda Moviprep

Om du har glömt att ta Moviprep, ta en dos genast då du märker detta. Om du borde ha tagit lösningen redan för flera timmar sedan, rådfråga din läkare eller apotekspersonalen.

När du tar Moviprep som uppdelade doser, är det viktigt att du har druckit hela mängden Moviprep-lösning minst en timme före undersökningen (om det görs utan narkos) eller minst två timmar före undersökningen (om det görs under narkos). När du tar Moviprep som engångsdos på morgonen på undersökningsdagen, är det viktigt att du har druckit hela mängden Moviprep-lösning minst två timmar före undersökningen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Diarré är en normal effekt av Moviprep.

Om du får någon av de följande biverkningarna, sluta använda Moviprep och kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal:

- hudutslag eller klåda
- svullnad i ansikte, vrister eller andra kroppsdelar
- hjärtklappning
- kraftig trötthet
- andnöd.

Alla ovan nämnda symptom är tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

Sluta ta Moviprep och kontakta omedelbart läkare om du märker någon av följande biverkningar:

- krampanfall.

Om du inte får avföringsbehov inom 6 timmar efter att du har intagit Moviprep, sluta dricka lösningen och kontakta omedelbart läkare.

Andra biverkningar är:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos över 1 av 10 användare): buksmärta, svullen mage, trötthet, allmän sjukdomskänsla, ömhet kring ändtarmen, illamående och feber.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): hungerskänsla, sömnsvårigheter, svindel, huvudvärk, kräkningar, matsmältningsstörningar, törst och frossbrytningsar.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): obehagskänsla, sväljningssvårigheter och förändringar i leverfunktionstester.

Följande biverkningar har ibland observerats men det är inte känt hur ofta de inträffar eftersom frekvensen inte kan beräknas från tillgängliga data: gasbildning, en tillfällig höjning av blodtrycket, oregelbunden hjärtrytm eller hjärtklappningar, vätskeförlust, kväljande känsla, bristning i matstrupen på grund av kräkning, ingen känd frekvens, mycket låga natriumvärdet, som orsakar kramper och förändringar i blodets elektrolytkoncentrationer, såsom sänkt bikarbonatnivå, förhöjd eller minskad kaliumnivå, förhöjd eller minskad kloridnivå, minskad fosfatnivå. Minskad kalium- och natriumnivå i blodet kan också förekomma.

Dessa biverkningar förekommer vanligen endast under behandlingen med Moviprep. Om de ändå fortsätter ska du kontakta läkare.

Allergiska reaktioner kan orsaka hudutslag, klåda, hudrodnad eller nässelutslag, svullnad i händer eller vrister, huvudvärk, hjärtklappning och andnöd.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Moviprep ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Observera, att de olika dospåsarna inte nödvändigtvis har samma utgångsdatum. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C.

När Moviprep pulvret har lösts upp i vatten kan lösningen förvaras övertäckt vid högst 25°C. Lösningen kan också förvaras i kylnskåp (2-8°C). Färdigberedd lösning ska användas inom 24 timmar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i **dospåse A** är:

Makrogol (också känd som polyetenglykol) 3350	100 g
Natriumsulfat, vattenfri	7,500 g
Natriumklorid	2,691 g
Kaliumklorid	1,015 g

De aktiva substanserna i **dospåse B** är:

Askorbinsyra	4,700 g
Natriumaskorbat	5,900 g

När de båda dospåsarna lösts upp i 1 liter vatten är lösningens elektrolythalt följande:

Natrium	181,6 mmol/l (som absorberas upp till 56,2 mmol)
Klorid	59,8 mmol/l
Sulfat	52,8 mmol/l
Kalium	14,2 mmol/l
Askorbat	56,5 mmol/l

Övriga innehållsämnen är citronarom (innehållande maltodextrin, citral, citronolja, limeolja, xantangummi, vitamin E) och sötningsmedlen aspartam (E 951) och acesulfamkalium (E 950). Se ytterligare uppgifter i punkt 2.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Förpackningen innehåller 2 genomskinliga påsar, som båda innehåller ett par dospåsar: dospåse A och dospåse B. En uppsättning av dospåsar (dospåse A och dospåse B) ska lösas upp i 1 liter vatten.

Förpackningstorlekarna för Moviprep pulver för oral lösning är 1, 10, 40, 80, 160 och 320 behandlingar och 40 behandlingars sjukhusförpackning.

Alla förpackningsstorlekar finns eventuellt inte på marknaden.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Norgine B.V.
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederlanderna.

Tillverkare:

Norgine Limited, New Road, Hengoed, Mid Glamorgan CF82 8SJ, Storbritannien
eller
Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederlanderna.
eller
Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, 263 35 Höganäs, Sverige
eller
Sophartex, 21 rue du Pressoir 28500 Vernouillet Frankrike.

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Förenade kungariket (Nordirland) under namnen:

Moviprep: Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,
Tyskland, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Nederlanderna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien
och Förenade kungariket (Nordirland)
Movprep: Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast 19.12.2024

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Moviprep ska användas med försiktighet till svaga patienter eller till patienter som har en allvarlig klinisk insufficiens såsom:

- försämrad sväljreflex, eller en risk för att innehållet i magsäcken eller övre mag-tarmkanalen hamnar i lungorna (tendens till aspiration eller reflux)
- sänkt medvetandegrad
- gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min)
- hjärtinsufficiens (NYHA grad III eller IV)
- risk för rytmrubbningsar, till exempel patienter som får behandling mot hjärt- och kärlsjukdomar eller som har sköldkörtelsjukdom
- vätskebrist
- svår akut inflammatorisk tarmsjukdom.

Vätskebrist och förändringar i elektrolytbalanse måste skötas innan användning av Moviprep.

Patienter med sänkt medvetandegrad eller en risk för att innehållet i magsäcken eller övre mag-tarmkanalen hamnar i lungorna bör övervakas noga under administreringen, speciellt om administrering sker via näringssond.

Moviprep skall inte användas till medvetslösa patienter.