

**Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle**  
**Precosa® 250 mg jauhe oraalisuspensiota varten**

Saccharomyces boulardii

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännä lääkärin puoleen, ellei olosi parane 2–3 päivän jälkeen tai se huononee.

**Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Precosa on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Precosaa
3. Miten Precosaa käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Precosan säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

**1. Mitä Precosa on ja mihin sitä käytetään**

Precosa koostuu kylmäkuivatusta hiivasienestä (*Saccharomyces boulardii*, kanta CNCM I-745), joka estää bakteerien haitallisia vaikutuksia suolen limakalvolla.

Precosaa käytetään ripulin hoitoon sekä antibiootihoidon aiheuttamiin suolen tulehduksiin/ripulitiloihin. Precosaa voidaan käyttää myös antibiootihoidon aikana estämään ripulia sekä ripulin ehkäisyssä (esim. matkoilla). Lisäksi sitä käytetään vankomysiini/metronidatsolihoidon lisänä ehkäisemään *Clostridium difficile*n aiheuttaman ripulin uusiutumista.

**2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Precosaa**

**Älä käytä Precosaa**

- jos olet allerginen *Saccharomyces boulardii*lle tai hiivoille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on keskuslaskimokatetri

**Varoitukset ja varotoimet**

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin seuraavissa tapauksissa:

- paranemista ei ole tapahtunut 2–3 päivän hoidon jälkeen
- sinulla on kuumetta tai pahoinvointia
- ulosteet ovat verisiä tai limaisia
- kova jano, kielen kuivuminen: nämä oireet viittaavat kuivumiseen (ripulin aiheuttama nestehukka). *Lääkäri päättää mahdollisesta nesteytyksestä.*

Ripulin yhteydessä ihminen menettää paljon nestettä. Menetetty nestemäärä pitää korvata juomalla runsaasti. Nestevajauksen hoito on erityisen tärkeää lapsilla.

**Muut lääkevalmisteet ja Precosa**

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä valmistetta samanaikaisesti antimykoottien (sienilääkkeiden) kanssa.

### **Precosa ruuan ja juoman kanssa**

Precosa sisältää eläviä soluja. Tästä syystä valmistetta ei pidä sekoittaa hyvin kuumaan (yli 50 °C), jääkylmään tai alkoholipitoiseen juomaan tai ruokaan.

### **Raskaus, imetys ja hedelmällisyys**

#### *Raskaus*

Saccharomyces boulardii kulkeutuu suoliston läpi imeytymättä eikä täten voi vaikuttaa sikiöön.

#### *Imetys*

Saccharomyces boulardii ei kulkeudu äidinmaitoon.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Precosa ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

### **Precosa sisältää laktoosia ja fruktoosia**

Koska Precosa sisältää laktoosia ja fruktoosia, valmiste ei sovellu potilaille, joilla on jokin sokeri-intoleranssi.

## **3. Miten Precosaa käytetään**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavallinen annos on:

- Ripulin lyhytaikainen oireenmukainen hoito  
Aikuisille 2 annospussia kahdesti päivässä, lapsille 1 annospussi kahdesti päivässä, viikon ajan.
- Antibioottihoitoon liittyvän ripulin esto  
Aikuisille 2 annospussia kahdesti päivässä, lapsille 1 annospussi kahdesti päivässä. Hoito tulee aloittaa 48–72 tunnin kuluessa antibiootikuurin aloittamisesta ja sitä tulee jatkaa vähintään 3 päivän mutta enintään 4 viikon ajan antibiootihoidon lopettamisesta.
- Suolistoflooran tasapainottaminen ripulin ehkäisyssä (esim. matkoilla)  
Aikuisille 2 annospussia kahdesti päivässä, lapsille 1 annospussi kahdesti päivässä. On suositeltavaa aloittaa hoito pari päivää ennen matkaa ja jatkaa sitä koko matkan ajan.
- Vankomysiini/metronidatsolihoitoon lisänä ehkäisemään Clostridium difficile aiheuttaman ripulin uusiutumista  
Aikuisille 2 annospussia kahdesti päivässä, lapsille 1 annospussi kahdesti päivässä. Hoito tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti antibiootihoidon aloittamisesta ja sen tulee jatkua 4 viikon ajan.

#### Antotapa:

Jauhe sekoitetaan veteen tai muuhun juomaan, ja se voidaan myös sirotella ruokaan.

### **Jos otat enemmän Precosaa kuin sinun pitäisi**

Yliannostuksesta ei ole raportoitu. Jos olet ottanut liikaa Precosaa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

### **Jos unohdat ottaa Precosaa**

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

*Melko harvinainen/harvinainen:* allergiset reaktiot, ummetus, jano, ihottuma, turvotus (angioödeema).

Tietyillä erittäin heikkokuntoisilla potilailla on esiintynyt verenmyrkytyksiä (sepsisiä) *Saccharomyces boulardii*-hoidon aikana.

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

### **5. Precosan säilyttäminen**

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

### **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

#### **Mitä Precosa sisältää**

- Vaikuttava aine on *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745. 1 annospussi sisältää kylmäkuivattua *Saccharomyces boulardii*ta 250 mg.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti 32,5 mg, fruktoosi 472 mg, kolloidinen vedetön piidioksidi, makuaine (tutti-frutti).

#### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoost**

Beigenvärisen jauhe.

10, 20 ja 50 annosjauhepussia (Al/paperi/PE).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

#### **Myyntiluvan haltija ja valmistaja**

*Myyntiluvan haltija:*

Biocodex, Gentilly, Ranska.

*Valmistaja:*

Biocodex, Beauvais, Ranska.

*Markkinoija:*

Algol Pharma Oy, PL 13, 02611 Espoo

**Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 6.11.2015**

**Bipacksedel: Information till användaren**  
**Precosa® 250 mg pulver till oral suspension**

Saccharomyces boulardii

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2–3 dagar.

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Precosa är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Precosa
3. Hur du använder Precosa
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Precosa ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

**1. Vad Precosa är och vad det används för**

Precosa består av en jästsvamp (Saccharomyces boulardii, stammen CNCM I-745) i frystorkad form som hindrar bakteriernas skadliga effekt på tarmslemhinnan.

Precosa används vid diarré och vid tarminfektioner/diarréttillstånd, som orsakats av antibiotikabehandling. Kan även användas under pågående antibiotikabehandling för att förhindra diarré och för att förebygga diarré t.ex. under resa. Används också som tillägg till vancomycin/metronidazol-behandling för att förebygga recidiv vid Clostridium difficile-orsakad diarré.

**2. Vad du behöver veta innan du använder Precosa**

**Använd inte Precosa**

- om du är allergisk mot Saccharomyces boulardii, jäst eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har en central venkateter inopererad

**Varningar och försiktighet**

Kontakta genast läkaren om

- ingen förbättring ses efter 2–3 dagars behandling
- du har feber eller illamående
- du har blodiga eller slemmiga avföringar
- du är mycket törstig eller har muntorrhet: dessa symtom tyder på uttorkningen (försakad av diarré). *Läkaren bestämmer om hydreringen behövs.*

Vid diarré förlorar man mycket vätska. Denna vätskeförlust skall ersättas genom att man dricker mycket. Behandling av vätskebrist är särskilt viktig hos barn.

**Andra läkemedel och Precosa**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Precosa får inte användas samtidigt med svampmedel.

**Precosa med mat och dryck**

Precosa innehåller levande celler. Därför får man inte blanda den med mycket varma (över 50 °C), iskalla eller alkoholhaltiga drycker eller mat.

### **Graviditet, amning och fertilitet**

#### *Graviditet*

Saccharomyces boulardii passerar tarmen utan att tas upp i kroppen och kan därför inte leda till ogynnsamma effekter på fostret.

#### *Amning*

Saccharomyces boulardii går inte över i modersmjölk.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Precosa påverkar inte din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.

### **Precosa innehåller laktos och fruktos**

Eftersom Precosa innehåller laktos och fruktos, lämpar det sig inte för patienter som har sockerintolerans.

## **3. Hur du använder Precosa**

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos är:

- Kortvarig symtomatisk behandling av diarré  
Vuxna: 2 dospåsar två gånger dagligen. Barn: 1 dospåse två gånger dagligen, i en vecka.
- Profylax mot antibiotikaassocierad diarré  
Vuxna: 2 dospåsar två gånger dagligen. Barn: 1 dospåse två gånger dagligen. Behandlingen bör inledas inom 48-72 timmar efter insättande av antibiotikabehandling och pågå minst 3 dagar men högst 4 veckor efter antibiotikabehandlingen har avslutats.
- Balansering av tarmfloran för att förebygga diarré (t.ex. under resa)  
Vuxna: 2 dospåsar två gånger dagligen. Barn: 1 dospåse två gånger dagligen. Det rekommenderas att påbörja behandlingen ett par dagar innan resans början och att fortsätta den under hela resan.
- Tillägg till vancomycin/metronidazol-behandling för att förebygga recidiv vid Clostridium difficile-orsakad diarré  
Vuxna: 2 dospåsar två gånger dagligen. Barn: 1 dospåse två gånger dagligen. Behandlingen bör inledas så fort som möjligt efter antibiotikabehandlingen har börjats och bör pågå under 4 veckor.

#### Administreringssätt:

Pulvret ska röras ut i vatten eller annan dryck, men kan även strös på maten.

### **Om du har tagit för stor mängd av Precosa**

Överdoseringsfall har inte rapporterats. Om du har tagit för mycket Precosa, kontakta läkare eller apoteket för rådgivning.

### **Om du har glömt att använda Precosa**

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

#### **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

*Mindre vanliga/sällsynta:* allergiska reaktioner, förstoppning, törst, hudutslag, svullnad (angioödem).

Hos vissa patienter med mycket nedsatt allmäntillstånd har fall av blodförgiftning (sepsis) med *Saccharomyces boulardii* förekommit.

#### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

#### **5. Hur Precosa ska förvaras**

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

#### **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

##### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745. 1 dospåse innehåller *Saccharomyces boulardii* (frystorkad) 250 mg.
- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 32,5 mg, fruktos 472 mg, kolloidal vattenfri kiseldioxid, smakämne (tuttifrutti).

##### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Beige pulver.

10, 20 och 50 dospåsar (Al/papper/PE).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

##### **Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare**

*Innehavare av försäljningstillstånd:*

Biocodex, Gentilly, Frankrike

*Tillverkare:*

Biocodex, Beauvais, Frankrike.

*Marknadsförs av:*

Algol Pharma Ab, PB 13, 02611 Esbo

**Denna bipacksedel ändrades senast 6.11.2015**