

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Oftagel 2,5 mg/g -silmägeeli karbomeeri

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Silmätippapullo on aina henkilökohtainen. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Oftagel-silmägeeli on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftagel-silmägeeliä
3. Miten Oftagel-silmägeeliä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Oftagel-silmägeelin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Oftagel-silmägeeli on ja mihin sitä käytetään

Oftagel-silmägeeli on tarkoitettu silmän pinnan kuivumisesta johtuvien oireiden hoitoon. Kuivasilmäisyyden oireiden lievitykseen tarkoitettujen silmätippojen tärkeitä ominaisuuksia ovat silmän pintaa suojaavan kyynelkalvon eheyttä ylläpitävä vaikutus ja hyvä voitelukyky. Näiden ominaisuuksien saavuttamiseksi Oftagel-silmägeelissä on käytetty karbomeeria, joka on suurimolekyylinen ristsidoksia sisältävä polymeeri. Karbomeeri lisää silmätipan viskositeettia ja kontaktiaikaa silmän pinnalla vähentäen näin silmän ärsytysoireita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftagel-silmägeeliä

Älä käytä Oftagel-silmägeeliä

- jos olet allerginen karbomeerille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- pehmeitä piilolinsejä ei tulisi käyttää yhdessä Oftagel-silmägeelin kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Oftagel-silmägeeliä. Poista kovat piilolinssit ennen valmisteen tiputtamista ja odota tiputtamisen jälkeen vähintään 15 minuuttia ennen kuin asetat linssit takaisin.

Lapset ja nuoret

Aikuisille suositellun Oftagel-annostuksen turvallisuus ja teho lapsilla ja nuorilla on arvioitu kliinisen kokemuksen perusteella. Kliinistä tutkimustietoa ei ole saatavilla.

Muut lääkevalmisteet ja Oftagel

Jos käytät jotain muuta paikallista silmälääkettä, pidä lääkkeiden annon välissä vähintään 15 minuutin tauko ja tiputa Oftagel-silmägeeli aina viimeisenä.

Raskaus, imetys ja heidelmällisyys

Oftagel-silmägeelin käytön turvallisuutta raskaana olevilla tai imettävillä äideillä ei ole erikseen tutkittu. Jos olet raskaana tai imetat, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos geeli aiheuttaa lyhytaikaista näön sumenemista, odota kunnes näkösi palautuu ennalleen ennen kuin ajat tai käytät koneita.

Oftagel sisältää bentsalkoniumkloridia

Oftagel sisältää bentsalkoniumkloridia, joka voi aiheuttaa pehmeiden piilolinssien värjäytymistä. Vältä kosketusta pehmeiden piilolinssien kanssa. Bentsalkoniumkloridi voi myös aiheuttaa silmä-ärsytystä.

3. Miten Oftagel-silmägeeliä käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suosittelun annos Oftageliä on 1 tippa 1–4 kertaa vuorokaudessa silmään oireiden vaikeusasteen mukaan.

Käyttö lapsille ja nuorille

Aikuisille suositellun Oftagel-annostuksen turvallisuus ja teho lapsilla ja nuorilla on arvioitu kliinisen kokemuksen perusteella. Kliinistä tutkimustietoa ei ole saatavilla.

Ennen tiputtamista:

- pese kädet
- valitse itsellesi luontevin asento lääkkeen laittoa varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä).

Oftagelin tiputtaminen:

1. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.
2. Kallista päätä taaksepäin ja aseta pullo silmän yläpuolelle.



3. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra pullosta tippa silmään.



4. Räpäytä silmää muutaman kerran, että geeli leviää. Sulje pullo.



Jos käytät enemmän Oftagel-silmägeeliä kuin sinun pitäisi

Yliannostuksesta ei tiedetä aiheutuneen haittavaikutuksia.

Jos unohdat käyttää Oftagel-silmägeeliä

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Oftagel-silmägeelin käytön

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Oftagel-silmägeelin käyttöön voi liittyä ohimenevää lyhytaikaista näön sumentumista, lievää kirvelyä tai paikallista ärsytystä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Oftagel-silmägeelin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Avatun pullon käyttöaika on 28 päivää.

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C) valolta suojattuna.

Käyttöönoton jälkeen säilytä pullo pakkauksessa ylösalaisin, jolloin geelin tiputtaminen helpottuu.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oftagel sisältää

- Vaikuttava aine on karbomeeri 974P 2,5 mg/g.
- Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi, sorbitoli, lysiinimonohydraatti, natriumasetaattitrihydraatti, polyvinyylialkoholi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kirkas tai hieman opaalinen, viskoosi liuos.

Läpinäkyvä muovinen pullo, valkoinen muovinen kierrekorkki.

Pakkauskoot: 10 g ja 3 x 10 g.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.6.2017

Bipacksedel: Information till användaren

Oftagel 2,5 mg/g ögongel karbomer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ögondroppsfliaskan är alltid personlig. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande :

1. Vad Oftagel ögongel är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Oftagel ögongel
3. Hur du använder Oftagel ögongel
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oftagel ögongel ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oftagel ögongel är och vad det används för

Oftagel-ögongel är avsett för behandling av symptom som orsakas av att ögats yta torkat.

De viktigaste egenskaperna hos ögondroppar avsedda att lindra symptom av ögontorrhet är att de bidrar till att hålla tårfilmen som skyddar ögats yta intakt och att de har en god smörjande effekt. Dessa egenskaper uppnås i Oftagel-ögongel tack vare karbomeren, som är en polymer med stora molekyler och tvärbindingar. Karbomeren ökar ögondroppens viskositet och kontakttid på ögats yta och minskar på så sätt irritationen.

2. Vad du behöver veta innan du använder Oftagel ögongel

Använd inte Oftagel ögongel

- om du är allergisk mot karbomer eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- använd inte mjuka kontaktlinser tillsammans med Oftagel-ögongel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Oftagel. Ta ut hårda kontaktlinser innan du droppar Oftagel i ögonen och vänta minst 15 minuter efter att du droppat innan du sätter dem i ögat på nytt.

Barn och ungdomar

Klinisk erfarenhet visar på säkerhet och effekt hos barn och ungdomar vid samma användning och dosering av Oftagel som hos vuxna, men det finns inga resultat från kliniska prövningar.

Andra läkemedel och Oftagel

Om du använder andra ögonläkemedel lokalt ska du vänta minst 15 minuter mellan administreringarna och alltid droppa i Oftagel-ögongel sist.

Graviditet, amning och fertilitet

Man har inte undersökt om Oftagel-ögongel kan användas i samband med graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om gelen orsakar kortvarig dimsyn bör du vänta tills synen blir normal igen innan du kör bil eller använder maskiner.

Oftagel innehåller bensalkoniumklorid

Oftagel innehåller bensalkoniumklorid som kan orsaka missfärgning av mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Bensalkoniumklorid kan också ge ögonirritation.

3. Hur du använder Oftagel ögongel

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en droppe Oftagel-ögongel i ögat 1–4 gånger om dygnet beroende på symptomens svårighetsgrad.

Användning för barn och ungdomar

Klinisk erfarenhet visar på säkerhet och effekt hos barn och ungdomar vid samma användning och dosering av Oftagel som hos vuxna, men det finns inga resultat från kliniska prövningar.

Före användning:

- Tvätta händerna.
- Välj den ställning du tycker är bekvämast för administrering av Oftagel. Du kan t.ex. sitta, ligga ned på rygg eller stå framför en spegel.

Administrering av Oftagel:

1. Öppna flaskan. Undvik att röra vid något med droppspetsen så att innehållet hålls rent.
2. Luta huvudet bakåt och håll flaskan ovanför ögat.



3. För försiktigt ned det nedre ögonlocket, rikta blicken uppåt och tryck ut en droppe i ögat.



4. Blinka några gånger så att gelet sprids. Tillslut flaskan.

**Om du har använt för stor mängd Oftagel ögongel**

Inga uppgifter finns om att en överdosering skulle ge några biverkningar.

Om du har glömt att använda Oftagel ögongel

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Oftagel ögongel

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Övergående, kortvarig dimsyn, lindrig sveda eller lokal irritation kan förekomma i samband med användningen av Oftagel-ögongel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Oftagel ögongel ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Använd Oftagel inom 28 dagar efter att flaskan öppnats.

Förvaras i rumstemperatur (15–25 °C) skyddad för ljus.

För att underlätta droppningen bör flaskan förvaras upp och ned i kartongen efter att den tagits i bruk.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är karbomer 974P 2,5 mg/g.
- Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, sorbitol, lysinmonohydrat, natriumacetattrihydrat, polyvinylalkohol och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar eller något opal viskös lösning.

Genomskinlig plastflaska, vit skruvkork av plast.

Förpackningsstorlekar: 10 g och 3 x 10 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tammerfors

Denna bipacksedel ändrades senast 29.6.2017