

## Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

**Efluelda Tetra, injektioneste, suspensio, esitâytyetty ruisku**  
Influenssarokote (virusfragmentit, inaktivoitu), 60 mikrogrammaa HA / kanta

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tämä rokote, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännny lääkärin, apteekkikenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
- Tämä rokote on määritty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin, apteekkikenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

**Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Efluelda Tetra on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Efluelda Tetra -rokote
3. Miten Efluelda Tetra -rokotetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Efluelda Tetra -rokotteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoja

### **1. Mitä Efluelda Tetra on ja mihin sitä käytetään**

Efluelda Tetra on rokote. Tämä rokote suojaaa vähintään 60-vuotiaita henkilöitä influenssalta. Efluelda Tetra -rokotteen käytön pitää perustua influenssarokotuksia koskeviin virallisiin suosituksiin.

Kun henkilölle annetaan Efluelda Tetra -rokote, immuunijärjestelmä (elimistön luonnollinen puolustusjärjestelmä) tuottaa itse suojan (vasta-aineita) tautia vastaan. Mikään rokotteen sisältämistä aineesta ei voi aiheuttaa influenssaa.

Influenssa on influenssavirusten aiheuttama tarttuva hengityselinsairaus, joka voi olla lievä tai vaikea tauti. Influenssa saattaa aiheuttaa sairaalahoitoa vaativia tai jopa kuolemaan johtavia vakavia komplikaatioita, kuten keuhkokuumetta. Influenssa on sairaus, joka voi levitä nopeasti ja sitä aiheuttaa eri viruskannata, jotka voivat muuttua joka vuosi. Tämän kiertävien kantojen mahdollisen vuosittaisen muutumisen sekä rokotteen tarjoaman suojan keston vuoksi rokote on suositeltavaa ottaa joka vuosi. Influenssaan sairastumisen riski on suurimmillaan kylminä kuukausina, lokakuusta maaliskuuhun. Jos sinua ei ole rokotettu syksyllä, rokotuksen ottaminen on silti järkevää kevääseen saakka, koska influenssatartunnan mahdollisuus on olemassa siihen asti. Lääkäri pystyy suosittelemaan sinulle parhaan rokotusajankohdan.

Efluelda Tetra on tarkoitettu suojaamaan sinua neljää rokotteen sisältämää viruskantaa vastaan ja sen antama suoja alkaa noin 2–3 viikon kuluttua rokotuksesta. Jos altistut kuitenkin influenssalle väliittömästi ennen rokotusta tai sen jälkeen, sinulle voi kehittyä influenssasairaus, koska influenssan itämisaika on muutamia päiviä.

Rokote ei suojaaa sinua tavalliselta nuhakuumelta, vaikka jotkin sen oireista ovat hyvin samankaltaisia kuin influenssan oireet.

## **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Efluelda Tetra -rokote**

Efluelda Tetra -rokotteen sopivuuden varmistamiseksi on tärkeää, että kerrot lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos jokin seuraavista kohdista koskee sinua. Jos et ymmärrä jotakin asiaa, pyydä lääkäriä tai apteekkienkilökuntaa selittämään se.

### **Älä käytä Efluelda Tetra -rokotetta:**

- jos olet allerginen:
  - vaikuttaville aineille tai
  - tämän rokotteen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) tai
  - jollekin aineelle, jota rokotteessa voi olla hyvin pieniä määriä, kuten kananmunalle (ovalbumiinille tai kanan proteiineille) tai formaldehydille.

### **Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen Efluelda Tetra -rokotteen ottamista.

Sinun on kerrottava lääkärille ennen rokotusta:

- jos sinulla on heikko immuunivaste (sinulla on immuunivajavuustila tai käytät immuunijärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä)
- jos sinulla on verenvuotohäiriö tai saat helposti mustelmia
- jos sinulla on ilmennyt Guillain-Barrén oireyhtymä (vaikea lihasheikkous) influenssarokotteen saamisen jälkeen
- jos sinulla on sairaus, johon liittyy korkea tai kohtalainen kuume, tai akuutti sairaus; rokotusta on lykättävä, kunnes olet toipunut.

Lääkäri päättää, voitko saada rokotteen.

Pyörtymistä voi ilmetä minkä tahansa neulalla annetun pistoksen jälkeen tai jopa sitä ennen. Siksi sinun on kerrottava lääkärille tai hoitajalle, jos olet pyörtynyt aiemmin pistoksen saamisen yhteydessä.

Kaikkien muiden rokotteiden tavoin Efluelda Tetra ei välttämättä anna täydellistä suojaaa kaikille rokotetuille henkilöille.

Kerro lääkärille, jos sinulta otetaan jostakin syystä verinäyte muutaman päivän kuluessa influenssarokotteen saamisen jälkeen. Tämä on tarpeen, sillä joillakin harvoilla potilailla verikokeiden tuloksissa on havaittu väärästi positiivisia tuloksia, kun näyte on otettu pian rokotuksen jälkeen.

### **Lapset**

Tätä rokotetta ei pidä käyttää lapsille. Se on tarkoitettu ainoastaan vähintään 60-vuotiaille aikuisille.

### **Muut lääkevalmisteet ja Efluelda Tetra**

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita rokotteita tai muita lääkkeitä.

- Jos Efluelda Tetra -rokote annetaan samanaikaisesti muiden rokotteiden kanssa, pistokset on aina annettava eri raajoihin.
- On otettava huomioon, että haittavaikutukset saattavat olla voimakkampia samanaikaisen annon yhteydessä.
- Immunologinen vaste saattaa heikentyä, jos potilas saa immuunivastetta heikentävästä hoitoa, kuten kortikosteroideja, solunsalpaajia tai sädehoitoa.

### **Raskaus ja imetyks**

Efluelda Tetra on tarkoitettu vain vähintään 60-vuotiaille aikuisille.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäristä tai apteekista neuvoa ennen tämän rokotteen käyttöä. Lääkäri/apteekkienkilökunta auttaa sinua päätämään, kannattaako sinun ottaa Efluelda Tetra -rokote.

## Ajaminen ja koneiden käyttö

Efluelda Tetra -rokotteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn. Ei kuitenkaan ole järkevää ajaa, jos sinulla ilmenee huonovointisuutta tai huimausta.

Olet itse vastuussa sen arvioimisesta, kykenetkö ajamaan autoa tai suorittamaan erityistä tarkkuutta vaativia tehtäviä. Lääkkeiden vaikutukset ja/tai haittavaikutukset voivat vaikuttaa toimintakykyysi. Tämän lääkkeen vaikutuksista ja haittavaikutuksista on kerrottu tämän pakkausselosten muissa kohdissa. Lue koko pakkausseloste huolellisesti saadaksesi tietoa mahdollisista toimintakykyysi vaikuttavista tekijöistä. Keskustele lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

## Efluelda Tetra sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per annos eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

## 3. Miten Efluelda Tetra -rokotetta käytetään

Vähintään 60-vuotiaat aikuiset saavat yhden 0,7 ml:n annoksen.

### Miten Efluelda Tetra annetaan

Lääkäri, apteekkienhenkilökunta tai hoitaja antaa suositellun annoksen rokotetta pistoksen lihakseen tai ihmisen alle.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän valmisten käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan puoleen.

## 4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin rokote voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

### Allergiset reaktiot

Käännny VÄLITTÖMÄSTI lääkärin puoleen, jos sinulla ilmenee:

- vaikea allerginen reaktio:
  - vaikeat allergiset reaktiot saattavat aiheuttaa lääketieteellisen hätilanteen, johon liittyy matala verenpaine, hengenahdistus, hengityksen vinkuminen tai hengitysvaikeus, nopea sydämen syke ja heikko syke, kylmähnikinen iho tai heitehuimaus, joka saattaa johtaa pyörtymiseen (anafylaktinen reaktio [mukaan lukien angioedeema eli tila, johon liittyy turvotusta, joka on selvimmin havaittavissa pään ja kaulan alueella, kuten kasvoissa, huulissa, kielessä tai nielussa, tai muualla kehossa ja joka saattaa aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia]).

Käännny lääkärin puoleen, jos sinulla ilmenee:

- allerginen reaktio, kuten ihoreaktio, joka saattaa levitä koko kehoon, kutina, nokkosihottuma ja ihottuma mukaan lukien.  
Nämä haittavaikutukset ovat harvinaisia (niitä saattaa ilmetä enintään 1 henkilöllä tuhannesta).

### Muita ilmoitettuja haittavaikutuksia

Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu vähintään 60-vuotiailla aikuisilla.

### Hyvin yleiset (yli 1 henkilöllä kymmenestä):

- reaktiot pistoskohdassa: kipu, punoitus
- yleinen huono olo (huonovointisuus), päänsärky, lihaskipu

### Yleiset (enintään 1 henkilöllä kymmenestä)

- reaktiot pistoskohdassa: turvotus, mustelma, kovettuma
- kuume, vilunväristykset

### Melko harvinaiset (enintään 1 henkilöllä sadasta)

- reaktiot pistoskohdassa: kutina
- väsymys, uneliaisuus (letargia), pahoinvoindi, oksentelu, ripuli
- yskä, lihasheikkous, ruuansulatushäiriö (dyspepsia), nielutulehdus (kipu suun ja nielun alueella)

### Harvinaiset (enintään 1 henkilöllä tuhannesta):

- epätavallinen voimattomuus (astenia), punoitus, nivelkipu (artralgia), heitehuimaus, yöhikoilu, ihottuma, puutuminen tai pistelyn tunne (parestesia), nenän tulehdus (voimakas nuha), huimaus, silmänvalkuaisen lisääntynyt verekkyyys (silmän hyperemia)
- kipu raajoissa

### Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin

- tietyt typpisten, verihuutaleiksi kutsuttujen verihuukkosten vähenneminen: niiden vähäinen määrä voi johtaa mustelmien tai verenvuodon lisääntymiseen (trombosytopenia)
- kaulassa, kainaloissa tai nivusissa olevien rauhasten turpoaminen (lymfadenopatia)
- hermoston häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa niskan jäykkyyttä, sekavuutta, puutumista, kipua ja heikkoutta raajoissa, tasapainohäiriötä, refleksien häviämistä, kehon osan tai koko kehon halvaantumista (enkefalomyeliitti, transversaalimyeliitti, hartiapunoksen neuriitti, Guillain-Barrén oireyhtymä), kasvohalvausta (Bellin pareesi), näköhermojen toimintahäiriöstä johtuvia näköhäiriöitä (näköhermotulehdus/neuropatia), kouristuskohtauksia (kuumekouristukset mukaan lukien), pyörtymistä pian rokottamisen jälkeen
- verisuonitulehdus (vaskuliitti), joka saattaa aiheuttaa ihottumaa ja hyvin harvinaisissa tapauksissa tilapäisiä munuaisvaivoja, verisuonten laajeneminen (vasodilataatio)
- rintakipu
- hengityksen vinkuminen, kuristava tunne kurkussa, hengitysvaikeudet (hengenahdistus)

Useimmat haittavaikutukset ilmenivät yleensä ensimmäisten kolmen vuorokauden sisällä rokotuksen jälkeen ja hävisivät 3 vuorokauden kuluessa. Nämä haittavaikutukset olivat voimakkuudeltaan lieviä tai kohtalaisia.

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkikenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

## **5. Efluelda Tetra -rokotteen säilyttäminen**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä rokotetta etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääläpissä (2 °C – 8 °C). Ei saa jäätyä. Pidä ruisku ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Rokotteita ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien rokotteiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

### Mitä Efluelda Tetra sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat: Influenssavirus (inaktivoitu, fragmentoitu) seuraavista kannoista\*:

Kannan A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09 kaltainen virus (A/Victoria/4897/2022, IVR-238) ..... 60 mikrogrammaa HA\*\*

Kannan A/Thailand/8/2022 (H3N2) kaltainen virus (A/California/122/2022, SAN-022) ..... 60 mikrogrammaa HA\*\*

Kannan B/Austria/1359417/2021 kaltainen virus (B/Michigan/01/2021, vilityyppi) ..... 60 mikrogrammaa HA\*\*

Kannan B/Phuket/3073/2013 kaltainen virus (B/Phuket/3073/2013, vilityyppi) ..... 60 mikrogrammaa HA\*\*

0,7 ml:n annoksessa

\* kasvatettu hedelmötetyissä kananmunissa

\*\* hemagglutiniini

Rokote on WHO:n (Maailman terveysjärjestön) suositusten (pohjoinen pallonpuolisko) ja EU:n päätöksen mukainen kaudelle 2024/2025.

Muut aineet ovat: puskuriliuos, joka sisältää natriumkloridia, yksiemäksistä natriumfosfaattia, kaksiemäksistä natriumfosfaattia, injektionesteisiin käytettävää vettä ja oktoksinoli-9:ää.

Rokotteessa saattaa olla hyvin pieniä määriä joitakin aineita, kuten kananmunaa (ovalbumiinia tai kanan proteiineja) tai formaldehydiä (ks. kohta 2).

### Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Rokote on kevyen ravistamisen jälkeen väritön opaalinhohtoinen neste.

Efluelda Tetra: 0,7 ml injektionestettä, suspensiota, esityytetyssä ruiskussa neulan kanssa tai ilman neulaa (pakkauskoot: 1, 5 tai 10) tai turvaneulan kanssa (pakkauskoot: 1 tai 10).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

### Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Sanofi Winthrop Industrie

82 avenue Raspail

94250 Gentilly

Ranska

Valmistaja:  
Sanofi Winthrop Industrie  
Voie de l'Institut - Parc Industriel d'Icarville  
B.P 101  
27100 Val de Reuil  
Ranska

**Paikallinen edustaja:**

Sanofi Oy  
Revontulenkua 1  
02100 Espoo  
Puh.: +358 (0) 201 200 300

**Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluviissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:**

Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsekki, Saksa, Tanska, Kreikka, Suomi, Ranska, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Romania, Ruotsi, Slovenia, Slovakia, Irlanti, Espanja	Efluenta Tetra
Iso-Britannia (Pohjois-Irlanti)	Quadrivalent Influenza Vaccine (Split Virion, Inactivated) High Dose

**Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.03.2025**

**Muut tiedonlähteet**

Viimeisimmät hyväksytty tiedot tästä valmisteesta ovat saatavilla ulkopakkauksessa olevan QR-koodin kautta älypuhelimella tai osoitteessa <https://efluenta-nh.info.sanofi>

<----->


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille:

Kuten aina injektoitavia rokotteita annettaessa, pitää asianmukaisen hoidon ja valvontan olla helposti saatavilla rokotuksen jälkeen mahdollisesti ilmenevän anafylaktisen reaktion varalta.  
Rokotteen on annettava lämmetä huoneenlämpöön ennen käyttöä.  
Ravista ennen käyttöä. Tarkasta silmämääräisesti ennen antoaa.  
Rokotetta ei saa käyttää, jos suspensiolla on vierashiukkasia.  
Rokotetta ei saa sekoittaa samassa ruiskussa muiden lääkevalmisteiden kanssa.  
Tätä rokotetta ei saa antaa verisuoneen.

Ks. myös kohta 3. Miten Efluenta Tetra -rokotetta käytetään

**<Valmistelut ennen antamista**

Ohjeet turvaneulan käytölle esitältyn Luer Lock -ruiskun kanssa:




**Vaihe 1:** Kiinnitä neula ruiskuun seuraavasti: Poista kannan suojuus, niin että neulan kanta tulee näkyviin, ja kierrä neulaa varovasti ruiskun Luer Lock -liittimeen, kunnes tunnet vähäisen vastuksen.

**Vaihe 2:** Poista turvaneulan kotelo vetämällä kohtisuoraan. Neula on turvasuojuksen ja suojaosan sisällä.

**Vaihe 3:**


**A:** Käännä turvasuojusta poispäin neulasta, kohti ruiskun sylinteriä kuvassa esitettyyn asentoon.

**B:** Poista suojaosa vetämällä kohtisuoraan.




**Vaihe 4:** Kun pistos on annettu, lukitse (aktivoi) turvasuojuks käytäväällä jotakin kolmesta (3) **yhden käden** tekniikasta, jotka on esitetty kuvassa, eli aktivoinnilla pintaan vasten, peukalolla tai sormella.


Huomaa: Aktivointi on onnistunut, kun kuulet ja/tai tunnet naksahduksen.



**Vaihe 5:** Tarkasta turvasuojuksen aktivoituminen silmämäärisesti. Turvasuojuksen on oltava **täysin lukkiutunut (aktivoitunut)**, kuten kuvassa C on esitetty.



Kuvassa D on turvasuojuus, joka **EI ole täysin lukkiutunut (ei ole aktivoitunut)**.



**Varoitus:** Älä yritä poistaa turvalaitteen lukitusta (peruuttaa turvalaitteen aktivoointia) ottamalla neula väkisin pois turvasuojuksesta.

Käytämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.>

## Bipacksedel: Information till användaren

### Efluelda Tetra, injektionsvätska, suspension i förfyllt spruta

Vaccin mot influensa (spjälkat virus), inaktiverat, 60 mikrogram HA/stam

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

#### Läs noga igenom denna bipacksedel innan du vaccineras. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta vaccin har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

#### I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Efluelda Tetra är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Efluelda Tetra
3. Hur du använder Efluelda Tetra
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Efluelda Tetra ska förvaras
6. Förfäckningens innehåll och övriga upplysningar

#### 1. Vad Efluelda Tetra är och vad det används för

Efluelda Tetra är ett vaccin. Detta vaccin hjälper till att skydda personer från 60 års ålder mot influensa. Användning av Efluelda Tetra ska baseras på officiella rekommendationer om vaccination mot influensa.

När en person blir vaccinerad med Efluelda Tetra börjar immunförsvaret (kroppens naturliga försvarssystem) att producera ett eget skydd (antikroppar) mot sjukdomen. Innehållsämnen i vaccinet kan inte orsaka influensa.

Influensa är en smittsam luftvägssjukdom orsakad av influensavirus. Sjukdomen kan variera från lindrig till svår och kan resultera i allvarliga komplikationer, såsom lunginflammation, vilket kan leda till sjukhusinläggning eller till och med döden. Influensa är en sjukdom som kan spridas snabbt och som orsakas av olika virusstammar som kan förändras varje år. Baserat på att dessa cirkulerande virusstammar kan förändras årligen och även på grund av varaktigheten av det skydd som du får av vaccinet rekommenderas vaccination varje år. Störst risk att smittas av influensa föreligger under de kalla månaderna mellan oktober och mars. Om du inte vaccinerades under hösten är det fortfarande klokt att vaccineras ända fram till våren eftersom du fortfarande riskerar att smittas av influensa. Läkaren kan rekommendera den lämpligaste tiden för dig att bli vaccinerad.

Efluelda Tetra är avsett att skydda dig mot de fyra virusstammar som ingår i vaccinet och börjar verka ungefär två till tre veckor efter injektionen. Om du utsätts för influensavirus precis innan eller efter vaccinationen, skulle du fortfarande kunna utveckla sjukdomen, eftersom inkubationsperioden (perioden från smittotillfället till dess att du uppvisar symtom) för influensa är några dagar.

Vaccinet skyddar dig inte mot vanlig förkylning, trots att vissa symtom påminner om influensa.

## **2. Vad du behöver veta innan du använder Efluelda Tetra**

För att säkerställa att Efluelda Tetra är lämpligt för dig är det viktigt att informera läkare eller apotekspersonal om någon av nedanstående punkter gäller för dig. Om det är något du inte förstår, be läkare eller apotekspersonal att förklara.

### **Använd inte Efluelda Tetra**

- om du är allergisk mot
  - aktiva substanser eller
  - något annat innehållsämne i detta vaccin (anges i avsnitt 6), eller
  - någon beståndsdel som kan finnas i mycket liten mängd, såsom ägg (ovalbumin, hönsprotein) och formaldehyd.

### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Efluelda Tetra.

Tala om för läkare före vaccinationen om du har:

- nedsatt immunförsvar (har en immunbrist eller tar läkemedel som påverkar immunförsvaret)
- problem med blödning eller lätt får blåmärken
- fått Guillain-Barrés syndrom (svår muskelsvaghet) efter att du vaccinerats mot influensa
- en sjukdom med hög eller måttlig feber eller en akut sjukdom; vaccinationen ska skjutas upp tills du blivit frisk igen.

Läkaren kommer att avgöra om du ska få vaccinet.

Svimning kan förekomma efter, eller till och med före, nälsticket. Tala därför om för läkare eller sjuksköterska om du tidigare har svimmat i samband med nälstick.

Liksom för alla vacciner finns risken att Efluelda Tetra kanske inte ger fullt skydd hos alla som vaccineras.

Tala om för din läkare om du av någon anledning lämnar blodprov inom några dagar efter en influensavaccination. Detta ska göras eftersom falskt positivt blodprov har observerats hos ett fåtal patienter som nyligen blivit vaccinerade.

### **Barn**

Detta vaccin ska inte användas för barn. Det ska endast användas för vuxna från 60 års ålder.

### **Andra läkemedel och Efluelda Tetra**

Tala om för läkaren eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra vacciner eller andra läkemedel.

- Om Efluelda Tetra ges vid samma tillfälle som andra vacciner, ska vaccinerna alltid ges i olika armar eller ben.
- Det ska noteras att biverkningarna kan förstärkas vid samtidig administrering.
- Immunsvaret kan bli sämre vid behandling med läkemedel som hämmar immunförsvaret, till exempel kortikosteroider (kortison), cellgifter eller strålbehandling.

### **Graviditet och amning**

Efluelda Tetra är enbart avsett för vuxna från 60 års ålder.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta vaccin. Läkare eller apotekspersonal kan avgöra om du ska få Efluelda Tetra.

### **Körförstånd och användning av maskiner**

Efluelda Tetra har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du bör dock inte framföra fordon om du känner dig sjuk eller yr.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **Efluelda Tetra innehåller natrium**

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

## **3. Hur du använder Efluelda Tetra**

Vuxna från 60 års ålder får en dos på 0,7 ml.

### **Hur Efluelda Tetra ges**

Läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan ger rekommenderad dos av vaccinet som en injektion i en muskel eller under huden.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

### **Allergiska reaktioner**

Uppsök OMEDELBART läkare om du upplever följande:

- Allvarliga allergiska reaktioner:
  - som kan leda till akuta besvär med lågt blodtryck, andnöd, väsande andning eller andningssvårigheter, snabb hjärtrytm och svag puls, kall och fuktig hud, yrsel som kan leda till kollaps (anafylaxi [inklusive angioödem, dvs. svullnad som främst uppstår på huvudet och i halsen, inkluderat ansikte, läppar, tunga, svalg eller andra delar av kroppen och som kan leda till svårigheter att svälja eller andas]).

Uppsök läkare om du upplever följande:

- Allergiska reaktioner såsom hudreaktioner som kan sprida sig över kroppen med klåda, nässelutslag, hudutslag.

Dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer).

### **Andra rapporterade biverkningar**

Biverkningarna nedan rapporterades hos vuxna från 60 års ålder.

#### Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

- reaktioner vid injektionsstället: smärta, rodnad (erytem)
- allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, muskelvärk (myalgi).

#### Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

- reaktioner vid injektionsstället: svullnad, blåmärken, förhårdnad (induration)
- feber, frossa.

#### Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

- reaktioner vid injektionsstället: klåda
- trötthet, matthet (letargi), illamående, kräkningar, diarré
- hosta, muskelsvaghets, matsmältningsbesvär (dyspepsi), inflammation i halsen (orofaryngeal smärta).

**Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):**

- onormal brist på energi (asteni), rodnad, ledsmärta (artralgi), yrsel, nattlig svettning, hudutslag, domningar eller stickningar (parestesi), inflammation i näsan (rinorré), svindel (vertigo), ökad mängd blod i ögonvitam (okulär hyperemi)
- smärta i armar och ben.

**Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):**

- minskat antal av en viss sorts blodkroppar s.k. blodplättar; ett lågt antal av dessa kan orsaka en ökad tendens att få blåmärken eller blödningar (trombocytopeni)
- svullna körtlar i hals, armhåla eller ljumske (lymfadenopati)
- neurologiska störningar som kan orsaka nackstelhet, förvirring, domningar, smärta och svaghet i armar och ben, försämrad balans, försämrade reflexer, förlamning i delar av eller hela kroppen (encefalomyelit, transversell myelit, brakial neurit, Guillain-Barrés syndrom), ansiktsförlamning (Bells pares), synstörningar på grund av störning i synnerverna (optikusneurit/neuropati), kramper (inklusive feberkramper), svimning (synkope) kort efter vaccinationen
- kärlinflammation i blodkärlen (vaskulit), som kan leda till hudutslag och i mycket sällsynta fall övergående njurproblem, kärlutvidgning (vasodilatation)
- bröstsmärta
- väsande andning, trånghetskänsla i halsen, andningssvårigheter (dyspné).

De flesta biverkningarna uppstod vanligtvis inom tre dagar efter vaccinationen och försvann av sig själva inom tre dagar. Biverkningarna var lindriga till måttliga.

**Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

**Finland**

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)  
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea  
Biverkningsregistret  
PB 55  
00034 FIMEA

**Sverige**

Läkemedelsverket  
Box 26  
751 03 Uppsala  
[www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

**5. Hur Efluelda Tetra ska förvaras**

Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.

Använts före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylnskåp (2 °C – 8 °C). Får ej frysas. Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Vacciner ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar vacciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- De aktiva substanserna är: Influensavirus (inaktiverat, spjälkat) av följande stammar\*:
  - A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 - liknande stam (A/Victoria/4897/2022, IVR-238)..... 60 mikrogram HA\*\*
  - A/Thailand/8/2022 (H3N2) - liknande stam (A/California/122/2022, SAN-022)..... 60 mikrogram HA\*\*
  - B/Austria/1359417/2021 - liknande stam (B/Michigan/01/2021, vildtyp)..... 60 mikrogram HA\*\*
  - B/Phuket/3073/2013 - liknande stam (B/Phuket/3073/2013, vildtyp)..... 60 mikrogram HA\*\*

Per 0,7 ml dos

\* framställda ur befruktade hönsägg

\*\* hemagglutinin

Detta vaccin överensstämmer med rekommendationer från WHO (Världshälsoorganisationen, norra hemisfären) och beslut inom EU för säsongen 2024/2025.

Övriga innehållsämnen: en buffertlösning innehållande natriumklorid, natriumdivätefosfat, dinatriumfosfat, vatten för injektionsvätskor och oktoxinol-9.

Vissa beståndsdelar såsom ägg (ovalbumin, hönsprotein) eller formaldehyd kan förekomma i mycket små mängder (se avsnitt 2).

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Efter försiktig omskakning är vaccinet en färglös och opaliserande vätska.

Efluelda Tetra är en 0,7 ml injektionsvätska, suspension i en förfylld spruta med eller utan nål (i en kartong om 1, 5 eller 10) eller med en nål med nålskydd (i en kartong om 1 eller 10).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### **Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare**

Innehavare av godkännande för försäljning:  
Sanofi Winthrop Industrie  
82 avenue Raspail  
94250 Gentilly  
Frankrike

Tillverkare:  
Sanofi Winthrop Industrie  
Voie de l'Institut - Parc Industriel d'Icarville  
B.P 101  
27100 Val de Reuil  
Frankrike

**Lokal representant:**I Finland:

Sanofi Oy  
Norrskensgränden 1  
02100 Esbo  
Tel: +358 (0) 201 200 300

I Sverige:

Sanofi AB  
Box 30052  
104 25 Stockholm  
Tel: +46 8-634 50 00

**Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:**

Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Grekland, Finland, Frankrike, Kroatien, Ungern, Italien, Lettland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovenien, Slovakien, Irland, Spanien	Efluelda Tetra
Storbritannien (Nordirland)	Quadrivalent Influenza Vaccine (Split Virion, Inactivated) High Dose

**Denna bipacksedel ändrades senast 10.03.2025****Övriga informationskällor**

Den senaste godkända informationen om detta läkemedel finns tillgänglig genom att skanna QR-koden på den yttre förpackningen med en smarttelefon eller på adressen <https://efluelda-nh.info.sanofi>

---

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Liksom med alla injicerbara vacciner ska lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas lätt tillgänglig om en anafylaktisk reaktion skulle inträffa efter administrering av vaccinet.

Vaccinet ska anta rumstemperatur före användning.

Omskakas före användning. Kontrolleras visuellt före användning.

Vaccinet ska inte användas om det finns främmande partiklar i suspensionen.

Vaccinet ska inte blandas med andra läkemedel i samma spruta.

Vaccinet får inte injiceras rakt in i ett blodkärl.

Se även avsnitt 3. Hur du använder Efluelda Tetra

**<Förberedelse för administrering**

Bruksanvisning för användning av förfyllt Luer Lock-spruta med nålskydd:


Bild A: Nål med nålskydd (inuti hylsa)	Bild B: Delar av nål med nålskydd (förberett för användning)
<p>hylsa</p> <p>navskydd</p>	

**Steg 1:** Fäst nälen vid sprutan genom att ta bort navskyddet så att du ser nälen och vrid sedan försiktigt fast nälen i Luer Lock-kopplingen på sprutan, tills du känner ett litet motstånd.

**Steg 2:** Dra av nålskyddets hylsa rakt av. Nälen täcks av nålskyddet och skyddsdelens.


**Steg 3:**

**A:** Lyft nålskyddet bort från nälen och bakåt mot sprutcylindern till den vinkel som visas i bilden.  
**B:** Dra av skyddsdelens rakt från nälen.




**Steg 4:** Efter injektionen ska nålskyddet låsas (aktiveras) genom att använda en av de tre (3) **enhandsteknikerna** som visas i bilden: aktivering mot en yta, med tummen eller med fingret.

Observera: Aktiveringsten har lyckats när du hör och/eller känner ett ”klick”.



**Steg 5:** Kontrollera visuellt att nålskyddet har aktiverats. Nålskyddet ska vara **helt låst (aktiverat)** såsom visas i bild C



I bild D visas ett nålskydd som **INTE är helt låst (inte aktiverat)**.

**Varning:** Försök inte låsa upp (avaktivera) skyddsmekanismen genom att tvinga ut nålen från nålskyddet.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar. >