

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Oxybutynin Viatris 5 mg tabletit

oksibutyniinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävä, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Oxybutynin Viatris on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Oxybutynin Viatris -valmistetta
3. Miten Oxybutynin Viatris -valmistetta otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Oxybutynin Viatris -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Oxybutynin Viatris on ja mihin sitä käytetään

Oxybutynin Viatris pienentää virtsarikon sisäistä painetta ja harventaa virtsaamispakosta johtuvaa virtsaamistihettä. Tämä parantaa virtsanpidätyskykyä.

Oxybutynin Viatris -valmistetta käytetään voimakkaan tai usein toistuvan virtsaamispakon hoitoon. Virtsaamispakkoon voi liittyä virtsankarkailua. Valmistetta käytetään myös hermostovammasta johtuvan virtsanpidätyskyvyttömyyden hoidossa.

Käyttö lapsille:

Oxybutynin Viatris -valmistetta voidaan antaa yli 5-vuotialle lapsille

- virtsanpidätyskyvyttömyyden (virtsankarkailun) hoitoon
- tiheävirtsaisuuden tai virtsaamispakon hoitoon
- yöllisen vuoteenkastelun hoitoon, kun muut hoidot eivät ole auttaneet.

Oksibutyniinihydrokloridia, jota Oxybutynin Viatris sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäristä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Oxybutynin Viatris -valmistetta

Älä käytä Oxybutynin Viatris -valmistetta

- jos olet allerginen oksibutyniinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on virtsaamisvaikeuksia, jotka johtuvat esimerkiksi suurentuneesta eturauhasta
- jos sinulla on silmänpainetauti (ahdaskulmaglaukooma) tai matala silmän etukammio
- jos sinulla on ruoansulatuskanavan ahtauma
- jos sinulla on vaikea haavainen paksusuolen tulehdus, toksinen megakoolon (laajentunut paksusuoli), veltto suoli tai suolilama

- jos sinulla on heikentynyt mahalaukun tyhjenemiskyky
- jos sinulla on vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta
- jos sinulla on lihasheikkoutta aiheuttava tauti (myasthenia gravis).

Kerro lääkärille, jos jokin yllä mainituista koskee sinua.

Varoitukset ja varotoimet

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos näkösi heikkenee äkillisesti tai sinulla on silmäkipua, sillä oksibutyniini voi aiheuttaa ahdaskulmaglaukoomaa.

Kerro lääkärille, jos sinulle ilmaantuu keskushermostovaikutuksia, kuten aistiharhoja, kiihyneisyyttä, sekavuutta tai uneliaisuutta. Tällöin lääkärin on harkittava lääkityksesi lopettamista tai annoksen pienentämistä. Huomioi myös, että tämä lääke voi pahentaa aikaisemmin ilmaantuneita keskushermosto-oireitasi.

Ole erityisen varovainen Oxybutynin Viatris -valmisteen suhteen, jos sinulla on korkea verenpaine, sydänsairaus, hypertyreoidismi (kilpirauhasen liikatoiminta), epilepsia, eturauhasen liikakasvu, autonominen neuropatia (hermostosairaus, esimerkiksi Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla), palleatyrä, refluksitauti, tai muu maha-suolikanavan sairaus, heikentynyt maksan ja/tai munuaisten toiminta, aivoverenkiertohäiriö, tai jos olet iäkäs tai jos käytät lääkeaineita, jotka voivat aiheuttaa tai pahentaa ruokatorven tulehdusta. Oxybutynin Viatris voi myös pahentaa kognitiivisia häiriöitä (muistin ja/tai älyllisten toimintojen häiriöt).

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin otat Oxybutynin Viatris -valmistetta, jos lääke on määräty lapselle (tätä valmistetta ei suositella alle 5-vuotialle).

Keskustele myös lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin otat Oxybutynin Viatris -valmistetta, jos olosuhteet ovat lämpimät tai sinulla on kuumetta. Oxybutynin Viatris estää hikoilua ja heikentää siten kuumuudensietokykyä.

Oksibutyniinia ei suositella potilaille, joilla on porfyria.

Oxybutynin Viatris -valmisteen käyttö voi aiheuttaa suun kuivumista erityisesti pitkääikaishoidossa. Tämä suurentaa hampaiden reikiintymisriskiä, joten on tärkeää huolehtia suuhygieniasta tarkoin hoidon aikana.

Tietty oksibutyniinin haittavaikutukset saattavat voimistua, jos samanaikaisesti käytetään muita lääkeitä, joilla on samanlaisia haittavaikutuksia, kuten suun kuivuminen, ummetus ja uneliaisuus.

Muut lääkevalmisteet ja Oxybutynin Viatris

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkeitä.

Muiden lääkkeiden samanaikainen käyttö Oxybutynin Viatris -valmisteen kanssa saattaa vaikuttaa hoidon tehoon. Tällaisia ovat esimerkiksi lääkkeet, joita käytetään psykoosien, Parkinsonin taudin, sydänsairauksien, masennuksen, sieni-infektioiden (esimerkiksi ketokonatsoli) tai allergisten oireiden hoitoon, sekä tietty antibiootit (esimerkiksi erytromysiini). Kerro sen vuoksi lääkärille, jos käytät samanaikaisesti muita lääkeitä.

Oxybutynin Viatris voi hidastaa muiden lääkkeiden imetymistä vähentämällä suoliston liikkeitä.

Oxybutynin Viatris alkoholin kanssa

Alkoholi voi voimistaa oksibutyniinin väsyttävää vaikutusta, joten alkoholin käyttöä ei suositella Oxybutynin Viatris -hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Oxybutynin Viatris -valmisteen käytöstä ihmisille raskauden aikana ei ole riittävästi tietoja. Oksibutyniinia ei pitäisi käyttää raskauden aikana, mikäli käyttö ei ole selvästi välttämätöntä.

Imetyks

Oxybutynin Viatris saattaa vaikuttaa rintaruokintaa saavaan lapseen. Siksi imetystä ei suositella oksibutyniinin käytön yhteydessä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Oxybutynin Viatris voi aiheuttaa näköhäiriötä, huimausta tai uneliaisuutta.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Oxybutynin Viatris sisältää laktoosia

Tabletit sisältävät laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Oxybutynin Viatris -valmistetta otetaan

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkienkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai aptekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määräää sinulle yksilöllisesti sopivan annoksen.

Aikuiset:

Suositeltu aloitusannos on 1 tabletti (5 mg) 2 kertaa vuorokaudessa. Lääkäri voi nostaa annoksen enintään 4 tablettiin (20 mg) vuorokaudessa.

Läkkääät:

Suositeltu aloitusannos on puoli tablettia (2,5 mg) 2–3 kertaa vuorokaudessa. Lääkäri voi nostaa annoksen enintään 3 tablettiin (15 mg) vuorokaudessa.

Yli 5-vuotiaat lapset:

Suositeltu aloitusannos on puoli tablettia (2,5 mg) 2–3 kertaa vuorokaudessa. Lääkäri voi nostaa annoksen enintään 3 tablettiin (15 mg) vuorokaudessa.

Tämä lääkevalmiste ei ole tarkoitettu alle 5-vuotiaalle lapsille.

Lääkkeen ottaminen

Koska tabletti maistuu pahalta, ota se kokonaisena tai puolitettuna nesteen (puoli lasillista) kera.

Jos otat enemmän Oxybutynin Viatris -valmistetta kuin sinun pitäisi

Yliannostuksessa lääkkeen tavallisimmat haittavaikutukset voimistuvat.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähohjeiden saamiseksi.

Jos unohtat ottaa Oxybutynin Viatris -valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Ota unohtunut annos heti, kun muistat unohtaneesi sen. Jos on jo melkein seuraavan annoksen aika, jätä unohtamasi annos väliin ja ota seuraava normaaliihin aikaan. Kysy lääkäriltä tai aptekista neuvoa, jos olet epävarma.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli yhdellä käyttäjällä 10:stä): Ummetus, pahoinvoindi, heiteihuimaus, päänsärky, uneliaisuus, kuiva iho, suun kuivuminen (ks. kohta Varoitukset ja varotoimet).

Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä): Ripuli, oksentelu, sekavuus, kuivat silmät, virtsaamisvaikeudet, punoitus, voimakas sydämenlyönti, joka voi olla nopea tai epäsäännöllinen.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta): Vatsavaivat, ruokahaluttomuus, nielemisvaikeudet.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia (yleisyys tuntematon, sillä saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyyvyyden arviointiin): Virtsatietulehdus, näristys, suolen näennäinen tukkeuma (voimakkaasti heikentynyt kyky kuljettaa suolen sisältöä eteenpäin) iäkkäillä tai potilailla, joilla on ummetus ja joita hoidetaan muilla suoliston liikkeitä vähentävillä lääkkeillä, psyykkiset vaivat kuten harhakuvat, ahdistus, painajaisunet, jännittyneisyys (levoton liikehdintä), vainoharhaisuus, kognitiiviset häiriöt (muistin ja/tai älyllisten toimintojen häiriöt), masennusoireet, riippuvuuus (potilailla, joilla on aiemmin ollut lääkkeiden tai pääteiden väärinkäyttöä), ajan ja paikan tajun hämärtymä, sekavuustila, kouristukset, sydämen rytmihäiriöt, heikentynyt näkökyky, vaikeus kohdistaa näkö lähelle tai kauas, mustuaisten laajentuminen, silmänpaineen nousu, ahdaskulmaglaukooma, niukka hikoilu, lämpöhalvaus, yliherkkyyssreaktiot kuten ihottumat, nokkosihottumat sekä huulten, kielen, kasvojen tai kurkun äkillinen turvotus (angioedeema). Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu edellä mainittuja äkillisiä turvotusoireita.

Jos Oxybutynin Viatris -valmistetta käytetään kuumassa ympäristössä, lääke saattaa aiheuttaa lämpööupumusta vähentyneen hikoilun vuoksi.

Haittavaikutukset riippuvat annoksen suuruudesta ja häviävät, kun hoito lopetetaan.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Oxybutynin Viatris -valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 30 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärään jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Nämä menetellään suojelet luontoa.

6. Pakkausen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oxybutynin Viatris sisältää

- Vaikuttava aine on oksibutyniinihydrokloridi 5 mg per tabletti.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, kalsiumstearaatti ja indigokarmiini (E132).

Lääkevalmisten kuvaus ja pakauskoot

Oxybutynin Viatris tabletti on sininen, pyöreä, kupera, päälystämätön, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm. Tablettissa on merkinnät "OB 5" jakourteen puolella ja "G" kääntöpuolella.

Pakauskoot ovat 20, 100 ja 100 x 1 tablettia PVC-Al -läpipainopakkauksissa.

Kaikkia pakauskokoja ei välittämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Viatris Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublin 15
DUBLIN
Irlanti

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Viatris Oy
infofi@viatris.com

Valmistaja

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom, 2900, Unkari

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.2.2025.

Bipacksedel: Information till användaren

Oxybutynin Viatris 5 mg tabletter

oxibutyninhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Oxybutynin Viatris är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Oxybutynin Viatris
3. Hur du tar Oxybutynin Viatris
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oxybutynin Viatris ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oxybutynin Viatris är och vad det används för

Oxybutynin Viatris gör att trycket i urinblåsan minskar och urinträngningarna blir mindre täta. Detta förbättrar förmågan att hålla urinen.

Oxybutynin Viatris används vid behandling av kraftiga eller täta urinträngningar. Urinträngningar kan förekomma med eller utan urinläckage. Preparatet används också för behandling av urininkontinens orsakad av nervskada.

Användning till barn:

Oxybutynin Viatris kan ges till barn över 5 år för behandling av

- avsaknad av kontroll över urinering (urininkontinens)
- onormalt ofta förekommande eller trängande urineringsbehov
- nattlig sängvätning då annan behandling inte gett resultat.

Oxibutyninhydroklorid som finns i Oxybutynin Viatris kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Oxybutynin Viatris

Ta inte Oxybutynin Viatris

- om du är allergisk mot oxibutyninhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har urineringssvårigheter, t.ex. på grund av förstorad prostata
- om du har trångvinkelglaukom (grön starr) eller grund främre kammare
- om du har förträngning i matsmältningskanalen
- om du har svår ulcerös kolit, toxisk megakolon (förstorad tjocktarm), slapp tarm (tarmatoni) eller tarmstopp
- om du har försämrat tömning av magsäcken
- om du har svår lever- eller njurinsufficiens

- om du har en sjukdom som orsakar muskelsvaghet (myasthenia gravis).

Tala med din läkare om någon av de ovan nämnda gäller dig.

Varningar och försiktighet

Kontakta omedelbart läkare om din synförmåga plötsligt försämrar eller om du får ögonsmärta då oxibutynin kan förorsaka trångvinkelglaukom.

Tala om för läkaren om du får effekter på centrala nervsystemet, såsom hallucinationer, agitation, förvirring eller sömnighet. I detta fall bör läkaren överväga avbrytning av behandlingen eller minskning av dosen. Du bör också iaktta att läkemedlet kan förvärra symptom på centrala nervsystemet som förekommit tidigare.

Var särskilt försiktig med Oxybutynin Viatris om du lider av högt blodtryck, hjärtsjukdom, hypertreoidism (överfunktion av sköldkörteln), epilepsi, prostataförstoring, autonom neuropati (nervsjukdom, t.ex. hos patienter med Parkinsons sjukdom), diafragmabråck, refluxsjukdom, eller annan magtarmsjukdom, nedsatt lever- och/eller njurfunktion, cerebrovaskulär sjukdom eller om du är äldre eller om du använder läkemedel som kan förorsaka eller förvärra matstrupsinflammation. Oxybutynin Viatris kan även försämra kognitiva störningar (minnesstörningar och/eller störningar i psykiska funktioner).

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Oxybutynin Viatris om läkemedlet har ordinerats åt ett barn (det här preparatet rekommenderas inte till barn under 5 år).

Tala även med läkare eller apotekspersonal innan du tar Oxybutynin Viatris under varma förhållanden eller då du har feber. Oxybutynin Viatris förhindrar svettning och försämrar därigenom förmågan att uthärda hetta.

Oxybutynin rekommenderas inte till patienter med porfyri.

Oxybutynin Viatris kan orsaka munorrhett, i synnerhet vid långtidsbehandling. Detta ökar risken för hål i tänderna och därför är det viktigt med noggrann munhygien under behandlingen.

Vissa biverkningar av oxibutynin kan förstärkas om man samtidigt använder andra läkemedel som har likadana biverkningar, såsom munorrhett, förstopning och dåsighet.

Andra läkemedel och Oxybutynin Viatris

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Behandlingen kan påverkas om Oxybutynin Viatris tas samtidigt med andra läkemedel. Detta gäller bland annat vissa läkemedel mot psykoser, Parkinsons sjukdom, hjärtsjukdom, depression, svampinfektion (såsom ketokonazol) och allergiska symptom, samt vissa antibiotika (såsom erytromycin). Tala om för läkare om du använder andra läkemedel samtidigt.

Oxybutynin Viatris kan födröja upptaget av andra läkemedel eftersom det minskar tarmens rörelser.

Oxybutynin Viatris med alkohol

Oxibutynin kan orsaka dåsighet och denna effekt kan stärkas vid samtidig användning av alkohol. Användning av Oxybutynin Viatris tillsammans med alkohol rekommenderas därför ej.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Det finns inte tillräckligt mycket data beträffande användning av Oxybutynin Viatris hos gravida kvinnor. Oxibutynin skall inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

Amning

Oxybutynin Viatris kan påverka barnet som ammas. Amning rekommenderas därför inte under användning av Oxybutynin Viatris.

Körförmåga och användning av maskiner

Oxybutynin Viatris kan orsaka synstörningar, yrsel eller dåsighet.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Oxybutynin Viatris innehåller laktos

Tabletterna innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. Hur du tar Oxybutynin Viatris

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren avpassar dosen individuellt för dig.

Vuxna:

Rekommenderad startdos är 1 tablett (5 mg) 2 gånger dagligen. Läkaren kan höja dosen till högst 4 tabletter (20 mg) per dygn.

Äldre:

Rekommenderad startdos är en halv tablett (2,5 mg) 2–3 gånger dagligen. Läkaren kan höja dosen till högst 3 tabletter (15 mg) per dygn.

Barn över 5 år:

Rekommenderad startdos är en halv tablett (2,5 mg) 2–3 gånger dagligen. Läkaren kan höja dosen till högst 3 tabletter (15 mg) per dygn.

Det här läkemedlet är inte avsett för barn under 5 års ålder.

Intag av läkemedlet

Tabletterna smakar illa och bör därför sväljas hela eller halverade med vätska (ett halvt glas).

Om du har tagit för stor mängd av Oxybutynin Viatris

Vid överdosering förstärks de vanligaste biverkningarna.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Oxybutynin Viatris

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg det men om det snart är dags för nästa dos, hoppa då över den glömda dosen och fortsätt som vanligt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar (kan påverka fler än 1 av 10 användare): Förstopning, illamående, svindel, huvudvärk, dåsighet, torr hud, muntorrhet (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 användare): Diarré, kräkningar, förvirring, torra ögon, svårigheter att urinera, rodnad, ett kraftfullt hjärtslag som kan vara snabbt eller oregelbundet.

Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 användare): Magbesvär, nedslatt aptit, sväljsvårigheter.

Ytterligare biverkningar som kan förekomma (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data): Urinvägsinflammation, sura uppstötningar, falsk tarmvred (kraftig försämring i tarmarnas förmåga att framflytta maten) hos patienter i riskgrupp (äldre eller patienter med förstopning och behandling med andra läkemedel som minskar tarmrörelserna), psykiska besvär såsom till exempel hallucinationer, ångest, mardrömmar, agitation (rastlösa rörelser), paranoia, kognitiva störningar (minnesstörningar och/eller störningar i kognitiva funktioner), nedstämdhet, beroende (hos patienter med historik av missbruk av läkemedel eller berusningsmedel), desorientering, delirium, kramper, rytmrubbnings i hjärtat, försämrade synförmåga, svårigheter för ögat att ställa om mellan närl- och fjärrseende, pupillutvidgning, högt ögontryck, trångvinkelglaukom, minskad svettning, värmeslag, överkänslighetsreaktioner som hudutslag, nässelutslag och plötslig svullnad i läppar, tunga, ansikte och hals (angioödem). Kontakta omedelbart läkare om du får någon av de ovannämnda plötsliga svullnadsreaktionerna.

Om Oxybutynin Viatris används i varmt klimat finns det risk för utmattning eftersom man svettas mindre.

Graden av biverkningar beror på dosens storlek och biverkningarna försvinner när behandlingen avslutas.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Oxybutynin Viatris ska förvaras

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använts före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Använd inte detta läkemedel om du märker synliga förändringar i preparatets utseende.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är oxibutyninhydroklorid 5 mg per tablett.
- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kalciumstearat och indigokarmin (E 132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Oxybutynin Viatris 5 mg är en blå, rund, kupad, odragerad tablett med brytskåra. Tabletten är ca 8 mm i diameter och den är märkt med "OB/5" på samma sida som brytskåran och "G" på andra sidan.

Förpackningsstorlekarna är 20, 100 och 100 x 1 tablett i PVC/Al -blister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatris Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublin 15
DUBLIN
Irland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Viatris Oy
infofi@viatris.com

Tillverkare

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom, 2900, Ungern

Denna bipacksedel ändrades senast 24.2.2025.