

## **Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle**

### **Recipect oraaliliuos**

kodeiinifosfaattihemihydraatti ja guaifenesiini

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännä lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän kuluessa tai se huononee.

**Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Recipect on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Recipectiä
3. Miten Recipectiä otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Recipectin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Recipect on ja mihin sitä käytetään**

Recipect-yskänlääkkeen vaikuttavista aineista kodeiini on tehokas yskänäritystä hillitsevä lääkeaine. Se vaikuttaa keskushermostossa sijaitsevaan yskänärityskeskukseen ja vaimentaa täten yskänrefleksiä. Guaifenesiini muuttaa sitkeän liman juoksevammaksi ja siten helpommin irtoavaksi. Lisäksi guaifenesiini lisää limaneritystä.

Recipect-yskänlääkettä käytetään tilapäisesti ilman lääkärin määräystä yskänärityksen hoitoon. Mikäli saat Recipectiä lääkärin määräyksestä, lääkärisi kertoo sinulle, mihin tarkoitukseen hän on lääkkeen määrännyt.

Käännä lääkärin puoleen, ellet tunne olosi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 7 päivän jälkeen.

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Recipectiä**

**Älä käytä Recipectiä**

- jos olet allerginen kodeiinille, guaifenesiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on synnynnäinen fruktoosi-intoleranssi
- jos olet alle 12-vuotias
- jos tiedät, että elimistösi muuntaa kodeiinia morfiiniksi erittäin nopeasti
- jos imetät.

**Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Recipectiä:

- jos sairastat astmaa, keuhkolaajentumaa eli emfyseemaa tai muuta hengityksen vajaatoimintaa

- jos saat herkästi sappivaivoja
- jos sinulle on hiljattain tehty vatsan- tai rinnanalueen leikkaus (kodeiinin aiheuttama yskänrefleksin lamaantuminen saattaa lisätä liman ja muun eritteen jäämistä hengitysteihin)
- jos sairastat akuuttia porfyriaa
- jos sairastat kroonista, astmaattista tai runsaasti limaa erittävää yskää. Käytä tällöin Recipectiä vain lääkärin määräyksellä.

Kerro lääkärille, jos jokin yllä mainituista koskee tai on koskenut sinua.

Kodeiini muuttuu maksassa morfiiniksi entsyymien vaikutuksesta. Morfiini on aine, joka saa aikaan kodeiinin vaikutukset. Joillakin ihmisillä on tämän entsyymien muunnos, mikä voi vaikuttaa ihmisiin eri tavoin. Joidenkin ihmisten elimistö ei tuota morfiinia tai sitä muodostuu erittäin pieniä määriä, jotka eivät riitä vaikuttamaan yskän oireisiin. Toiset puolestaan saavat vakavia haittavaikutuksia todennäköisemmin kuin muut, koska heidän elimistönsä muodostaa erittäin suuria määriä morfiinia. Jos huomaat minkä tahansa seuraavista haittavaikutuksista, lopeta tämän lääkkeen käyttö ja käänny välittömästi lääkärin puoleen: hidas tai pinnallinen hengitys, sekavuus, uneliaisuus, pienet pupillit, pahoinvointi tai oksentelu, ummetus, ruokahaluttomuus.

### **Yli 12-vuotiaat nuoret**

Recipect-valmistetta ei suositella nuorille, joiden hengitystoiminta on heikentynyt, yskän oireiden hoitoon.

### **Muut lääkevalmisteet ja Recipect**

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Recipect-valmisteen ja rauhoittavien lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien ja vastaavanlaisten lääkkeiden samanaikainen käyttö lisää uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä, ja se voi olla henkeä uhkaavaa. Sen vuoksi samanaikaista käyttöä voidaan harkita vain, jos muut hoitovaihtoehdot eivät ole mahdollisia.

Jos lääkäri määrää sinulle Recipect-valmistetta samanaikaisesti rauhoittavien lääkkeiden kanssa, annosta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava.

Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi rauhoittavista lääkkeistä, ja noudata huolellisesti lääkäriltä saamiasi annostussuosituksia. Voi olla hyödyllistä kertoa läheisille yllä kuvatuista rauhoittavien lääkkeiden kanssa samanaikaiseen käyttöön liittyvistä oireista ja merkeistä. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu tällaisia oireita.

Recipect-yskänlääkettä ei suositella käytettäväksi samanaikaisesti tiettyjen masennuslääkkeiden, kuten trisyklisten masennuslääkkeiden tai ns. MAO:n estäjien (monoamiinioksidaasin estäjät) kanssa.

### **Recipect alkoholin kanssa**

Recipectiä ei pidä käyttää yhtäaikaaisesti alkoholin kanssa.

### **Raskaus ja imetys**

Recipect-oraaliliuosta ei pidä käyttää raskauden aikana.

Älä käytä Recipect-valmistetta, kun imetät. Kodeiini ja morfiini erittyvät rintamaitoon.

### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Recipectin sisältämä kodeiini voi hidastaa reaktiokykyä ja näin heikentää suorituskykyä liikenteessä ja erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Vältä autolla ajoa ja koneiden käyttöä, jos tunnet väsymystä tai huimausta.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

**Recipect sisältää sorbitolia, etanolia, metyyli parahydroksibentsoaattia, propyyli parahydroksibentsoaattia ja poltettua sokeria**

Tämä lääke sisältää sorbitolia 500 mg/ml. Annosteluohjeen mukainen kerta-annos (10–15 ml lääkettä) sisältää 5,0–7,5 g sorbitolia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Voi olla lievästi laksatiivinen. Energiasisältö 2,6 kcal/g sorbitolia.

Tämä lääkevalmiste sisältää 4,9 tilavuus % etanolia (alkoholia), eli enimmillään 582 mg per annos, mikä vastaa noin 15 ml olutta, tai 6 ml viiniä per annos. Haitallinen alkoholismissa. Otettava huomioon raskaana olevilla ja imettävillä naisilla, lapsilla ja suuren riskin ryhmissä, kuten potilailla, joilla on maksasairaus tai epilepsia.

Tämä lääke sisältää säilytysaineena metyyli parahydroksibentsoaattia ja propyyli parahydroksibentsoaattia. Voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Lääke sisältää poltettua sokeria 5 mg/ml (50–75 mg/annos). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

### **3. Miten Recipectiä otetaan**

Ota tätä lääkettä juuri siten, kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset (vähintään 18-vuotiaat):  
15 ml 3–4 kertaa päivässä.

#### **Käyttö lapsille ja nuorille**

Alle 12-vuotiaat lapset:

Recipect-valmistetta ei saa käyttää alle 12 vuoden ikäisten lasten hoidossa.

12–15-vuotiaat nuoret:

10 ml 3–4 kertaa päivässä.

16–17-vuotiaat nuoret:

15 ml 3–4 kertaa päivässä.

Recipect -valmisteen käyttöä ei suositella 12–18 vuoden ikäisille nuorille, joiden hengitystoiminta on heikentynyt.

Noudata näitä ohjeita, ellei lääkäri toisin määrää.

Recipect annostellaan lääkeMITAN avulla.

Ravistettava.

#### **Tärkeää**

Ilman reseptiä saatava Recipect-yskänlääke on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, yleensä enintään viikon ajaksi, ellei lääkäri ole määrännyt pitempää käyttöä.

Yskänlääkkeen vaikutus tehostuu, kun muistat juoda runsaasti nestettä. Hoidon alkaessa limantulo ja yskimisen tarve saattavat lisääntyä, kun lima alkaa irrota.

#### **Jos otat enemmän Recipectiä kuin sinun pitäisi**

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

#### **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 käyttäjällä sadasta):

- päänsärky, pahoinvointi, huimaus
- oksentelu, ummetus
- väsymys.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 käyttäjällä sadasta):

- sydämentykytys
- kutina.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 käyttäjällä tuhannesta):

- yliherkkyysoireet
- kiihtymys
- hikoilu.

#### Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

#### **5. Recipectin säilyttäminen**

Säilytettävä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

### **Mitä Recipect sisältää**

- Vaikuttavat aineet ovat kodeiinifosfaattihemihydraatti, jota on 0,958 mg yhdessä millilitrassa liuosta, ja guaifenesiini, jota on 20 mg yhdessä millilitrassa liuosta.
- Muut aineet ovat sorbitoli (E420), sakkariinatrium, ammoniumkloridi, timjamin nesteuute, etanoli ja puhdistettu vesi. Lääke sisältää säilöntäaineina metyyli- ja propyyli parahydroksibentsoattia (E218 ja E216), aromiaineena lakritsiaromia ja väriaineena poltettua sokeria (E150).

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko**

Recipect on hieman samaa, ruskea liuos.

Pakkauskoko: 150 ml

### **Myyntiluvan haltija ja valmistaja**

#### Myyntiluvan haltija

Orion Oyj  
Orionintie 1  
02200 Espoo

#### Valmistaja

Orion Pharma  
Volltikatu 8  
70700 Kuopio

**Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.5.2019**

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Recipect oral lösning**

Kodeinfosfathemihydrat och guaifenesin

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

**I denna bipacksedel finns information om följande :**

1. Vad Recipect är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Recipect
3. Hur du tar Recipect
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Recipect ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Recipect är och vad det används för**

Av de aktiva substanserna i Recipect är kodein ett läkemedel som effektivt lindrar hostretning. Kodein verkar på hostretningscentret i det centrala nervsystemet och hämmar därmed hostreflexen.

Guaifenesin gör segt slem mera lättflytande och därmed lättare att hosta bort. Därtill ökar guaifenesin utsöndringen av slem.

Recipect används tillfälligt utan läkarordination mot hostretning. Om du får Recipect på ordination av läkare, informerar läkaren för vilket ändamål läkemedlet är ordinerat.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

#### **2. Vad du behöver veta innan du tar Recipect**

**Använd inte Recipect**

- om du är allergisk mot kodein, guaifenesin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har medfödd fruktosintolerans
- om du är under 12 år
- om du vet att du mycket snabbt omvandlar kodein till morfin
- om du ammar.

**Varningar och försiktighet**

Tala med läkare innan du använder Recipect:

- om du lider av astma, lungemfysem eller annan nedsatt andningsfunktion
- om du lätt får gallbesvär
- om du har nyligen genomgått en operation i mag- eller bröstområdet (hämmningen av hostreflexen, som förorsakas av kodein, kan leda till att slem och annat sekret blir kvar i luftvägarna)

- om du lider av akut porfyri
- om du lider av kronisk, astmatisk eller rikligt slemavsöndrande hosta. Använd i så fall Recipect endast på ordination av läkare.

Tala om för läkaren om något av de ovan nämnda gäller eller har gällt dig.

Kodein omvandlas till morfin i levern av ett enzym. Ämnet som producerar kodeinets effekter är morfin. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Hos vissa människor produceras inget eller nästan inget morfin vilket gör att deras hosta inte lindras. Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar eftersom de kan bilda en mycket stor mängd morfin. Om du får någon av följande biverkningar måste du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring, sömnhet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.

### **Ungdomar över 12 år**

Recipect rekommenderas inte till ungdomar med nedsatt andningsfunktion vid behandling av hosta.

### **Andra läkemedel och Recipect**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Samtidig användning av Recipect och lugnande läkemedel såsom bensodiazepiner och liknande läkemedel ökar risken för sömnhet, andningssvårigheter (andningsdepression) och koma vilket kan vara livshotande. På grund av detta bör samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om läkaren förskriver Recipect samtidigt med lugnande, bör dosen och behandlingstiden begränsas.

Berätta för läkaren om du tar lugnande läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om riskerna som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du får dessa symtom.

Det rekommenderas att Recipect inte används samtidigt med vissa depressionsmediciner, såsom tricykliska antidepressiva läkemedel eller sk. MAO-hämmare (monoaminoxidas-inhibitorer).

### **Recipect och alkohol**

Recipect bör inte användas samtidigt med alkohol.

### **Graviditet och amning**

Recipect oral lösning bör inte användas under graviditet.

Ta inte Recipect om du ammar. Kodein och morfin passerar över till bröstmjolk.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Kodeinet i Recipect kan göra reaktionsförmågan långsammare och på detta sätt försämra prestationsförmågan i trafiken och i annat precisionsbetonat arbete. Undvik att köra bil eller att hantera maskiner om du känner dig trött eller om du upplever yrsel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

## **Recipect innehåller sorbitol, etanol, metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat och sockerkulör**

Detta läkemedel innehåller sorbitol 500 mg/ml. En engångsdos enligt doseringsanvisningarna (10–15 ml läkemedlet) innehåller 5,0–7,5 g sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin. Kan ha en mild laxerande effekt. Kalorivärde 2,6 kcal/g sorbitol.

Detta läkemedel innehåller 4,9 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 582 mg per dos, motsvarande ca. 15 ml öl, eller 6 ml vin per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

Detta läkemedel innehåller som konserveringsmedel metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat. Kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Läkemedlet innehåller sockerkulör 5 mg/ml (50–75 mg/dos). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

### **3. Hur du tar Recipect**

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker

Vuxna (18 år och äldre):  
15 ml 3–4 gånger dagligen.

#### **Användning för barn och ungdomar**

##### Barn under 12 år:

Recipect får inte användas för behandling av barn under 12 år.

##### Ungdomar mellan 12 och 15 år:

10 ml 3–4 gånger dagligen.

##### Ungdomar mellan 16 och 17 år:

15 ml 3–4 gånger dagligen.

Recipect rekommenderas inte till ungdomar mellan 12 och 18 år med nedsatt andningsfunktion.

Följ dessa anvisningar om inte läkaren ordinerat annat.

Recipect doseras med hjälp av ett medicinmått.

Bör omskakas.

#### **Viktigt**

Recipect kan köpas utan recept och är avsedd för tillfälligt bruk. I allmänhet används läkemedlet högst i en vecka, om läkaren inte ordinerat annat.

Hostmedicinens verkan förbättras då du kommer ihåg att dricka rikligt med vätska. Då behandlingen påbörjas kan slemutsöndringen tillta och behovet att hosta öka då slemmet börjar lossna.



## **Om du har tagit för stor mängd av Recipect**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 användare av 100):

- huvudvärk, illamående, yrsel
- kräkningar, förstoppning
- trötthet.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 användare av 100):

- hjärtklappning
- klåda.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 användare av 1 000):

- överkänslighetsreaktioner
- upprördhet
- svettning.

### Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

## **5. Hur Recipect ska förvaras**

Förvaras vid rumstemperatur (15–25 °C).

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- De aktiva substanserna är kodeinfosfathemihydrat, varav det finns 0,958 mg i en milliliter lösning och guaifenesin, varav det finns 20 mg i en milliliter lösning.
- Övriga innehållsämnen är sorbitol (E420), sackarinnatrium, ammoniumklorid, flytande timjanextrakt, etanol och renat vatten. Läkemedlet innehåller metyl- och propylparahydroxibensoat (E218 och E216) som konserveringsmedel, lakritsarom som aromämne och sockerkulör (E150) som färgämne.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek**

Recipect är en aning grumlig, brun lösning.

Förpackningsstorlek: 150 ml

### **Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare**

#### Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation  
Orionvägen 1  
02200 Esbo

#### Tillverkare

Orion Pharma  
Volltikatu 8  
70700 Kuopio

**Denna bipacksedel ändrades senast 9.5.2019**