

Pakkauseloste: Tietoa käyttäjälle

Precosa 250 mg jauhe oraalisuspensiota varten

Saccharomyces boulardii, kanta CNCM I-745

Lue tämä pakkauseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin pakkauselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkienkilokunta ovat neuvoneet sinulle.

- Säilytä tämä pakkauseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkauselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 2–3 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkauselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Precosa on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Precosaa
3. Miten Precosaa käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Precosan säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Precosa on ja mihin sitä käytetään

Precosa koostuu kylmäkuivatusta hiivasienestä (*Saccharomyces boulardii*, kanta CNCM I-745), joka estää bakteerien haitallisia vaikutuksia suolen limakalvolla. Precosa korjaa mikrobiston epätasapainoa.

Precosaa käytetään ripulin hoitoon sekä antibioottihoidon aiheuttamiin suolen tulehdusiin/ripulitiloihin. Precosaa voidaan käyttää myös antibioottihoidon aikana estämään ripulia. Lisäksi sitä käytetään lääkärin määräämän vankomysiini/metronidatsolioidon lisänä ehkäisemään *Clostridium difficile* aiheuttaman ripulin uusiutumista.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Precosaa

Älä käytä Precosaa

- jos olet allerginen *Saccharomyces boulardii*lle tai hiivoille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on keskuslaskimokatetri.
- jos olet immuunipuutteinen tai sairaalahoidossa (vakavan sairauden tai muuttuneen/heikentyneen immuunijärjestelmän vuoksi).

Varoitukset ja varotoimet

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin seuraavissa tapauksissa:

- paranemista ei ole tapahtunut 2–3 päivän hoidon jälkeen
- sinulla on kuumetta tai pahoinvointia
- ulosteet ovat verisiä tai limaisia

- kova jano, kielen kuivuminen: nämä oireet viittaavat kuivumiseen (ripulin aiheuttama nestehukka).
Lääkäri päättää mahdollisesta nesteytyksestä.

Ripulin yhteydessä ihmisen menettää paljon nestettä. Menetetty nestemääri pitää korvata juomalla runsaasti. Nestevajauksen hoito on erityisen tärkeää lapsilla.

Muut lääkevalmisteet ja Precosa

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä valmistetta samanaikaisesti antimykotien (sienilääkkeiden) kanssa.

Precosa ruuan ja juoman kanssa

Precosa sisältää eläviä soluja. Tästä syystä valmistetta ei pidä sekoittaa hyvin kuumaan (yli 50 °C), jäälkylmään tai alkoholipitoiseen juomaan tai ruokaan.

Raskaus, imetyks ja he de lmällisyys

Raskaus

Saccharomyces boulardii kulkeutuu suoliston läpi imetyymättä eikä täten voi vaikuttaa sikiöön.

Imetyks

Saccharomyces boulardii ei kulkeudu äidinmaitoon.

Kysy lääkäristä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Precosa ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Precosa sisältää laktoosia ja fruktoosia

Tämä lääkevalmiste sisältää 32,5 mg laktoosia ja 472 mg fruktoosia per annospussi. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla (tai lapsellasi) on jokin sokeri-intoleranssi tai jos sinulla on diagnosoitu perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei pysty hajottamaan fruktoosia, kerro asiasta lääkärillesi ennen tämän lääkevalmisten käyttöä (sinulle tai lapsellesi). Fruktoosi voi vahingoittaa hampaita.

Precosa sisältää sorbitolia

Tämä lääkevalmiste sisältää 0,1 mg sorbitolia per yksi annospussi.

3. Miten Precosaa käytetään

Käytä tästä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu. Tarkista ohjeet lääkäristä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavallinen annos on:

- Ripulin lyhytaikainen oireenmukainen hoito
Aikuisille 2 annospussia kahdesti päivässä, lapsille 1 annospussi kahdesti päivässä, viikon ajan.
- Antibioottihoitoon liittyvä ripulin esto
Aikuisille 2 annospussia kahdesti päivässä, lapsille 1 annospussi kahdesti päivässä. Hoito tulee aloittaa 48–72 tunnin kuluessa antibioottikurun aloittamisesta ja sitä tulee jatkaa vähintään 3 päivän

mutta enintään 4 viikon ajan antibioottihoidon lopettamisesta.

- Lääkärin määräämän vankomysiini/metronidatsolihoidon lisänä ehkäisemään Clostridium difficileen aiheuttaman ripulin uusiutumista

Aikuisille 2 annospussia kahdesti päivässä, lapsille 1 annospussi kahdesti päivässä. Hoito tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti antibioottihoidon aloittamisesta ja sen tulee jatkua 4 viikon ajan.

Antotapa:

Jauhe sekoitetaan veteen tai muuhun juomaan, ja se voidaan myös sirotella ruokaan.

Jos otat enemmän Precosaa kuin sinun pitäisi

Yliannostuksesta ei ole raportoitu. Jos olet ottanut liikaa Precosaa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Jos unohdat ottaa Precosaa

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Precosa-valmisten käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista (turvotus [angioedeema], äkillinen yliherkkyyssreaktio [anafylaktinen reaktio tai sokki]):

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

- kasvojen, kielen tai kurkun turvotus,
- nielemisvaikeudet,
- nokkosihottuma ja hengitysvaikeudet.

Muut haittavaikutukset

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta): allergiset reaktiot, ummetus, jano, nokkosihottuma.

Harvinaiset (alle 1 potilaalla tuhannesta): ihottuma.

Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla kymmenestä tuhannesta): hiivan tunkeutuminen vereen (fungemia).

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin): vakava verenmyrkytys (sepsis).

Tietyillä erittäin heikkokuntoisilla potilailla on esiintynyt verenmyrkytyksiä (sepsiä) *Saccharomyces boulardii* -hoidon aikana.

Haittavaikutuksista ilmoittamineen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

5. Precosan säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettää pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkausen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Precosa sisältää

- Vaikuttava aine on *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745. 1 annospussi sisältää kylmäkuivattua *Saccharomyces boulardiita* 250 mg, joka vastaa $7,5 \times 10^9$ elävää solua valmistamisen jälkeen.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, fruktoosi, kolloidinen vedetön piidioksidi, makuaine (tuttifrutti), joka sisältää sorbitolia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Beigenvärisen jauhe.

10, 20 ja 50 annosjauhepussia (Al/paperi/PE).

Kaikkia pakkauskokoja ei vältämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Biocodex

22 rue des Aqueducs

F-94250 Gentilly

Ranska.

Valmistaja:

Biocodex

1 avenue Blaise Pascal

F-60000 Beauvais

Ranska.

Markkinoija:

Biocodex Oy, info@biocodex.fi

Tämä pakkausseleoste on tarkistettu viimeksi 3.6.2024.

Bipacksedel: Information till användaren

Precosa 250 mg pulver till oral suspension

Saccharomyces boulardii, stammen CNCM I-745

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2–3 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Precosa är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Precosa
3. Hur du använder Precosa
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Precosa ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Precosa är och vad det används för

Precosa består av en jästsvamp (*Saccharomyces boulardii*, stammen CNCM I-745) i frystorkad form som hindrar bakteriernas skadliga effekt på tarmslemhinnan. Precosa återställer balansen i mikrobiotan.

Precosa används vid diarré och vid tarminfektioner/diarré tillstånd, som orsakats av antibiotikabehandling. Kan även användas under pågående antibiotika behandling för att förhindra diarré. Används också som tillägg till vancomycin/metronidazol-behandling ordinerad av läkaren för att förebygga recidiv vid *Clostridium difficile*-orsakad diarré.

2. Vad du behöver veta innan du använder Precosa

Använd inte Precosa

- om du är allergisk mot *Saccharomyces boulardii*, jäst eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har en central venkateter inopererad.
- om du har nedsatt immunförsvar eller är inlagd på sjukhus (på grund av allvarlig sjukdom eller förändrat/försvagat immunsystem).

Varningar och försiktighet

Kontakta genast läkaren om

- ingen förbättring ses efter 2–3 dagars behandling
- du har feber eller illamående
- du har blodiga eller slemmiga avföringar

- du är mycket törstig eller har muntorrhet: dessa symtom tyder på uttorkning (förorsakad av diarré). *Läkaren bestämmer om hydreringen behövs.*

Vid diarré förlorar man mycket vätska. Denna vätskeförlust skall ersättas genom att man dricker mycket. Behandling av vätskebrist är särskilt viktig hos barn.

Andra läkemedel och Precosa

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Precosa får inte användas samtidigt med svampmedel.

Precosa med mat och dryck

Precosa innehåller levande celler. Därför får man inte blanda den med mycket varma (över 50 °C), iskalla eller alkoholhaltiga drycker eller mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Saccharomyces boulardii passerar tarmen utan att tas upp i kroppen och kan därför inte leda till ognynsamma effekter på fostret.

Amning

Saccharomyces boulardii går inte över i modersmjölk.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel om du är gravid eller ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Precosa påverkar inte din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.

Precosa innehåller laktos och fruktos

Detta läkemedel innehåller 32,5 mg laktos och 472 mg fruktos per dospåse. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiseras med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel. Fruktos kan vara skadligt för tänderna.

Precosa innehåller sorbitol

Detta läkemedel innehåller 0,1 mg sorbitol per dospåse.

3. Hur du använder Precosa

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos är:

- Kortvarig symptomatisk behandling av diarré
Vuxna: 2 dospåsar två gånger dagligen. Barn: 1 dospåse två gånger dagligen, i en vecka.
- Profylax mot antibiotikaassocierad diarré
Vuxna: 2 dospåsar två gånger dagligen. Barn: 1 dospåse två gånger dagligen. Behandlingen bör inledas inom 48–72 timmar efter insättande av antibiotikabehandling och pågå minst 3 dagar men

högst 4 veckor efter antibiotikabehandlingen har avslutats.

- Tillägg till vancomycin/metronidazol-behandling ordinerad av läkaren för att förebygga recidiv vid Clostridium difficile-orsakad diarré

Vuxna: 2 dospåsar två gånger dagligen. Barn: 1 dospåse två gånger dagligen. Behandlingen bör inledas så fort som möjligt efter antibiotikabehandlingen har börjats och bör pågå under 4 veckor.

Administreringssätt:

Pulvret ska röras ut i vatten eller annan dryck, men kan även strös på maten.

Om du har tagit för stor mängd av Precosa

Överdoseringssfall har inte rapporterats. Om du har tagit för mycket Precosa, kontakta läkare eller apoteket för rådgivning.

Om du har glömt att använda Precosa

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Precosa och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (svullnad [angioödem], plötslig överkänslighetsreaktion [anafylaktisk reaktion eller chock]):

Ingen känd frekvens (förekommer hos ett okänt antal användare):

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg,
- svårigheter att svälja,
- nässelutslag och andningssvårigheter.

Övriga biverkningar

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100): allergiska reaktioner, förstopning, törst, nässelutslag.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000): hudutslag.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000): förekomst av jäst i blodet (fungemi).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): allvarlig blodinfektion (sepsis).

Hos vissa patienter med mycket nedsatt allmäntillsstånd har fall av blodförgiftning (sepsis) med *Saccharomyces boulardii* förekommit.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret

PB 55
00034 Fimea

5. Hur Precosa ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745. 1 dospåse innehåller *Saccharomyces boulardii* (frystorkad) 250 mg, som motsvarar $7,5 \times 10^9$ levande celler efter beredning.
- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, fruktos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, smakämne (tuttifrutti), som innehåller sorbitol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Beige pulver.

10, 20 och 50 dospåsar (Al/papper/PE).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av försäljningstillstånd:

Biocodex
22 rue des Aqueducs
F-94250 Gentilly
Frankrike

Tillverkare:

Biocodex
1 avenue Blaise Pascal
F-60000 Beauvais
Frankrike

Marknadsförs av:

Biocodex Ab, info@biocodex.fi

Denna bipacksedel ändrades senast 3.6.2024.