

## **Pakkausseloste: Tietoa potilaalle**

### **Ormox 10 mg ja 20 mg tabletit** isosorbidimononitraatti

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

**Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Ormox on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Ormox-tabletteja
3. Miten Ormox-tabletteja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Ormox-tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Ormox on ja mihin sitä käytetään**

Ormox on sydänlääke. Ormoxin vaikuttava aine, isosorbidimononitraatti, on orgaaninen nitraatti, joka laajentaa verisuonia. Se vähentää sydämen työtä ja hapenkulutusta ja lisää sydänlihaksen hapensaantia.

Ormox-tabletteja käytetään rintakipukohtausten (angina pectoris) ehkäisyyn sepelvaltimotaudissa. Sitä käytetään myös sydämen vajaatoiminnan hoitoon.

Lääke ei ole tarkoitettu äkillisen rintakipukohtauksen hoitoon.

Isosorbidimononitraattia, jota Ormox sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Ormox-tabletteja**

**Älä ota Ormox-tabletteja**

- jos olet allerginen isosorbidimononitraatille, muille ns. orgaanisille nitraateille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos verimääräsi on epänormaalin pieni (hypovolemia)
- jos sinulla on poikkeuksellisen matala verenpaine, johon liittyy huimausta tai nestehukka
- jos sinulla ilmenee äkillinen rintakipukohtaus (akuutti sydäninfarkti), sillä tämä lääke vaikuttaa liian hitaasti ja siksi on käytettävä nopeavaikutteista nitrovalmistetta
- jos joudut sokkitilaan
- jos käytät erektiohäiriölääkkeitä (kuten sildenafiliä, vardenafilia tai tadalafileiä)
- jos käytät riosiguaattia (samanaikainen käyttö voi aiheuttaa verenpaineen laskua).

**Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Ormox-tabletteja

- jos sinulla on aivoverenkiertohäiriö tai taipumusta nopeaan verenpaineen laskuun ylös noustessa
- jos sinulla on jokin sydänsairaus, esim. paksuntava sydänlihassairaus (hypertrofinen kardiomyopatia), aortan tai hiippaläpän ahtauma, hiippaläpän poikkeava rakenne (mitraaliprolapsi), verta sydänpussissa (sydämen tamponaatio) tai sydänpussitulehdus
- jos sinulla on keuhkosydänsairaus (*cor pulmonale*) tai liian vähän happea veressä (hypoksemia)
- jos sinulla on kohonnut kallonsisäinen paine
- jos sinulla on silmänpainetauti (glaukooma)
- jos sinulla on hemoglobiini muutoksia.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

### **Muut lääkevalmisteet ja Ormox**

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden tai Ormox-tablettien teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

- verenpainelääkkeet (verisuonia laajentavat lääkkeet, kalsiuminestäjät, ACE:n estäjät, beetasalpaajat) – verenpainetta laskeva vaikutus voi tehostua
- nesteenpoistolääkkeet (diureetit) – verenpainetta laskeva vaikutus voi tehostua
- eräät psyykenlääkkeet (fentiatsiini, MAO:n estäjät, trisykliset masennuslääkkeet) – ylös noustessa verenpaine voi laskea ja ilmetä huimausta
- dihydroergotamiini (migreenilääke)
- erektiohäiriölääkkeet (sildenafilfiili, vardenafiili, tadalafiili) – Ormox-tablettien verenpainetta laskeva vaikutus tehostuu
- saproteriini, jolla hoidetaan veren liian suurta fenyylialaniinipitoisuutta (hyperfenyylialaninemia [HPA] tai fenyyliketouria [PKU]).

Muista mainita Ormox-tablettien käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

### **Ormox ruuan, juoman ja alkoholin kanssa**

Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin. Tabletit voidaan ottaa joko ruuan yhteydessä tai tyhjään vatsaan.

Alkoholin samanaikainen käyttö voi laskea verenpainetta voimakkaasti.

### **Raskaus, imetys ja hedelmällisyys**

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Ormox-hoidon alussa tai annosta tai lääkitystä muutettaessa saattaa esiintyä huimausta, joka voi heikentää suoriutumiskykyä liikenteessä ja tarkkuutta vaativissa tehtävissä. Hyvän hoitotasapainon vallitessa valmiste ei vaikuta suorituskykyyn.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseleste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

### **Ormox sisältää laktoosia**

10 mg:n tabletti sisältää 57 mg laktoosia (monohydraattina) ja 20 mg:n tabletti sisältää 114 mg laktoosia (monohydraattina). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

## **Muut aineet**

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

### **3. Miten Ormox-tabletteja otetaan**

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suosittelun annos on 1–2 tablettia aamulla ja iltapäivällä. Tabletit on tarkoitettu säännölliseen, jatkuvaan käyttöön.

Noudata näitä ohjeita, ellei lääkäri toisin määrää.

Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin. Tabletit voidaan ottaa joko ruuan yhteydessä tai tyhjään vatsaan. Tabletit on tarkoitettu nieltäväksi, niitä ei laiteta kielen alle liukenemaan. Ormox 20 mg tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

#### **Jos otat enemmän Ormox-tabletteja kuin sinun pitäisi**

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen oireita voivat olla tihentynyt sydämensyke, voimakas verenpaineen lasku, päänsärky, ihon punoitus, sekavuuden tunne, huimaus, pyöräytyminen ja pahoinvointi.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

#### **Jos unohtat ottaa Ormox-tabletteja**

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

#### **Jos lopetat Ormox-tablettien oton**

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Hoitoa ei saa lopettaa omatoimisesti. Hoidon keskeyttäminen äkillisesti saattaa aiheuttaa rintakipukohtauksia tai sydämen rytmihäiriöitä. Jos hoito on lopetettava, lääkäri antaa sinulle ohjeet.

### **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hoidon alussa Ormox aiheuttaa usein päänsärkyä, joka kuitenkin häviää hoidon jatkuessa. Jos päänsärky ei häviä muutamassa päivässä tai jos se on voimakasta, ota yhteys lääkäriin.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

- päänsärky, huimaus, heikkouden tunne
- tihentynyt syketiheys (takykardia)
- matala verenpaine, etenkin pystyasennossa; ihon punoitus
- pahoinvointi, oksentelu.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

- hemoglobiinimuutokset (methemoglobinemia)
- levottomuus, sekavuus, unettomuus
- pyörtyminen, kohonnut kallonsisäinen paine
- näköhäiriöt
- rytmihäiriöt
- sokkitila
- vatsakipu, ripuli, närästys, suun kuivuminen
- allerginen ihottuma, kutina
- lihassärky
- virtsaamisvaivat, tiheä virtsaamistarve
- erektiohäiriöt
- kohonnut silmänpaine.

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

## **5. Ormox-tablettien säilyttäminen**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Pidä tölkki tiiviisti suljettuna.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteen mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

### **Mitä Ormox sisältää**

- Vaikuttava aine on isosorbidimononitraatti, jota on 10 mg tai 20 mg yhdessä tablettissa.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), povidoni, mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti.

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot**

10 mg tabletti: Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera, jakourteeton tabletti, halkaisija 6 mm.

20 mg tabletti: Valkoinen tai melkein valkoinen kapselitabletti, pituus 10 mm, leveys 5 mm, jakouurre molemmin puolin.

HDPE-tölkki, HDPE-kierrekorkki; 30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

**Myyntiluvan haltija**

Orion Corporation  
Orionintie 1  
02200 Espoo

**Valmistaja**

Orion Corporation Orion Pharma  
Joensuunkatu 7  
24100 Salo

**Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.3.2022.**

## **Bipacksedel: Information till patienten**

### **Ormox 10 mg och 20 mg tabletter** isosorbidmononitrat

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande :**

1. Vad Ormox är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Ormox
3. Hur du tar Ormox
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ormox ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Ormox är och vad det används för**

Ormox är en hjärtmedicin. Isosorbidmononitrat, den aktiva substansen i Ormox, är ett organiskt nitrat, som utvidgar blodkärlen. Det minskar hjärtats arbete och syreförbrukning samt ökar syretillförseln till hjärtmuskeln.

Ormox används för att förebygga kärlkramp (angina pectoris) vid kranskärlssjukdom. Det används också för att behandla nedsatt hjärtfunktion.

Läkemedlet används inte för att behandla akut kärlkramp.

Isosorbidmononitrat som finns i Ormox kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

#### **2. Vad du behöver veta innan du tar Ormox**

##### **Ta inte Ormox**

- om du är allergisk mot isosorbidmononitrat, mot andra så kallade organiska nitrater eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har förminskad blodvolym (hypovolemi)
- om du har ovanligt lågt blodtryck kombinerat med svindel eller vätskeförlust
- om du har akut kärlkramp (akut hjärtattack), eftersom detta läkemedel inverkar för långsamt och vid akut hjärtattack måste man använda snabbverkande nitropreparat
- om du hamnar i chocktillstånd
- om du använder läkemedel mot impotens (såsom sildenafil, vardenafil eller tadalafil)
- om du använder riociguat (samtidig användning kan leda till sänkning av blodtrycket).

##### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare innan du tar Ormox

- om du har cirkulationsstörningar i hjärnan eller benägenhet för sänkning av blodtrycket när du

- stiger upp från liggande eller sittande ställning
- om du har någon hjärtsjukdom, t.ex. förstoring av hjärtmuskeln (kardiomyopati), aorta- eller mitralstenos, defekt mitralklaff (prolaps), hjärttamponad (blod i hjärtsäcken) eller hjärtsäcksinflammation
- om du har lunghjärta (*cor pulmonale*) eller för låg halt av syrgas i blodet (hypoxemi)
- om du har förhöjt intrakraniellt tryck
- om du har ögontryckssjukdom (glaukom)
- om du har förändringar i hemoglobin.

Berätta för läkaren också om du har andra sjukdomar eller allergier.

### **Andra läkemedel och Ormox**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av vissa läkemedel eller av Ormox kan förändras eller du kan få biverkningar, om de används samtidigt. Till dessa läkemedel hör t.ex.:

- blodtrycksmediciner (läkemedel som utvidgar blodkärlen, kalciumantagonister, ACE-hämmare, betablockerare) – den blodtryckssänkande effekten kan förstärkas
- vätskedrivande medel (diuretika) – den blodtryckssänkande effekten kan förstärkas
- vissa psykofarmaka (fentiazin, MAO-hämmare, tricykliska antidepressiva) – det kan förekomma sänkning av blodtrycket med tillhörande svindel när man reser sig upp
- dihydroergotamin (läkemedel mot migrän)
- läkemedel mot impotens (sildenafil, vardenafil, tadalafil) – den blodtryckssänkande effekten av Ormox förstärkas
- sapropterin som används för behandling av ovanligt hög fenyylalaninhalt i blodet (hyperfenylalaninemi [HPA] eller fenyylketonuri [PKU]).

Kom ihåg att tala om att du använder Ormox i samband med följande läkarbesök.

### **Ormox med mat, dryck och alkohol**

Drick ett glas vatten eller annan dricka, när du tar tablett. Tabletterna kan tas i samband med måltid eller på tom mage.

Samtidig användning av alkohol kan leda till massivt blodtrycksfall.

### **Graviditet, amning och fertilitet**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

I början av behandlingen, vid dosökning eller vid byte av medicinen till en annan kan det förekomma svindel som försämrar prestationsförmågan i trafiken och i annat precisionsbetonat arbete. Preparatet påverkar inte prestationsförmågan när god behandlingsjämvikt råder.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **Ormox innehåller laktos**

Varje 10 mg tablett innehåller 57 mg laktos (i form av monohydrat) och varje 20 mg tablett innehåller 114 mg laktos (i form av monohydrat). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

### **Övriga innehållsämnen**

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

### **3. Hur du använder Ormox**

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1–2 tabletter på morgonen och på eftermiddagen. Tabletterna ska intas regelbundet och kontinuerligt.

Följ dessa anvisningar om inte läkaren ordinerat annat.

Drick ett glas vatten eller annan dricka, när du tar tablett. Tabletterna kan tas i samband med måltid eller på tom mage. Tabletterna är avsedda för att sväljas, de ska inte lösas upp under tungan. Ormox 20 mg tablett kan delas i två lika stora doser.

#### **Om du har tagit för stor mängd av Ormox**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering är bl.a hjärtklappning, kraftigt blodtrycksfall, huvudvärk, hudrodnader, förvirring, svindel, yrsel och illamående.

Ta läkemedelsförpackningen med när du uppsöker läkare eller sjukhus.

#### **Om du har glömt att ta Ormox**

Ta den bortglömda dosen så snart som möjligt. Om det snart är dags för följande dos, ska du inte ta den bortglömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Kontrollera inför semester eller resa att du har tillräckligt av läkemedlet.

#### **Om du slutar att ta Ormox**

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal. Man ska inte avbryta behandlingen på egen hand. Om man plötsligt avbryter behandlingen kan det förekomma kärlkramp eller rytmstörningar i hjärtat. Läkaren ger anvisningar för hur man slutar användningen, om detta är nödvändigt.

### **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

I början av behandlingen kan Ormox förorsaka huvudvärk, som avtar under behandlingens gång. Om huvudvärken inte slutar efter några dagar eller om den är svår, kontakta läkaren.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- huvudvärk, svindel, svaghet
- försnabbad hjärtfrekvens (takykardi)
- blodtrycksfall då man reser sig upp (hypotension), hudrodnad
- illamående, kräkningar.



Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- förändringar i hemoglobin (methemoglobinemi)
- orolighet, förvirring, sömnlöshet
- svimningsanfall, förhöjt intrakraniellt tryck
- synrubbningar
- rytmrubbningar i hjärtat
- chock
- magknip, diarré, halsbränna, muntorrhet
- allergiskthudutslag, klåda
- muskelsmärta
- svårighet att kasta vatten, ökat behov av att urinera
- impotens
- förhöjt ögontryck.

### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

## **5. Hur Ormox ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C. Tillslut burken väl.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är isosorbidmononitrat, varav finns 10 mg eller 20 mg i en tablett.
- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

10 mg tablett: vit eller nästan vit, rund, konvex tablett utan brytskåra, diameter 6 mm

20 mg tablett: vit eller nästan vit kapselformad tablett, längd 10 mm, bredd 5 mm, brytskåra på båda sidorna.

HDPE-burk, HDPE-lock; 30 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

**Innehavare av godkännande för försäljning**

Orion Corporation  
Orionvägen 1  
FI-02200 Esbo  
Finland

**Tillverkare**

Orion Corporation Orion Pharma  
Joensuunkatu 7  
FI-24100 Salo  
Finland

**Denna bipacksedel ändrades senast 14.3.2022.**