

Pakkausseloste: Tie toa käyttäjälle

Efavirenz Sandoz 600 mg kalvopäällysteiset tabletit

efavirentsi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tie toja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysytävä, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Efavirenz Sandoz on ja mielin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Efavirenz Sandoz -valmistetta
3. Miten Efavirenz Sandoz -valmistetta otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Efavirenz Sandoz -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Efavirenz Sandoz on ja mielin sitä käytetään

Efavirenz Sandoz, jonka vaikuttava aine on efavirensi, on retroviruслääkkeisiin kuuluva ei-nukleosidinen käänteiskopiojaentsyymin estää (NNRTI). Se on **retroviruslääke, joka taistelee ihmisen immuunikatovirusta** (HIV-infektiota) vastaan vähentäen virusten määrää veressä. Sitä käytetään aikuisten, nuorten ja 3 vuotta täyttäneiden lasten hoitoon.

Lääkäri on määrittänyt Efavirenz Sandozia, koska sinulla on HIV-infektio. Efavirenz Sandoz vähentää virusmäärää veressä, kun sitä käytetään yhdessä muiden retroviruслääkkeiden kanssa. Tämä vahvistaa immuuni-järjestelmää ja vähentää HIV-infektiion liittyvien sairauksien ilmaantumisen riskiä.

Efavirensia, jota Efavirenz Sandoz sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Efavirenz Sandoz -valmisteita

Älä otta Efavirenz Sandoz -valmisteita

- **jos olet allerginen efavirensille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).** Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkienkilökunnalta.
- **jos sinulla on vaikea maksasairaus**
- **jos sinulla on sydänsairaus, kuten muutoksia sydämen rytmistä tai lyöntinopeudessa, hidaskäyvyydestä tai vaikea sydänsairauteen**
- **jos lähisukulaisesi (vanhempi, isovanhempi, veli tai sisar) on kuollut äkillisesti sydänsairautta tai sairastaa synnynnäistä sydänsairautta**

- jos lääkäri on kertonut sinulle, että veresi elektrolyytipitoisuus, kuten kalium- tai magnesiumpitoisuus, on korkea tai matala
- **jos käytät tällä hetkellä jotakin seuraavista lääkeistä (ks. myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Efavirenz Sandoz”):**
 - **aste mitsoli tai terfe nadiini** (allergiaoireiden hoitoon)
 - **bepridiili** (sydänlääke)
 - **sisapridi** (näristyslääke)
 - **torajyväalkaloidit** (esim. ergotamiini, dihydroergotamiini, ergonoviini tai metyyliergonoviini) (migreenin ja sarjoittaisen päänsäryyn hoitoon)
 - **midatsolaami tai triatsolaami** (nukahtamislääkkeitä)
 - **pimotsidi, imipramiini, amitriptyliini tai kloripramiini** (psykenlääkkeitä)
 - **mäkikuisma** (*Hypericum perforatum*) (rohdosvalmiste masennuksen ja ahdistuneisuuden hoitoon)
 - **flekainidi, metoprololi** (rytmihäiriölääkkeitä)
 - **tie tyt antibiootit** (makrolidit, fluorokinolonit, imidatsoli)
 - **triatsolisi enilääkkeet**
 - **tie tyt malarialääkeet**
 - **metadoni** (käytetään opioidiriippuvuuden hoitoon)
 - **elbasviiri/gratsopreviiri** (käytetään hepatiitti C:n hoitoon).

Kerro lääkärille välittömästi, jos käytät jotakin näistä lääkeistä. Näiden lääkkeiden ja Efavirenz Sandozin samanaikainen käyttö voi aiheuttaa vakavia ja/tai hengenvaarallisia haittavaikutuksia tai heikentää Efavirenz Sandozin tehoa.

Varoituksset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin otat Efavirenz Sandoz -valmistetta.

- **Efavirenz Sandoz on otettava muiden HI-virusta vastustavien lääkkeiden kanssa.** Jos Efavirenz Sandoz -hoito aloitetaan, koska nykyinen hoito ei ole estänyt viruksen lisääntymistä, tulee samanaikaisesti aloittaa myös toinen uusi lääke, jota et ole käytänyt aikaisemmin.
- Lääke ei paranna HIV-infektiota, ja sinulle saattaa edelleen kehittyä infektiota tai muita sairauksia, jotka liittyvät HIV-tautiin.
- Hoitavan lääkärin tulee seurata terveydentilaasi, kun käytät Efavirenz Sandozia.
- **Kerro lääkärille :**
 - **jos sinulla on ollut jokin psykkinen sairaus**, kuten masennus, tai olet väärinkäytänyt alkoholia tai päliteitä. Kerro heti lääkärille, jos olosi on massentunut, ajattelet itsemurhaa tai sinulla on epätavallisia ajatuksia (ks. kohta 4 Mahdolliset haittavaikutukset).
 - **jos sinulla on ollut epilepsiakohtauksia (kouristuksia)** tai käytät epilepsialääkkeitä, esimerkiksi karbamatsepiinia, fenobarbitaalia tai fentyoümia. Jos käytät jotakin näistä lääkeistä, lääkäri joutuu ehkä mittaamaan epilepsialääkkeen pitoisuudet veressä tarkistaakseen, ettei Efavirenz Sandoz -hoito vaikuta niihin. Lääkäri saattaa määrättää sinulle jotakin muuta epilepsialääkettä.
 - **jos sinulla on ollut maksasairaus, esimerkiksi aktiivinen krooninen maksatulehdus.** Vaikeiden ja mahdollisesti henkeä uhkaavien maksavaivojen riski on tavallista suurempi, jos potilaalla on krooninen B- tai C-hepatiitti ja hän käyttää antiretroviruslääkkeiden yhdistelmää. Lääkäri saattaa määrättää sinulle verikokeita maksan toiminnan tutkimiseksi tai vaihtaa sinulle toisen lääkityksen. **Älä ota Efavirenz Sandozia, jos sinulla on vaikea maksasairaus** (ks. kohta 2 Älä ota Efavirenz Sandoz -valmistetta).

- jos sinulla on sydänsairaus, kuten epänormaali sydämen sähköisen signaalin johtumineen, jota kutsutaan QT-ajan pidentymiseksi.
- **Ole valppaan seuraavien seikkojen varalta, kun aloitat Efavirenz Sandoz -hoidon:**
 - **huimaus, nukkumisvaikeudet, uneliaisuus, keskittymisvaikeudet tai epätavallisten unien näkeminen.** Nämä haittavaikutukset saattavat alkaa ensimmäisten 1–2 hoitopäivän aikana ja häviää yleensä ensimmäisten 2–4 hoitovuikon jälkeen.
 - **sekavuuden merkit, ajattelun ja liikkumisen hitaus sekä harhaluulot tai aistiharhat (näkö- tai kuuloharhat).** Nämä haittavaikutukset saattavat ilmetä kuukausien tai vuosien kuluttua Efavirenz Sandoz -hoidon aloittamisesta. Jos huomaat jonkin näistä oireista, ota yhteys lääkäriin.
 - **ihottuman merkit.** Jos huomaat merkkejä vaikeasta ihottumasta, johon liittyy rakkulamuodostusta tai kuumetta, lopeta Efavirenz Sandozin käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin. Jos sinulla on ollut ihottumaa jonkin toisen NNRTI-hoidon aikana, ihottuman riski voi olla Efavirenz Sandoz -hoidon yhteydessä tavaramaisista suurempi.
 - **tulehdusen tai infektion merkit.** Joillekin potilaille, joilla on edennyt HIV-infektiö (AIDS) ja joilla on aikaisemmin ollut opportunistinen infektiö, voi ilmaantua aikaisemman infektion aiheuttamaan tulehdukseen liittyviä löydöksiä ja oireita pian HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen. Näiden oireiden uskotaan johtuvan elimistön immuunivasteen paranemisesta, mikä auttaa elimistöä puolustautumaan jo mahdollisesti olemassa olevia, mutta oireettomia infektioita vastaan. Jos havaitset infektiointioireita, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Opportunististen infektioiden lisäksi HIV-lääkityksen aloittamisen jälkeen voi ilmaantua myös autoimmuunisairauksia (tila, joka ilmaantuu, kun immuunijärjestelmä hyökkää kehon tervettä kudosta vastaan). Autoimmuunisairauksia voi ilmaantua useiden kuukausien kuluttua lääkkeen käytön aloittamisesta. Jos huomaat mitä tahansa infektiointioireita tai muita oireita kuten lihasheikkoutta, heikkoutta, joka alkaa käsistä ja jaloista ja siirtyy kohti vartaloa, sydämentykyystä, vapinaa tai yliaktiivisuutta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin saadaksesi tarvitsemaasi hoitoa.
 - **luustovaivat.** Joillekin antiretroviruslääkkeiden yhdistelmää saaville potilaille voi ilmaantua osteonekroosiksi kutsuttu luustosairaus (luukudoksen kuolema luun verenkierron heikentyessä). Sairauden kehittymiselle voi olla useita riskitekijöitä. Tällaisia voivat olla mm. antiretroviruslääkeyhdistelmähoidon kesto, kortikosteroidihoito, alkoholin käyttö, vaikea immuunivasteen heikentyminen ja korkea painoindeksi. Osteonekroosin oireita ovat niveljäykkyys, nivelsärky ja nivellikvit (erityisesti lonkan, polven ja olkapään alueella) ja liikkumisvaikeudet. Jos huomaat jonkin näistä oireista, ota yhteys lääkäriin.

Liset ja nuoret

Efavirenz Sandoz -valmistetta ei suositella alle 3 vuoden ikäisille eikä alle 13 kg painaville lapsille, sillä sitä ei ole tutkittu riittävästi tässä potilasryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Efavirenz Sandoz

Efavirenz Sandozia ei saa käyttää yhdessä tietyjen lääkkeiden kanssa. Nämä lääkkeet on lueteltu kohdan 2 alussa kohdassa ”Älä otta Efavirenz Sandoz -valmistetta”. Niihin kuuluu useita yleisiä lääkkeitä ja yksi rohdosvalmiste (mäkipuismi). Näiden valmisteiden käyttö yhdessä Efavirenz Sandozin kanssa voi aiheuttaa vakavia yhteisvaikutuksia.

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkeitä. Efavirenz Sandozilla voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, myös

rohdosvalmisteiden kuten neidonhiuspuu-uutteen (*Ginkgo biloba*) kanssa. Tällöin Efavirenz Sandozin tai muiden lääkkeiden pitoisuudet veressä voivat muuttua, jolloin lääkkeet eivät ehkä tehoa tai niiden haittavaikutukset voivat pahentua. Joissakin tapauksissa lääkäri joutuu ehkä muuttamaan lääkeannosta tai tarkistamaan veren lääkepitoisuudet. **Siksi on tärkeää kertoa lääkärille tai apteekkarihenkilökunnalle seuraavien lääkkeiden käytöstä:**

- **Muut HIV-lääkkeet:**
 - proteaasinetäjät: darunaviiri, indinaviiri, lopinaviiri/ritonaviiri, ritonaviiri, ritonaviirilla tehostettu atatsanaviiri, sakinaviiri tai fosamprenaviiri/sakinaviiri. Lääkäri voi harkita jonkin muun lääkkeen käyttöä tai proteaasinestäjäännoksen muuttamista.
 - maraviroki
 - efavirentsia, emtrisitabiinia ja tenofoviiria sisältävä yhdistelmätablettia ei saa ilman lääkärin suositusta käyttää yhdessä Efavirenz Sandozin kanssa, sillä se sisältää Efavirenz Sandozin vaikuttavaa ainetta efavirentsia.
- **Hepatiitti C-virusinfektion hoitoon käytettävät lääkkeet:** bosepreviiri, telapreviiri, simepreviiri, sofosbuviiri/velpatasviiri, glekapreviiri/pibrentasviiri ja sofosbuviiri/velpatasviiri/voksilapreviiri
- **Bakteeri-infektion hoitoon käytettävät antibiootit,** mm. tuberkuloosilääkkeet ja AIDS:iin liittyvien Mycobacterium avium -ryhmän bakteerien aiheuttamien infektion hoitoon käytettävät lääkkeet: klaritromysiini, rifabutiini, rifampisiimi. Lääkäri voi harkita annoksen muuttamista tai jonkin muun antibiootin käyttöä. Myös Efavirenz Sandoz -annosta saatetaan suurentaa.
- **Sieni-infektiolääkkeet (sienilääkkeet):**
 - vorikonatsoli. Efavirenz Sandoz saattaa pienentää veren vorikonatsolipitoisuksia, ja vorikonatsoli saattaa puolestaan suurentaa veren efavirentsipitoisuksia. Jos käytät näitä kahta lääkettä samanaikaisesti, vorikonatsoliannosta tulee suurentaa ja efavirentsianosta pienentää. Tarkista asia ensin lääkärliltäsi.
 - itrakonatsoli. Efavirenz Sandoz saattaa pienentää veren itrakonatsolipitoisuksia.
 - posakonatsoli. Efavirenz Sandoz saattaa pienentää veren posakonatsolipitoisuksia.
- **Malarian hoitoon käytettävät lääkkeet:**
 - artemeetteri/lumefantriini: Efavirenz Sandoz saattaa pienentää veren artemeetterin/lumefantriinin pitoisuksia.
 - atovakoni/proguaniili: Efavirenz Sandoz saattaa pienentää veren atovakonin/proguaniilin pitoisuksia.
- **Pratsikvanteeli** (lääke, jota käytetään loisten aiheuttamien matoinfektion hoitoon).
- **Kouristuskohtauksen hoitoon käytettävät lääkkeet (epilepsialääkkeet):** karbamatsepiini, fenytoini, fenobarbitaali. Efavirenz Sandoz saattaa pienentää tai suurentaa veren epilepsialääkepitoisuksia. Karbamatsepiini saattaa heikentää Efavirenz Sandozin tehoa. Lääkäri joutuu ehkä harkitsemaan jonkin muun epilepsialääkkeen määräämistä.
- **Veren rasva-arvoja alentavat lääkkeet (ns. statiinit):** atorvastatiini, pravastatiini, simvastatiini. Efavirenz Sandoz saattaa pienentää veren statiinipitoisuksia. Lääkäri tarkistaa kolesteroliarvosi ja harkitsee tarvittaessa statiiniannoksen muuttamista.
- **Metadoni** (opioidiriippuvuuden hoidossa käytettävä lääke): lääkäri saattaa suositella toisen lääkkeen käyttöä.

- **Sertraliini** (masennuslääke): lääkäri joutuu ehkä muuttamaan sertraliinianostasi.
- **Bupropioni** (masennuslääke sekä tupakoinnin lopettamisen tukena käytettävä lääke): lääkäri joutuu ehkä muuttamaan bupropioniannostasi.
- **Diltiaasetami ja muut samankaltaiset lääkkeet (ns. kalsiumkanavan salpaajat), joita tyypillisesti käytetään korkean verenpaineen ja sydänongelmien hoitoon:** lääkäri joutuu ehkä muuttamaan kalsiumkanavan salpaajan annosta Efavirenz Sandoz -hoitosi aloittamisen yhteydessä.
- **Immunosuppressantit kuten siklosporiini, sirolimuusi ja takrolimuusi** (elinsiirteen hyljinnän ehkäisyyn): lääkäri seuraa plasman immunosuppressanttipitoisuksia tarkoin Efavirenz Sandoz -hoidon aloittamisen ja lopettamisen yhteydessä ja saattaa muuttaa immunosuppressantiannostasi.
- **Hormonaaliset ehkäisyvalmis teet kuten ehkäisytabletit, ehkäisypistokset (esim. Depo-Provera)** tai ehkäisyimplantaatit (esim. Nexplanon): samanaikaisesti tulee käyttää myös luotettavaa estemenetelmää (ks. kohta ”Raskaus ja imetys”). Efavirenz Sandoz saattaa heikentää hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden tehoa. Efavirenz Sandoz -hoitoa käytetäneet naiset ovat joskus tulleet raskaaksi ehkäisyimplantaatista huolimatta. Ei ole kuitenkaan vahvistettu, että ehkäisytehon pettäminen olisi johtunut Efavirenz Sandoz -hoidosta.
- **Varfariini ja asenokumaroli** (veren hyytymistä vähentäviä lääkeitä): lääkäri joutuu ehkä muuttamaan varfariini- tai asenokumaroliannostasi.
- **Neidonhiuspuu-uute (*Ginkgo biloba*)** (rohdosvalmiste)
- **Metamitsoli**, kivun ja kuumeen hoidossa käytettävä lääke
- **Sydämen rytmien vaikuttavat lääkevalmisteet:**
 - **Rytmihäiriöiden hoitoon käytettävät lääkevalmisteet** kuten flekainidi tai metoprololi.
 - **Masennuksen hoitoon käytettävät lääkevalmisteet** kuten imipramiini, amitriptyliini tai klomipramiini.
 - **Antibiootit**, muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvat: makrolidit, fluorokinolonit tai imidatsoli.

Efavirenz Sandoz ruuan ja juoman kanssa

Efavirenz Sandozin ottaminen tyhjään mahaan voi vähentää haittavaikutuksia. Greippimehua pitää välttää Efavirenz Sandoz -hoidon yhteydessä.

Raskaus ja imetyks

Naiset tulee välttää raskaaksi tulemista Efavirenz Sandoz -hoidon aikana ja **12 viikon ajan sen jälkeen**. Lääkäri määräät sinut ehkä tekemään raskaustestin ennen Efavirenz Sandoz -hoidon aloittamista varmistaakseen, että et ole raskaana.

Jos voit tulla raskaaksi Efavirenz Sandoz -hoidon aikana, sinun on käytettävä jotakin luotettavaa estemenetelmää (esimerkiksi kondomia) yhdessä muiden ehkäisymenetelmien, esimerkiksi ehkäisytablettien tai muiden hormonaalisten ehkäisymenetelmien (esim. ehkäisyimplantaattien tai -pistosten) kanssa. Veressä voi olla efavirensia vielä jonkin aikaa hoidon lopettamisen jälkeenkin. Jatka siis ehkäisyä käyttöä edellä mainittuun tapaan vielä 12 viikon ajan Efavirenz Sandoz -hoidon päättymisen jälkeen.

Kerro heti hoitavalle lääkärille, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta. Jos olet raskaana, käytä Efavirenz Sandozia vain, jos lääkäri ja sinä päättäte, että sen käyttö on selvästi tarpeellista. Kysy lääkäristä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Eläinten sikiöillä ja efavirensihoitaa tai efavirentsiiä, emtrisitabiinia ja tenofoviiria sisältävää yhdistelmävalmisteesta raskauden aikana käytäneiden äitienväistä lapsilla on havaittu vakavia synnynnäisiä epämuodostumia. Jos olet ottanut Efavirenz Sandozia tai efavirentsiiä, emtrisitabiinia ja tenofoviiria sisältävää yhdistelmävalmisteesta raskauden aikana, lääkäri saattaa määrättää sinulle säännöllisiä verikokeita ja muita diagnostisia tutkimuksia lapsesi kehityksen seuraamiseksi.

Efavirenz Sandoz -hoidon aikana **eisaa imettää**.

Imettämistä **eisaa suositella** HIV-positiivisille naisille, koska HIV-infektio saattaa tarttua lapseen äidinmaidon välityksellä.

Jos imetät tai harkitset imettämistä, **keskustele asiasta lääkärin kanssa mahdollisimman pian**.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Efavirenz Sandoz sisältää efavirentsia ja voi aiheuttaa huimausta, keskittymiskyvyn heikkenemistä ja uneliaisuutta. Älä aja äläkää käytä työkaluja tai koneita, jos sinulla esiintyy näitä oireita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Efavirenz Sandoz sisältää natriumia ja laktoosia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kalvopäällysteinen tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Muita efavirentsia sisältäviä valmisteita on saatavilla näille potilaille.

3. Miten Efavirenz Sandoz -valmisteita otetaan

Ota tästä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrittänyt tai apteekkienhenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäristä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäristä saat ohjeet oikeaa annosta varten.

- Aikuisten annos on 600 mg kerran päivässä.
- Efavirenz Sandoz -annosta voidaan joutua nostamaan tai laskemaan, jos käytät myös tiettyjä lääkkeitä (ks. kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Efavirenz Sandoz”).
- Efavirenz Sandoz otetaan suun kautta. Se suositellaan otettavaksi tyhjään mahaan mieluiten nukkumaanmenon yhteydessä. Tällöin tietyistä haittavaikutuksista (esim. huimauksesta tai uneliaisuudesta) saattaa olla vähemmän haittaa. Tyhjään mahaan ottamisella tarkoitetaan tablettien ottamista yksi tunti ennen ateriaa tai kaksi tuntia aterian jälkeen.

- Tabletit on suositeltavaa niellä kokonaisenä veden kera.
- Efavirenz Sandoz täytyy ottaa joka päivä.
- Efavirenz Sandozia ei pidä koskaan käyttää yksinään HIV:n hoitoon. Efavirenz Sandozia tulee käyttää aina muiden HIV-lääkkeiden kanssa.

Käyttö lapsille ja nuorille

Efavirenz Sandoz kalvopäällysteiset tabletit eivät sovella alle 40 kg painoisille lapsille.

- Vähintään 40 kg painavien lasten annos on 600 mg kerran päivässä. Muita efavirentsilääkemuotoja on saatavilla potilaille, joiden annosta tulee muuttaa.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Tabletti voidaan jakaa nielemisen helpottamiseksi.

Jos otat enemmän Efavirenz Sandoz -valmisteetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähohjeiden saamiseksi. Ota lääkepakkaus mukaasi, jotta voit helposti näyttää, mitä lääkettä olet ottanut.

Jos unohdat ottaa Efavirenz Sandoz -valmisteetta

Pyri siihen, että et unohda annoksen ottamista. Jos unohdat ottaa yhden annoksen, ota seuraava niin pian kuin mahdollista, mutta älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos tarvitset apua suunnitellaksesi parhaan lääkkeenottoajan, kysy neuvoa lääkäriltäsi tai aptekrista.

Jos lopetat Efavirenz Sandoz -valmisteen oton

Kun Efavirenz Sandoz -lääkkeesi alkavat loppua, hanki lisää lääkäriltäsi tai apteekrista. Se on erittäin tärkeää, sillä virusmäärä saattaa alkaa lisääntyä heti, kun lääkkeen ottaminen keskeytetään vaikka lyhyeksikin ajaksi. Sen jälkeen viruksen hoitaminen voi olla vaikeampaa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. HIV-infektiota hoidettaessa voi olla vaikeaa tietää, johtuuko tietty haittavaikutus Efavirenz Sandozista, muista samanaikaisesti käytämistäsi lääkeistä vai itse HIV-infektiosta.

HIV-lääkityksen aikana voi esiintyä painon nousua ja veren rasva- ja sokeriarvojen nousua. Tämä johtuu osittain terveyden parantumisesta ja elämäntavoista. Veren rasva-arvojen muutos johtuu joskus osittain HIV-lääkeistä. Lääkäri tekee kokeita näiden muutosten varalta.

Huomattavimpia efavirentsia ja muiden HIV-lääkkeiden yhdistelmähoidon haittavaikutuksia ovat ihottuma ja hermosto-oireet.

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulle tulee ihottuma, sillä jotkin ihottumat voivat olla vakavia; kuitenkin useimmat niistä häviävät Efavirenz Sandoz -hoitoa muuttamatta. Ihottumaa on esiintynyt useammin efavirensihoidoa saaneilla lapsilla kuin aikuisilla.

Hermosto-oireita esiintyy tavallisesti heti hoidon alussa, mutta ne vähentyvät yleensä ensimmäisten viikkojen aikana. Eräässä tutkimuksessa hermosto-oireita esiintyi usein 1–3 tunnin kuluessa annoksen ottamisesta. Jos niitä esiintyy, lääkäri voi kehottaa sinua ottamaan Efavirenz Sandoz -annoksen nukkumaan mennessä ja tyhjään mahaan. Joillakin potilailla voi olla vakavampia oireita, jotka voivat vaikuttaa mielialaan tai kykyyn ajatella selkeästi. Jotkut potilaat ovat tehneet itsemurhan. Näitä ongelmia esiintyy yleensä useammin sellaisilla potilailla, joilla on aikaisemmin ollut mielerterveyden häiriöitä. Lisäksi jotkin hermosto-oireet (kuten sekavuus, ajattelu ja liikkumisen hitaus sekä harhaluulot tai aistiharhat [näkö- tai kuuloharhat]) saattavat ilmetä kuukausien tai vuosien kuluttua Efavirenz Sandoz -hoidon aloittamisesta. Kerro aina hoitavalle lääkärille heti, jos Efavirenz Sandoz -hoidon yhteydessä esiintyy näitä oireita tai muita haittavaikutuksia.

Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)

- ihottuma.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

- poikkeavat unet, keskittymisvaikeudet, huimaus, päänsärky, nukkumisvaikeudet, uneliaisuus, koordinaatio- tai tasapainohäiriöt
- vatsakipu, ripuli, pahoinvoindi, oksentelu
- kutina
- väsymys
- ahdistunut tai masentunut olo.

Verikokeissa saattaa näkyä:

- veren maksentsyytmien kohoamista
- veren triglyseridiarvojen (rasvhappojen) kohoamista.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

- hermostuneisuus, unohtelu, sekavuus, kouristuskohtaukset, epätavalliset ajatukset
- näön hämärtyminen
- kiertohuimaus
- vatsakipu, jonka syynä on haimatulehdus
- allerginen reaktio (yliherkkyyss), joka voi aiheuttaa vaikeita ihoreaktioita (erythema multiforme -ihottuma, Stevens–Johnsonin oireyhtymä)
- ihmisen silmävalkuisten keltaisuus, ihmisen kutina tai vatsakipu, joiden syynä on maksatulehdus
- miesten rintojen suureneminen
- vihainen käytös, mielialan muuttuminen, näkö- tai kuuloharhat (aistiharhat), psykoosit, mania (psykyken sairaustila, jonka ominaispiirteitä ovat yliaktiivisuus [”vauhdikkuus”], epätavallinen iloisuus tai ärtyneisyys), vainoharhat, itsemurha-ajatukset, katatonias (tila, jossa potilaas on liikkumaton ja puhumaton jonkin aikaa), itsemurhayritykset
- korvien vinkuminen, soiminen tai muu jatkuva ääni
- tremor (vapina)
- punoitus.

Verikokeissa saattaa näkyä:

- veren kolesterolipitoisuuden kohoamista.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

- auringonvalolle altistumisesta johtuva kutiava ihottuma
- maksan vajaatoimintaa, joka joissakin tapauksissa on johtanut kuolemaan tai maksansiiroon, on esiintynyt efavirensin käytön yhteydessä. Useimmiten tästä ilmeni potilailla, joilla oli ennestään jokin maksasairaus, mutta muutamia tapauksia on raportoitu myös potilailla, joilla ei ennestään ollut maksasairautta.

- selittämätön ahdistuneisuuden tunne, johon ei liity aistiharhoja, mutta jolloin ajatteleminen selkeästi tai järkevästi saattaa olla vaikeaa
- itsemurha
- harhaluulot.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkienkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Efavirenz Sandoz -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä läkettä purkin etiketissä, läpipainopakkauksessa tai kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Purkki: Käytettävä 2 kuukauden kuluessa avaamisesta.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Efavirenz Sandoz sisältää

- Vaikuttava aine on: efavirensi. Yksi kalvpäälysteinen tabletti sisältää 600 mg efavirensia.
- Muut aineet ovat: kroskarmelloosinatrium, mikrokiteinen selluloosa, natriumlauryylisulfaatti, hydroksipropyliselluloosa, laktoosimonohydraatti ja magnesiumstearaatti tabletin ytimessä; hypromeloolosi (E464), kinoliinikeltainen alumiinilakka (E104), titaanidioksidi (E171), makrogoli ja punainen rautaoksidi (E172) kalvpäälysteessä.

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkaukset

Efavirenz Sandoz on keltainen, kapselinmuotoinen (9,6 x 19,2 mm) kalvpäälysteinen tabletti, jossa on jakouurre molemmilla puolilla.

Efavirenz Sandoz on pakattu:

- HDPE-purkkeihin, joissa on lapsiturvallinen polypropeenisuljin ja sinetöity säiliö, joka sisältää silikageeliä: 30, 90 (3 x 30) tai 120 (4 x 30) kalvpäälysteistä tablettia Valkoisin, läpinäkymättömiin PVC/Aclar/Al-läpipainopakkauksiin: 10, 28, 30, 50, 60, 84, 90, 100 tai 120 kalvpäälysteistä tablettia.

Kaikkia pakkaukokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska

Valmistaja:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia
tai

LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672, Varsova, Puola
tai

S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures, Romania
tai

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Saksa
tai

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenia

Tämä pakkausseoste on tarkistettu viimeksi 07.08.2024

Bipacksedel: Information till användaren

Efavirenz Sandoz 600 mg filmdrage rade tabletter

efavirenz

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läke medel. Den inne håller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Efavirenz Sandoz är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Efavirenz Sandoz
3. Hur du tar Efavirenz Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Efavirenz Sandoz ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Efavirenz Sandoz är och vad det används för

Efavirenz Sandoz, som innehåller den aktiva substansen efavirenz, tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-nukleosida omvänt transkriptashämmare (NNRTI). Det är ett antiretroviral läkemedel mot infektion med humant immunbristvirus (hiv) som verkar genom att minska virusmängden i blodet. Läkemedlet används av vuxna, ungdomar och barn som är 3 år eller äldre.

Din läkare har förskrivit Efavirenz Sandoz till dig eftersom du har en hiv-infektion. Om man tar Efavirenz Sandoz i kombination med andra antiretroviral läkemedel minskar virusmängden i blodet. Detta stärker ditt immunförsvar och minskar risken för att utveckla sjukdomar som är kopplade till hiv-infektion.

Efavirenz som finns i Efavirenz Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Efavirenz Sandoz

Ta inte Efavirenz Sandoz

- om du är allergisk mot efavirenz eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Kontakta din läkare eller apotekspersonal för rådgivning.
- om du har en svår leversjukdom
- om du har hjärtproblem, såsom förändringar av hjärtslagens rytm eller frekvens, långsamma hjärtslag eller svår hjärtsjukdom
- om någon i din familj (föräldrar, far- eller morföräldrar, bröder eller systrar) har avlidit plötsligt på grund av hjärtproblem eller föddes med hjärtproblem

- om din läkare har berättat för dig att du har höga eller låga nivåer av elektrolyter, t.ex. kalium eller magnesium, i ditt blod
- om du **samtidigt använder** något av följande läkemedel (se även ”Andra läkemedel och Efavirenz Sandoz”):
 - **astemizol eller terfenadin** (för behandling av allergiska symtom)
 - **bepridil** (för behandling av hjärtsjukdom)
 - **cisaprid** (för behandling av halsbränna)
 - **ergotalkaloider** (till exempel ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin och metylergonovin) (för behandling av migrän och klusterhuvudvärk)
 - **midazolam eller triazolam** (för sömnsvårigheter)
 - **pimozid, imipramin, amitriptylin eller clomipramin** (för behandling av vissa psykiska besvär)
 - **johannesört (*Hypericum perforatum*)** (ett naturläkemedel mot depression och oro)
 - **flekainid, metoprolol** (för behandling av oregebunden hjärtrytm)
 - **vissa antibiotika** (makrolider, fluorokinoloner, imidazol)
 - **vissa läkemedel mot svamp (triazoler)**
 - **vissa läkemedel mot malaria**
 - **metadon** (för behandling av opioidberoende)
 - **elbasvir/grazoprevir** (för behandling av hepatit C).

Om du tar något av dessa läkemedel, meddela din läkare snarast. Om dessa läkemedel tas tillsammans med Efavirenz Sandoz kan de ge allvarliga och/eller livshotande biverkningar eller ta bort effekten av Efavirenz Sandoz.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Efavirenz Sandoz.

- **Efavire nz Sandoz ska tas tillsammans med andra läkemedel som är verksamma mot hiv-virus.** Om du får Efavirenz Sandoz för att din nuvarande behandling inte har förhindrat virusföroreningen måste du samtidigt få ett annat läkemedel som du inte tagit tidigare.
- Detta läkemedel är inte något botemedel mot hiv-infektion, och du kan fortsätta utveckla infektioner eller andra sjukdomar som är förknippade med hiv.
- Du ska fortsätta att vara under läkarobservation under tiden du tar Efavirenz Sandoz.
- **Tala om för din läkare:**
 - **om du tidigare haft en psykisk sjukdom**, som depression, eller missbruk av alkohol eller droger. Berätta omedelbart för din läkare om du känner dig deprimerad, har självmordstankar eller underliga tankar (se avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”).
 - **om du tidigare haft kramper (krampfall eller -attacker)** eller om du behandlas med krampförebyggande behandling som carbamazepin, fenobarbital och fenytoin. Om du tar något av dessa läkemedel kan din läkare behöva kontrollera läkemedelshalten i blodet för att kontrollera att den inte påverkas då du tar Efavirenz Sandoz. Din läkare kan välja att ge dig ett annat krampförebyggande läkemedel.
 - **om du tidigare haft någon leversjukdom, gäller även kronisk hepatitis i aktivt skede.** Patienter med kronisk hepatitis B eller C och som behandlas med en kombination av antiretrovira medel löper en ökad risk för allvarliga och potentiellt livshotande leverbiverkningar. Din läkare kan ta blodprover för

kontroll av leverfunktionen eller ändra din behandling till ett annat läkemedel. **Om du har en svår leversjukdom ska du inte ta Efavirenz Sandoz** (se avsnitt 2, ”Ta inte Efavirenz Sandoz”).

- **om du har en hjärtsjukdom, såsom en onormal elektrisk signal som benämns förlängt QT-intervall.**
- **När du börjat ta Efavirenz Sandoz, var uppmärksam på följande:**
 - **tecken på yrsel, sömnsvårigheter, dåsighet, koncentrationsstörningar eller onormala drömmar.** Dessa biverkningar kan uppstå under första eller andra behandlingsdagen och försvinner vanligtvis efter de första 2–4 veckorna.
 - **tecken på förvirring, långsamma tankar och långsammare fysiska rörelser, vanföreställningar (felaktiga föreställningar) eller hallucinationer (att se eller höra sådant som andra inte ser eller hör).** Dessa biverkningar kan uppstå flera månader upp till flera år efter påbörjad behandling med Efavirenz Sandoz. Informera din läkare om du upptäcker några symtom.
 - **tecken på hudutslag.** Om du ser tecken på svåra hudutslag med blåsor eller feber ska du sluta ta Efavirenz Sandoz och snarast informera din läkare. Om du fått hudutslag med ett annat läkemedel i gruppen NNRTI kan det finnas större risk att du får hudutslag med Efavirenz Sandoz.
 - **tecken på inflammation eller infektion.** Hos vissa patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) och som tidigare haft opportunistiska infektioner kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner inträffa en kort tid efter att behandlingen mot hiv påbörjats. Dessa symtom beror troligtvis på en förbättring av kroppens immunsvaret, vilken gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kanske har funnits där utan några tydliga symtom. Tala omedelbart om för din läkare om du märker några symtom på infektion. Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsdel) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din hiv-infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghets, svaghets som startar i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrning eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.
 - **benvävnadsbesvär.** Vissa patienter som får antiretroviral kombinationsbehandling kan utveckla en bensjukdom som heter osteonekros (benvävnad dör på grund av förlorad blodtillförsel till benet). Några av de många riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är: långvarig antiretroviral kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, svår nedsättning av immunförsvaret och högre kroppsmaßeindex. Tecken på osteonekros är stelhet i lederna, värv och smärta (särskilt i höft, knä och axlar) och svårigheter att röra sig. Tala om för din läkare om du upplever några av dessa symtom.

Barn och ungdomar

Efavirenz Sandoz rekommenderas inte till barn som är under 3 år eller som väger mindre än 13 kg, eftersom det inte har undersökts tillräckligt hos dessa patienter.

Andra läkemedel och Efavirenz Sandoz

Du får inte ta Efavirenz Sandoz tillsammans med vissa läkemedel. Dessa finns angivna i början av avsnitt 2 under ”Ta inte Efavirenz Sandoz”. Detta gäller för vissa vanliga läkemedel och naturläkemedel (johannesört) som kan orsaka allvarlig interaktion (samverkan).

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Efavirenz Sandoz kan interagera med andra läkemedel, inklusive naturläkemedel såsom extrakt av *Ginkgo biloba*. Det innebär att mängden Efavirenz Sandoz eller andra läkemedel i blodet kan påverkas. Detta kan innebära att läkemedlens effekt minskas eller uteblir eller att biverkningar kan bli värre. I vissa fall behöver läkaren därför ändra doseringen eller mäta läkemedelshalten i blodet. **Det är viktigt att tala om för läkaren eller apotekspersonal om du tar något av följande:**

- **Andra läkemedel mot hiv-infektion:**
 - proteashämmare: darunavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, ritonavirförstärkt atazanavir, sakvinavir eller fosamprenavir/sakvinavir. Din läkare kan överväga att ge dig ett annat läkemedel eller att ändra dosen för proteashämmaren.
 - maravirok
 - kombinationsläkemedel som innehåller efavirenz, emtricitabin och tenofovir bör inte tas tillsammans med Efavirenz Sandoz om inte detta rekommenderats av din läkare eftersom de innehåller efavirenz, den aktiva substansen i Efavirenz Sandoz.
- **Läkemedel som används för behandling av infektion med hepatit C-virus:** boceprevir, telaprevir, simeprevir, sofosbuvir/velpatasvir, glecaprevir/pibrentasvir och sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir
- **Läkemedel som används för behandling av bakterieinfektioner**, vilket inkluderar tuberkulos och AIDS-relaterad MAC-infektion (*mycobacterium avium complex*): klaritromycin, rifabutin, rifampicin. Din läkare kan överväga att ändra dosen eller ge dig ett annat antibiotikum. Din läkare kan även öka dosen av Efavirenz Sandoz.
- **Läkemedel som används för behandling av svampinfektioner:**
 - vorikonazol. Efavirenz Sandoz kan minska mängden vorikonazol i ditt blod och vorikonazol kan öka mängden efavirenz i blodet. Om du tar dessa två läkemedel samtidigt måste dosen vorikonazol ökas och dosen efavirenz minskas. Du måste rådfråga din läkare först.
 - itrakonazol. Efavirenz Sandoz kan minska mängden itrakonazol i ditt blod.
 - posaconazol. Efavirenz Sandoz kan minska mängden posaconazol i ditt blod.
- **Läkemedel som används för behandling av malaria:**
 - artemeter/lumefantrin: Efavirenz Sandoz kan minska mängden artemeter/lumefantrin i ditt blod.
 - atovakvon/proguanil: Efavirenz Sandoz kan minska mängden atovakvon/proguanil i ditt blod.
- **Prazikvantel** (ett läkemedel som används för att behandla parasitiska maskinfektioner).
- **Läkemedel för behandling av kramper/krampanfall (antikonvulsiva):** karbamazepin, fenytoin, fenobarbital. Efavirenz Sandoz kan minska eller öka mängden antikonvulsivt läkemedel i ditt blod. Karbamazepin kan minska effekten av Efavirenz Sandoz. Din läkare kan välja att ge dig ett annat antikonvulsivt läkemedel.
- **Läkemedel som används för att sänka blodfettarna (s.k. statiner):** atorvastatin, pravastatin, simvastatin. Efavirenz Sandoz kan minska mängden statiner i ditt blod. Din läkare kommer att kontrollera dina kolesterolvärden och kan överväga att vid behov ändra dosen statin.
- **Metadon** (ett läkemedel som används för behandling av opiatberoende): läkaren kan rekommendera en alternativ behandling.
- **Sertraline** (ett läkemedel för behandling av depression): läkaren kan behöva ändra doseringen av sertraline.

- **Bupropion** (ett läkemedel för behandling av depression eller som hjälper att sluta röka): läkaren kan behöva ändra doseringen av bupropion.
- **Diltiazem eller liknande läkemedel (s.k. kalciumblockerare som är läkemedel som vanligen används vid högt blodtryck eller hjärtbesvär)**: när du påbörjar Efavirenz Sandoz-behandling kan din läkare behöva ändra dosen av kalciumblockeraren.
- **Läkemedel som hämmar immunförsvaret, som ciklosporin, sirolimus eller takrolimus** (läkemedel som förebygger avstötning av organ efter transplantation): när du påbörjar eller avslutar behandling med Efavirenz Sandoz kommer läkaren att noga följa plasmanivåerna av det immunförsvarshämmande läkemedlet och kan behöva ändra dosen av det.
- **Hormonella preventivmedel, såsom p-piller, p-spruta (t.ex. Depo-Provera)** eller p-stav (t.ex. Nexplanon): du måste också använda ett tillförlitligt barriärpreventivmedel (se ”Graviditet och amning”). Efavirenz Sandoz kan försämra effekten av de hormonella preventivmedlen. Graviditer har inträffat hos kvinnor som behandlats med Efavirenz Sandoz när de använt p-stav. Det har dock inte kunnat fastställas att behandlingen med Efavirenz Sandoz orsakade uteblivet skydd av preventivmedlet.
- **Warfarin eller acenokumarol** (läkemedel som används för att minska blodets levringsförmåga): läkaren kan behöva ändra doseringen av warfarin eller acenokumarol.
- **Extrakt av *Ginkgo biloba*** (naturläkemedel)
- **Metamizol**, ett läkemedel som används för att behandla smärta och feber
- **Läkemedel som påverkar hjärtrytmene:**
 - **Läkemedel för behandling av problem med hjärtrytmene:** t.ex. flekainid eller metoprolol.
 - **Läkemedel för behandling av depression:** t.ex. imipramin, amitriptylin eller klomipramin.
 - **Antibiotika,** inkluderande följande typer: makrolider, fluorokinoloner eller imidazol.

Efavirenz Sandoz med mat och dryck

Intag av Efavirenz Sandoz på fastande mage kan minska biverkningarna. Grapefruktjuice bör undvikas vid användning av Efavirenz Sandoz.

Graviditet och amning

Kvinnor bör inte bli gravida under pågående behandling med Efavirenz Sandoz och under **12 veckor** **därefter**. Din läkare kan begära att du gör ett graviditetstest för att vara säker på att du inte är gravid innan behandling med Efavirenz Sandoz påbörjas.

Om du risikerar att bli gravid under tiden du får Efavirenz Sandoz behöver du använda ett tillförlitligt barriärpreventivmedel (till exempel kondom) tillsammans med andra preventivmetoder såsom tabletter (p-piller) eller andra hormonella preventivmedel (till exempel p-stav, p-spruta). Efavirenz kan finnas kvar i ditt blod en tid efter avslutad behandling. Därför bör du fortsätta använda preventivmedel, såsom beskrivits ovan, i 12 veckor efter sista dosen Efavirenz Sandoz.

Tala genast om för läkaren om du är gravid eller planerar att bli gravid. Om du är gravid ska du ta Efavirenz Sandoz bara om du och läkaren beslutar att ett klart behov föreligger. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Allvarliga fosterskador har setts hos ofödda djur och hos spädbarn till kvinnor som fått behandling med efavirenz eller ett kombinationsläkemedel som innehåller efavirenz, emtricitabin och tenofovir under graviditeten. Om du har tagit Efavirenz Sandoz eller kombinationstabletten som innehåller efavirenz, emtricitabin och tenofovir under din graviditet kan din läkare behöva ta regelbundna blodprover och andra diagnostiska tester för att följa utvecklingen hos ditt barn.

Du ska inte amma ditt barn om du tar Efavirenz Sandoz.

Amning **rekommenderas inte** för kvinnor som lever med hiv eftersom HIV-infektion kan överföras till barnet via bröstmjölken.

Om du ammar eller funderar på att börja amma ska du **diskutera detta med din läkare så snart som möjligt.**

Körförmåga och användning av maskiner

Efavirenz Sandoz innehåller efavirenz och kan orsaka yrsel, nedsatt koncentrationsförmåga och dåsighet.
Om du påverkas ska du undvika bilkörs och användning av verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Efavirenz Sandoz innehåller natrium och laktos

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Andra formuleringar av efavirenz finns tillgängliga på marknaden för dessa patienter.

3. Hur du tar Efavirenz Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare talar om för dig vilken dos du ska ta.

- Dosen för vuxna är 600 mg en gång dagligen.
- Om du samtidigt tar vissa andra läkemedel kan dosen av Efavirenz Sandoz behöva ökas eller minskas (se avsnittet ”Andra läkemedel och Efavirenz Sandoz”).
- Efavirenz Sandoz tas via munnen. Efavirenz Sandoz rekommenderas att intas på fastande mage, företrädesvis vid sänggåendet. Detta kan minska besvären av vissa biverkningar (som t.ex. yrsel och dåsighet). Med fastande mage menas vanligtvis 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid.
- Tabletten bör sväljas hel med vatten.
- Efavirenz Sandoz måste tas varje dag.

- Efavirenz Sandoz ska aldrig användas ensamt för behandling av hiv. Efavirenz Sandoz måste alltid tas i kombination med andra läkemedel mot hiv.

Användning för barn och ungdomar

- Efavirenz Sandoz filmdragerade tablettär är inte lämpliga för barn som väger mindre än 40 kg.
- Dosen för barn som väger 40 kg eller mer är 600 mg en gång dagligen. Andra formuleringar av efavirenz finns tillgängliga på marknaden för patienter som behöver dosjustering.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Tabletten kan delas om du har svårt att svälja den hel.

Om du har tagit för stor mängd av Efavirenz Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 0800 147 111 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning. Ha med dig läkemedelsförpackningen så du kan redogöra för vad du tagit.

Om du har glömt att ta Efavirenz Sandoz

Försök att inte glömma någon dos. Om du glömmer att ta en dos, ta nästa dos så snart som möjligt, men ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du behöver hjälp med att planera när det är bäst att ta din medicin, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Om du slutar att ta Efavirenz Sandoz

När dina Efavirenz Sandoz-tabletter börjar ta slut ska du se till att få fler från din läkare eller apotekspersonal. Detta är mycket viktigt eftersom virusmängden kan börja öka så snart man slutar ta medicinen, även om det bara gäller en kort tid. Viruset kan då bli svårare att behandla.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vid behandling av hiv-infektion är det inte alltid möjligt att säga om vissa av de önskade effekterna orsakats av Efavirenz Sandoz, av andra läkemedel som du tar samtidigt eller av själva hiv-sjukdomen.

Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana förändringar.

De mest påfallande biverkningarna som rapporterats för efavirenz i kombination med andra läkemedel mot hiv är hudutslag och symptom från centrala nervsystemet.

Kontakta alltid din läkare om du får utslag, eftersom en del utslag kan bli svåra. I de flesta fall försvinner dock hudutslagen utan att man behöver ändra behandlingen med Efavirenz Sandoz. Utslag är vanligare hos barn än hos vuxna som behandlas med efavirenz.

Symtomen från centrala nervsystemet brukar uppträda i början av behandlingen, men minskar vanligen under de första veckorna. I en studie uppträddes ofta symptom från centrala nervsystemet under de första 1–3 timmarna efter en dos. Om du är påverkad av symtomen kan din läkare föreslå att du tar Efavirenz Sandoz vid sänggåendet och på fastande mage. Vissa patienter kan få allvarligare symptom som påverkar humöret eller förmågan att tänka klart. Några patienter har begått självmord. Problemen har en tendens att oftare inträffa hos dem som tidigare

haft psykiska sjukdomar. Dessutom kan vissa symtom från centrala nervsystemet uppträda flera månader upp till flera år efter påbörjad behandling med Efavirenz Sandoz (t.ex. förvirring, långsamma tankar och längsammare fysiska rörelser, vanföreställningar [felaktiga föreställningar] eller hallucinationer [att se eller höra sådant som andra inte ser eller hör]). Tala alltid omedelbart om för din läkare om du får dessa symtom eller andra biverkningar när du tar Efavirenz Sandoz.

Berätta för din läkare om du upplever några av följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

- hudutslag.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- onormala drömmar, koncentrationssvårigheter, yrsel, huvudvärk, sömnsvårigheter, dåsighet, koordinations- eller balanssvårigheter
- magsmärta, diarré, illamående, kräkningar
- klåda
- trötthet
- ångest, känsla av nedstämdhet.

Tester kan visa:

- förhöjda leverenzymer i blodet
- förhöjda triglycerider (fettsyror) i blodet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

- nervositet, glömska, förvirring, krampanfall, konstiga tankar
- dimsyn
- känsla av snurrigitet eller fallfärdighet (svindel)
- buksmärter orsakade av inflammation i bukspottkörteln
- allergisk reaktion (överkänslighet) som kan orsaka allvarliga hudreaktioner (*erythema multiforme*, Stevens-Johnsons syndrom)
- gulfärgad hud eller gulfärgade ögon, klåda eller buksmärter orsakade av leverinflammation
- bröstdförstoring hos män
- argsint uppträdande, humörsvängningar, att se eller höra inbillade saker (hallucinationer, psykos), mani (mentalt tillstånd kännetecknat av hyperaktivitet, upprymdhets- eller irritabilitet), paranoja, självmordstankar, katatoni (tillstånd där patienten blir orörlig och tappar talförmågan under en period), självmordsförsök
- visslande, ringande eller annat bestående ljud i öronen
- darrningar (skakning)
- blodvallning.

Tester kan visa:

- förhöjt kolesterol i blodet.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

- kliande utslag orsakade av en reaktion på solljus
- leversvikt, som i vissa fall lett till död eller levertransplantation, har inträffat med efavirenz. De flesta fallen inträffade hos patienter som redan hade leversjukdom, men ett fåtal rapporter har innefattat patienter utan någon leversjukdom.
- oförklarlig ångestkänsla som inte förknippas med hallucinationer men med eventuella svårigheter att tänka klart eller förfnuftigt
- självmord
- vanföreställningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Sverige: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

Finland: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret PB55, 00034 FIMEA. Webbplats: www.fimea.fi.

5. Hur Efavirenz Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på burketiketten, blistret eller kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Burk: Används inom 2 månader efter öppnandet.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är efavirenz. Varje filmdragerad tablett innehåller 600 mg efavirenz.
- Övriga innehållsämnen är kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, natriumlaurilsulfat, hydroxipropylcellulosa, laktosmonohydrat och magnesiumstearat i tablettkärnan; hypromellos (E464), kinolingtunt aluminiumlack (E104), titandioxid (E171), makrogol och röd järnoxid (E172) i filmdrageringen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Efavirenz Sandoz är en gul, kapselformad (9,6 x 19,2 mm), filmdragerad tablett med brytskåra på båda sidor.

Efavirenz Sandoz är förpackad i:

- HDPE-burkar med barnskyddande polypropylenlock och förseglad behållare innehållande kiselgel: 30, 90 (3 x 30) eller 120 (4 x 30) filmdragerade tablettter
- Vita, ogenomskinliga PVC/Aclar/Al-blister: 10, 28, 30, 50, 60, 84, 90, 100 eller 120 filmdragerade tablettter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller
LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672, Warszawa, Polen
eller
S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures, Rumänien
eller
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland
eller
Lek Pharmaceuticals d.d., Trimplini 2D, 9220 Lendava, Slovenien

Denna bipacks edel ändrades senast 07.08.2024