

## **Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle**

### **Aspirin Cardio 100 mg enterotabletti**

asetyyლისისყილიჰოპო

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

**Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Aspirin Cardio on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Aspirin Cardio -enterotabletteja
3. Miten Aspirin Cardio -enterotabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Aspirin Cardio -enterotablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Aspirin Cardio on ja mihin sitä käytetään**

Aspirin Cardio 100 mg -enterotabletteja käytetään estämään verisuonitukosten syntymistä, etenkin sydämen ja aivojen verisuoniin. Aspirin Cardio 100 mg -enterotabletteja voidaan käyttää sydäninfarktin ensiapuna.

Aspirin Cardio 100 mg -enterotabletti sisältää vaikuttavana aineena asetyyლისისყილიჰოპო. Asetyyლისისყილიჰოპო kuuluu salisylaattiryhmään ja sitä käytetään kipu-, särky- ja kuumelääkkeenä sekä lievittämään tulehduskipuun liittyvää turvotusta. Asetyyლისისყილიჰოპო on todettu jo pienempinä annoksina vaikuttavan myös veren hyytymisominaisuuksiin ja ehkäisevän veritulppien syntymistä mm. sydämen ja aivojen verisuoniin. Vaikutuksensa vuoksi Aspirin Cardio 100 mg -enterotabletteja käytetään verisuonitukosten syntymistä estävänä lääkkeenä. Aspirin Cardio 100 mg -enterotabletti on päällystetty kalvolla, joka ei liukene mahassa vaan vasta ohutsuolessa. Siksi asetyyლისისყილიჰოპო vapautuu enterotablettista myöhemmin kuin tavallisesta, päällystämättömästä tablettista. Toimintaperiaatteensa vuoksi enterotabletti aiheuttaa vähemmän ruoansulatuskanavan ärsytystä kuin tavallinen tabletti.

Asetyyლისისყილიჰოპო, jota Aspirin Cardio sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Aspirin Cardio -enterotabletteja**

**Älä ota Aspirin Cardio -enterotabletteja**

- jos olet allerginen asetyyლისისყილიჰოპოille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) tai muille samantyyppisille kipu- ja tulehduslääkkeille (salisylaateille).

Hoitavalle lääkärille tulee kertoa muista todetuista sairauksista ennen lääkähoidon aloittamista, sillä Aspirin Cardio -enterotabletteja ei pidä käyttää:

- jos sinulla on taipumusta verenvuotoihin (esim. verenvuototauti eli hemofilia)
- jos sinulla on tai on ollut maha- tai pohjukaissuolihaava
- jos sinulla on tai on ollut maksan, munuaisten tai sydämen vajaatoiminta
- jos olet saanut astma-kohtauksen salisylaateista tai muista tulehduskipulääkkeistä
- jos käytät metotreksaattia viikossa yli 15 mg tai enemmän.

Lääkettä ei suositella käytettäväksi raskauden aikana, eikä sitä saa käyttää raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana.

### **Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Aspirin Cardio -enterotabletteja.

Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää kertoa hoitavalle lääkärille muista todetuista sairauksista samoin kuin mahdollisesta raskaudesta jo **ennen** hoidon aloittamista. Aspirin Cardio -enterotablettien käytössä tulee noudattaa varovaisuutta ja tarvittaessa tulee kääntyä lääkärin puoleen, jos:

- käytät samanaikaisesti veren hyytymistä estäviä lääkkeitä (esim. varfariini ja muut kumariinijohdannaiset tai hepariini); näiden lääkkeiden vaikutukset voivat voimistua Aspirin Cardio -enterotablettien käytön yhteydessä
- käytät muita tulehduskipulääkkeitä, kuten ibuprofeenia ja naprokseenia (kuumeseen, särkyyn tai tulehdukseen) (ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Aspirin Cardio)
- sinulla on todettu sydän-, maksa- tai munuaissairauksia. Tulehduskipulääkkeiden tavoin valmiste voi lisätä turvotustaipumusta sydämen tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.
- sinulla on pitkäaikaisia tai toistuvia ruoansulatuskanavan sairauksia
- olet saanut allergisia oireita (esim. astma-kohtauksen, ihottumia, allergista nuhaa) muista tulehduskipu- tai reumalääkkeistä
- sinulla on tai on ollut astma tai pitkäaikaisia hengitystiesairauksia
- sinulla on harvinainen glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasipuutos
- sinulla on ollut kihti. Asetyyლისისილინო- saattaa pieninä annoksina laukaista kihti-kohtauksen, jos sinulla on taipumusta kihtiin.

Sinun tulee kertoa lääkärille Aspirin Cardio -enterotablettien ja muiden asetyylisalisyylihappovalmisteiden käytöstä, jos menet leikkaukseen. Lääkkeen käyttö joudutaan ehkä lopettamaan useita päiviä ennen suunniteltua leikkausta.

Jos lääkkeen käytön yhteydessä ilmenee ongelmia, käänny lääkärin puoleen.

### **Lapset ja nuoret**

Asetyyლისისილინო- valmisteita ei suositella ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi lapsille ja nuorille, koska virussairauksien (esim. flunssa, vesirokko) yhteydessä ne saattavat lisätä vakavan Reyen oireyhtymän vaaraa. Sen ensioireita on mm. pitkään jatkuva oksentelu.

### **Muut lääkevalmisteet ja Aspirin Cardio**

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Lääkehoidon vaikutukset tai teho voivat muuttua, jos Aspirin Cardio -enterotabletteja käytetään samanaikaisesti tiettyjen toisten lääkkeiden kanssa.

Keskustele hoitavan lääkärin kanssa ennen kuin käytät Aspirin Cardio -enterotablettien kanssa samanaikaisesti

- veren hyytymistä estäviä lääkkeitä (esim. varfariini ja muut kumariinijohdannaiset tai hepariini)

- eräitä tulehduskipulääkkeitä, kuten ibuprofeeni ja naprokseeni: heikentävät Aspirin Cardio -valmisteen kykyä estää verisuonitukoksia ja voivat täten vähentää valmisteen tehoa sydänkohtauksen ja aivohalvauksen estohoidossa
- suun kautta tai ruiskeena annosteltavia kortisonivalmisteita. Aspirin Cardio -enterotablettien ja kortisonivalmisteen samanaikainen käyttö voi lisätä ruoansulatuskanavan verenvuodon vaaraa.
- muita samankaltaisia tulehduskipulääkkeitä
- selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (ns. SSRI), joita käytetään esim. masennuslääkkeinä
- tiettyjä diabeteslääkkeitä (esim. insuliini, glibenklamidi, glipitsidi)
- metotreksaattivalmisteita (käytetään mm. nivelreumassa ja tietyissä kasvainsairauksissa)
- sulfonamideja (sulfat) sisältäviä antibioottivalmisteita
- digoksiinia (sydänlääke)
- epilepsialääkkeitä (barbituraatit kuten fenobarbitaali, fenytoiini, natriumvalproaatti)
- litiumia sisältäviä lääkkeitä (käytetään mm. mielialahäiriöiden hoidossa)
- nesteenoistossa käytettäviä lääkkeitä (esim. spironolaktoni, furosemidi)
- virtsahapon eritystä lisääviä kihtilääkkeitä (probenesidi)
- tietyt verenpainelääkkeet (ACE:n estäjät ja angiotensiini II-salpaajat).

### **Aspirin Cardio alkoholin kanssa**

Aspirin Cardio -enterotablettien ja alkoholin samanaikainen käyttö voi lisätä ruoansulatuskanavan verenvuodon vaaraa.

### **Raskaus, imetys ja hedelmällisyys**

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmiste kuuluu lääkeryhmään (tulehduskipulääkkeet), joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemistä. Tämä vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.

Aspirin Cardio -enterotablettien, kuten muidenkaan salisylaatteja sisältävien lääkevalmisteiden käyttö ei ole suositeltavaa raskauden aikana eikä saa käyttää raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana. Raskauden aikaisesta hoidosta tulisi aina neuvotella lääkärin kanssa.

Asetyyylisalisyylihappo erittyy äidinmaitoon pieninä määrinä. Vaikka satunnaisesti otettujen pienten annosten ei ole todettu aiheuttavan haittavaikutuksia lapselle, tulisi imetyksen aikaisesta lääkkeen käytöstä aina neuvotella lääkärin kanssa.

### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Aspirin Cardio 100 mg -enterotablettien ei ole todettu vaikuttavan haitallisesti ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

## **3. Miten Aspirin Cardio -entertabletteja käytetään**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

### **Annostus**

Verisuonitukosten estohoito aloitetaan lääkärin aloitteesta ja ohjauksessa. Tavallisesti käytetty annos on 100–300 mg vuorokaudessa (1–3 Aspirin Cardio 100 mg -enterotablettia vuorokaudessa).

Sydäninfarktin ensiapuna tulee ottaa 2–3 tablettia (200–300 mg) pureskelemalla tai murskaamalla ja nielaisemalla tabletit imeytymisen nopeuttamiseksi. Ensiapuna sydäninfarktissa suositellaan tavanomaista ei-suolistoliukoista asetyyylisalisyylihappovalmistetta.

Aspirin Cardio 100 mg -enterotabletit on tavallisesti nieltävä **kokonaisina** runsaan veden kanssa vähintään 30 minuuttia ennen ateriaa.

### **Jos otat enemmän Aspirin Cardio -enterotabletteja kuin sinun pitäisi**

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

### **Jos unohtat ottaa Aspirin Cardio -enterotabletin**

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lääkkeen haittavaikutuksina voi esiintyä erilaisia ruoansulatuskanavan oireita, kuten vatsakipua, närästystä, pahoinvointia, ripulia ja oksentelua. Joissakin harvinaisissa tapauksissa saattaa syntyä ruoansulatuskanavan haavaumia, joihin voi liittyä verenvuotoa (voi ilmetä mustina veriulosteina ja verioksennuksina). Enteropäällysteisen tabletin aiheuttamat ärsytysoireet ovat kuitenkin vähäisemmät kuin tavallisella päällystämättömällä tabletilla. Koska asetyylisalisyylihappo vaikuttaa veren hyytymisominaisuuksiin, haavat voivat vuotaa tavallista pitempään.

Verenvuotoja, kuten leikkaukseen liittyvää verenvuotoa, verenpurkauksia, nenäverenvuotoa, virtsa- ja sukupuolielimiin liittyvää verenvuotoa ja ienverenvuotoa voi esiintyä. Verenvuodot voivat joissakin tapauksissa olla vakavia.

Verenvuoto voi johtaa anemiaan/raudanpuutosanemiaan.

Joskus voi esiintyä allergisia oireita, kuten ihottumaa, allergista nuhaa tai astmaa.

Yksittäisissä tapauksissa on esiintynyt häiriöitä maksan tai munuaisten toiminnassa, verensokerin laskua ja muutoksia verihiutaleiden määrässä.

Potilailla, joilla on vaikea glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasipuutos, on esiintynyt punasolujen hajoamista ja siitä johtuvaa hemolyyttistä anemiamia.

Yliannostuksen oireina voi esiintyä myös huimausta ja korvien soimista, erityisesti lapsilla ja vanhuksilla. Tällaisissa tapauksissa tulee kääntyä lääkärin puoleen.

Aspirin Cardio -enterotablettien käytön yhteydessä mahdollisesti esiin tulevat haittavaikutukset tulee ilmoittaa lääkärille (tai apteekkiin).

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

## 5. Aspirin Cardio -enterotablettien säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Herkkä kosteudelle.  
Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

### Mitä Aspirin Cardio -enterotabletti sisältää

- Vaikuttava aine on asetyylisalisyylihappo. Yksi enterotabletti sisältää 100 mg asetyylisalisyylihappoa.
- Muut aineet ovat selluloosajauhe ja maissitärkkelys. Kalvopäällyste: metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri, natriumlauryylisulfaatti, polysorbaatti 80, talkki, trietyylisitraatti.

### Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkausko

Valkoinen, pyöreä kalvopäällystetty enterotabletti.  
Pakkaus: 98 tai 100 tablettiä läpipainopakkauksessa.

### Myyntiluvan haltija

Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku.

### Valmistaja

Bayer Bitterfeld GmbH, Ortsteil Greppin, Bitterfeld-Wolfen, Saksa.

### Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Bayer Oy, PL 73, 02151 Espoo. Puhelin 020 78521.

**Tämä pakkauseloste on tarkistettu viimeksi 3.4.2017**

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter**

acetylsalicylsyra

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

**I denna bipacksedel finns information om följande :**

1. Vad Aspirin Cardio är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Aspirin Cardio enterotabletter
3. Hur du använder Aspirin Cardio enterotabletter
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Aspirin Cardio enterotabletter ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Aspirin Cardio är och vad det används för**

Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter används för att förhindra blodproppsbildning särskilt i hjärtats och hjärnans blodkärl. Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter kan användas som förstahjälp vid hjärtinfarkt.

Den aktiva substansen i Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter är acetylsalicylsyra. Acetylsalicylsyra tillhör gruppen salicylater och används som ett läkemedel vid smärta, värk och feber samt för att lindra svullnad relaterad till inflammatoriskt betingad smärta. Acetylsalicylsyra har redan i mindre doser konstaterats påverka även blodets koagulationsförmåga och förhindra uppkomsten av blodproppar bl.a. i hjärtats och hjärnans blodkärl. På grund av sin effekt används Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter som ett läkemedel för att förebygga blodproppsbildning. Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter är dragerade med en film som löser upp sig först i tunntarmen, inte i magen. Följaktligen frisätts acetylsalicylsyra senare från enterotabletter än från vanliga, odragerade tabletter. På grund av sin verkningsmekanism framkallar enterotabletter mindre irritation i mag-tarmkanalen än konventionella tabletter.

Acetylsalicylsyra som finns i Aspirin Cardio kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

#### **2. Vad du behöver veta innan du tar Aspirin Cardio enterotabletter**

**Ta inte Aspirin Cardio enterotabletter**

- om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller andra likartade smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel (salicylater).

Den vårdande läkaren bör informeras om andra samtidiga sjukdomar innan läkemedelsbehandling inleds, eftersom Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter inte skall användas:

- om du har ökad blödningsbenägenhet (t.ex. blödarsjuka, dvs. hemofili)
- om du har eller har haft magsår eller sår i tolvfingertarmen

- om du har eller har haft leversvikt, njursvikt eller hjärtsvikt.
- om du har fått astmaanfall av salicylater eller andra antiinflammatoriska läkemedel
- om du använder 15 mg eller mera metotrexat per vecka.

Läkemedlet rekommenderas inte under graviditet, och det får inte användas under graviditetens tre sista månader.

### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Aspirin Cardio.

För att behandlingen skall vara framgångsrik är det viktigt att du redan **innan** behandlingen inleds informerar den vårdande läkaren om andra sjukdomar som konstaterats hos dig samt om du är gravid. Vid användning av Aspirin Cardio enterotabletter skall försiktighet iakttas och läkare vid behov rådfrågas i följande fall:

- Om du samtidigt använder läkemedel som hämmar blodets koagulationsförmåga (t.ex. warfarin, andra kumarinderivat eller heparin); effekterna av dessa läkemedel kan förstärkas vid samtidigt intag av Aspirin Cardio enterotabletter
- Om du använder andra antiinflammatoriska värkmedel som ibuprofen och naproxen (mot feber, värk eller inflammation) (se avsnitt Andra läkemedel och Aspirin Cardio)
- Om du har konstaterats lida av en hjärt-, njur- eller leversjukdom. Liksom antiinflammatoriska analgetika, kan detta läkemedel predisponera för ödem hos patienter med hjärt- eller njursvikt.
- Om du har haft långvariga eller återkommande sjukdomar i mag-tarmkanalen
- Om du har fått allergiska symtom (t.ex. astmaanfall, eksem, allergisk snuva) av andra antiinflammatoriska värkmedel eller antireumatiska läkemedel
- Om du har eller har haft astma eller långvariga luftvägssjukdomar
- Om du har det sällsynta tillståndet glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist
- Om du har haft gikt. I låga doser kan acetylsalicylsyra utlösa giktanfall, om du har benägenhet för gikt.

Du bör berätta för din läkare om användning av Aspirin Cardio enterotabletter eller andra acetylsalicylsyrpreparat om du ska opereras. Användning av medicinen måste kanske avbrytas flera dagar före den planerade operationen.

Om problem relaterade till användning av läkemedlet uppstår, bör den vårdande läkaren kontaktas.

### **Barn och ungdomar**

Preparat som innehåller acetylsalicylsyra rekommenderas inte som förstahandsmedel vid feber hos barn och ungdomar, eftersom dessa läkemedel i samband med virusinfektioner (såsom influensa och vattkoppor) kan öka risken för den allvarliga Reyes sjukdomen. Tidiga symtom är bl.a. långvariga kräkningar.

### **Andra läkemedel och Aspirin Cardio**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Läkemedelsbehandlingens verkningar och effekt kan påverkas om Aspirin Cardio enterotabletter tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

Rådgör med den vårdande läkaren innan du tillsammans med Aspirin Cardio enterotabletter intar:

- läkemedel som hämmar blodets koagulationsförmåga (t.ex. warfarin och andra kumarinderivat eller heparin)
- vissa antiinflammatoriska värkmedel (som ibuprofen och naproxen): försvagar Aspirin Cardio för att förebygga proppar i blodkärl och kan därmed minska profylaktiska effekten för hjärtattack och stroke
- kortisonpreparat som tas peroralt eller ges som injektion. Samtidig användning av Aspirin Cardio enterotabletter och kortison kan ge ökad risk för blödning i mag-tarmkanalen.
- andra jämförbara inflammationshämmande värkmedel

- selektiva serotoninåterupptagshämmare (s.k. SSRI) som används t.ex. mot depression
- vissa diabetesmedel (t.ex. insulin, glibenklamid, glipizid)
- metotrexatpreparat (som bl.a. används vid reumatoid artrit och vissa tumörsjukdomar)
- antibiotika som innehåller sulfonamider (sulfa)
- digoxin (en hjärtmedicin)
- antipileptika (barbiturater såsom fenobarbital, fenytoin, natriumvalproat)
- läkemedel som innehåller litium (används bl.a. vid behandling av depressionstillstånd)
- urindrivande medel (t.ex. spironolakton, furosemid)
- giktmedel som ökar utsöndringen av urinsyra (probenecid)
- vissa blodtrycksmediciner (ACE- och angiotensin II-hämmare).

### **Aspirin Cardio med alkohol**

Aspirin Cardio enterotabletter i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.

### **Graviditet, amning och fertilitet**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Produkten hör till en grupp av läkemedel (NSAIDs), som kan försvåra möjligheten att bli gravid. Påverkan är reversibel, dvs upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

Liksom andra läkemedel som innehåller salicylater rekommenderas Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter inte under graviditet. Aspirin Cardio 100 mg får inte användas under de tre sista graviditetsmånaderna. Behandling under graviditet bör alltid diskuteras med läkare.

Acetylsalicylsyra utsöndras i små mängder i modersmjölken. Fastän tillfälligt intag av små doser inte har visats medföra skadeverkningar på barnet, bör läkare alltid rådfrågas om användning av läkemedlet under amning.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter har inte konstaterats påverka skadligt körförmågan eller användningen av maskiner.

## **3. Hur du använder Aspirin Cardio enterotabletter**

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **Dosering**

Profylaktisk behandling av blodproppar inleds av läkare och ges under läkaruppsikt. Normaldosen är 100–300 mg per dygn (1–3 Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter per dygn).

Som förstahjälp vid hjärtinfarkt bör man ta 2–3 tabletter (200–300 mg) genom att tugga eller krossa och svälja tabletterna för att påskynda upptagningen. Som förstahjälp vid hjärtinfarkt rekommenderas vanliga icke-tarmlösliga acetylsalicylsyrapreparat.

Aspirin Cardio 100 mg enterotabletterna skall vanligen sväljas **hela** tillsammans med en riklig mängd vatten 30 minuter före måltid.

### **Om du har tagit för stor mängd av Aspirin Cardio enterotabletter**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

### **Om du har glömt att ta Aspirin Cardio enterotabletten**



Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

#### **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Under läkemedelsbehandling kan varierande symtom från mag-tarmkanalen uppträda, såsom magont, halsbränna, illamående, diarré och kräkningar. I sällsynta fall kan blödande sår i mag-tarmkanalen uppstå (kan yttra sig som mörkfärgad avföring och blodkräkning). Dragerade enterotabletter framkallar emellertid mindre retningssymtom än konventionella, odragerade tabletter. Eftersom acetylsalicylsyra påverkar blodets koagulationsförmåga kan sår blöda längre än vanligtvis.

Blödningar såsom postoperativ blödning, hematom, näsblödning, blödning i urinvägar och könsorgan och blödande tandkött kan uppträda. I vissa fall kan blödningarna vara allvarliga.

Blödning kan orsaka anemi/järnbrist.

Överkänslighetssymtom, t.ex. hudutslag, allergisk snuva eller astma, utvecklas stundom.

I enstaka fall kan störningar i lever- eller njurfunktionen, minskad blodsockerhalt och ändringar i mängden av blodplättar förekomma.

Hos patienter med svår glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist har hemolys och hemolytisk anemi förekommit.

Symtom på överdosering kan yttra sig som yrsel och öronsusningar, särskilt hos barn och äldre. I dessa fall bör läkare kontaktas.

Biverkningar som eventuellt framkommer vid användning av Aspirin Cardio enterotabletter skall rapporteras till läkaren (eller till apotekspersonal).

#### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

#### **5. Hur Aspirin Cardio enterotabletter ska förvaras**

Förvaras vid högst 25 °C. Fuktkänsligt.

Förvaras i originalförpackningen.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra. Varje enterotablett innehåller 100 mg acetylsalicylsyra.
- Övriga innehållsämnen är cellulosapulver, majsstärkelse. Filmdragering: metakrylsyra-etylakrylatkopolymer, natriumlaurylsulfat, polysorbat 80, talk, trietylcitrat.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Vita, runda, filmdragerade enterotabletter.

Förpackning: 98 eller 100 tabletter i en tryckförpackning.

### **Innehavare av godkännande för försäljning**

Bayer Oy, Pansiovägen 47, 20210 Åbo.

### **Tillverkare**

Bayer Bitterfeld GmbH, Ortsteil Greppin, Bitterfeld-Wolfen, Tyskland.

### **Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:**

Bayer Oy, PB 73, 02151 Esbo. Telefon 020 78521.

**Denna bipacksedel ändrades senast 3.4.2017**