

## VALMISTEYHTEENVETO

### 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletit  
Methylphenidate Mylan 27 mg depottabletit  
Methylphenidate Mylan 36 mg depottabletit  
Methylphenidate Mylan 54 mg depottabletit

### 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

*Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletit*

Yksi depottabletti sisältää 18 mg metyylifenidaattihydrokloridia (vastaan 15,57 mg metyylifenidaattia)

*Methylphenidate Mylan 27 mg depottabletit*

Yksi depottabletti sisältää 27 mg metyylifenidaattihydrokloridia (vastaan 23,35 mg metyylifenidaattia)

*Methylphenidate Mylan 36 mg depottabletit*

Yksi depottabletti sisältää 36 mg metyylifenidaattihydrokloridia (vastaan 31,13 mg metyylifenidaattia)

*Methylphenidate Mylan 54 mg depottabletit*

Yksi depottabletti sisältää 54 mg metyylifenidaattihydrokloridia (vastaan 46,7 mg metyylifenidaattia)

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

*Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletit*

Yksi depottabletti sisältää 12,3 mg sakkaroosia.

*Methylphenidate Mylan 27 mg depottabletit*

Yksi depottabletti sisältää 15,0 mg sakkaroosia.

*Methylphenidate Mylan 36 mg depottabletit*

Yksi depottabletti sisältää 24,6 mg sakkaroosia.

*Methylphenidate Mylan 54 mg depottabletit*

Yksi depottabletti sisältää 36,9 mg sakkaroosia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

### 3. LÄÄKEMUOTO

Depottabletti

*Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletit*

Kellertävä tai keltainen, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jonka halkaisija on 6,3 mm.

*Methylphenidate Mylan 27 mg depottabletit*

Keltainen, pitkänomainen, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jonka koko on 10,3 x 4,8 mm ja jonka kummallakin puolella on jakouurre. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

*Methylphenidate Mylan 36 mg depottabletit*

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, soikea, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jonka koko on 11,3 x 5,3 mm ja jonka kummallakin puolella on jakouurre. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

*Methylphenidate Mylan 54 mg depottabletit*

Punertava tai punainen, soikea, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jonka koko on 13,3 x 6,4 mm ja jonka kummallakin puolella on jakouurre. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

### 4. KLIINISET TIEDOT

#### 4.1 Käyttöaiheet

## Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD)

Methylphenidate Mylan on tarkoitettu aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) hoitoon osana kattavaa hoito-ohjelmaa vähintään 6-vuotiaille lapsille, kun muut tukitoimenpiteet yksinään ovat osoittautuneet riittämättöviksi. Hoito pitää toteuttaa lapsuusajan käytöshäiriöihin perehtyneen erikoislääkärin valvonnassa. Taudinmääritys tehdään voimassaolevien DSM-tautiluokituskriteerien tai ICD-ohjeiston mukaisesti ja sen pitää perustua täydellisiin potilastietoihin ja potilaan arviointiin. Taudinmääritystä ei voi perustaa ainoastaan yhden tai muutaman oireen ilmenemiseen.

Tämän oireyhtymän tarkkaa syytä ei tunneta eikä siihen ole olemassa yksittäistä diagnostista testiä. Asianmukaisen taudinmääritynksen tekeminen edellyttää lääketieteellisten, psykologisten, kasvatuksellisten ja sosiaalisten erityismenetelmien käyttöä.

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön kokonaisvaltaiseen hoito-ohjelmaan sisältyy yleensä psykologisia, kasvatuksellisia ja sosiaalisia toimenpiteitä yhdessä lääkityksen kanssa, ja hoidon tavoitteena on hyvä hoitotasapaino käytöshäiriötä sairastavilla lapsilla, joiden oireita voivat olla pitkään jatkuneet tarkkaamattomuusoireet, keskittymisvaikeudet, mielialojen ailahtelu, impulsiivisuus, kohtalainen tai vaikea yliaktiivisuus, lievät neurologiset oireet ja poikkeava EEG. Oppimisvaikeuksia voi esiintyä.

Metyylifenidaattihoitoa ei ole tarkoitettu kaikille aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä kärsiville lapsille ja lääkkeen käyttöä koskevan päätöksen saa tehdä vasta, kun lapsen oireiden vaikeus- ja kroonisuusaste suhteessa lapsen ikään on arvioitu huolellisesti.

Sopiva opetusympäristö on tärkeä ja psykososiaaliset toimenpiteet ovat yleensä tarpeen. Kun muut tukitoimenpiteet yksinään ovat osoittautuneet riittämättöviksi, päätös stimulanttien käytöstä täytyy perustaa lapsen oireiden vakavuuden perusteelliseen arviointiin. Metyylifenidaatin käytön pitää aina perustua myyntiluvan mukaiseen käyttöaiheeseen ja lääkehoidon määräämistä ja taudinmääritystä koskeviin ohjeistoihin.

### 4.2 Annostus ja antotapa

#### **Hoito pitää aloittaa lasten ja/tai nuorten käytöshäiriöihin perehtyneen erikoislääkärin valvonnassa.**

##### Ennen hoidon aloittamista tapahtuva seulonta

Ennen lääkityksen määräämistä, potilaan lähtötilanteen kardiovaskulaarinen tila on arvioitava. Arviointiin pitää sisältyä verenpaineen ja sydämen sykkeen mittaus. Potilaan sairauskertomukseen pitää kirjata tiedot samanaikaisesti käytettävistä lääkkeistä, aiemmista ja nykyisistä muista sairauksista ja psykkisistä häiriöistä tai oireista, tiedot suvussa esiintyneistä äkillisistä sydänkuolemista tai selittämättömistä kuolemista, ja kasvukäyrästölle kirjataan tarkat tiedot potilaan pituudesta ja painosta ennen hoidon aloittamista (ks. kohdat 4.3 ja 4.4).

##### Hoidon aikainen seuranta

Potilaan kasvua sekä psykkistä ja kardiovaskulaarista tilaa pitää seurata säännöllisesti (ks. kohta 4.4).

- Verenpaine ja sydämen syke kirjataan käyrästölle jokaisen annosmuutoksen yhteydessä ja vähintään kuuden kuukauden välein.
- Pituus, paino ja ruokahalu kirjataan vähintään kuuden kuukauden välein lapsen kasvukäyrästöön.
- Jokaisen annosmuutoksen yhteydessä, vähintään kuuden kuukauden välein ja jokaisella vastaanottokäynnillä potilas arvioidaan mahdollisten uusien psykkisten häiriöiden ilmenemisen tai aiempien oireiden pahanemisen varalta.

Potilaita pitää seurata metyylifenidaatin mahdollisen pähdekayttöön luovuttamisen ja virheellisen tai väärinkäytön havaitsemiseksi.

## **Annostus**

### Annoksen suurentaminen

Annostitrus on tehtävä varovaisesti, kun metyylifenidaattihoito aloitetaan. Annostitrus aloitetaan pienimmällä mahdollisella annoksella.

Sellaisia annostuksia varten, joita ei voida toteuttaa tällä lääkevalmisteella, on saatavana muita vahvuksia ja valmisteita.

Vuorokausiannosta voidaan suurentaa 18 mg:n osissa. Annosta voidaan yleensä suurentaa noin viikon välein. Metyylifenidaatin enimmäisvuorokausiannos on 54 mg.

### *Potilaat, jotka eivät ole ennen saaneet metyylifenidaattia*

Metyylifenidaatin käytöstä saatu kliininen kokemus näillä potilailla on vähäinen (ks. kohta 5.1). Metyylifenidaattia ei välttämättä suositella kaikille lapsille, joilla on tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö. Pienempi annos lyhytvaikuttelua metyylifenidaattia voidaan katsoa riittäväksi potilaille, jotka eivät ole ennen saaneet metyylifenidaattia. Hoitavan lääkärin valvoma varovainen annostitrus voi olla tarpeen tarpeettoman suuren metyylifenidaattianostelun välttämiseksi. Metyylifenidaatin suositeltu aloitusannos potilaille, jotka eivät parhaillaan käyttä metyylifenidaattia tai jotka käyttävät muita stimulantteja kuin metyylifenidaattia, on 18 mg kerran vuorokaudessa.

### *Potilaat, jotka parhaillaan käyttävät metyylifenidaattia*

Methylphenidate Mylan -valmisten suositusannos potilaille, jotka käyttävät parhaillaan metyylifenidaattia kolmesti päivässä 15–45 mg:n vuorokausiannoksina, on taulukossa 1. Annossuositukset perustuvat tämänhetkiseen annostukseen ja kliiniseen arvioon.

### **Taulukko 1: Suositeltu annosmuutos siirryttäässä muusta metyylifenidaattihydrokloridilääkityksestä (mikäli saatavilla) Methylphenidate Mylan -valmisten käyttöön**

Aiempi metyylifenidaatti-hydrokloridi-vuorokausiannos	Suositeltu Methylphenidate Mylan -annos
5 mg metyylifenidaattia kolmesti vuorokaudessa	18 mg kerran vuorokaudessa
10 mg metyylifenidaattia kolmesti vuorokaudessa	36 mg kerran vuorokaudessa
15 mg metyylifenidaattia kolmesti vuorokaudessa	54 mg kerran vuorokaudessa

Kun annosta on asianmukaisesti tarkistettu, eikä paranemista havaita yhden kuukauden aikana, lääkkeen käyttö tulee lopettaa.

### Lasten ja nuorten pitkääikainen (yli 12 kuukautta jatkuva) hoito

Metyylifenidaatin turvallisuutta ja tehoa pitkääikäiskäytössä ei ole arvioitu järjestelmällisesti kontrolloiduissa tutkimuksissa. Metyylifenidaattihoito ei saa eikä tarvitse jatkaa rajattomasti. Hoito lopetetaan yleensä murrosiän aikana tai sen jälkeen. Jos lääkäri päättää jatkaa metyylifenidaatin käyttöä pidemmän aikaa (yli 12 kuukautta) lapsilla ja nuorilla, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, hänen pitää ajottain arvioida lääkevalmisten pitkääikäiskäytön hyödyllisyyttä potilaskohtaisesti määräämällä taukoja lääkkeen käyttöön, jotta voidaan arvioida potilaan toimintaa ilman lääkehoitoa.

Metyylifenidaattioidon keskeyttämisen vaikutuksia pitäisi tarkastella vähintään kerran vuodessa (mieluiten koulujen loma-aikaan) lapsen oireiden arvioimiseksi. Hoidolla saatu vaikutus saattaa säilyä myös silloin, kun lääkevalmisteen käyttö lopetetaan väliaikaisesti tai kokonaan.

#### Annoksen pienentäminen ja käytön lopettaminen

Lääkehoito on lopetettava, jos oireet eivät lievene, vaikka lääkettä on käytetty kuukauden ajan annostusta asianmukaisesti muuttaen. Jos oireet odotusten vastaisesti pahenevat tai muita vakavia haittatahtumia ilmenee, annosta on pienennettävä tai lääkkeen käyttö on lopetettava.

#### Aikuiset

Jos nuorena alkaneet oireet jatkuvat vielä aikuisiässä ja hoidosta on todettu selkeää hyötyä, hoidon jatkaminen aikuisiässä saattaa olla tarkoituksenmukaista. Methylphenidate Mylan -hoidon aloittaminen aikuisille ei sen sijaan ole asianmukaista (ks. kohdat 4.4 ja 5.1).

#### Iäkkäät potilaat

Metyylifenidaattia ei saa käyttää iäkkäille potilaille. Turvallisuutta ja tehoa tässä ikäryhmässä ei ole varmistettu.

#### Alle 6-vuotiaat lapset

Metyylifenidaattia ei saa käyttää alle 6-vuotiaalle lapsille. Turvallisuutta ja tehoa tässä ikäryhmässä ei ole varmistettu.

#### Antotapa

##### *Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletit*

Depottabletti niellään kokonaisena riittävän nestemääränen kera eikä sitä saa pureskella, jakaa eikä murskata (ks. kohta 4.4).

##### *Methylphenidate Mylan 27 mg, 36 mg ja 54 mg depottabletit*

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin. Depottabletti niellään kokonaisena riittävän nestemääränen kera eikä sitä saa pureskella tai murskata (ks. kohta 4.4).

Methylphenidate Mylan -depottabletit voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman (ks. kohta 5.2).

### **4.3 Vasta-aiheet**

- Yliherkkyyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.
- Glaukooma.
- Feokromosytooma.
- Käyttö yhdessä epäselektiivisten irreversiibalien monoamiinioksidaasin (MAO) estäjien käytön kanssa ja vähintään 14 vuorokautta epäselektiivisen irreversiibelin MAO:n estäjän käytön lopettamisen jälkeen, koska seurausena voi olla verenpainekriisi (ks. kohta 4.5).
- Kilpirauhasen liikatoiminta tai tyreotoksikoosi.
- Nykyinen tai aiemmin esiintynyt vaikea masennus, anoreksia nervosa tai muu laihuushäiriö, itsemurhataipumus, psykoottiset oireet, vakavat mielialahäiriöt, mania, skitsofrenia, psykopaattinen tai rajatilapersoonallisuushäiriö.
- Nykyinen tai aiemmin esiintynyt vakava ja jaksoittain ilmenevä (tyypin I) kaksisuuntainen mielialahäiriö (joka ei ole hyvässä hoitotasapainossa).
- Sydän- ja verisuonitaudit, kuten vaikea verenpainetauti, sydämen vajaatoiminta, ahtauttava valtimosairaus, rasitusrintakipu, vaikea hemodynaminen synnynnäinen sydänvika, sydänlihassairaus, sydäninfarkti, mahdollisesti henkeä uhkaavat sydämen rytmihäiriöt ja ionikanavien toimintahäiriöstä johtuvat sairaudet.
- Aivooverenkiertohäiriö, aivovaltimoaneurysma, verisuonipoikkeavuudet mukaan lukien vaskuliitti tai aivohalvaus.

#### **4.4 Varoituukset ja käyttöön liittyvät varotoimet**

Metyylifenidaattihoitoa ei ole tarkoitettu kaikille aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä kärsiville lapsille, ja lääkkeen käyttöä koskevan päätöksen saa tehdä vasta, kun lapsen oireiden valkeus- ja kroonisuusaste suhteessa lapsen ikään on arvioitu huolellisesti.

##### Pitkääikainen käyttö (yli 12 kuukautta) lapsille ja nuorille

Metyylifenidaatin turvallisuutta ja tehoa pitkääikäiskäytössä ei ole arvioitu järjestelmällisesti kontrolloiduissa tutkimuksissa. Metyylifenidaattihoitoa ei saa eikä tarvitse jatkaa rajattomasti. Hoito lopetetaan yleensä murrosiän aikana tai sen jälkeen. Pitkäkestoista lääkehoitoa (yli 12 kuukautta) saavien potilaiden kardiovaskulaarista tilaa, kasvua, ruokahalua, uusien psykkisten häiriöiden ilmenemistä tai aiempien oireiden pahanemista pitää säännöllisesti seurata huolellisesti kohdissa 4.2 ja 4.4 annettujen ohjeiden mukaisesti. Potilaalla tarkkailtavat psykkiset häiriöt on kerrottu seuraavassa ja niitä voivat olla (mutta ne eivät rajoitu vain näihin) motoriset tai äänelliset nykimisoireet (tics), aggressiivinen tai vihamielinen käytös, kiihtyneisyys, ahdistuneisuus, masennus, psykoosi, mania, harhaluulot, ärtyvyys, spontaanisuuden puute, eristäytyminen ja voimakas toimintojen toistelu (perseveratio).

Jos lääkäri päättää jatkaa metyylifenidaatin käyttöä pidemmän aikaa (yli 12 kuukautta) lapsilla ja nuorilla, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, hänen pitää ajottain arvioida lääkevalmisteen pitkääikäiskäytön hyödyllisyyttä potilaskohtaisesti määräämällä taukoja lääkkeen käyttöön, jotta voidaan arvioida potilaan toimintaa ilman lääkehoitoa. Metyylifenidaattihoidon keskeyttämisen vaikutuksia pitäisi tarkastella vähintään kerran vuodessa (mieluiten koulujen loma-aikaan) lapsen oireiden arvioimiseksi. Hoidolla saatu vaikutus saattaa säilyä myös silloin, kun lääkevalmisteen käyttö lopetetaan väliaikaisesti tai kokonaan.

##### Käyttö aikuisille

Aikuisille aloitetun hoidon tai rutinieluonteesi 18 ikävuoden jälkeen jatkettun hoidon turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu. Jos hoidon lopettaminen ei ole onnistunut nuoren täytettyä 18 vuotta, hoidon jatkaminen aikuisiässä saattaa olla tarpeen. Hoidon jatkamisen tarve näillä aikuisilla on tarkistettava säännöllisesti vuosittain.

##### Käyttö iäkkäälle potilaille

Metyylifenidaattia ei saa käyttää iäkkäälle potilaille. Turvallisuutta ja tehoa tässä ikäryhmässä ei ole varmistettu.

##### Käyttö alle 6-vuotiaalle lapsille

Metyylifenidaattia ei saa käyttää alle 6-vuotiaalle lapsille. Turvallisuutta ja tehoa tässä ikäryhmässä ei ole varmistettu.

##### Sydän- ja verisuonitaudit

Kun potilaalle harkitaan stimulanttihoitoa, pitää selvitää tarkasti hänellä mahdollisesti aiemmin todetut sydänsairaudet (mukaan lukien mahdolliset suvussa esiintyneet äkilliset sydänkuolemat, selittämättömät kuolemantapaukset tai malignit rytmihäiriöt) ja potilaalle tehdään lääkärintarkastus mahdollisen sydänsairauden toteamiseksi ja tarvittaessa sydäntautilääkärin lisätutkimuksia, jos alustavat löydökset viittaavat aiemmin sairastettuun tai nyt todettavaan tällaisen sairauden mahdollisuuteen. Jos potilaalla metyylifenidaattihoidon aikana ilmenee sydänsairauteen viittaavia oireita, kuten sydämentykytystä, rasitusrintakipua, selittämätöntä pyörtylyä, hengenahdistusta tai muita oireita, hänet pitää välittömästi ohjata sydäntautilääkärin tutkittavaksi.

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä sairastavilla lapsilla ja nuorilla tehtyjen kliinisten tutkimusten tietojen analyysi osoitti, että metyylifenidaattihoitoa saaneilla potilailla voi yleisesti ilmetä diastolisen ja systolisen verenpaineen yli 10 mmHg:n muutoksia verrattuna verrokkiryhmään. Näiden kardiovaskulaarivaikutusten lyhyen ja pitkän aikavälin merkitystä lasten ja nuorten terveyteen ei tiedetä. Terveydellisten komplikaatioiden mahdollisuutta ei kliinisissä tutkimuksissa havaittujen vaikutusten

perusteella voida sulkea pois etenkään silloin, kun lapsena/nuorena aloitettua hoitoa jatketaan aikuisiässä.  
**Varovaisuutta on noudattava, kun hoide taan potilasta, jonka perussairaus voi paentua verenpaineen tai sydämen syketiheden kohoamisesta johtuen.** Ks. kohdasta 4.3 sairaudet, joissa metyylifenidaattihoito on vasta-aiheista.

**Potilaan kardiovaskulaaris ta tilaa pitää seurata tarkoin. Verenpaine ja sydämen syketiheds kirjataan käyrästölle jokaisen annosmuutoksen yhteydessä ja vähintään kuuden kuukauden välein.**

Metyylifenidaatin käyttö on vasta-aiheista tiettyjen todettujen sydän- ja verisuonitautien yhteydessä, ellei lasten sydänlääkäriä ole konsultoitu (ks. kohta 4.3).

#### **Äkkikuolema ja aiemmin todetut rakenteelliset sydänviat tai muut vakavat sydänsairaudet**

Keskushermosta stimuloivien lääkkeiden tavanomaisten annosten käytön yhteydessä on raportoitu äkkikuolemia lapsilla, joista osalla oli rakenteellinen sydänvika tai muu vakava sydänsairaus. Eräisiin rakenteellisiin sydänvikoihin saattaa lääkityksestä riippumatta liittyä äkkikuoleman suurennutun riski. Silti stimulanttilääkkeiden käyttöä ei suositella lapsille tai nuorille, joilla tiedetään olevan rakenteellinen sydänvika, sydänlihassairaus, vakavia sydämen rytmihäiriöitä, tai muu sydänsairaus, joka saattaa lisätä heidän herkkyyttään stimulanttilääkkeiden sympatomimeettisille vaikutuksille.

#### Väärinkäyttö ja kardiovaskulaariset tapahtumat

Keskushermosta stimuloivien lääkkeiden väärinkäytöön saattaa liittyä äkkikuolemia tai muita vakavia kardiovaskulaarisia haittoja.

#### Aivoverenkiertohäiriöt

Kohdassa 4.3 kerrotaan aivoverenkiertohäiriöistä, joiden yhteydessä metyylifenidaattihoito on vasta-aiheista. Jos potilaalla on muita riskitekijöitä (kuten aiemmin todettu sydän- ja verisuonitauti, samanaikaisesti käytettävä verenpainetta kohottava lääkitys) ja hänen aloitetaan metyylifenidaattihoito, potilaan neurologiset oireet ja merkit pitää arvioida jokaisella lääkärissä käynnillä.

Aivojen verisuonitulehdus näyttää olevan erittäin harvinainen idiosynkraattinen reaktio, joka voi ilmetä kun potilaas altistuu metyylifenidaatille. On vain vähän näyttöä siitä, että suuremman riskin omaavat potilaat voidaan tunnistaa, ja oireiden ilmeneminen voi olla ensimmäinen viittaus taustalla olevaan sairauteen. Aikaisessa vaiheessa tehty diagnoosi, joka perustuu voimakkaaseen epäilyyn, voi mahdollistaa metyylifenidaattioidon nopean lopettamisen ja taudin varhaisen hoidon. Taudin mahdollisuutta pitää punnita jokaisen sellaisen potilaan kohdalla, jolla ilmenee metyylifenidaattioidon aikana uusia neurologisia oireita, jotka sopivat aivoiskemiaan. Tällaisia oireita voivat olla kova päänsärky, tunnottomuus, heikkous, halvaus ja koordinaation, näön, puheen, kielen tai muistin heikentyminen.

**Metyylifenidaattihoito ei ole vasta-aiheista hemiplegistä CP-oireyhtymää sairaastaville.**

#### Psyykkiset häiriöt

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön liittyy usein muita psyykkisiä häiriöitä ja ne on otettava huomioon stimulanttihoitoa määrättääessä. Jos psyykkisiä oireita ilmenee tai aiemmin todetun psyykkisen häiriön oireet pahenevat, metyylifenidaattia ei pidä antaa, elleivät hoidosta saatavat hyödyt ole suuremmat kuin potilaalle mahdollisesti hoidosta aiheutuvat haitat.

**Potilaas on tutkittava uusien tai paheentuneiden psyykkisten häiriöiden varalta jokaisen annosmuutoksen yhteydessä, vähintään kuuden kuukauden välein ja jokaisella lääkärissä käynnillä. Hoidon lopettaminen voi olla asianmukaista.**

#### Psykoottisten tai maanisten oireiden pahaneminen

Metyylifenidaatin antaminen psykoottisille potilaille voi pahentaa käytös- ja ajatushäiriöoireita.

#### Uusien psykoottisten tai maanisten oireiden ilmeneminen

Tavanomaisilla annoksilla metyylifenidaattihoito voi aiheuttaa psykoottisia tai maanisia oireita (näkö/maku/kuuloharhat ja harhaluulot) lapsille ja nuorille, joilla ei aiemmin ole esiintynyt psykoottista sairautta tai maniaa. Jos maanisia tai psykoottisia oireita ilmenee, niiden mahdollinen yhteytys metyylifenidaattiin on otettava huomioon ja hoidon lopettaminen voi olla asianmukaista.

#### Aggressiivisuus tai vihamielinen käytös

Stimulanttihoito voi aiheuttaa uutta tai pahentuvaa aggressiivisuutta tai vihamielistä käytöstä. Metyylifenidaattihoitoa saaneilla potilailla on raportoitu aggressiivisuutta (ks. kohta 4.8). Potilaan huolellinen seuranta aggressiivisen käytöksen tai vihamielisyyden ilmenemisen tai pahenemisen varalta on aiheellista metyylifenidaattioidon alussa, jokaisen annosmuutoksen yhteydessä, vähintään kuuden kuukauden välein ja jokaisella lääkärissä käynnillä. Lääkärin pitää arvioida annostuksen muuttamisen tarve, jos potilaalla ilmenee käytöksen muutoksia, ja huomioitava samalla, että annosta voi olla tarpeen suurentaa tai pienentää. Hoidon keskeyttämistä voidaan harkita.

#### Itsemurhataipumus

Hoitavan lääkärin pitää tutkia välittömästi potilaat, joilla ilmenee itsemurha-ajatuksia tai itsetuhoista käyttäytymistä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön lääkehoidon aikana. Taustalla olevan psyykkisen sairauden pahenemista ja sen mahdollista yhteyttä metyylifenidaattihoitoon pitää pohtia. Taustalla olevan psyykkisen sairauden hoito voi olla tarpeen ja metyylifenidaattioidon mahdollista lopettamista pitää harkita.

#### Nykimishäiriöt (tics)

Metyylifenidaatin käyttöön voi liittyä motorista tai verbaalista nykimistä tai näiden oireiden pahenemista. Touretten oireyhtymän pahenemista on myös raportoitu. Siksi suvussa mahdollisesti esiintyneet oireet on arvioitava ja lapsi on arvioitava klinisesti nykimisoireiden ja Touretten oireyhtymän varalta ennen metyylifenidaattilääkityksen käyttöä. Potilaita on seurattava säännöllisesti uusien tai pahenevien nykimisoireiden varalta metyylifenidaattioidon aikana. **Seuranta on aiheellista jokaisen annosmuutoksen yhteydessä ja vähintään kuuden kuukauden välein tai jokaisella lääkärissä käynnillä.**

#### Ahdistuneisuus, kiihyneisyys tai jännittyneisyys

Metyylifenidaattihoitoa saaneilla potilailla on raportoitu ahdistuneisuutta, kiihyneisyyttä ja jännittyneisyyttä (ks. kohta 4.8). Metyylifenidaatin käyttöön voi liittyä myös ahdistuneisuuden, kiihyneisyyden tai jännittyneisyyden pahenemista, ja ahdistuneisuus johti joillakin potilailla metyylifenidaattioidon lopettamiseen. Potilaat on arvioitava klinisesti ahdistuneisuuden, kiihyneisyyden ja jännittyneisyyden varalta ennen metyylifenidaattilääkityksen käyttöä. **Potilaita on seurattava säännöllisesti uusien tai paheenvien oireiden varalta hoidon aikana, jokaisen annosmuutoksen yhteydessä ja vähintään kuuden kuukauden välein tai jokaisella lääkärissä käynnillä.**

#### Kaksisuuntaisen mielialahäiriön muodot

Metyylifenidaatin käytössä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön hoitoon on oltava erityisen varovainen, jos potilaalla on samanaikainen kaksisuuntainen mielialahäiriö (mukaan lukien hoitamaton tyypin I kaksisuuntainen mielialahäiriö tai muu kaksisuuntainen mielialahäiriön muoto), koska tällaisilla potilailla sekamuotoisen tai maanisen jakson nopea kehittyminen on mahdollista. Ennen metyylifenidaattioidon aloittamista potilaat, joilla on samanaikaisia masennusoireita, pitäisi tutkia riittävän tarkasti sen selvittämiseksi, onko heillä kaksisuuntaisen mielialahäiriön riski. Tällaiseen tutkimukseen pitäisi kuulua yksityiskohtainen psykiatristen taustatietojen, kuten suvussa aiemmin esiintyneiden itsemurhien, kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja masennuksen, tarkka selvittäminen. **Näiden potilaiden tarkka ja säännöllisesti seuranta on erittäin tärkeää (ks. kohta Psyykkiset häiriöt ja kohta 4.2).** Potilaita on seurattava oireiden varalta jokaisen annosmuutoksen yhteydessä, vähintään kuuden kuukauden välein ja jokaisella lääkärissä käynnillä.

#### Kasvu

Lapsilla on metyylifenidaatin pitkäaikaiskäytön yhteydessä ilmoitettu hieman hidastunutta painonkehitystä ja pituuskasvun hidastumista.

Metyylifenidaatin vaikutusta lapsen lopulliseen pituuteen ja painoon ei tiedetä ja sitä tutkitaan parhaillaan.

**Potilaan kasvua pitää seurata metyylifenidaattioidon aikana, ja pituus, paino ja ruokahalu pitää kirjata vähintään kuuden kuukauden välein lapsen kasvukäyrän töön.** Jos potilas ei kasva tai hänen painonsa ei nouse odotusten mukaisesti, hoito voidaan joutua tilapäisesti keskeyttämään.

### Kouristuskohtaukset

Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä metyylifenidaattia epilepsiaa sairastaville. Metyylifenidaatti saattaa madaltaa kouristuskynnystä potilailla, joilla on aiemmin esiintynyt kouristuksia, potilailla, joilla on ollut EEG-poikkeamia ilman kouristuskohtauksia, ja harvoin potilailla, joilla ei ole ollut kouristuskohtauksia tai EEG-poikkeamia. Jos kouristuskohtauksia ilmenee aiempaa useammin tai ensimmäistä kertaa, metyylifenidaatin käyttö on lopettava.

### Priapismi

Metyylifenidaattivalmisteiden käytön yhteydessä on saatu ilmoituksia pitkittyneistä ja kivuliaista erektoista etenkin muutettaessa metyylifenidaattihoito-ohjeimaa. Potilaiden, joille kehittyy poikkeuksellisen pitkään kestäviä tai toistuvia ja kivuliaita erektoita, olisi hakeuduttava välittömästi hoitoon.

### Käyttö serotonergisten lääkkeiden kanssa

Serotoniinioireyhtymää on raportoitu käytettäessä metyylifenidaattia yhdessä serotonergisten lääkkeiden kanssa. Jos metyylifenidaatin käyttö yhdessä serotonergisten lääkeaineiden kanssa on perusteltua, serotoniinioireyhtymän oireiden aikainen tunnistaminen on tärkeää. Oireita saattavat olla psyykkisen tilan muutokset (esim. agitaatio, hallusinaatiot, kooma), autonomisen hermoston epävakaus (esim. takykardia, verenpainemuutokset, hypertermia), hermo-lihastoiminnan poikkeavuudet (esim. hyperrefleksia, koordinaatiokyvyn heikkeneminen, jäykkyys), ja/tai ruuansulatuskanavan oireet (esim. pahoinvointi, oksentelu, ripuli). Jos serotoniinioireyhtymää epäillään, metyylifenidaattihoito pitää lopettaa niin pian kuin mahdollista.

### Väärinkäyttö, virheellinen käyttö ja päihdekäyttöön luovuttaminen

Potilaita pitää seurata tarkoin metyylifenidaatin mahdollisen päihdekäyttöön luovuttamisen, virheellisen ja väärinkäytön riskin varalta.

Metyylifenidaattia pitää käyttää varoen potilaille, joilla on todettu lääkeaine- tai alkoholiriippuvuus, koska käyttöön voi liittyä väärinkäytön, virheellisen käytön ja päihdekäyttöön luovuttamisen mahdollisuus.

Pitkääikainen metyylifenidaatin väärinkäyttö voi aiheuttaa huomattavan toleranssin ja psyykkistä riippuvuutta, johon liittyy eriasteista epänormaalista käyttäytymistä. Psykoottisia episodeja voi ilmetä, etenkin parenteraalisen väärinkäytön yhteydessä.

Potilaan ikä, väärinkäyttöön liittyvät riskitekijät (kuten samanaikaisesti sairastettava uhmakkuus- tai käytöshäiriö ja kaksisuuntainen mielialahäiriö), aiempi tai nykyinen päähteiden väärinkäyttö pitäisi ottaa huomioon, kun harkitaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön hoitovaihtoehtoja.

Tunne-elämältään epävakaiden, kuten aiemmin lääke- tai alkoholiriippuvuudesta kärsineiden potilaiden kohdalla on noudatettava varovaisuutta, koska tällaiset potilaat saattavat suurentaa annosta oma-aloitteisesti.

Metyylifenidaatti ja muut stimulantit eivät välttämättä sovi sellaisille potilaille, joilla on suuri päähteiden väärinkäytön riski ja heidän kohdallaan pitää harkita muuta kuin stimulanttihoitoa.

### Hoidon lopettaminen

Lääkehoidon lopettamista on seurattava tarkoin, koska se voi tuoda esiin taustalla olevan masennuksen samoin kuin kroonisen ylivilkkauden. Jotkut potilaat saattavat tarvita pitkääikaista seurantaa.

Väärinkäytön lopettamista on seurattava tarkoin, koska vaikeaa masennusta voi ilmetä.

## Väsymystilat

Metyylifenidaattia ei saa käyttää normaalien väsymystilojen ehkäisyyn eikä hoitoon.

## Metyylifenidaattilääkemuodon valinta

Hoitava lääkäri valitsee hoitoon käytettävän metyylifenidaattivalmisteen ja lääkemuodon potilaskohtaisesti, ja valinta riippuu vaikutuksen halutusta kestosta.

## Lääkeaineiden seulonta

Tämä valmiste sisältää metyylifenidaattia, joka voi aiheuttaa väärän positiivisen tuloksen amfetamiineille laboratoriokokeissa ja erityisesti immuunimääritysseulontatesteissä.

## Munuaisten ja maksan vajaatoiminta

Metyylifenidaatin käytöstä potilaille, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, ei ole kokemusta.

## Hematologiset vaikutukset

Metyylifenidaatin turvallisuutta pitkäaikaiskäytössä ei täysin tunneta. Jos potilaalle kehittyy leukopenia, trombosytopenia, anemia tai muita muutoksia, kuten vakavaan munuais- tai maksasairauuteen viittavia muutoksia, hoidon keskeyttämistä pitää harkita.

## Maha-suolikanavan tukkeumat

Koska metyylifenidaattitabletti ei muotoudu eikä juurikaan muuta muotoaan maha-suolikanavassa, sitä ei tavallisesti pidä antaa potilaille, joiden maha-suolikanavassa on vaikea ahtauma (sairauden tai hoidon vuoksi) tai joilla on dysfagia tai huomattavia vaikeuksia niellä tabletteja. Harvinaisissa tapauksissa potilailla, joilla on todettu kuroumia, on ilmoitettu ahtaumaoireita muotoutumattomien depot-valmisteiden käytön yhteydessä.

## *Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletit*

Koska kyseessä on depottabletti, Methylphenidate Mylan -valmistetta saa antaa ainoastaan potilaille, jotka kykenevät nielemään tabletin kokonaisen. Potilaille pitää kertoa, että Methylphenidate Mylan on nieltävä kokonaisen nesteen kera. Tabletteja ei saa pureskella, jakaa eikä murskata.

## *Methylphenidate Mylan 27 mg, 36 mg ja 54 mg depottabletit*

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin. Potilaille pitää kertoa, että Methylphenidate Mylan on nieltävä nesteen kera. Tabletteja ei saa pureskella tai murskata.

## Methylphenidate Mylan sisältää sakkaroosia ja natriumia:

Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, glukoosi-galaktoosi imetyymishäiriö tai sakkaroosi-isomaltaasin vajaatoimintaa, ei tule käyttää tästä lääkettä.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

## **4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset**

### Farmakokineettiset yhteisvaikutukset

Ei tiedetä, miten metyylifenidaatti saattaa vaikuttaa samanaikaisesti annettavien lääkkeiden pitoisuksiin plasmassa. Varovaisuutta on siksi syytä noudattaa, kun metyylifenidaattia käytetään yhdessä muiden lääkkeiden kanssa ja erityisesti silloin, jos näiden lääkkeiden terapeutinen alue on kapea.

Sytokromi P450-entsyymit eivät osallistu metyylifenidaatin metabolismiin kliinisesti merkittävässä määrin. Sytokromi P450:n indusorien ja estäjien ei odoteta vaikuttavan merkittävästi metyylifenidaatin farmakokinetiikkaan. Käanteisesti metyylifenidaatin d- ja l-enantiomeerit eivät myöskään merkittävästi estä sytokromi P450 1A2:ta, 2C8:ta, 2C9:ta, 2C19:ta, 2D6:ta, 2E1:ta tai 3A:ta.

On kuitenkin olemassa viitteitä siitä, että metyylifenidaatti saattaa estää kumariiniantikoagulantien, antikonvulsantien (esim. fenobarbitaalin, fenytoiinin, primidonin) ja joidenkin masennuslääkkeiden (trisyklisten masennuslääkkeiden ja selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien) metabolismia. Kun metyylifenidaattihoito aloitetaan tai lopetetaan, voi olla tarpeen muuttaa näiden samanaikaisesti käytettävien lääkkeiden annostusta ja määrittää plasman lääkeaineepitoisuus (ja kumariinin osalta hyytymisajan).

### Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset

#### *Verenpainelääkkeet*

Metyylifenidaatti voi heikentää verenpainelääkkeiden vaikutusta.

#### *Käyttö verenpainetta kohottavien lääkkeiden kanssa*

Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä metyylifenidaattia muiden myös verenpainetta kohottavien lääkkeiden kanssa (ks. myös kohdat joissa kerrotaan kardiovaskulaarisista ja aivoverenkierthäiriöistä kohdassa 4.4).

Mahdollisen verenpaineekriisiin vaaran vuoksi metyylifenidaatin käyttö on vasta-aiheista potilaille, joita hoidetaan (parhaillaan tai edeltävien kahden viikon aikana) epäselektiivisillä irreversiibeleillä MAO:n estäjillä (ks. kohta 4.3).

#### *Alkoholi*

Alkoholi voi pahentaa psykoaktiivisten lääkevalmisteiden, myös metyylifenidaatin, keskushermostoon kohdistuvia haittavaikutuksia. Siksi potilaiden on suositeltavaa olla käytämättä alkoholia hoidon aikana.

#### *Käyttö serotonergisten lääkkeiden kanssa*

Serotoninioireyhtymää on raportoitu käytettäessä metyylifenidaattia yhdessä serotonergisten lääkkeiden kanssa. Jos metyylifenidaatin käyttö yhdessä serotonergisten lääkeaineiden kanssa on perusteltua, serotoninioireyhtymän oireiden aikainen tunnistaminen on tärkeää (ks. kohta 4.4). Jos serotoninioireyhtymää epäillään, metyylifenidaattihoito pitää lopettaa niin pian kuin mahdollista.

#### *Halogenoidut anesteetit*

Kirurgisen toimenpiteen aikana on verenpaineen äkillisen kohoamisen riski. Jos potilaalle on suunniteltu kirurginen toimenpide, metyylifenidaattihoito pitäisi keskeyttää toimenpidepäiväksi.

#### *Keskushermostoon vaikuttavat alfa-2-agonistit (esim. klonidiini)*

Metyylifenidaatin ja klonidiinin tai muiden keskushermostoon vaikuttavien alfa-2-agonistien yhteiskäytön pitkääikaista turvallisuutta ei ole järjestelmällisesti arvioitu.

#### *Dopaminergiset lääkkeet*

Varovaisuutta suositellaan noudatettavaksi, kun metyylifenidaattia käytetään samanaikaisesti dopaminergisten lääkkeiden, kuten psykoosilääkkeiden, kanssa.

Koska metyylifenidaatin hallitseva vaikutusmekanismi on solun ulkopuolisen dopamiinipitoisuuden kohottaminen, metyylifenidaatin käyttöön saattaa liittyä farmakodynaamisia yhteisvaikutuksia, kun sitä annetaan samanaikaisesti suorien ja epäsuorien dopamiiniagonistien kanssa (mukaan lukien dopa ja trisykliset masennuslääkkeet) tai yhdessä dopamiiniantagonisteja sisältävien psykoosilääkkeiden kanssa.

## **4.6 He delmällisyys, raskaus ja imetyys**

#### Raskaus

Tulokset kohorttitutkimuksesta, joka käsitti noin 3 400 ensimmäisellä kolmanneksella altistunutta raskautta, eivät viittaa synnynnäisten poikkeavuuksien riskin lisääntymiseen kaiken kaikkiaan. Sydämen epämuodostumien esiintyvyys lisääntyi hieman altistumattomiin raskauksiin verrattuna (yhdistetty korjattu suhteellinen riski 1,3; 95 %:n luottamusväli 1,0–1,6). Esiintyvyyden lisääntyminen vastaa kolmea lasta, joilla

on synnynnäinen sydämen epämuodostuma, jokaista metyylifenidaattia ensimmäisellä raskauskolmanneksella saanutta 1 000:tta naista kohden.

Vastaanoton kardiorespiratorista toksisuutta ja erityisesti sikiön takykardiaa ja hengitysvaikeuksia on ilmoitettu spontaaniraporteissa.

Eläinkokeet osoittavat reproduktiivista toksisuutta vain emolle toksisilla annoksilla (ks. kohta 5.3).

Metyylifenidaatin käyttöä ei suositella raskauden aikana, ellei lääkäri totea hoidon siirtämisen saattavan aiheuttaa suuremman riskin raskaudelle.

#### Imetsys

Metyylifenidaatti erittyy ihmisen rintamaitoon. Viiden äidin rintamaitonäytteistä tehtyjen raporttien perusteella imetettävän lapsen ihmisen rintamaidon metyylifenidaattipitoisuudesta saama annos oli 0,16–0,7 % äidin painonmukaisesta annoksesta, ja rintamaidon ja äidin plasman välinen suhde oli 1,1–2,7.

Yhdessä tapauksessa imeväisikäisellä lapsella todettiin yksilöimätöntä painon laskua altistuksen aikana, mutta lapsi toipui ja paino nousi sen jälkeen, kun äiti lopetti metyylifenidaattihoidon. Mahdollista riskiä imetettävälle lapselle ei voida sulkea pois.

Päättös lopettaa imettäminen tai lopettaa metyylifenidaattihoidoita tai pidättyä metyylifenidaattihoidosta on tehtävä ottaen huomioon imetyksestä koituva hyöty lapselle ja lääkehoidosta koituva hyöty äidille.

#### Hedelmällisyys

Nonkliinisissä tutkimuksissa ei havaittu ollenaisia vaikutuksia.

### **4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn**

Metyylifenidaatti voi aiheuttaa huimausta, uneliaisuutta ja näköhäiriötä, mukaan lukien akkommodatiovaikeuksia, kahtena näkemistä ja näön hämärtymistä. Sillä voi olla kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Potilaasta pitää varoittaa näistä mahdollisista vaikutuksista ja häntä on kehotettava välttämään mahdollisesti vaaraa aiheuttavia toimia, kuten ajamista tai koneiden käyttöä, jos hänellä ilmenee tällaisia vaikutuksia.

### **4.8 Haimavaikutukset**

Seuraavaan taulukkoon on sisällytetty lapsilla, nuorilla ja aikuisilla tehdyissä metyylifenidaatin kliinisissä tutkimuksissa havaitut ja myyntiluvan saamisen jälkeisen käytön yhteydessä ilmoitetut haimavaikutukset ja muilla metyylifenidaattihydrokloridivalmisteilla ilmoitetut haimavaikutukset. Jos metyylifenidaatti-depottableilla ilmoitettujen ja metyylifenidaattivalmisteilla ilmoitettujen haimavaikutusten esiintymistihyeissä oli eroja, valittiin molemmista tietokannoista se, jossa esiintymistihyes oli suurempi.

Haimavaikutusten esiintymistihyes määritellään seuraavasti:

Hyvin yleinen:	$\geq 1/10$
Yleinen:	$\geq 1/100, <1/10$
Melko harvinainen:	$\geq 1/1\ 000, <1/100$
Harvinainen:	$\geq 1/10\ 000, <1/1\ 000$
Hyvin harvinainen:	$<1/10\ 000$
Tuntematon:	koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin

Elinjärjestelmä	Haimavaikutus					
	Esiintymistihyes					
	Hyvin yleinen	Yleinen	Melko harvinainen	Harvinainen	Hyvin harvinainen	Tuntematon

<b>Infektiot</b>		Naso-faryngiitti, ylähengitystieinfekcio <sup>#</sup> sinuiitti <sup>#</sup>				
<b>Veri ja imukudos</b>					Anemia <sup>†</sup> , leukopenia <sup>†</sup> , trombosytopenia, trombosytopeeninen purppura	Pansytopenia
<b>Immuunijärjestelmä</b>			Yliherkkyysreaktiot, kuten angioedeema, anafylaktiset reaktiot, aurikulaarin turvotus, vesikellot, hilseilyoireet, nokkosihottuma, kutina, ihottumat ja äkillinen ihottuma			
<b>Aineenvaihdunta ja ravitsemus*</b>		Ruoka-haluttomuus, heikentynyt ruokahalu <sup>†</sup> , hieman heikentynyt painonkehitys ja pituuskasvun hidastuminen pitkääikaikäytössä lapsilla*				
<b>Psykkiset häiriöt*</b>	Unetto-muus, hermos-tuneisuus	Tunteiden epävakaus, aggressio*, kiihyneisyys*, ahdistuneisuus*†, masennus*#, ärtyneisyys, poikkeava käytös, mielialan vaihtelut,	Psykoottiset häiriöt*, kuulo-, näkö- ja tuntoharhat*, vihaisuus, itsemurha-ajatukset*, mielialan muutos, levottomuus†, itkuisuus, nykimis-	Mania*†, des-orientaatio, sukuvielin häiriö, sekavuus-tila†	Itsemurharytys (myös toteutunut itsemurha)*†, ohimenevä masentuneisuus, poikkeavat ajatukset, apatia†, itseään toistava käytös, ylikeskittyminen	Harhat*†, ajatushäiriöt*, riippuvuus. Väärinkäyttö ja riippuvuutta on raportoitu, useammin välittömästi lääkeainetta vapautta-

		nykimis-oireet*, hoidon alussa esiintyvä unettomuus#, alakuloisuus#, heikentynyt sukupuoli-vietti#, jännitty-neisyys#, bruksismi#, paniikki-kohaus#	oireiden tai Touretten oireyhtymän pahene-minen*, logorrea, liika-valppaus, unihäiriö			villa lääke-muodoilla.
<b>Hermosto</b>	Päänsärky	Heite-huimaus, dyskinesia, psyko-motorinen hyper-aktiivisuus, uneliaisuus, parestesiat#, jännitys-päänsärky#	Sedaatio, vapina†, letargia#		Kouristukset, koreo-atetoottiset liikkeet, iskemiasta johtuva, palautuva neurologinen puutostila (RIND), maligni neurolepti-oireyhtymä (NMS; raportit oli huonosti dokumentoitut ja useimmissa tapauksissa potilaat saivat myös muita lääkkeitä, joten metyyli-fenidaatin vaikutus on epäselvä).	Aivoveren-kierto-häiriöt *† (kuten vaskuliitti, aivoveren-vuoto, aivoveren-kierto-tapahtumat, aivo-valtimotulehdus, aivo-valtimotukos), Grand mal -kouristuk-set*, migreeni†
<b>Silmät</b>		Silmän mukautumiskyvyn häiriöt#	Näön hämärtyminen†, kuivat silmät#	Akkomo-daatio-vaikeudet, näkökyvyn heikkene-minen, kahtena näkeminen		Mydriasi
<b>Kuulo ja tasapainoelin</b>		Kierto-huimaus (vertigo) #				
<b>Sydän</b>		Rytmihäiriö, takykardia, sydämen-	Rintakipu	Rasitus-rintakipu	Sydän-pysähdyks, sydäninfarkti	Supra-ventri-kulaarinen

		tykytys				takykardia, brady- kardia, kammio- lisälyönnit <sup>†</sup> , lisälyönnit <sup>†</sup>
<b>Verisuonisto</b>		Kohonnut verenpaine	Kuumat aallot <sup>#</sup>		Aivovaltimotulehdus ja/tai -tukos, raajojen kylmyys <sup>†</sup> , Raynaud'n oireyhtymä	
<b>Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina</b>		Yskä, suunielun kipu	Hengen-ahdistus <sup>†</sup>			
<b>Ruoansulatus-elimistö</b>		Ylävatsa- kipu, ripuli, pahoinvointi <sup>†</sup> , vatsavaivat, oksentelu, suun kuivuminen <sup>†</sup> , ruoansulatus- häiriöt <sup>#</sup>	Ummetus <sup>†</sup>			
<b>Maksa ja sappi</b>		Suurentunut alaniini-aminotransfераasipitoisuus <sup>#</sup>	Maksentesyyymi- arvojen nousu		Poikkeava maksan toiminta, kuten akuutti maksan vajaatoiminta tai maksakooma, veren suurentunut alkaliini-fosfataasiarvo, veren bilirubiini- arvon nousu <sup>†</sup>	
<b>Iho ja ihonalainen kudos</b>		Hiustenlähtö, kutina, ihottuma, nokkos-ihottuma	Angio- edeema, vesirakkulat, hilseilyoireet	Liika- hikoilu <sup>†</sup> , makulaarin en ihottuma, eryteema	Erythema multiforme, hilseilevä ihotulehdus, samoilla ihoalueilla toistuva lääkeihottuma	
<b>Luusto, lihakset ja sidekudos</b>		Nivelkipu, lihasten kireys <sup>#</sup> , lihas-kouristikset <sup>#</sup>	Lihaskipu <sup>†</sup> , lihas-nykäykset		Lihaskrampit	Leukalukko

Munuaiset ja virtsatiet			Verivirtsaisuus, tihävirtsaaminen			Virtsainkon-tinenssi
Sukupuolielimet ja rinnat		Erektio-häiriöt <sup>#</sup>		Gynekomastia		Priapismi, erektioiden lisääntymisen ja pitkittynyt erektio
Yleisoireet ja antipaikassa todettavat haitat		Kuumet, kasvun hidastuminen pitkäkestoisen käytön yhteydessä lapsilla*, väsymys <sup>†</sup> , ärtymys <sup>#</sup> , hermostuneisuuden tunne <sup>#</sup> , voimatto-muus <sup>#</sup> , jano <sup>#</sup>	Rintakipu		Äkillinen sydänkuolema*	Rintakehän vaivat <sup>†</sup> , erittäin korkea kuume
Tutkimukset		Veren-paineen ja sydämen sykkeen muutokset (yleensä kohoa-minen)*, painon lasku*	Sydämen sivuääni*		Verihiutaleiden määrän pienentäminen, valkosolu-määrän poikkeama	

\* Ks. kohta 4.4

# Esiintyvyys todettu aikuisilla tehdyissä kliiniseissä tutkimuksissa eikä lapsiin ja nuoriin perustuvista tiedoista, mutta saattaa olla oleellinen myös lasten ja nuorten osalta.

† Esiintyvyys todettu lapsilla ja nuorilla tehdyissä kliiniseissä tutkimuksissa ja raportoitu yleisemmin kuin aikuisilla potilailla tehdyissä kliiniseissä tutkimuksissa.

#### Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisten hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Tervydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

## **4.9 Yliannostus**

Metyylifenidaatin pitkäkestoinen vapautuminen pitkäkestoisesti vaikuttavasta lääkemuodosta pitää ottaa huomioon yliannostusta hoidettaessa.

### **Merkit ja oireet**

Pääasiassa keskushermiston ja sympaattisen hermoston ylikiihottumisesta johtuvia akuutin yliannostuksen oireita voivat olla oksentelu, agitaatio, vapina, hyperrefleksia, lihasten nykiminen, kouristukset (joita voi seurata kooma), euforia, sekavuus, aistiharhat, delirium, hikoilu, kasvojen punoitus, päänsärky, hyvin korkea kuume, takykardia, sydämentykytys, sydämen rytmihäiriöt, hypertensio, silmien mustuaisten laajeneminen ja limakalvojen kuivuminen.

### **Hoito**

Metyylifenidaatin yliannostuksen hoitoon ei ole erityistä vasta-ainetta.

Hoito käsittää asianmukaiset elintoimintoja tukevat toimenpiteet.

Potilasta on suojahtava itse aiheutetuista vammoilta ja ulkoisilta ärsykeiltä, jotka voisivat lisätä ylikiihottuneisuutta entisestään. Aktiivihiilen tehoa ei ole varmistettu.

Tehohoitoa on annettava riittävän verenkierron ja hengityksen ylläpitämiseksi; hyvin korkea kuume saattaa vaatia potilaan viilentämistä ulkoisesti.

Peritoneaalidialyyzin tai hemodialyyzin tehoa metyylifenidaatin yliannostuksen hoidossa ei ole osoitettu.

## **5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET**

### **5.1 Farmakodynamiikka**

Farmakoterapeutinen ryhmä: Masennuslääkkeet; keskushermosta stimuloivat lääkeaineet; ADHD:n hoitoon käytettävä lääke ja nootrooppiset aineet; keskushermostoon vaikuttavat symptomimeetit, ATC-koodi: N06BA04

### **Vaikutusmekanismi**

Metyylifenidaatti on keskushermosta lievästi stimuloiva aine. Hoidollista vaikutusmekanismia tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) yhteydessä ei tunneta. Metyylifenidaatin oletetaan estävän noradrenaliinin ja dopamiinin takaisinottoa presynaptiseen hermosoluun ja lisäävän näiden monoamiinien vapautumista hermosolujen soluvätilaan. Metyylifenidaatti on raseeminen seos, joka koostuu d- ja l-isomeereistä. D-isomeeri on farmakologisesti aktiivisempi kuin l-isomeeri.

### **Kliininen teho ja turvallisuus**

Kliinisissä pivotalitutkimuksissa metyylifenidaattia arvioitiin 321 potilaalla, joiden tila oli jo saatu tasapainoon väliittömästi lääkeainetta vapauttavilla metyylifenidaattivalmisteilla, sekä 95 potilaalla, jotka eivät olleet aiemmin saaneet hoitoa väliittömästi lääkeainetta vapauttavilla metyylifenidaattivalmisteilla.

Kliinisissä tutkimuksissa metyylifenidaatin vaikutusten osoitettiin säilyvän 12 tuntia lääkkeen ottamisesta, kun valmistetta otettiin kerran vuorokaudessa aamuisin.

Kahdeksansataayhdeksänkymmentähdeksän (899) iältään 18–65-vuotiasta aikuista, joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD), oli mukana kolmessa kaksoissokkoutetussa lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa 5–13 viikon ajan. Metyylifenidaatilla on osoitettu jonkin verran lyhytkestoista tehoa annosvälillä 18–72 mg/vrk, mutta tästä ei ole osoitettu yhdenmukaisesti pidempään kuin 5 viikon ajan.

Yhdessä tutkimuksessa vasta määritettiin ADHD-oireita kuvaavien Conners' Adult ADHD Rating Scales (CAARS) -kokonaispisteiden vähenemiseksi vähintään 30 % lähtötilanteesta viikolla 5 (pääätetapahtuma) ja

analyysi tehtiin siten, että potilaan ei katsottu saaneen vastetta, jos hänen tietonsa puuttuivat loppukäynnillä. Tässä tutkimuksessa huomattavasti suurempi osuus potilaista sai vasteen metyylifenidaattiin annoksilla 18, 36 tai 72 mg/vrk lumelääkkeeseen verrattuna. Kun analyysi tehtiin kahdessa muussa tutkimuksessa siten, että potilaan ei katsottu saaneen vastetta, jos hänen tietonsa puuttuivat loppukäynnillä, metyylifenidaatti oli numeroisesti parempi verrattuna lumelääkkeeseen, mutta ennalta määritetyjen vastekriteerien saavuttaneiden potilaiden osuudessa ei ollut tilastollisesti merkitsevä eroa metyylifenidaatin ja lumelääkkeen välillä.

## 5.2 Farmakokinetiikka

### *Imeytyminen*

Metyylifenidaatin imetytyminen on tehokasta. Suun kautta otetun kerta-annoksen jälkeen lääkevalmiste (depotvalmiste, jossa on välittömän vapautumisen vaihe ja hitaan vapautumisen vaihe) vapauttaa metyylifenidaattia kaksivaiheisesti. Välittömästi lääkeainetta vapauttava komponentti saa aikaan ensimmäisen plasman huippupitoisuuden 1,35 tunnin kuluttua ja lääkeainetta hitaasti vapauttava osa saa aikaan toisen plasman huippupitoisuuden noin 5,30 tunnin kuluttua. Depotmuotoisen metyylifenidaattivalmisten ottaminen kerran vuorokaudessa vähentää huippu- ja vähimmäispitoisuuden välistä vaihtelua, joka liittyy kolmesti vuorokaudessa otettavan ei-depotmuotoisen metyylifenidaatin käyttöön. Kerran vuorokaudessa otettavan depotvalmisten imetyymisaste on yleisesti verrattavissa tavallisiiin ei-depotmuotoisiin valmisteisiin.

Bioekvivalentitutkimusten mukaan metyylifenidaattihydrokloridi 54 mg depottabletit ovat bioekvivalentteja alkuperäisvalmisteen (Concerta® 54 mg depottabletit) kanssa. Tämän voidaan katsoa koskevan myös muita tuoteperheen vahvuksia.

Kun metyylifenidaattia annettiin paasto-olosuhteissa 54 mg kerran vuorokaudessa 52 aikuiselle, keskimääriiset farmakokineettiset muuttujat olivat seuraavat:  $AUC_{(0-2,5\text{ h})}$  12,95 ng/ml\*h ja  $AUC_{(2,5-24\text{ h})}$  97,583 ng/ml\*h,  $C_{\max(0-2,5\text{ h})}$  6,6 ng/ml ja  $C_{\max(2,5-24\text{ h})}$  11,2 ng/ml,  $t_{\max(0-2,5\text{ h})}$  1,4 h ja  $t_{\max(2,5-24\text{ h})}$  5,3 h.

Kun metyylifenidaattia annettiin kerta-annoksina aikuisille 18, 36 ja 54 mg/vrk, metyylifenidaatin  $C_{\max}$  ja  $AUC_{(0-\infty)}$  olivat annosriippuvaisia.

### *Jakautuminen*

Suun kautta otetun metyylifenidaatin pitoisuus plasmassa pienenee aikuisilla bieksponentiaalisesti. Kun metyylifenidaattia otettiin suun kautta, metyylifenidaatin puoliintumisaika oli aikuisilla noin 3,5 tuntia. Metyylifenidaatin ja sen metaboliittien proteiineihin sitoutuva osuus on noin 15 %. Metyylifenidaatin ilmeinen jakautumistilavuus on noin 13 litraa/kg.

### *Biotransformaatio*

Metyylifenidaatti metaboloituu ihmisellä pääasiassa de-esterifioitumalla alfa-fenyylipiperidiinietikkahapaksi (PPA, noin 50-kertaisesti muuttumattoman lääkeaineen määrä), jonka farmakologinen aktiivisuus on vähäinen tai olematon. Aikuisilla kerran vuorokaudessa otetun metyylifenidaatin metabolismi PPA:ksi metaboloitumisen osalta samanlainen kuin kolmesti vuorokaudessa otetun metyylifenidaatin. Metyylifenidaatin metabolismi on samanlainen kerta-annoksen ja toistuvina annoksina otettuna.

### *Eliminaatio*

Aikuisilla metyylifenidaatin eliminaation puoliintumisaika oli metyylifenidaattianoksen jälkeen noin 3,5 tuntia. Suun kautta otetun annoksen jälkeen noin 90 % annoksesta erityi metaboliitteina virtsaan ja 1–3 % ulosteisiin 48–96 tunnin aikana. Virtsassa todettiin pieniä määriä (alle 1 %) muuttumatonta metyylifenidaattia. Virtsan kautta erityvä päämetaboliitti on alfafenyylipiperidiinietikkahaappo (60–90 %).

Kun ihmisille annettiin suun kautta radioaktiivisesti merkittyä metyylifenidaattia, noin 90 % radioaktiivisuudesta erityi virtsaan. Pääasiallinen metaboliitti virtsassa oli PPA, jonka osuus oli noin 80 % annoksesta.

### *Ruoan vaikutus*

Kun potilaille annettiin metyylifenidaattia rasvaisen aamiaisen jälkeen tai tyhjään mahaan, ei lääkkeen farmakokinetiikassa eikä farmakodynamiikassa havaittu muutoksia.

### Erityisryhmät

#### *Sukupuoli*

Terveillä aikuisilla metyylifenidaatin annokseen suhteutetun AUC<sub>(0-∞)</sub>:n keskiarvo oli miehillä 36,7 ng h/ml ja naisilla 37,1 ng h/ml eikä näiden kahden ryhmän välillä havaittu eroja.

#### *Rotu*

Terveillä aikuisilla, jotka saivat metyylifenidaattia, annokseen suhteutettu AUC<sub>(0-∞)</sub>-arvo oli samanlainen eri etnisissä ryhmissä; otos on kuitenkin saattanut olla riittämätön, jotta etnisten ryhmien välinen farmakokineettinen vaihtelu olisi havaittu.

#### *Pediatriset potilaat*

Metyylifenidaatin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu alle 6-vuotiailla lapsilla. 7–12 -vuotiailla lapsilla metyylifenidaatti-annosten farmakokinetiikka (keskiarvo±keskijahonta) oli 18 mg:n annoksen jälkeen C<sub>max</sub> 6,0±1,3 mg/ml, T<sub>max</sub> 9,4±0,02 h, ja AUC<sub>0-11,5</sub> 50,4±7,8; 36 mg:n annoksen jälkeen C<sub>max</sub> 11,3±2,6 mg/ml, T<sub>max</sub> 8,1±1,1 h, ja AUC<sub>0-11,5</sub> 87,7±18,2; 54 mg:n annoksen jälkeen C<sub>max</sub> 15,0±3,8 mg/ml, T<sub>max</sub> 9,1±2,5 h, ja AUC<sub>0-11,5</sub> 121,5±37,3.

#### *Munuaisten vajaatoiminta*

Metyylifenidaatin käytöstä munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ei ole kokemusta. Ihmisille suun kautta annettu radioaktiivisesti merkitty metyylifenidaatti metaboloitui laajalti ja noin 80 % radioaktiivisuudesta erityi virtsaan PPA:na. Koska munuaispuhdistuma ei ole tärkeä metyylifenidaatin puhdistuman kannalta, munuaisten vajaatoiminnan oletetaan vaikuttavan vain vähän metyylifenidaatin farmakokinetiikkaan.

#### *Maksan vajaatoiminta*

Metyylifenidaatin käytöstä maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ei ole kokemusta.

### **5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta**

#### Karsinogeenisuus

Rotalla ja hiirellä tehdyyissä elinikäisissä karsinogeenisuustutkimuksissa havaittiin pahanlaatuisten maksakasvaimien lisääntymistä vain uroshiirollä. Tämän löydöksen merkitystä ihmiselle ei tiedetä.

Metyylifenidaatti ei vaikuttanut lisääntymiskyyyn tai hedelmällisyteen, kun sitä annettiin terapeuttisten annosten pieninä kerrannaisina.

#### Raskaus, alkion/sikiön kehitys

Metyylifenidaattia ei pidetä teratogeenisena rotille ja kaniineille. Rotilla todettiin sikiötoksisuutta (eli koko poikueen menetyksiä) ja emotoksisuutta emolle haitallisilla annoksilla.

## **6. FARMASEUTTISET TIEDOT**

### **6.1 Apuaineet**

*Methylphenidate Mylan 18 mg, 27 mg, 36 mg ja 54 mg depottabletit*

*Tablettiyydin:*

Sokeripallot (sakkaroosi, maissitärkkelys), hypromellosei, talkki, etyyliselluloosa, hydroksipropylelluloosa, trietyylisitraatti, hypromellosiasetaatisuksinaatti, karmelloosinatrium,

mikrokiteinen selluloosa, magnesiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, suolahappo (pH-arvon säätöön)

*Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletit*

*Tabletin päälyste:*

Polyvinyylialkoholi, makrogoli 3350, talkki, suolahappo (pH-arvon säätöön), titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172)

*Methylphenidate Mylan 27 mg depottabletit*

*Tabletin päälyste:*

Polyvinyylialkoholi, makrogoli 3350, talkki, keltainen rautaoksidi (E172), suolahappo (pH-arvon säätöön)

*Methylphenidate Mylan 36 mg depottabletit*

*Tabletin päälyste:*

Polyvinyylialkoholi, makrogoli 3350, talkki, suolahappo (pH-arvon säätöön), titaanidioksidi (E171)

*Methylphenidate Mylan 54 mg depottabletit*

*Tabletin päälyste:*

Polyvinyylialkoholi, makrogoli 3350, talkki, suolahappo (pH-arvon säätöön), titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172)

## **6.2 Yhteensopimattomuudet**

Ei oleellinen.

## **6.3 Kestoaika**

3 vuotta.

## **6.4 Säilytys**

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

## **6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)**

HDPE-purkki, jossa lapsiturvallinen PP-kierrekorkki.

Pakkauskoot:

28 depottablettia (ei Methylphenidate Mylan 27 mg depottabletit)

30 depottablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

## **6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle**

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen.

## **7. MYYNTILUVAN HALTIJA**

Mylan AB  
Box 23033  
104 35 Tukholma  
Ruotsi

**8. MYYNTILUVAN NUMERO(T)**

*18 mg: 31525*

*27 mg: 32954*

*36 mg: 31526*

*54 mg: 31527*

**9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

*18 mg, 36 mg ja 54 mg: 22.9.2014/12.5.2019*

*27 mg: 29.8.2016/12.5.2019*

**10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ**

31.10.2019

## PRODUKTRESUMÉ

### 1. LÄKEMEDLETS NAMN

Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletter  
Methylphenidate Mylan 27 mg depottabletter  
Methylphenidate Mylan 36 mg depottabletter  
Methylphenidate Mylan 54 mg depottabletter

### 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

*Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletter*

Varje depottablett innehåller 18 mg metylfenidathydroklorid (motsvarande 15,57 mg metylfenidat).

*Methylphenidate Mylan 27 mg depottabletter*

Varje depottablett innehåller 27 mg metylfenidathydroklorid (motsvarande 23,35 mg metylfenidat).

*Methylphenidate Mylan 36 mg depottabletter*

Varje depottablett innehåller 36 mg metylfenidathydroklorid (motsvarande 31,13 mg metylfenidat).

*Methylphenidate Mylan 54 mg depottabletter*

Varje depottablett innehåller 54 mg metylfenidathydroklorid (motsvarande 46,7 mg metylfenidat).

#### Hjälpmé med känd effekt:

*Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletter*

Varje depottablett innehåller 12,3 mg sackaros.

*Methylphenidate Mylan 27 mg depottabletter*

Varje depottablett innehåller 15,0 mg sackaros.

*Methylphenidate Mylan 36 mg depottabletter*

Varje depottablett innehåller 24,6 mg sackaros.

*Methylphenidate Mylan 54 mg depottabletter*

Varje depottablett innehåller 36,9 mg sackaros.

För fullständig förteckning över hjälpménen, se avsnitt 6.1.

### 3. LÄKEMEDELSFORM

Depottablett.

*Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletter*

Gulaktiga till gula, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter på 6,3 mm.

*Methylphenidate Mylan 27 mg depottabletter*

Gula, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter på 10,3 x 4,8 mm med brytskåra på båda sidor.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

*Methylphenidate Mylan 36 mg depottabletter*

Vita till nästan vita, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter på 11,3 x 5,3 mm med brytskåra på båda sidor.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

*Methylphenidate Mylan 54 mg depottabletter*

Rödaktiga till röda, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter på 13,3 x 6,4 mm med brytskåra på båda sidor. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

### 4. KLINISKA UPPGIFTER

#### 4.1 Terapeutiska indikationer

## **ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)**

Methylphenidate Mylan är indicerat som en del i det totala behandlingsprogrammet för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn från 6 år, när endast stödjande åtgärder visat sig vara otillräckliga. Behandlingen ska ske under överinseende av specialist på beteendestörningar hos barn. Diagnos ska ställas enligt de aktuella DSM-kriterierna eller ICD-riktlinjerna och ska grundas på en fullständig anamnes och utvärdering av patienten. Diagnos kan inte ställas enbart på närväro av ett eller flera symtom.

Den specifika etiologin för detta syndrom är okänd, och det finns inget enstaka diagnostiskt test. Adekvat diagnos kräver användning av såväl medicinska som specialiserade psykologiska, pedagogiska och sociala resurser.

Ett omfattande behandlingsprogram karakteriseras av psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder såväl som farmakoterapi och har som målsättning att stabilisera barn med ett beteendesyndrom karakterisert av symtom som kan inkludera kronisk anamnes av kort uppmärksamhetsperiod, distraherbarhet, emotionell labilitet, impulsivitet, måttlig till svår hyperaktivitet, obetydliga neurologiska tecken och onormalt EEG. Syndromet kan förekomma både med och utan inlärningssvårigheter.

Behandling med metylfenidat är inte indicerat för alla barn med ADHD och beslutet att använda läkemedlet måste grundas på en mycket noggrann bedömning av svårighetsgrad och kronicitet av barnets symtom i förhållande till barnets ålder.

Välvald utbildningsplacering är väsentlig, och psykosocialt ingripande är i allmänhet nödvändigt. Där enbart stödjande åtgärder visat sig vara otillräckliga måste beslutet att använda stimulantia grundas på en mycket noggrann bedömning av svårighetsgraden hos barnets symtom. Användning av metylfenidat ska alltid ske enligt godkänd indikation och enligt föreskrivnings-/diagnostiska riktlinjer.

### **4.2 Dosering och administreringssätt**

**Behandlingen ska påbörjas under överinseende av specialist på beteendestörningar hos barn och/eller ungdomar.**

#### Undersökningar före behandling

Före föreskrivning är det nödvändigt att genomföra en bedömning av patientens utgångsvärde beträffande kardiovaskulär status inklusive blodtryck och hjärtfrekvens. En omfattande anamnes ska dokumentera samtidig medicinering, nuvarande och tidigare medicinska och psykiska sjukdomar eller symtom, familjär förekomst av plötslig kardiell eller oförklarad död och noggrann journalföring av längd och vikt på tillväxtdiagram före behandling (se avsnitt 4.3 och 4.4).

#### Fortgående monitorering

Tillväxt, psykisk status och kardiovaskulär status ska monitoreras kontinuerligt (se avsnitt 4.4).

- Blodtryck och puls ska journalföras i ett diagram vid varje justering av dosen och därefter minst var 6:e månad;
- längd, vikt och aptit ska journalföras minst var 6:e månad med hjälp av ett tillväxtdiagram;
- utveckling av nya eller förvärring av existerande psykiska störningar ska monitoreras vid varje dosjustering och därefter minst var 6:e månad samt vid varje besök.

Patienterna ska monitoreras beträffande risk för avsteg från dos, felanvändning och miss bruk av metylfenidat.

#### **Dosering**

#### Dositrering

Noggrann döstrivering krävs vid start av behandling med metylfenidat. Döstrivering ska påbörjas med lägsta möjliga dos.

För dosering som inte är tillämplig med detta läkemedel finns andra styrkor och andra läkemedel.

Dosen kan ökas stegvis med 18 mg åt gången. I allmänhet kan dosjusteringar göras med en veckas mellanrum.

Maximal daglig dos av metylfenidat är 54 mg.

#### *Patienter som inte tidigare behandlats med metylfenidat*

Klinisk erfarenhet av metylfenidat är begränsad hos patienter som inte tidigare behandlats med metylfenidat (se avsnitt 5.1). Metylfenidat är inte indicerat för alla barn med ADHD. Lägre doser med kortverkande formuleringar av metylfenidat kan anses tillräckligt för de patienter som inte tidigare behandlats med metylfenidat. Noggrann döstrivering skall utföras av ansvarig läkare för att undvika onödig höga doser av metylfenidat. Den rekommenderade startdosen av metylfenidat till patienter som inte står på behandling med metylfenidat eller patienter som tar andra centralstimulantia än metylfenidat, är 18 mg en gång om dagen.

#### *Patienter som behandlas med metylfenidat*

Den rekommenderade dosen av Methylphenidate Mylan till patienter som behandlas med metylfenidat tre gånger dagligen i doser om 15-45 mg/dag anges i tabell 1. Dosrekommendationerna grundas på den aktuella doseringsregimen och klinisk bedömning.

**Tabell 1: Rekommenderad dosering vid övergång från andra metylfenidathydroklorid-produkter till Methylphenidate Mylan**

Tidigare dygnsdos av metylfenidathydroklorid	Rekommenderad dos
5 mg metylfenidat 3 ggr/dag	18 mg en gång/dag
10 mg metylfenidat 3 ggr/dag	36 mg en gång/dag
15 mg metylfenidat 3 ggr/dag	54 mg en gång/dag

Om ingen förbättring noteras efter lämpliga dosjusteringar, under en period av en månad, bör läkemedlet sättas ut.

#### Långtidsbehandling (mer än 12 månader) hos barn och ungdomar

Säkerhet och effekt av långtidsbehandling med metylfenidat har inte utvärderats systematiskt i kontrollerade studier. Metylfenidatbehandling bör inte, och behöver inte, pågå under obegränsad tid.

Metylfenidatbehandling avslutas vanligtvis under eller efter puberteten. Läkare som väljer att använda metylfenidat under längre perioder (mer än 12 månader) till barn och ungdomar med ADHD ska regelbundet omvärdra den långsiktiga nyttan av läkemedlet för varje enskild patient med perioder utan behandling för att bedöma hur patienten fungerar utan läkemedel.

Det rekommenderas att metylfenidat sätts ut minst en gång per år för bedömning av barnets tillstånd (företrädesvis under skollov). Förbättring kan bibehållas när läkemedlet sätts ut antingen tillfälligt eller permanent.

### Dosminskning och utsättning

Behandlingen måste upphöra om symtomen inte förbättras efter lämplig dosjustering under en månad. Om paradoxal försämring av symtomen eller andra allvarliga biverkningar uppträder ska doseringen minskas eller läkemedlet sättas ut.

### Vuxna

Hos ungdomar vars symptom kvarstår i vuxen ålder och som visat sig ha en klar nytta av behandlingen kan det vara lämpligt att fortsätta med behandlingen i vuxen ålder. Att påbörja behandling med Methylphenidate Mylan i vuxen ålder är dock inte lämpligt (se avsnitt 4.4 och 5.1).

### Äldre

Metylfenidat ska inte användas till äldre. Säkerhet och effekt har inte fastställts i denna åldersgrupp.

### Pediatrisk population under 6 år

Metylfenidat ska inte användas till barn under 6 år. Säkerhet och effekt i denna åldersgrupp har inte fastställts.

### Administreringssätt

#### *Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletter*

Methylphenidate Mylan skall sväljas hel tillsammans med vätska och får inte tuggas, delas eller krossas (se avsnitt 4.4).

#### *Methylphenidate Mylan 27 mg, 36 mg och 54 mg depottabletter*

Tabletten kan delas i två lika stora doser. Methylphenidate Mylan kall sväljas tillsammans med vätska och får inte tuggas eller krossas (se avsnitt 4.4).

Methylphenidate Mylan kan ges oberoende av måltid (se avsnitt 5.2).

## **4.3 Kontraindikationer**

- Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpmäne som anges i avsnitt 6.1.
- Glaukom.
- Feokromocytom.
- Under behandling med icke-selektiva, irreversibla monoaminoxidas (MAO)-hämmare, samt inom minst 14 dagar efter att dessa läkemedel har satts ut på grund av risk för hypertonisk kris (se avsnitt 4.5).
- Hypertyreoidism eller tyreotoxikos.
- Diagnos på eller anamnes av svår depression, anorexia nervosa/anorektiska störningar, självmordstendenser, psykotiska symptom, svåra humörstörningar, mani, schizofreni, psykopatisk/borderline personlighetsstörning.
- Diagnos på eller anamnes av svåra och episodiska (typ I), bipolära (affektiva) störningar (som inte är välviktrollerade).
- Existerande kardiovaskulära sjukdomar, inklusive svår hypertoni, hjärtsvikt, arteriell ocklusiv sjukdom, angina pectoris, hemodynamiskt signifikant kongenital hjärtsjukdom, kardiomyopati, hjärtinfarkt, potentiellt livshotande arytmier och channelopathy (störning orsakad av dysfunktion i jonkanaler).
- Existerande cerebrovaskulära rubbningar, t.ex. cerebral aneurysm, kärlrubbningar inklusive vaskulit eller stroke.

## **4.4 Varningar och försiktighet**

Behandling med metylfenidat är inte indicerat för alla barn med ADHD och beslutet att använda läkemedlet måste grundas på en mycket noggrann bedömning av svårighetsgrad och kronicitet av barnets symptom i förhållande till barnets ålder.

### Långtidsbehandling (mer än 12 månader) hos barn och ungdomar

Säkerhet och effekt av långtidsbehandling med metylfenidat har inte utvärderats systematiskt i kontrollerade studier. Metylfenidatbehandling bör inte, och behöver inte, pågå under obegränsad tid.

Metylfenidatbehandling avslutas vanligtvis under eller efter puberteten. Patienter som kräver långtidsbehandling (mer än 12 månader) ska därför fortlöpande övervakas noggrant enligt riktlinjer i avsnitten 4.2 och 4.4 med avseende på kardiovaskulär status, tillväxt, aptit, utveckling av nya eller förvärring av existerande psykiska störningar. Psykiska störningar som ska övervakas beskrivs nedan och inkluderar (men är inte begränsade till) motoriska eller röst-tics, aggressiva eller fientliga beteenden, agitation, ångest, depression, psykos, mani, vanföreställningar, irritabilitet, avsaknad av spontanitet, tillbakadragenhet eller uttalad perseveration.

Läkare som väljer att använda metylfenidat under längre perioder (mer än 12 månader) till barn och ungdomar med ADHD ska regelbundet omvärdera den långsiktiga nyttan av läkemedlet för varje enskild patient med perioder utan behandling för att bedöma hur patienten fungerar utan läkemedel. Det rekommenderas att metylfenidat sätts ut minst en gång per år för bedömning av barnets tillstånd (företrädesvis under skollov). Förbättringen kan komma att bibehållas när läkemedlet sätts ut antingen tillfälligt eller permanent.

#### Vuxna

Säkerhet och effekt har inte fastställts för initiering av behandling i vuxen ålder eller för att rutinmässigt fortsätta med behandlingen efter 18 års ålder. Om behandlingsutsättning inte varit framgångsrik hos en ungdom som nått 18 års ålder kan fortsatt behandling i vuxen ålder vara nödvändig. Behovet av ytterligare behandling av dessa vuxna ska ses över regelbundet och avgöras årligen.

#### Äldre

Metylfenidat ska inte användas till äldre. Säkerhet och effekt har inte fastställts i denna åldersgrupp.

#### Barn under 6 år

Metylfenidat ska inte användas till barn under 6 år. Säkerhet och effekt i denna åldersgrupp har inte fastställts.

#### Kardiovaskulär status

För patienter där man överväger att behandla med stimulantia ska en noggrann genomgång av anamnes (inklusive bedömning av familjär förekomst av plötslig kardiell eller oförklarad död eller malign arytmia) samt fysisk undersökning göras för att bedöma närväro av hjärtsjukdom. Ytterligare hjärtundersökning ska göras av specialist om initiala fynd visar på en sådan anamnes eller sjukdom. Patienter som utvecklar symptom som palpitationer, ansträngningsutlöst bröstmärta, oförklarad synkope, dyspné eller andra symptom som tyder på hjärtsjukdom under metylfenidatbehandling ska genomgå en omedelbar hjärtundersökning av specialist.

Analyser av data från kliniska studier med metylfenidat på barn och ungdomar med ADHD visade att patienter som använder metylfenidat vanligen upplever förändringar i diastoliskt och systoliskt blodtryck på över 10 mmHg jämfört med kontrollgrupper. Den kort- och långsiktiga kliniska betydelsen av dessa kardiovaskulära effekter hos barn och ungdomar är inte känd. Risken för kliniska komplikationer kan inte uteslutas som ett resultat av de effekter som observerades i dessa kliniska studier, speciellt då behandling under barnålder eller ungdomsålder fortsätts i vuxen ålder. **Försiktighet är indicerat vid behandling av patienter vilkas underliggande medicinska tillstånd kan skadas av ökat blodtryck eller hjärtfrekvens.** Se avsnitt 4.3 för tillstånd där metylfenidat är kontraindicerade.

**Kardiovaskulär status ska noggrant övervakas. Blodtryck och puls ska journalföras i ett diagram vid varje dosjustering och där efter minst var 6:e månad.**

Användning av metylfenidat är kontraindicerat vid vissa existerande kardiovaskulära sjukdomar **såvida inte råd har erhållits av specialist i hjärtsjukdomar hos barn** (se avsnitt 4.3).

**Plötslig död och existerande kardiella strukturavvikelser eller andra allvarliga hjärtproblem**

Plötslig död har rapporterats i samband med användning av CNS-stimulerande medel vid normala doser hos barn, varav somliga hade kardiella strukturavvikelser eller andra allvarliga hjärtproblem. Även om vissa allvarliga hjärtproblem i sig kan innehålla en ökad risk för plötslig död, rekommenderas inte stimulantia till barn eller ungdomar med kända kardiella strukturavvikelser, kardiomyopati, allvarliga hjärtrytmstörningar eller andra allvarliga hjärtproblem, vilka kan göra dem extra sårbara för de sympathomimetiska effekterna av ett stimulerande läkemedel.

#### Felanvändning och kardiovaskulära händelser

Felanvändning av CNS-stimulerande medel kan ha samband med plötslig död och andra allvarliga kardiovaskulära biverkningar.

#### Cerebrovaskulära rubbningar

Se avsnitt 4.3 beträffande cerebrovaskulära tillstånd där behandling med metylfenidat är kontraindicerat. Patienter med ytterligare riskfaktorer (såsom kardiovaskulär sjukdom i anamnesen, samtidig behandling med läkemedel som höjer blodtrycket) bör bedömas vid varje besök med avseende på neurologiska tecken och symptom efter påbörjad behandling med metylfenidat.

Cerebral vasklit verkar vara en mycket sällsynt idiosynkratisk reaktion på exponering för metylfenidat. Det finns få bevis för att högriskpatienter kan identifieras och symptomdebuten kan vara den första indikationen på ett underliggande kliniskt problem. Tidig diagnos baserad på hög misstanke kan möjliggöra omedelbar utsättning av metylfenidat och tidig behandling. Diagnosen bör därför övervägas hos varje patient som utvecklar nya neurologiska symptom som överensstämmer med cerebral ischemi under metylfenidatterapi. Dessa symptom kan inkludera svår huvudvärk, känslobortfall, svaghet, paralys och försämring av koordination, syn, tal, språk eller minne.

#### **Behandling med metylfenidat är inte kontraindicerat hos patienter med hemiplegisk cerebral pares.**

#### Psykiska störningar

Samtidig psykisk sjukdom är vanlig vid ADHD och bör tas i beaktande vid förskrivning av stimulantia. Om psykiska symptom eller förvärring av existerande psykiska störningar uppträder, ska metylfenidat inte ges såvida inte nytta överväger riskerna för patienten.

**Utveckling eller förvärring av psykiska störningar ska kontrolleras vid varje dosjustering, därefter minst var 6:e månad och vid varje besök; utsättning av behandlingen kan vara lämpligt.**

#### Förvärring av existerande psykotiska eller maniska symptom

Metylfenidat kan förvärra symptom på beteende- och tankestörning hos psykotiska patienter.

#### Uppträdande av nya psykotiska eller maniska symptom

Behandlingsutlösta psykotiska symptom (syn-/känsel-/hörselhallucinationer och vanföreställningar) eller mani hos barn eller ungdomar utan tidigare psykotisk sjukdom eller mani i anamnesen kan orsakas av metylfenidat vid normala doser. Om maniska eller psykotiska symptom uppträder bör metylfenidat övervägas som eventuell orsak och utsättande av behandlingen kan vara lämplig.

#### Aggressivt eller fientligt beteende

Uppträdande eller förvärring av aggression eller fientlighet kan orsakas av behandling med stimulantia. Aggression har rapporterats hos patienter som behandlas med metylfenidat (se avsnitt 4.8). Patienter som behandlas med metylfenidat ska övervakas noggrant med avseende på uppträdande eller förvärring av aggressivt beteende eller fientlighet vid behandlingsstart, vid varje dosjustering och därefter minst var 6:e månad samt vid varje besök. Läkaren bör utvärdera behovet av justering av behandlingen hos patienter som uppvisar beteendeförändringar och vara uppmärksam på att upp- eller nedtitrering av dosen kan vara lämplig. Utsättande av behandlingen kan övervägas.

#### Självmordstendens

Patienter som utvecklar självmordstankar eller självmordsbeteende under behandling av ADHD bör omedelbart bedömas av sin läkare. Förvärring av en underliggande psykisk åkomma samt ett möjligt orsakssamband med metylfenidatbehandling bör tas i beaktande. Behandling av en underliggande psykisk åkomma kan vara nödvändig och eventuellt utsättande av metylfenidat bör övervägas.

#### Tics

Metylfenidat förknippas med uppträdande eller förvärring av motoriska och verbala tics. Förvärring av Tourettes syndrom har också rapporterats. Familjär förekomst bör utvärderas och klinisk utvärdering beträffande tics eller Tourettes syndrom hos barn bör föregå användning av metylfenidat. Patienter bör övervakas regelbundet med avseende på uppträdande eller förvärring av tics under behandlingen med metylfenidat. **Kontroll ska ske vid varje dosjustering och där efter minst var 6:e månad eller vid varje besök.**

#### Ångest, agitation eller spänningar

Ångest, agitation och spänningar har rapporterats hos patienter som behandlas med metylfenidat (se avsnitt 4.8). Metylfenidat förknippas även med förvärring av existerande ångest, agitation eller spänningar, och ångest har lett till utsättning av metylfenidat hos vissa patienter. Klinisk utvärdering beträffande ångest, agitation eller spänning ska föregå användning av metylfenidat och patienter ska **kontrolleras regelbundet med avseende på uppträdande eller förvärring av dessa symptom under behandlingen, vid varje dosjustering och där efter minst var 6:e månad eller vid varje besök.**

#### Bipolära sjukdomar

Särskild försiktighet bör iakttas vid användning av metylfenidat för behandling av ADHD-patienter med samtidig bipolär sjukdom (inklusive obehandlad bipolär sjukdom typ I eller andra bipolära sjukdomar) på grund av möjligt påskyndande av blandad/manisk episod hos sådana patienter. Före initiering av behandling med metylfenidat bör patienter med samtidiga depressiva symptom undersökas för utvärdering av eventuell risk för bipolär sjukdom. En sådan undersökning bör omfatta en detaljerad psykiatrisk anamnes samt familjär förekomst av självmord, bipolär sjukdom och depression. **Noggrann fortlöpande övervakning av dessa patienter är nödvändig (se Psykiska störningar ovan och avsnitt 4.2).** Patienterna ska övervakas med avseende på symptom vid varje dosjustering och där efter minst var 6:e månad eller vid varje besök.

#### Tillväxt

Måttligt nedsatt viktökning och födröjd tillväxt har rapporterats vid långtidsbehandling av barn med metylfenidat.

Effekterna av metylfenidat på slutlig längd och vikt är ännu okända och studeras för närvarande.

**Tillväxten ska kontrolleras under behandling med metylfenidat; längd, vikt och aptit ska journalföras minst var 6:e månad med hjälp av ett tillväxtdiagram.** För patienter som inte växer eller ökar i längd eller vikt som förväntat kan behandlingen behöva avbrytas.

#### Epileptiska anfall

Metylfenidat ska användas med försiktighet hos patienter med epilepsi. Metylfenidat kan sänka krampröskeln hos patienter med epileptiska anfall i anamnesen, hos patienter med tidigare EEG-avvikelse utan epileptiska anfall samt, i sällsynta fall, hos patienter utan epileptiska anfall i anamnesen eller tidigare EEG-avvikelse. Vid ökning av anfallsfrekvensen eller om anfall uppträder för första gången ska metylfenidat sättas ut.

#### Priapism

Långvariga och smärtsamma erektoner har rapporterats vid användning av metylfenidatprodukter, främst i samband med ändring av behandlingsregimen för metylfenidat. Patienter som får onormalt långvariga eller frekventa och smärtsamma erektoner ska söka vård omedelbart.

#### Användning med serotonerga läkemedel

Serotonergt syndrom har rapporterats efter samtidig administrering av metylfenidat med serotonerga läkemedel. Om samtidig användning av metylfenidat och ett serotonergt läkemedel är berättigad är det viktigt att genast känna igen symptomen på serotonergt syndrom. Dessa symptom kan omfatta mentala förändringar (t.ex. agitation, hallucinationer, koma), autonom instabilitet (t.ex. takykardi, labilt blodtryck, hypertermi), neuromuskulära avvikelse (t.ex. hyperreflexi, koordinationssvårigheter, stelhet), och/eller gastrointestinala symptom (t.ex. illamående, kräkningar, diarré). Vid misstanke om serotonergt syndrom måste behandlingen med metylfenidat avbrytas så snart som möjligt.

#### Missbruk, felanvändning och avvikande användning

Patienter ska övervakas noggrant med avseende på risk för avvikande användning, felanvändning eller missbruk av metylfenidat.

Metylfenidat ska användas med försiktighet hos patienter med känt drog- eller alkoholberoende på grund av risken för missbruk, felanvändning eller avvikande användning.

Kroniskt missbruk av metylfenidat kan leda till påtaglig toleransutveckling och psykologiskt beroende med varierande grader av onormalt beteende. Verkliga psykotiska episoder kan uppträda, särskilt vid parenteralt missbruk.

Patientens ålder, förekomsten av riskfaktorer för läkemedelsmissbruk (såsom samtidigt trotssyndrom eller uppförandestörning och bipolär sjukdom), tidigare eller nuvarande läkemedelsmissbruk ska alla tas i beaktande vid beslut om behandling mot ADHD.

Försiktighet ska iakttas hos emotionellt labila patienter såsom de med tidigare drog- eller alkoholberoende, eftersom sådana patienter kan öka dosen på eget initiativ.

För vissa patienter med hög risk för missbruk kan metylfenidat eller andra stimulantia vara olämpliga och behandling med icke-stimulantia ska övervägas.

#### Utsättning av behandling

Noggrann övervakning krävs när läkemedlet sätts ut eftersom detta kan demaskera depression eller kronisk överaktivitet. Vissa patienter kan kräva långvarig uppföljning.

Noggrann övervakning krävs vid utsättning vid missbruk eftersom allvarlig depression kan uppträda.

#### Trötthet

Metylfenidat ska inte användas för prevention eller behandling av normala trötthetsställstånd.

#### Val av läkemedelsform av metylfenidat

Valet av läkemedelsform av metylfenidat-innehållande produkt ska göras av behandlande specialist på individuell basis och beror på avsedd effektduration.

#### Undersökningar

Detta läkemedel innehåller metylfenidat vilket kan inducera ett falskt positivt laboratorievärde för amfetamin, speciellt med immunanalystest.

#### Nedsatt njur- eller leverfunktion

Erfarenhet av behandling med metylfenidat hos patienter med njur- eller leverinsufficiens saknas.

#### Hematologiska effekter

Säkerheten vid långtidsbehandling med metylfenidat är inte fullständigt känd. Vid leukopeni, trombocytopeni, anemi eller andra avvikelse, inklusive de som tyder på allvarliga njur- eller leverproblem, ska utsättningen av läkemedlet övervägas.

#### Potentiell gastrointestinal obstruktion

Eftersom metylfenidat-tabletten inte är deformbar och inte märkbart ändrar form i magtarmkanalen, ska den under normala omständigheter inte administreras till patienter med existerande förträngning i magtarmkanalen (patologisk eller iatrogen) eller till patienter med dysfagi eller tydlig svårighet att svälja tablett. Obstruktiva symptom har rapporterats i sällsynta fall hos patienter med kända förträngningar i förbindelse med intag av läkemedel i icke deformbara depot-formuleringar.

#### *Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletter*

På grund av depot-formuleringen av tabletten ska Methylphenidate Mylan endast användas av patienter som kan svälja tabletten hel. Patienterna ska informeras om att Methylphenidate Mylan måste sväljas hel med hjälp av vätska. Tabletten får inte tuggas, delas eller krossas.

#### *Methylphenidate Mylan 27 mg, 36 mg och 54 mg depottabletter*

Tabletten kan delas i två lika stora doser. Patienterna ska informeras om att Methylphenidate Mylan måste sväljas med hjälp av vätska. Tabletten får inte tuggas eller krossas.

#### Methylphenidate Mylan innehåller sackaros och natrium

Patienter med något av följande sällsynta, ärliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

#### **4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner**

##### Farmakokinetiska interaktioner

Det är inte känt hur metylfenidat kan påverka plasmakoncentrationerna av andra samtidigt administrerade läkemedel. Därför bör försiktighet iakttas vid kombination av metylfenidat och andra läkemedel, speciellt sådana som har smalt terapeutiskt fönster.

Metylfenidat metaboliseras inte av cytokrom P450 i någon kliniskt relevant grad. Inducerare eller hämmare av cytokrom P450 förväntas inte ha någon relevant effekt på metylfenidats farmakokinetik. Omvänt hämmar d- och l-enantiomererna av metylfenidat inte cytokrom P450 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 eller 3A i relevant grad.

Det finns dock rapporter som indikerar att metylfenidat kan hämma metabolismen av kumarin-antikoagulantia, antikonvulsiva läkemedel (t ex fenobarbital, fenytoin, primidon) och vissa antidepressiva läkemedel (tricykliska läkemedel och selektiva serotoninåterupptagshämmare). När behandling med metylfenidat påbörjas eller avslutas kan det bli nödvändigt att justera dosen för dessa läkemedel som redan tas och övervaka plasmakoncentrationer (respektive koagulationstider för kumarin).

##### Farmakodynamiska interaktioner

###### *Läkemedel mot hypertoni*

Metylfenidat kan minska effekten av läkemedel mot hypertoni.

###### *Blodtryckshöjande läkemedel*

Försiktighet tillrådes för patienter behandlade med metylfenidat tillsammans med annat läkemedel som också kan höja blodtrycket (se även avsnitten om kardiovaskulära och cerebrovaskulära tillstånd i avsnitt 4.4).

På grund av risken för hypertonisk kris är metylfenidat kontraindicerat hos patienter som behandlas med icke-selektiv, irreversibel MAO-hämmare (pågående behandling eller behandling under de senaste 14 dagarna) (se avsnitt 4.3).

##### *Alkohol*

Alkohol kan förstärka de CNS-relaterade biverkningarna av psykoaktiva läkemedel, inklusive metylfenidat. Patienter bör därför avstå från alkohol under behandling.

#### *Serotonerga läkemedel*

Det har förekommit rapporter om serotonergt syndrom efter samtidig administrering av metylfenidat med serotonerga läkemedel. Om samtidig användning av metylfenidat och ett serotonergt läkemedel är berättigad är det viktigt att genast känna igen symtomen på serotonergt syndrom (se avsnitt 4.4). Vid misstanke om serotonergt syndrom måste behandlingen med metylfenidat avbrytas så snart som möjligt.

#### *Halogenerade anestesimедел*

Det finns en risk för plötslig förhöjning av blodtrycket under operationen. Om operation är planerad ska metylfenidat inte användas på operationsdagen.

#### *Centralt verkande alfa-2-agonister (t ex klonidin)*

Säkerheten vid långtidsbehandling av metylfenidat i kombination med klonidin eller andra centralt verkande alfa-2-agonister har inte utvärderats systematiskt.

#### *Dopaminerga läkemedel*

Försiktighet rekommenderas vid administrering av metylfenidat tillsammans med dopaminerga läkemedel, inklusive antipsykotika.

På grund av att en dominerande verkan av metylfenidat är ökning av extracellulära dopaminnivåer kan metylfenidat vara förbundet med farmakodynamiska interaktioner när det ges tillsammans med direkta och indirekta dopaminagonister (inklusive DOPA och tricykliska antidepressiva) eller dopaminantagonister inklusive antipsykotika.

## **4.6 Fertilitet, graviditet och amning**

#### Graviditet

Data från en kohortstudie med totalt cirka 3 400 graviditeter som exponerats under den första trimestern tyder dock inte på en ökad risk för missbildningar totalt sett. En liten ökning påvisades av hjärtnissbildningar (poolad justerad relativ risk, 1,3; 95 % CI, 1,0–1,6) motsvarande tre ytterligare spädbarn med medfödda hjärtnissbildningar per 1 000 kvinnor som fått metylfenidat under graviditetens första trimester, jämfört med icke-exponerade graviditeter.

Fall av neonatal kardiorespiratorisk toxicitet, specifikt fetal takykardi och andnöd har rapporterats i spontana fallrapporter.

Djurstudier har gett bevis för reproduktionstoxikologiska effekter vid doser som är toxiska för modern (se avsnitt 5.3).

Metylfenidat rekommenderas inte under graviditet om inte ett kliniskt beslut tas att senareläggning av behandlingen kan utgöra en större risk för graviditeten.

#### Amning

Metylfenidat utsöndras i bröstmjölk. Enligt rapporter baserade på prover från fem mödrars bröstmjölk, resulterade metylfenidatkonzcentrationen i bröstmjölk i doser hos spädbarnen på 0,16 % till 0,7 % av den viktjusterade dosen hos modern, och ett förhållande mellan bröstmjölk och moderns plasma på mellan 1,1 och 2,7.

Ett fall av ospecifierad viktminskning under exponeringsperioden har rapporterats hos ett spädbarn, som dock hämtade sig och gick upp i vikt när modern avbröt behandlingen med metylfenidat. En risk kan inte uteslutas för barn som ammas.

Ett beslut måste tas huruvida man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med metylfenidat med hänsyn taget till fördelen av amning för barnet och fördelen av behandling för kvinnan.

## Fertilitet

Inga relevanta effekter har observerats i icke-kliniska studier.

## **4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner**

Metylfenidat kan orsaka yrsel, dåsighet och synstörningar inklusive ackommodationssvårigheter, diplopi och dimsyn. Det kan ha en måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienterna bör varnas för dessa eventuella effekter och, om de påverkas, rådas att undvika potentiellt riskfylda aktiviteter såsom bilkörning eller användning av maskiner.

## **4.8 Biverkningar**

Tabellen nedan visar alla biverkningar observerade under kliniska studier på barn, ungdomar och vuxna och i spontanrapporter efter godkännandet för försäljning av metylfenidat samt de som har rapporterats med andra formuleringar som innehåller metylfenidathydroklorid. Om frekvensen biverkningar skilde sig åt mellan metylfenidat-depottabletter och andra metylfenidatformuleringar, användes den högsta frekvensen från båda databaser.

Frekvensen av biverkningar som listas nedan definieras enligt följande:

Mycket vanliga	(≥1/10)
Vanliga	(≥1/100, <1/10)
Mindre vanliga	(≥1/1 000, <1/100)
Sällsynta	(≥1/10 000, <1/1 000)
Mycket sällsynta	(<1/10 000)
Ingen känd frekvens	(kan inte beräknas från tillgängliga data)

Organsystem	Biverkning					
	Frekvens					
	Mycket vanliga	Vanliga	Mindre vanliga	Sällsynta	Mycket sällsynta	Ingen känd frekvens
<b>Infektioner och infestationer</b>		Naso-faryngit, övre luftvägsinfektion <sup>#</sup> ,bihåle-inflammation <sup>#</sup>				
<b>Blodet och lymfsystemet</b>					Anemi <sup>†</sup> , leukopeni <sup>†</sup> , trombocytopeni, trombocytopenisk purpura	Pancytopeni
<b>Immunsystemet</b>			Överkänslighetsreaktioner som Angioneurotiskt ödем, anafylaktiska reaktioner, öronsvullnad,			

Organsystem	Biverkning					
	Frekvens					
	Mycket vanliga	Vanliga	Mindre vanliga	Sällsynta	Mycket sällsynta	Ingen känd frekvens
			vesikulösa tillstånd, exfoliativa tillstånd, urtikaria, pruritus, utslag och eruption			
<b>Metabolism och nutrition*</b>		Anorexi, minskad aptit <sup>†</sup> , måttligt reducerad viktuppgång och längdtillväxt under långvarig användning hos barn*				
<b>Psykiska störningar*</b>	Sömnlöshet, nervositet	Affektlabilitet, aggression*, agitation*, ångest*, depression**, irritabilitet, onormalt beteende, humörsvängningar, tics, initial sömnlöshet#, nedstämdhet#, minskad libido#, spänning#, bruxism#, panikattack#	Psykotiska tillstånd*, hörsel-, syn- och känselhallucination*, ilska, självmordstankar*, humörförändring, rastlöshet, gråmildhet, förvärring av befintliga tics eller Tourettes syndrom*, logorré, spänd väksamhet, sömnstörningar	Mani**†, desorientering, libido-störningar, förvirrings-tillstånd†	Självmordsförsök (inklusive fullbordat självmord)**†, övergående depressiv sinnesstämning*, onormala tankar, apati†, repetitiva beteenden, överfokusering	Vanföreställningar **†, tankestörningar*, beroende, fall av missbruk och beroende har beskrivits, oftare med formuleringar med omedelbar frisättning
<b>Centrala och perifera nervsystemet</b>	Huvudvärk	Yrsel, dyskinesi, psyko-motorisk hyperaktivitet, somnolens, parestesi#, spänningshuvudvärk#	Sedation, tremor†, letargi#		Konvulsion, koreoatetoida rörelser, reversibla ischemiska bortfalls-symtom (RIND), malignt neuroleptika-	Cerebro-vaskulära störningar **† (inklusive vaskulit, cerebral blödning, cerebro-vaskulära

Organsystem	Biverkning					
	Frekvens					
	Mycket vanliga	Vanliga	Mindre vanliga	Sällsynta	Mycket sällsynta	Ingen känd frekvens
					syndrom (NMS; rapporterna var dåligt dokumenterade och i de flesta fall fick patienterna även andra läkemedel. Metyl-fenidats roll är ärför oklar).	händelser, cerebral artrit, cerebral ocklusion), grand mal -anfall*, migrän†
<b>Ögon</b>		Ackom-modations-störning #	Dimsyn†, torra ögon#	Svårigheter att ackommodera, försämrat syn, diplopi		Mydriasis
<b>Öron och balansorgan</b>		Vertigo#				
<b>Hjärtat*</b>		Arytmi, takykardi, hjärtklappning	Bröstsmärta	Angina pectoris	Hjärtstillestånd, hjärtinfarkt	Supraventrikulär takykardi, bradykardi, ventrikulära extrasystolier†, extrasystolier†
<b>Blodkärl*</b>		Hypertoni	Värme-vallningar#		Cerebral arterit och/eller ocklusion, perifer kyla†, Raynauds fenomen	
<b>Andningsvägar, bröstkorg och mediasinum</b>		Hosta, orofaryngeal smärta	Dyspné†			
<b>Magtarm-kanalen</b>		Övre buksmärta, diarré, illamående†, bukbesvär, kräkningar, munorrhet†, dyspepsi#	Förstoppning†			

Organsystem	Biverkning					
	Frekvens					
	Mycket vanliga	Vanliga	Mindre vanliga	Sällsynta	Mycket sällsynta	Ingen känd frekvens
<b>Lever och gallvägar</b>		Förhöjt alaninaminotransferas <sup>#</sup>	Ökning av lever-enzymter		Onormal leverfunktion inklusive akut leversvikt och leverkoma, ökning av alkaliska fosfater och bilirubin <sup>†</sup> i blodet	
<b>Hud och subkutan vävnad</b>		Alopeci, klåda, utslag, urtikaria	Angio-neurotiskt ödem, vesikulösa tillstånd, exfoliativa tillstånd	Hyperhidros <sup>†</sup> , makulära utslag, erytem	Erythema multiforme, exfoliativ dermatit, fixt läkemedelsutslag	
<b>Muskuloskeletala systemet och bindväv</b>		Artralgi, muskel-spänning <sup>#</sup> , muskelpasm <sup>#</sup>	Myalgi <sup>†</sup> , muskelryckningar		Muskelkramp	Trismus
<b>Njurar och urinvägar</b>			Hematuri, pollakisuri			Inkontinen s
<b>Reproduktionsorgan och bröstkörtel</b>		Erektil dysfunction <sup>#</sup>		Gynekomasti		Priapism, kraftig och förlängd erekton
<b>Allmänna symptom och/eller symptom vid administre rings-ställe t</b>		Pyrexia, tillväxtfördröjning under långvarig användning hos barn <sup>*</sup> , trötthet <sup>†</sup> , irritabilitet <sup>#</sup> , nervositet <sup>#</sup> , asten <sup>#</sup> , törst <sup>#</sup>	Bröstsmärta		Plötslig kardiell död*	Obehagskänsla i bröstet <sup>†</sup> , hyperpyrexia
<b>Undersökningar</b>		Förändringar i blodtryck och hjärtfrekvens (vanligtvis ökning)*, viktminsknings*	Blåsljud på hjärtat*		Minskat antal trombocyter, onormalt antal leukocyter	

\* Se avsnitt 4.4

# Frekvens bestämd från kliniska prövningar med vuxna och inte på data från prövningar med barn och ungdomar. Kan också vara relevant för barn och ungdomar.

† Frekvens bestämd från kliniska prövningar med barn och ungdomar och rapporterade i en högre frekvens i kliniska prövningar med vuxna patienter.

## Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

## **4.9 Överdosering**

Vid behandling av överdosering ska den fördröjda frisättningen av metylfenidat från depotberedningar med förlängd verkan beaktas.

### Tecken och symptom

Akut överdos, framförallt till följd av överstimulering av de centrala och sympatiska nervsystemen, kan resultera i kräkningar, agitation, tremor, hyperreflexi, muskelryckningar, konvulsioner (som kan följas av koma), eufori, förvirring, hallucinationer, delirium, svettningar, hudrodnad, huvudvärk, hyperpyrexia, takykardi, hjärtklappning, hjärtarytmier, hypertoni, mydriasis och torra slemhinnor.

### Behandling

Det finns ingen specifik antidot mot överdos med metylfenidat.

Behandling består av lämpliga understödjande åtgärder.

Patienten måste skyddas från att skada sig själv och från externa stimuli som kan förvärra den redan befintliga överstimuleringen. Effekten av aktivt kol har inte fastställts.

Intensivvård måste ges för att upprätthålla adekvat cirkulation och respiration. Avkyllning av kroppen kan krävas vid hyperpyrexia.

Effekten av peritonealdialys eller extrakorporeal hemodialys vid överdosering av metylfenidat har inte fastställts.

## **5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER**

### **5.1 Farmakodynamiska egenskaper**

Farmakoterapeutisk grupp: Psykoanaleptika; centrat verkande sympathomimetika, ATC-kod: N06BA04

### Verkningsmekanism

Metylfenidathydroklorid är ett milt centralstimulerande medel. Den terapeutiska verkningsmekanismen vid ADHD är inte känd. Metylfenidat tros blockera återupptaget av noradrenalin och dopamin till presynaptiska neuron och öka frisättningen av dessa monoaminer till den synaptiska spalten. Metylfenidat är en racemisk blandning bestående av d- och l-isomererna. D-isomeren är mer farmakologiskt aktiv än l-isomeren.

### Klinisk effekt och säkerhet

I de kliniska studier som ligger till grund för registreringen, utvärderades metylfenidat hos 321 patienter som tidigare behandlats med preparat innehållande metylfenidat med omedelbar frisättning och hos 95 patienter vilka inte tidigare behandlats med preparat innehållande metylfenidat med omedelbar frisättning.

Kliniska studier visade att effekterna av metylfenidat kvarstod upp till 12 timmar efter dosering, när medlet togs en gång om dagen på morgonen.

Åttahundranittionio (899) vuxna i åldrarna 18 till 65 år med ADHD utvärderades i tre dubbeldolda, placebokontrollerade studier med studielängder på 5-13 veckor. Viss korttidseffekt har visats för metylfenidat i doserna 18 till 72 mg/dag men detta har inte visats konsekvent längre än 5 veckor. I en studie, i vilken behandlingssvar var definierat som minst 30 % minskning från utgångsvärde i Conners' Adult ADHD Rating Scales (CAARS-skala) för totala ADHD-symtom vid vecka 5 (endpoint) och att man i analysen betraktat patienter som saknar data vid sista besöket som non-responders, svarade en betydligt högre andel patienter på behandlingen med metylfenidat vid doserna 18, 36 eller 72 mg/dag jämfört med placebo. I de andra två studierna, där man i analysen antagit försökspersoner som saknar data från deras sista besök som non-responders, var det numeriskt fördelaktigt för metylfenidat jämfört med placebo men någon statistisk signifikant skillnad i andelen patienter som uppnådde förbestämda kriterier har inte vistats mellan metylfenidat och placebo.

## 5.2 Farmakokinetiska egenskaper

### Absorption

Metylfenidat absorberas effektivt. Metylfenidat frisätts bifasiskt efter en oral engångsdos (depottablett bestående av en fas med omedelbar frisättning och en fas med förlängd frisättning). Komponenten med omedelbar frisättning ger en första koncentrationstoppen efter 1,35 timmar och komponenten med förlängd frisättning ger den andra koncentrationstoppen efter cirka 5,30 timmar. Metylfenidat depottablett tas en gång om dagen och minimerar de fluktuationer mellan topp- och bottenkoncentrationer som uppträder med metylfenidat med omedelbar frisättning som tas tre gånger om dagen. Absorptionsgraden för metylfenidat depottabletter, som tas en gång om dagen, är i allmänhet jämförbar med konventionella beredningar med omedelbar frisättning som tas tre gånger dagligen.

I bioekvivalensstudierna var metylfenidathydroklorid 54 mg depottabletterna bioekvivalenta med originalprodukten (Concerta® 54 mg depottabletter). Detta kan anses gälla även andra styrkor i produktfamiljen.

Efter administrering av metylfenidat 54 mg en gång om dagen till 52 vuxna på fastande mage erhölls följande medelvärden för farmakokinetiska parametrar:  $AUC_{(0-2,5\text{ h})}$  12,95 ng/ml\*h och  $AUC_{(2,5-24\text{ h})}$  97,583 ng/ml\*h,  $C_{\max(0-2,5\text{ h})}$  6,6 ng/ml ja  $C_{\max(2,5-24\text{ h})}$  11,2 ng/ml,  $t_{\max(0-2,5\text{ h})}$  1,4 h ja  $t_{\max(2,5-24\text{ h})}$  5,3 h.

Efter administrering av metylfenidat i engångsdoser om 18, 36 och 54 mg/dag till vuxna, var  $C_{\max}$  och  $AUC_{(0-\infty)}$  för metylfenidat proportionella mot dosen.

### Distribution

Plasmakoncentrationerna av metylfenidat hos vuxna sjunker biexponentiellt efter peroral administrering. Metylfenidats halveringstid hos vuxna efter peroral administrering av metylfenidat var cirka 3,5 timmar. Proteinbindningsgraden av metylfenidat och dess metaboliter är cirka 15 %. Distributionsvolymen för metylfenidat är cirka 13 liter/kg.

### Metabolism

Hos mänskliga metaboliseras metylfenidat huvudsakligen via de-esterifiering till alfa-fenyl-piperidinättiksyra (PPA, cirka 50 gånger nivån för oförändrad substans) som har föga eller ingen farmakologisk aktivitet. Metabolismen hos vuxna av metylfenidat en gång/dag, uppmätt som metabolisering till PPA, liknar den som noterats för metylfenidat tre ggr/dag. Metabolismen vid enstaka eller upprepade doseringar en gång/dag är likartad.

### Eliminering

Halveringstiden för metylfenidat hos vuxna, efter administrering av metylfenidat, är cirka 3,5 timmar. Efter oral administrering utsöndras cirka 90 % i urinen och 1 till 3 % i faeces som metaboliter inom 48 till 96

timmar. Små kvantiteter av oförändrad metylfenidat återfinns i urinen (mindre än 1 %). Den huvudsakliga renala metaboliten är PPA (60–90 %).

Efter peroral administrering av radioaktivt märkt metylfenidat till människa, återfanns cirka 90 % av radioaktiviteten i urinen. Den metabolit som framförallt återfanns i urinen var PPA som stod för cirka 80 % av dosen.

#### *Effekt av födointag*

Inga skillnader avseende farmakokinetiska eller farmakodynamiska egenskaper hos metylfenidat noterades när medlet gavs efter en fetrik frukost eller på fastande mage.

#### Särskilda patientgrupper

##### *Kön*

Hos friska vuxna var medelvärden för dosjusterad  $AUC_{(0-\infty)}$  för metylfenidat 36,7 ng\*tim/ml hos män och 37,1 ng\*tim/ml hos kvinnor. Inga skillnader mellan de båda grupperna noterades.

##### *Etnisk bakgrund*

Hos friska vuxna som fick metylfenidat var värdena för dosjusterad  $AUC_{(0-\infty)}$  likartade och oberoende av etnisk tillhörighet. Underlaget kan dock ha varit för litet för att påvisa etniska variationer med avseende på farmakokinetiska egenskaper.

##### *Pediatriska patienter*

Farmakokinetiken för metylfenidat har inte studerats hos barn under 6 år. Hos barn 7-12 år har följande farmakokinetik-data uppmätts för metylfenidat (medelvärde $\pm$ standardavvikelsen) efter 18 mg:  $C_{max}$  6,0 $\pm$ 1,3 mg/ml,  $T_{max}$  9,4 $\pm$ 0,02 h, ja  $AUC_{0-11,5}$  50,4 $\pm$ 7,8; efter 36 mg:  $C_{max}$  11,3 $\pm$ 2,6 mg/ml,  $T_{max}$  8,1 $\pm$ 1,1 h, och  $AUC_{0-11,5}$  87,7 $\pm$ 18,2; efter 54 mg:  $C_{max}$  15,0 $\pm$ 3,8 mg/ml,  $T_{max}$  9,1 $\pm$ 2,5 h, och  $AUC_{0-11,5}$  121,5 $\pm$ 37,3.

##### *Njurinsufficiens*

Erfarenhet av behandling av patienter med njurinsufficiens med metylfenidat saknas. Efter peroral administrering av radioaktivt märkt metylfenidat till människa, noterades omfattande metabolism av metylfenidat och cirka 80 % av radioaktiviteten utsöndrades via urinen i form av PPA. Eftersom renal clearance inte är eniktig clearanceväg för metylfenidat, antas njurinsufficiens ha liten påverkan på de farmakokinetiska egenskaperna hos metylfenidat.

##### *Leverinsufficiens*

Erfarenhet av behandling av patienter med leverinsufficiens med metylfenidat saknas.

### **5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter**

##### Karcinogenicitet

I karcinogenitetsstudier under hela levnadstiden på mus och råtta noterades ett ökat antal maligna levertumörer endast på hanmöss. Betydelsen av dessa fynd för människa är okänd.

Metylfenidat påverkade inte reproduktionsförmåga eller fertilitet vid låga multipler av klinisk dos.

##### Graviditet, embryo/foster-utveckling

Metylfenidat anses inte vara teratogen hos råtta och kanin. Fostertoxicitet (det vill säga total kullförlust) och maternell toxicitet noterades hos råttor vid doser som var toxiska för modern.

## **6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER**

### **6.1 Förteckning över hjälpmänne**

*Methylphenidate Mylan 18 mg, 27 mg, 36 mg ja 54 mg depottabletter*

*Tablettkärna:*

Sockersärer (sackaros, majsstärkelse), hypromellos, talk, etylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, trietylcitrat, hypromellosacetatsuccinat, karmellosnatrium, mikrokristallin cellulose, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, saltsyra (för justering av pH)

*Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletter*

*Tablettdragering:*

Polyvinylalkohol, makrogol 3350, talk, saltsyra (för justering av pH), titandioxid (E171), gul järnoxid (E172)

*Methylphenidate Mylan 27 mg depottabletter*

*Tablettdragering:*

Polyvinylalkohol, makrogol 3350, talk, saltsyra (för justering av pH), gul järnoxid (E172)

*Methylphenidate Mylan 36 mg depottabletter*

*Tablettdragering:*

Polyvinylalkohol, makrogol 3350, talk, saltsyra (för justering av pH), titandioxid (E171)

*Methylphenidate Mylan 54 mg depottabletter*

*Tablettdragering:*

Polyvinylalkohol, makrogol 3350, talk, saltsyra (för justering av pH), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172)

## **6.2 Inkompatibiliteter**

Ej relevant.

## **6.3 Hållbarhet**

3 år.

## **6.4 Särskilda förvaringsanvisningar**

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

## **6.5 Förpackningstyp och innehåll**

HDPE-burk med barnskyddat PP-skruvlock.

Förpackningsstorlekar:

28 depottabletter (ej Methylphenidate Mylan 27 mg depottabletter)

30 depottabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

## **6.6 Särskilda anvisningar för destruktion**

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

## **7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

Mylan AB  
Box 23033  
104 35 Stockholm

Sverige

**8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

*18 mg:* 31525

*27 mg:* 32954

*36 mg:* 31526

*54 mg:* 31527

**9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE**

*18 mg, 36 mg ja 54 mg:* 22.9.2014/12.5.2019

*27 mg:* 29.8.2016/12.5.2019

**10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN**

31.10.2019