

VALMISTEYHTEENVETO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Primolut Nor 10 mg tabletti

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1 tabletti sisältää 10 mg noretisteroniasetaattia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti 62 mg

Täydellinen apuaineluettelo, ks. 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Tabletti

Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm).

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Vuotohäiriöt, primaarinen ja sekundaarinen amenorrea, kuukautisia edeltävä oireyhtymä, mastopatia, kuukautisten siirtäminen, endometrioosi.

4.2 Annostus ja antotapa

Antotapa

Tabletit on tarkoitettu nieltäväksi kokonaисina nesteen kera.

Primolut Nor -tablettien teho saattaa heikentyä, jos tabletin ottaminen unohtuu. Vain viimeiseksi unohdettu tabletti tulisi ottaa niin pian kuin mahdollista, ja seuraava tabletti otetaan normaaliihin aikaan seuraavana päivänä.

Jos raskauden ehkäisyä tarvitaan, tulee lisäksi käyttää muuta kuin hormonaalista ehkäisymenetelmää (estemenetelmä).

Annostus

Vuotohäiriöt

Kohtuperäinen vuoto, johon ei liity elinvaurioita, saadaan loppumaan 1–3 päivän kuluessa annoksella ½ tablettia (5 mg) 3 kertaa päivässä 10 päivän ajan. Hoidon onnistumisen takaamiseksi Primolut Nor -tablettien ottamista tulee jatkaa yhteensä 10 päivän ajan. Normaalia kuukautisvuotoa intensiteetiltään ja kestoltaan muistuttava tyhjennysvuoto alkaa noin 2–4 päivää hoidon lopettamisen jälkeen.

Vähäinen vuoto hoidon aikana

Joskus potilaalla saattaa esiintyä vähäistä vuotoa vielä sen jälkeen, kun vuoto on ensin saatu tyrehdytettyä. Tablettien ottamista ei pidä keskeyttää, vaikka vähäistä vuotoa esiintyisikin.

Verenvuodon jatkuminen, voimakas läpivuoto

Jos vuoto ei lopu säännöllisestä tablettien ottamisesta huolimatta, tulee elimellisen tai ekstragenitaalisen syyn (esim. polyypit, kohdunkaulan tai kohdun limakalvon syöpä, myooma, abortin jälkeen kohtuun jääneet jäänteet, kohdunulkoinen raskaus, hyytymishäiriöt) mahdollisuutta harkita jatkotoimenpiteitä varten. Näin tulee tehdä myös, jos runsas verenvuoto alkaa vuodon loppumisen jälkeen, vaikka tablettihoito jatkuu edelleen.

Vuotohäiriöiden uusiutumisen estäminen

Vuotohäiriöiden uusiutumisen estämiseksi anovulatorisen kierron yhteydessä Primolut Nor -tabletteja suositellaan käytettäväksi profylaktisesti: $\frac{1}{2}$ tablettia (5 mg) 1–2 kertaa päivässä kierron 16.–25. päivinä (kierron 1. päivä = 1. vuotopäivä). Tyhjennysvuoto alkaa muutaman päivän kuluttua tablettien ottamisen lopettamisesta.

Primaarinen ja sekundaarinen amenorrea

Raskauden mahdollisuus tulee sulkea pois ennen sekundaarisen amenorrean hoitoa hormonivalmisteilla.

Ennen hoidon alkua tulisi sulkea pois prolaktinia tuottavan aivolisäkekasvaimen olemassaolo, sillä suuria estrogeeniannoksia pitkään käytettäessä ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että makroadenoomien koko kasvaa.

Kuukautisvuota muistuttavan vuodon aikaansaamiseksi potilaalle tulee antaa estrogeenia (esim. 14 päivän ajan) ennen Primolut Nor -hoidon aloittamista. Estrogeenihoitoon lisätään Primolut Nor annoksella $\frac{1}{2}$ tablettia (5 mg) 1–2 kertaa päivässä 10 päivän ajan. Tyhjennysvuoto alkaa muutaman päivän kuluttua tablettien ottamisen lopettamisesta.

Jos riittävä endogeeninen estrogeenituotanto on saatu aikaan, estrogeenin antaminen voidaan lopettaa ja syklin mukainen vuoto voidaan yrittää saada alkamaan Primolut Nor -annoksella $\frac{1}{2}$ tablettia (5 mg) 2 kertaa päivässä kierron 16.–25. päivänä.

Kuukautisia edeltävä oireyhtymä, mastopatia

Kuukautisia edeltäviä oireita, kuten päänsärkyä, alakuloisuutta, turvotusta ja rintojen aristusta, voidaan lievittää annoksella $\frac{1}{2}$ tablettia 1–3 kertaa päivässä kierron luteaalivaiheen aikana.

Kuukautisten siirtäminen

Kuukautisia voidaan siirtää myöhemmäksi Primolut Nor -tableteilla, mutta vain sellaisen kierron aikana, jolloin raskaus ei ole mahdollinen.

Annostus: $\frac{1}{2}$ tablettia (5 mg) 2–3 kertaa päivässä enintään 10–14 päivän ajan. Tablettien ottaminen aloitetaan noin 3 päivää ennen oletettua kuukautisten alkamista. Vuoto alkaa 2–3 päivän kuluttua hoidon lopettamisesta.

Endometrioosi

Hoito aloitetaan kierron 1.–5. päivänä annoksella $\frac{1}{2}$ tablettia (5 mg) 2 kertaa päivässä. Jos potilaalla esiintyy tiputteluvuotoa, annosta lisätään 1 tablettiin 2 kertaa päivässä. Kun vuoto lakkaa, voidaan palata alkuperäiseen annostukseen. Hoitoa jatketaan vähintään 4–6 kuukauden ajan. Päivittäisen hoidon aikana ei yleensä esiinny ovulaatioita eikä kuukautisvuotoja.

Tyhjennysvuoto alkaa, kun hormonihoito lopetetaan.

4.3 Vasta-aiheet

Primolut Nor -tabletteja ei tule käyttää, jos potilaalla on jokin alla mainituista tiloista; niihin liittyviä tietoja on kerätty myös pelkästään progestiinia sisältävien valmisteiden sekä yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön yhteydessä. Jos jokin alla mainituista todetaan Primolut Nor -tablettien käytön aikana, valmisteen käyttö tulee lopettaa välittömästi:

- raskaus tai sen epäily
- imetys
- aktiivinen tai aiemmin sairastettu laskimon tai valtimon tromboottinen tai tromboembolinen tapahtuma (esim. syvä laskimotukos, keuhkoembolia, sydäninfarkti) tai aivoverisuonitapahtuma
- aktiivinen tai aiemmin sairastettu tromboosin ennakkooire (esim. ohimenevä iskeeminen kohtaus, angina pectoris)
- kohonnut laskimo- tai valtimotromboosin riski (ks. kohta 4.4)
- aiemmin esiintynyt migreeni, johon liittyy fokaalisia neurologisia oireita
- diabetes mellitus, johon liittyy verisuonikomplikaatioita
- vakava maksasairaus (myös aiemmin sairastettu), jos maksan toiminta-arvot eivät ole palautuneet normaaliksi
- hyvän- tai pahanlaatuiset maksakasvaimet (myös aiemmin sairastetut)
- sukupuolihormoneista riippuvaiset pahanlaatuiset muutokset tai niiden epäily (esim. sukupuolielimissä tai rinnossa)
- yliherkkyyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Primolut Nor -valmisten samanaikainen käyttö ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmän sekä dasabuviiria sisältävien lääkevalmisteiden kanssa on vasta-aiheista (ks. kohdat 4.4 ja 4.5).

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jos potilaalla on jokin alla mainituista sairauksista tai riskitekijöistä tai se pahenee, on riskit ja hyödyt analysoitava ennen Primolut Nor -hoidon aloittamista tai jatkamista.

Verenkiertohäiriöt

Epidemiologisten tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että ovulaation estävien oraalisten estrogeenia ja progestiinia sisältävien valmisteiden käyttö ja tromboembolisten sairauksien suurentunut riski ovat yhteydessä toisiinsa. Tromboembolisen riskin suureneminen tulee pitää mielessä erityisesti, jos potilaalla on aiemmin ollut tromboembolinen sairaus.

Laskimotukoksen tunnettuja riskitekijöitä ovat esimerkiksi potilaalla tai hänen lähisuvussaan aiemmin ilmennyt laskimotukos (sisaruksellla tai vanhemmalla suhteellisen nuorena ilmennyt laskimotukos), ikä, ylipaino, pitkittynyt liikkumattomuus, suuri leikkaus tai trauma.

Kohonnut laskimotukoksen riski lapsivuodeaikana on otettava huomioon.

Hoito tulee lopettaa välittömästi, jos potilaalla ilmenee laskimo- tai valtimotukoksen oireita tai niitä epäillään.

Kasvaimet

Joskus harvoin noretsteronin kaltaisten hormonien käyttäjillä on raportoitu hyvänlaatuisia ja vielä harvemmin pahanlaatuisia maksakasvaimia. Yksittäistapauksissa nämä kasvaimet ovat aiheuttaneet hengenvaarallisia sisäisiä vatsaonteloverenvuotoja. Erotusdiagnostisesti maksakasvaimen mahdollisuutta tulisi harkita, kun Primolut Nor -valmisten käyttäjällä on voimakasta ylävatsakipua, suurentunut maksa tai merkkejä vatsaontelonsisäisestä verenvuodosta.

Muut

Diabeetikkoja tulee seurata huolellisesti Primolut Nor -hoidon aikana.

Maksaläiskiä saattaa joskus ilmetä, etenkin jos potilaalla on ollut niitä aiemmin raskauden aikana. Maksaläiskille alittiiden naisten tulisi välttää altistumista auringonvalolle ja ultraviolettisäteilylle Primolut Nor -hoidon aikana.

Masennusta aiemmin sairastaneita potilaita tulee seurata huolellisesti, ja lääkkeen käyttö tulee lopettaa, jos aiempaa vakavampia masennusoireita ilmenee hoidon aikana.

Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imetyymishäiriö, ei tule käyttää tästä lääkettä.

Lääkärintarkastus

Ennen Primolut Nor -hoidon aloittamista on selvitettyvä potilaan aiemmat sairaudet ja tehtävä perusteellinen lääkärintarkastus ja gynekologinen tutkimus ottaen huomioon valmisten vasta-aiheet (ks. kohta 4.3) ja varoitukset (ks. kohta 4.4). Tutkimukset tulee toistaa Primolut Nor -hoidon aikana. Tutkimusten tihys ja luonne sovitaan yksilöllisesti, mutta tutkimusten aikana mitataan yleensä verenpaine, tutkitaan rinnat, alavatsa ja sukupuolielimet ja otetaan kohdunkaulan irtosolunäyte.

Valmisten käyttö tulee lopettaa heti, jos potilaalla esiintyy jokin alla luetelluista tiloista:

Ensimmäistä kertaa esiintyvä migreenityypin päänsärky tai poikkeuksellisen vaikean päänsäryyn ilmeneminen yhä useammin, äkillinen aistitoiminnon häiriö (esim. näkökyvyn tai kuulon häiriöt), tromboflebitin tai tromboembolisten tapahtumien ensioireet (esim. jalkojen epätavallinen kipu tai turvotus, hengittäessä tai yskiessä ilmenevä pistävä kipu ilman selvää syttä), kipu ja puristava tunne rinnassa, sovittu leikkaus (6 viikkoa ennen), immobilisaatio (esim. onnettomuuden yhteydessä), keltaisuus tai hepatiitti, johon ei liity keltaisuutta, yleistynyt kutina, verenpaineen merkittävä nousu, raskaus.

Lisävaroitukset, jotka perustuvat noretisteronin osittaiseen metaboloitumiseen etinylyiestradioliksi

Noretisteroni metaboloituu osittain etinylyiestradioliksi suun kautta tapahtuvan annostelun jälkeen. Tämä muutos johtaa annokseen 4–6 mikrogrammaa etinylyiestradiolia / 1 mg noretisteroniasetaattia (suun kautta otettuna) (ks. kohta 5.2).

Johtuen noretisteronin osittaisesta muuttumisesta etinylyiestradioliksi, Primolut Nor -tablettien oletetaan aiheuttavan samanlaisia farmakologisia vaikutuksia kuin yhdistelmäehkäisyvalmisteilla on havaittu. Tämän vuoksi seuraavat yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyvät yleiset varoitukset on lisäksi otettava huomioon:

Verenkiertohäiriöt

Laskimotromboembolian lisääntynyt riski on suurin yhdistelmäehkäisytablettien ensimmäisen käyttövuoden aikana, kun käyttö aloitetaan ensimmäistä kertaa tai uudelleen vähintään kuukauden tauon jälkeen.

Epidemiologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että laskimotromboemboliaa esiintyy matalaestrogeenisten, suun kautta otettavien yhdistelmäehkäisyvalmisteiden (< 50 mikrogrammaa etinylyiestradiolia) käytön yhteydessä noin 20–40 tapausta 100 000 naisvuotta kohti ja arvioitu riski vahitelee progestiinista riippuen. Vastaavasti esiintyvyys on 5–10 tapausta 100 000 naisvuotta kohti naisilla, jotka eivät käytä ehkäisytabletteja. Kaikkien yhdistelmäehkäisytablettien käyttö lisää laskimotromboembolian riskiä ei-käyttäjiin verrattuna. Tämä kohonnut riski on pienempi kuin raskauteen liittyvä riski, jonka on arvioitu olevan 60 tapausta 100 000 raskautta kohti.

Laskimotromboembolia voi olla henkeä uhkaava tai kuolemaan johtava (1–2 % tapauksista).

Laskimotromboembolia, joka ilmenee syvänä laskimotromboosina ja/tai keuhkoemboliana, voi esiintyä kaikkien yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön aikana.

Muiden verisuonten, kuten maksan, suoliliepen, munuaisten, aivojen tai verkkokalvon laskimo- tai valtimotrombooseja on raportoitu esiintyneen ehkäisytablettien käytäjillä erittäin harvoin.

Laskimon tai valtimon tromboottisen/tromboembolisen tapahtuman tai aivohalvauksen oireita voivat olla:

- jalan toispuolinen epätavallinen kipu ja/tai turvotus
- äkillinen vaikea rintakipu, riippumatta siitä, sateileekö se vasempaan käsviin tai ei
- äkillinen hengästyminen
- äkillisesti alkanut yskä
- poikkeuksellinen, vaikea, pitkittynyt päänsärky
- äkillinen, osittainen tai täydellinen näönmenetys
- kaksoiskuvat
- puheen puuroutuminen tai afasia
- kiertohuimaus
- pyörtyminen, johon voi liittyä fokaalinen epileptinen kohtaus
- vartalon toisen puolen tai jonkin ruumiinosan äkillinen heikkous tai erittäin huomattava tunnottomuus
- motoriset häiriöt
- akuutti vatsa.

Mahdollinen tromboosin lisääntynyt synergistinen riski on otettava huomioon naisilla, joilla on useita riskitekijöitä tai joilla yksittäisen riskitekijän vakavuus on suuri. Yksittäinen kohonnut riskitekijä voi olla suurempi kuin useiden riskitekijöiden kumuloituminen. Yhdistelmäehkäisyvalmisteita ei saa määräätä naiselle, jos riski-hyötyarvio on negatiivinen (ks. kohta 4.3)

Laskimo- tai valtimotromboemboliakomplikaatioiden ja aivoverisuonitapahtumien riskiä lisäävät seuraavat tekijät:

- ikä
- lihavuus (painoindeksi yli 30 kg/m²)
- positiivinen sukuanamneesi (laskimo- tai valtimotromboembolia sisaruksella tai vanhemmalla suhteellisen nuorena). Jos perinnöllistä alittiota epäillään, nainen on syytä ohjata erikoislääkärin konsultaatioon, ennen kuin yhdistelmäehkäisytablettien käytöstä päätetään.
- pitkääkainen immobilisaatio, suuri leikkaus, alaraajaleikkaus tai suuri trauma. Näissä tilanteissa ehkäisytablettien käyttö on syytä keskeyttää (vähintään neljä viikkoa ennen elektiivistä kirurgiaa) ja aloittaa uudelleen aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun liikuntakyky on täysin palautunut.
- tupakointi (riski lisääntyy runsaasti tupakoivilla sekä iän myötä, erityisesti yli 35-vuotiailla)
- dyslipoproteinemia
- hypertensio
- migreeni
- sydämen läppävika
- eteisvärinä.

Suonikohjujen tai pinnallisen tromboflebiitin ja laskimotromboosin välisestä yhteydestä ei ole yksimielisyyttä.

Muita haitallisiin verisuonitapahtumiin yhdistettyjä tiloja ovat diabetes, SLE, hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä, krooninen tulehdusellinen suolistosairaus (Crohnin tauti tai colitis ulcerosa) ja sirppisoluanemia.

Jos migreenikohtaukset tihenevät tai voimistuvat yhdistelmäehkäisytablettien käytön yhteydessä (mahdollinen aivoverisuonitapahtuman ennakkooire), voi olla syytä lopettaa niiden käyttö välittömästi.

Biokemialliset tekijät, jotka voivat viitata perinnölliseen tai hankittuun valtimo- tai laskimotromboosin alttiuteen, ovat APC-resistenssi, hyperhomokystinemia, antitrombiini-III:n puutos, C- ja S-proteiinin puutos, antifosfolipidivasta-aineet (kardioliipiinivasta-aine, lupusantikoagulantti).

Arvioitaessa riskejä ja hyötyjä on otettava huomioon, että tilan asianmukainen hoito voi laskea siihen liittyvän tromboosin riskiä ja että raskauteen liittyvä tromboosiriski on suurempi kuin matala-annoksissa yhdistelmähkäisyvalmisteilla (< 0,05 mg etinyylestriolia).

Kasvaimet

Kohdunkaulasyövän tärkein riskitekijä on pitkittynyt papilloomavirustartunta (HPV-tartunta). Joissakin epidemiologissa tutkimuksissa on raportoitu kohdunkaulasyövän riskin kasvaneen yhdistelmähkäisytablettien pitkääikäiskäytön yhteydessä, mutta yksimielisyyttä ei ole siitä, missä määrin tähän havaintoon vaikuttavat sekoittavat tekijät, kuten kohdunkaulan seulontatutkimukset ja sukupuolikäyttäytyminen mukaan lukien estemenetelmiä käyttö raskauden ehkäisyyn.

Meta-analyysi 54 epidemiologisesta tutkimuksesta osoitti, että yhdistelmähkäisytablettien käyttäjien suhteellinen rintasyöpäriski on hieman suurentunut (suhteellinen riskikerroin 1,24). Tämä riski häviää vähitellen 10 vuoden kuluessa yhdistelmähkäisytablettien käytön lopettamisesta. Koska rintasyöpä on harvinainen alle 40-vuotiailla naisilla, on yhdistelmähkäisytabletteja käyttävillä tai hiljattain niihä käytäneillä havaittu rintasyöpädiagoosien ylimäärä pieni verrattuna rintasyöpäriskiin koko elinaikana. Nämä tutkimukset eivät anna näyttöä kausaliteetista. Havaittu riskin suureneminen voi johtua rintasyövän varhaisemasta diagnoosista yhdistelmähkäisytablettien käyttäjillä, yhdistelmähkäisytablettien biologista vaikutusta tai molemmista. Lisäksi käyttäjiltä diagnosoidut rintasyöpätapaukset ovat yleensä kliinisesti varhaisemmassa vaiheessa kuin ehkäisytabletteja käyttämättömiltä diagnosoidut rintasyöpätapaukset.

Pahanlaatuiset kasvaimet voivat olla henkeä uhkaavia tai kuolemaan johtavia.

Muut tilat

Naisilla, joilla on hypertriglyceridemia tai sitä esiintyy suvussa, saattaa olla suurentunut haimatulehdusen riski yhdistelmähkäisytablettien käytön aikana.

Vähäistä verenpaineen kohoamista on raportoitu monilla yhdistelmähkäisytablettien käyttäjillä, mutta kliinisesti merkitsevä verenpaineen kohoaminen on harvinaista.

Jos yhdistelmähkäisytablettien käytön aikana potilaalle kuitenkin kehittyy kliinisesti merkitsevä hypertensio, yhdistelmähkäisytablettien käyttö on lopetettava ja kohonnut verenpaine on hoidettava. Yhdistelmähkäisytablettien käyttöä voidaan jatkaa, jos verenpainelääkityksellä saadaan aikaan normotensio.

Seuraavia sairaustiloja tai niiden pahenemista on raportoitu esiintyneen sekä raskauden että yhdistelmähkäisytablettien käytön yhteydessä, mutta niiden yhteydestä yhdistelmähkäisytablettien käyttöön ei ole pitävä näyttöä: kolestaasiin liittyvä keltaisuus ja/tai kutina, sappikivet, porfyria, SLE, hemolyttis-ureeminen oireyhtymä, Sydenhamin korea, herpes gestationis, otoskleroosiin liittyvä kuulon alenema.

Perinnöllistä angioedeemaa sairastavilla naisilla estrogeenien käyttö saattaa aiheuttaa tai pahentaa angioedeeman oireita.

Yhdistelmähkäisytablettien käytön keskeyttäminen saattaa olla tarpeen akuuteissa tai kroonisissa maksan toimintahäiriöissä, kunnes maksan toimintakokeiden arvot ovat normalisoituneet. Yhdistelmähkäisytablettien käyttö on lopetettava, jos aiemmin raskausaikana tai aiemman sukupuolihormonien käytön aikana on ilmennyt kolestaasiin liittyvä keltaisuutta ja/tai kutina uusiutuu.

Yhdistelmähkäisytablettien käyttoon on yhdistetty Crohnin tauti ja colitis ulcerosa.

ALAT-arvojen kohoaminen

Kliinisissä tutkimuksissa, joissa potilaat saivat hepatiitti C-virusinfektion hoitoon ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmää sisältävä lääkevalmisteesta sekä dasabuviria yhdessä ribaviriinin kanssa tai ilman, transaminaasiarvot (ALAT) kohosivat yli 5-kertaisiksi normaaliarvoihin (upper limit of normal, ULN) nähden merkittävästi useammin naisilla, jotka käyttivät etinyyliestradiolia sisältäviä valmisteita (kuten hormonaalisia yhdistelmähkäisyvalmisteita). Koska noretisteroni metaboloituu osittain etinyyliestradioliksi, tämä varoitus koskee naisia, jotka käyttävät noretisteronia (ks. kohdat 4.3 ja 4.5).

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Huomautus: Mahdollisten yhteisvaikutusten varalta tulee tutustua kaikkien samanaikaisesti käytettävien lääkkeiden valmisteyleyhteenvetoihin.

Muiden lääkevalmisteiden vaikutus Primolut Nor -valmisteeseen

Lääkeaineinteraktioita voi esiintyä käytettäessä maksaaentsyymejä indusoivia lääkkeitä, mikä voi johtaa sukupuolihormonien lisääntyneeseen puhdistumaan ja voi aiheuttaa vuotoprofiiliin muutoksia ja/tai heikentää valmisteen tehoa.

Entsyymi-induktio on havaittavissa jo parin hoitopäivän jälkeen. Maksimaalinen entsyymi-induktio havaitaan yleensä muutaman viikon sisällä. Induktio voi jatkua vielä neljän viikon ajan lääkehoidon päätyttyä.

Lääkeaineet, jotka lisäävät sukupuolihormonien puhdistumaa (entsyymi-induktion aiheuttama tehon heikkeneminen):

Fenytoini, barbituraatit, bosentaani, primidoni, karbamatepiini, rifampisiini ja HIV-lääkkeet ritonaviiri, nevirapiini ja efavirensi sekä mahdollisesti myös okskarbatsepiini, topiramaatti, felbamaatti, griseofulviini ja mäkkiusmaa (*Hypericum perforatum*) sisältävät rohdosvalmisteet.

Lääkeaineet, joilla on vaihteleva vaikutus sukupuolihormonien puhdistumaan

Useat HIV/HCV-proteasin estääjät ja ei-nukleosidiset käänteiskopiojaentsyymin estääjät saattavat suurentaa tai pienentää estrogeenin tai progestiinin plasmakonsentraatiota annettaessa samanaikaisesti sukupuolihormoneita. Nämä muutokset voivat tietyissä tapauksissa olla kliinisesti merkittäviä.

Aineet jotka vähentävät sukupuolihormonien puhdistumaa (entsyymi-inhibiitorit):

Entsyymi-inhibiittoreiden ja sukupuolihormonien välisen mahdollisten yhteisvaikutusten kliininen merkittävyys on tuntematon.

Vahvat ja kohtalaiset CYP3A4-inhibiitorit kuten atsolisienilääkkeet (esim. itrakonatsoli, vorikonatsoli, flukonatsoli), verapamiili, makrolidit (esim. klaritromysiini, erytromysiini), diltiatseemi ja greippimehu voivat nostaa plasman estrogeenin ja/tai progestiinin pitoisuutta.

Etorikoksibin 60–120 mg päiväänäksen on havaittu nostavan etinyyliestradiolin plasmapitoisuutta 1,4–1,6-kertaiseksi käytettäessä samanaikaisesti yhdistelmähormonivalmisteiden kanssa, jotka sisältävät 0,035 mg etinyyliestradiolia.

Primolut Nor -valmisteen vaikutus muihin lääkevalmisteisiin

Progestiinit saattavat vaikuttaa muiden lääkkeiden metabolismaan niin, että lääkkeiden pitoisuudet plasmassa ja kudoksissa voivat joko nousta (esim. siklosporiini) tai laskea (esim. lamotrigiini).

Kliinisen tutkimustiedon perusteella etinyyliestradioli estää CYP1A2-substraattien puhdistumaa, joka johtaa heikkoon (esim. teofylliini) tai kohtalaiseen (esim. titsanidiini) nousuun näiden plasmapitoisuksissa.

Farmakodynamiset yhteisvaikutukset

Samanaikaiseen käyttöön ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmää sekä dasabuviaaria sisältävien lääkevalmisteiden kanssa, joko yhdistettyinä ribaviriinin kanssa tai ilman, liittyy suurentunut ALAT-arvon kohoaamisen riski (ks. kohdat 4.3 ja 4.4). Primolut Nor -valmisten käyttö voidaan aloittaa uudestaan 2 viikkoa tämän hoidon päättymisen jälkeen.

Muut yhteisvaikutukset

Laboratoriotutkimukset

Progesteriinin käyttö saattaa vaikuttaa joidenkin laboratoriotutkimusten tuloksiin, esim. maksan biokemialliset arvot, kilpirauhasen, lisämunuaisten ja munuaisten toimintakoheet, (kantaja)proteiinien pitoisuus plasmassa (esim. kortikosteroideja sitova globuliini ja lipidi-/lipoproteiinifraktiot), hiilihydraattien metabolia ja hyytymis- ja fibrinolyysiарвот. Muutokset pysyvät yleensä viiterajoissa.

4.6 He deImällisyys, raskaus ja imetyks

Raskaus

Valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana.

Imetyks

Valmistetta ei tulisi käyttää imetyksen aikana.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisten vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

4.8 Haittavaikutukset

Haittavaikutukset ovat yleisempää ensimmäisten hoitokuukausien aikana ja häviävät vähitellen hoidon jatkessa. Kohdassa 4.4 (Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet) mainittujen haittavaikutusten lisäksi Primolut Nor -valmisten käytön aikana on raportoitu seuraavassa taulukossa mainittuja haittavaikutuksia, mutta niiden syy-yhteyttä valmisteeseen ei ole aina pystytty osoittamaan.

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto haittavaikutuksista MedDRA-järjestelmän mukaan elinryhmittäin. Haittavaikutusten yleisyysluokitus perustuu markkinoille tulon jälkeen saatuihin tietoihin ja tutkimustuloksiin.

Elinjärjestelmä (MedDRA)	Hyvin yleinen ($\geq 1/10$)	Yleinen ($\geq 1/100$, $< 1/10$)	Melko harvinainen ($\geq 1/1\,000$, $< 1/100$)	Harvinainen ($\geq 1/10\,000$, $< 1/1\,000$)	Hyvin harvinainen ($< 1/10\,000$)
Immunojärjestelmä				Yliherkkyyss-reaktiot	
Hermosto		Päänsärky	Migreeni		
Silmät					Näkökyvyn häiriöt
Hengityselimet, rintakehä- ja välikarsina					Hengen-ahdistus
Ruoansulatuselimistö		Pahoinvointi			
Iho ja iholalainen kudos				Nokkosihottuma Ihottuma	

Elinjärjestelmä (MedDRA)	Hyvin yleinen (≥ 1/10)	Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)	Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)	Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)	Hyvin harvinainen (< 1/10 000)
Sukupuolielimet ja rinnat	Kohdun ja emättimen verenvuoto mukaan lukien tiputtele* Hypomenorrea*	Amenorrea*		Rintojen arkuus Libidon muutokset	
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat		Turvotus			

* Endometrioosi-käyttöaiheessa

Taulukossa on käytetty sopivinta MedDRA-termiä kuvaamaan tiettyä haittavaikutusta ja sen synonyymejä ja sairauksiin liittyviä muita tiloja.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisten hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Tervydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

4.9 Yliannostus

Akuuttien toksisuustutkimusten perusteella akuuttien haittavaikutusten riskiä ei ole, vaikka noretisteroniasettaattia otettaisiin vahingossa moninkertainen terapeuttinen annos.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeutinen ryhmä: Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet, progestageenit, estreenijohdokset
ATC-koodi: G03DC02

Noretisteroni on vahva progestiini. Asianmukaista estrogeenihoitoa saaville naisille kohdun limakalvon täydellinen transformaatio kasvuvalheesta eritysvaiheeseen saadaan aikaan suun kautta annettavilla 100–150 mg:n noretisteroniannoksilla. Primolut Nor -hoidon vaikutus vuotohäiriöiden, primaarisen ja sekundaarisen amenorrean ja endometrioosin hoidossa perustuu kohdun limakalvoon kohdistuvaan progestiinivaikutukseen.

Gonadotropiinin eritys ja ovulaatio saadaan estettyä päivittäisellä 0,5 mg:n annoksella noretisteroniasettaattia. Primolut Nor -hoidon positiiviset vaikutukset kuukautisia edeltäviin oireisiin perustuvat munasarjojen toiminnan estämiseen.

Kohdun limakalvoon kohdistuvien vaikutusten ansiosta noretisteronilla voidaan siirtää kuukautisten alkamisaikaa.

Noretisteroni nostaa peruslämpöä kuten progesteroni.

5.2 Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suun kautta otettu noretisteroniasetaatti imeytyy nopeasti ja täydellisesti laajalla annostasolla. Imeytymisen ja maksan ensikierron aikana noretisteroniasetaatti hydrolysoituu vaikuttavaksi aineeksi noretisteroniksi sekä etikkahapoksi. Noretisteronin huippupitoisuudet plasmassa (noin 18 ng/ml 5 mg:n noretisteroniasetaattianonksen jälkeen ja noin 25 ng/ml 10 mg:n annoksen jälkeen) saavutetaan noin 2 tunnin kuluttua Primolut Nor -tabletin ottamisesta. Suhteellista hyötyosuutta tutkitaessa on aineen todettu vapautuvan tabletista täydellisesti.

Jakautuminen

Noretisteroni sitoutuu seerumin albumiiniin ja sukupuolihormoneja sitovaan globuliiniin (SHBG). Vain noin 3–4 % lääkeaineen kokonaispitoisuudesta seerumissa on vapaana steroidina, ja 35 % on sitoutunut SHBG:iin ja 61 % albumiiniin. Noretisteronin jakaantumistilavuus on $4,4 \pm 1,3 \text{ l/kg}$. Suun kautta otetun lääkkeen pitoisuus seerumissa vähenee kahdessa vaiheessa, joiden puoliintumisajat ovat 1–3 tuntia ja noin 5–13 tuntia.

Noretisteronia erittyy äidinmaitoon, ja sen pitoisuus äidinmaidossa on noin 10 % aineen pitoisuudesta äidin plasmassa lääkkeen antoreitistä riippumatta. Jos oletetaan, että lääkkeen keskimääräinen huippupitoisuus äidin seerumissa on noin 16 ng/ml ja lapsi imee päivittäin noin 600 ml maitoa, enintään noin 1 mikrog lääkettä (0,02 % äidin annoksesta) voi päästä lapsen verenkiertoon.

Biotransformaatio

Noretisteroni metaboloituu pääasiassa siten, että rengas A:n kaksoissidos saturoituu ja 3-ketaryhmä pelkistyy hydroksyyliryhmäksi, mitä seuraa konjugoituminen vastaaviksi sulfataateiksi ja glukuronideiksi. Jotkut metaboliiteista erittyvät plasmasta suhteellisen hitaasti ($t_{1/2}$ noin 67 h), ja siksi niitä kertyy plasmaan, kun noretisteronia käytetään päivittäin pitkään.

Noretisteroni tai noretisteroniasetaatti metaboloituu osittain etinyliestradioliksi ihmisillä suun kautta tapahtuvan annostelun jälkeen. Tämä muutos johtaa annokseen 4–6 mikrogrammaa etinyliestradiolia / 1 mg noretisteronia tai noretisteroniasetaattia (suun kautta otettuna).

Eliminaatio

Merkittäviä määriä muuttumatonta noretisteronia ei erity. Pääasiassa rengas A:n suhteenvaihtelut ja hydroksyloituja metaboliitteja sekä niiden konjugaatteja (glukuronideja ja sulfaatteja) erittyy virtsaan ja ulosteisiin suhteessa 7:3. Pääosa munuaisten kautta erityvistä metaboliiteista erittyy 24 tunnin kuluessa, ja niiden puoliintumisaika on noin 19 tuntia.

Vakaan tilaan

Vaikka noretisteronia otettaisiin useita annoksia päivittäin, ei sen kertyminen elimistöön ole todennäköistä suhteellisen lyhyen puoliintumisajan takia. Jos samanaikaisesti kuitenkin annetaan SHBG:a indusoivia aineita, kuten etinyliestradiolia, saattaa noretisteronin pitoisuus seerumissa lisääntyä, koska se sitoutuu SHBG:iin.

5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta ja karsinogeenisuutta koskeviin konventionaalisiin tutkimuksiin perustuvat tiedot noretisteronista ja sen estereistä eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisiille sen lisäksi, mitä muissa kohdissa on jo kerrottu. On kuitenkin muistettava, että sukupuolisteroidit saattavat stimuloida hormoneista riippuvien kudosten ja tuumoreiden kasvua.

Lisääntymis- ja kehitystoksikologisissa tutkimuksissa havaittiin, että valmisten käyttö suurina annoksina ulkoisten sukupuolielinten kehittymisen aikana johtaa naarassikiöiden maskulinisoitumiseen. Koska epidemiologiset tutkimukset osoittavat, että suuria annoksia käytettäessä näin tapahtuu myös ihmisen, on otettava huomioon, että Primolut Nor voi aiheuttaa tyttösikiöissä virilisoitumista, jos valmistetta käytetään hormoniherkän somaattisen sukupuolisen eriytymisvaiheen aikana (45. raskauspäivän jälkeen). Tutkimusten mukaan aineella ei kuitenkaan ole teratogeenisia vaikutuksia.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

laktoosimonohydraatti
maissitärkkelys
povidoni 25 000
talkki
magnesiumstearaatti

6.2 Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3 Kestoaika

5 vuotta.

6.4 Säilytys

Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko

30 tablettia läpipainopakkauksessa (PVC/Alumiini).

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Säilytä kaikkia lääkkeitä asianmukaisesti ja poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Bayer Oy
Pansiontie 47
20210 Turku

8. MYYNTILUVAN NUMERO

4840

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUSIMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 19.7.1967

Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: 24.6.2008

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

7.6.2021

PRODUKTRESUMÉ

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Primolut Nor 10 mg tablett

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En tablett innehåller 10 mg noretisteronacetat.

Hjälpméne med känd effekt: 62 mg laktosmonohydrat

För fullständig förteckning över hjälpmännen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Tablett

Läkemedlets utseende: Vit, rund tablett med krysskåra, märkt med AN inom sexhörning på ena sidan (7 mm i diameter).

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Blödningsstörningar, primär och sekundär amenorré, premenstruell syndrom, mastopati, uppskjutning av menstruation, endometrios.

4.2 Dosing och administreringssätt

Administreringssätt

Tabletterna ska sväljas hela med vätska.

Effekten av Primolut Nor kan vara nedsatt vid glömd tablett. Endast den senast glömda tabletten ska tas så snart som möjligt och nästa tablett tas vid vanlig tid följande dag.

Om skydd mot graviditet krävs ska ett icke-hormonellt preventivmedel användas (barriärmetod).

Dosing

Blödningsstörningar

Blödningar från livmodern, som inte involverar organiskador, upphör inom 1 till 3 dagar med doseringen $\frac{1}{2}$ tablett (5 mg) 3 gånger dagligen i 10 dagar. För att säkerställa effektiv behandling ska intag av Primolut Nor tabletterna fortsätta i totalt 10 dagar. En bortfallsblödning som till intensitet och längd liknar normal menstruationsblödning uppträder inom 2–4 dagar efter att behandlingen avslutats.

Mindre blödningar under behandlingen

Mindre blödningar kan ibland förekomma efter att blödningen först har upphört. Tablettintaget ska inte avbrytas även om mindre blödning förekommer.

Uteblivet upphörande av blödning, kraftig genombrottsblödning

Om blödningen inte upphör trots regelbundet intag av tabletterna måste organiska eller extragenitala orsaker utredas (t.ex. polyper, cancer i livmoderhalsen eller i livmoderslembhinnan, myom, rester efter en abort, utomkvedshavandeskap, koagulationsstörningar) så att nödvändiga åtgärder kan vidtas. Detta ska även göras om riklig blödning uppträder på nytt efter det att blödningen först upphört, trots att behandlingen med tabletter fortsätter.

Recidivprofylax av blödningsstörningar

För att förebygga att blödningsstörningar återuppstår i samband med anovulatoriska cykler, rekommenderas att Primolut Nor tablettar administreras profylaktiskt: $\frac{1}{2}$ tablett (5 mg) 1–2 gånger dagligen från den 16:e till den 25:e dagen i cykeln (1:a dagen i cykeln = 1:a blödningsdagen). Bortfallsblödning uppträder några dagar efter att den sista tabletten har tagits.

Primär och sekundär amenorré

Möjlighet till graviditet ska uteslutas innan hormonbehandling av sekundär amenorré påbörjas.

Innan behandling påbörjas måste förekomsten av en prolaktinproducerande tumor i hypofysen uteslutas, eftersom man med dagens kunskap inte kan utesluta möjligheten att makroadenomen kan öka i storlek vid längre tids behandling med höga doser av östrogen.

För att uppnå menstruationsliknande blödning ska patienten ges östrogen (t.ex. i 14 dagar) innan behandlingen med Primolut Nor inleds. Till östrogenbehandlingen tillsätts Primolut Nor med dosen $\frac{1}{2}$ tablett (5 mg) 1–2 gånger dagligen i 10 dagar. Bortfallsblödning uppträder några dagar efter att den sista tabletten har tagits.

Om tillräcklig endogen östrogenproduktion uppnåtts kan östrogenbehandlingen avbrytas och man kan försöka få igång en blödning som följer menstruationscykeln med en Primolut Nor dos om $\frac{1}{2}$ tablett (5 mg) 2 gånger dagligen under cykelns 16:e–25:e dag.

Premenstruellt syndrom, mastopati

Premenstruella symtom såsom huvudvärk, nedstämdhet, svullnad och ömhet i brösten kan lindras med dosen $\frac{1}{2}$ tablett 1–3 gånger dagligen under lutealfasen av cykeln.

Uppskjutning av menstruation

Menstruationen kan uppskjutas med Primolut Nor tabletter, men endast under en cykel då graviditet inte är möjlig.

Dosering: $\frac{1}{2}$ tablett (5 mg) 2–3 gånger dagligen i högst 10–14 dagar som påbörjas omkring 3 dagar innan förväntad menstruation. Blödning uppträder 2–3 dagar efter avslutad behandling.

Endometrios

Behandlingen inleds under cykelns 1:a–5:e dag med dosen $\frac{1}{2}$ tablett (5 mg) 2 gånger dagligen. Ifall stänkblödningar förekommer höjs dosen till 1 tablett 2 gånger dagligen. Då blödningen upphör kan den ursprungliga doseringen återupptas. Behandlingen ska pågå i minst 4–6 månader. Ovulation eller menstruationsblödningar förekommer vanligtvis inte under behandlingen.

Bortfallsblödning uppträder efter det att hormonbehandlingen sätts ut.

4.3 Kontraindikationer

Primolut Nor tabletter ska inte användas om patienten har något av de tillstånd som anges nedan; relaterade data har också samlats in vid användning av preparat som enbart innehåller progestin samt vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel. Om något av de nedanstående tillstånden uppkommer under användning av Primolut Nor ska behandlingen omedelbart sättas ut:

- Känd eller misstänkt graviditet
- Amning

- Förekomst av eller anamnes på venös eller arteriell tromboembolism eller tromboembolisk händelse (t.ex. djup ventrombos, lungemboli, myokardinfarkt) eller cerebrovaskulär händelse
- Förekomst av eller anamnes på prodromalsymtom för tromboembolism (t.ex. transitorisk cerebral ischemisk attack, angina pectoris)
- Ökad risk för venös eller arteriell tromboembolism (se avsnitt 4.4)
- Migrän med fokala neurologiska symtom i anamnesen
- Diabetes mellitus med vaskulära symtom
- Allvarlig leversjukdom (inklusive i anamnesen), ifall leverfunktionsvärdena inte återgått till de normala
- Benigna eller maligna levertumörer (inklusive i anamnesen)
- Kända eller misstänkta hormonberoende maligna förändringar (t.ex. i könsorganen eller brösten)
- Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpmämne som anges i avsnitt 6.1.

Primolut Nor är kontraindicerat vid samtidig användning av läkemedel som innehåller kombinationen ombitasvir, paritaprevir och ritonavir samt läkemedel som innehåller dasabuvir (se avsnitt 4.4 och 4.5).

4.4 Varningar och försiktighet

Om en patient har någon av de sjukdomar eller riskfaktorer som anges nedan eller om dessa förvärras, ska riskerna och fördelarna analyseras innan behandling med Primolut Nor initieras eller fortsätter.

Blodcirculationsstörningar

Resultat från epidemiologiska studier tyder på att användningen av orala läkemedel innehållande östrogen och progestin som hämmar ovulation är förknippad med en och ökad risk för tromboemboliska sjukdomar. Den ökade tromboemboliska risken bör beaktas, särskilt om patienten tidigare haft en tromboembolisk sjukdom.

Kända riskfaktorer för venös tromboembolism är t.ex. venös tromboembolism i anamnesen eller positiv anamnes hos en nära släkting (venös tromboembolism hos ett syskon eller förälder i relativt ung ålder), ålder, övervikt, långvarig immobilisering, större kirurgiska ingrepp eller trauma.

Den ökade risken för venös tromboembolism i puerperiet ska beaktas.

Behandlingen ska omedelbart avbrytas vid symtom på venös eller arteriell tromboembolism eller om dessa misstänks.

Tumörer

I sällsynta fall har benigna levertumörer och i ännu mer sällsynta fall maligna levertumörer rapporterats hos användare av noretisteronliknande hormoner. I enstaka fall har dessa tumörer lett till livshotande intraabdominella blödningar. Möjligheten till levertumör ska övervägas som differentialdiagnos när en patient som använder Primolut Nor har svår smärta i övre buken, förstorad lever eller tecken på intraabdominell blödning.

Övriga tillstånd

Diabetiker ska övervakas noggrant under behandling med Primolut Nor.

I bland kan kloasma förekomma, särskilt hos patienter som haft kloasma under tidigare graviditet. Kvinnor med benägenhet för kloasma bör undvika solexponering eller exponering för ultraviolett ljus under behandling med Primolut Nor.

Patienter som tidigare haft depression ska övervakas noggrant och läkemedlet ska sättas ut ifall förvärrade depressionssymtom uppträder under behandlingen.

Patienter med något av följande sällsynta ärfliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Läkarundersökning

Innan behandling med Primolut Nor påbörjas ska patientens tidigare sjukdomshistoria utredas och en grundlig läkarundersökning samt gynekologisk undersökning ska utföras med hänsyn till läkemedlets kontraindikationer (se avsnitt 4.3) och varningar och försiktighet (se avsnitt 4.4). Undersökningarna ska upprepas under behandlingen med Primolut Nor. Frekvensen och typen av undersökningar ska anpassas individuellt, men dessa omfattar vanligtvis blodtryck, bröst, nedre delen av buken samt könsorgan och cellprov från livmoderhalsen.

Läkemedlet ska omedelbart sättas ut om patienten får något av nedanstående tillstånd:

Migränliknande huvudvärk som uppträder för första gången eller ovanligt svår huvudvärk som uppträder allt oftare, plötslig störning av den sensoriska funktionen (t.ex. syn- eller hörselrubbningar), första symtom på tromboflebit eller tromboemboliska händelser (t.ex. ovanlig smärta eller ödem i benen, stickande smärta vid andning eller hosta utan uppenbar orsak), smärta och tryckande känsla i bröstet, förestående operation (6 veckor innan), immobilisering (t.ex. i samband med en olycka), gulsort eller hepatit utan gulsort, generaliserad klåda, signifikant ökning av blodtrycket, graviditet.

Ytterligare varningar relaterade till den partiella omvandlingen av noretisteron till etinylestradiol

Noretisteron metaboliseras delvis till etinylestradiol efter oral administrering. Detta motsvarar en ekivalent dos av 4–6 mikrogram etinylestradiol per 1 mg noretisteronacetat (oralt administrerat) (se avsnitt 5.2).

På grund av den partiella omvandlingen av noretisteron till etinylestradiol, förväntas Primolut Nor resultera i liknande farmakologiska effekter som ses med kombinerade hormonella preventivmedel. Därför ska dessutom följande allmänna varningar som förknippas med användning av kombinerade hormonella preventivmedel beaktas:

Blodcirculationsstörningar

Den ökade risken för venös tromboembolism vid behandling med kombinerade hormonella preventivmedel är högst under det första året då behandlingen påbörjas för första gången eller då behandlingen påbörjas på nytt efter en paus på minst en månad.

Epidemiologiska studier har visat att det förekommer cirka 20–40 fall av venös tromboembolism per 100 000 kvinnoår vid användning av orala kombinerade hormonella preventivmedel som innehåller en låg dos av östrogen (< 50 mikrogram etinylestradiol) och den uppskattade risken varierar beroende på progestin. Motsvarande förekomst för kvinnor som inte använder p-piller är 5–10 fall per 100 000 kvinnoår. Alla kombinerade hormonella preventivmedel ökar risken för venös tromboembolism jämfört med icke-användare. Denna ökade risk är lägre än risken förknippad med graviditet, som uppskattas vara 60 fall per 100 000 graviditeter.

Venös tromboembolism kan vara livshotande eller leda till döden (1–2 % av fallen).

Venös tromboembolism, som uppträder som djup ventrombos och/eller lungemboli, kan förekomma vid användning av alla kombinerade hormonella preventivmedel.

Venös eller arteriell tromboembolism i andra blodkärl, såsom lever, tarmkäx, njure, hjärna eller näthinna, har rapporterats i extremt sällsynta fall vid användning av p-piller.

Symtom på venös eller arteriell trombotisk/tromboembolisk händelse eller stroke kan innefatta:

- ovanlig unilateral smärta och/eller svullnad i benet
- plötslig kraftig bröstmärta oberoende om den strålar ut till vänstra armen eller inte
- plötslig andfåddhet
- plötslig debut av hosta
- exceptionell, svår, långvarig huvudvärk
- plötslig, partiell eller fullständig synförlust
- dubbelseende
- sluddrigt tal eller afasi
- yrsel
- swimning som kan åtföljas av ett fokalt epileptiskt anfall
- plötslig svaghet eller mycket markant domning i ena sidan av kroppen eller någon kroppsdel
- motoriska störningar
- akut buk.

Eventuell ökad synergistisk risk för trombos ska beaktas hos kvinnor som har flera riskfaktorer eller en enskild allvarlig riskfaktor. En enskild förhöjd riskfaktor kan vara större än den sammanlagda risken för flera riskfaktorer. Om förhållandet nyttar-risk anses vara negativt ska ett kombinerat hormonellt preventivmedel inte förskrivas (se avsnitt 4.3).

Följande faktorer ökar risken för venösa- eller arteriella tromboemboliska komplikationer och cerebrovaskulära händelser:

- ålder
- fetma (BMI över 30 kg/m²)
- positiv familjeanamnes (venös eller arteriell tromboembolism hos ett syskon eller förälder i relativt unga år). Om ärftlig predisposition misstänks ska kvinnan remitteras till en specialist för konsultation innan ett beslut om användning av kombinerade hormonella preventivmedel görs.
- vid långvarig immobilisering, större kirurgiska ingrepp, kirurgiska ingrepp i nedre extremiteterna eller omfattande trauma ska behandling med p-piller avbrytas (minst 4 veckor innan elektiv kirurgi) och återupptas tidigast 2 veckor efter att rörelseförmågan är helt återställd.
- rökning (risken ökar hos personer som röker riktigt samt med stigande ålder, särskilt hos över 35 åringar)
- dyslipoproteinemi
- hypertoni
- migrän
- hjärtklaffssjukdom
- förmaksflimmer.

Det råder inte enighet om sambandet mellan varicer eller ytlig tromboflebit och venös tromboembolism.

Andra medicinska tillstånd som förknippas med negativa vaskulära händelser är diabetes, systemisk lupus erythematosus (SLE), hemolytiskt-uremiskt syndrom, kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom eller ulcerös kolit) och sicklecellanemi.

En ökning av frekvens eller svårighetsgrad av migrän vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel (som kan vara prodromalsymtom på en cerebrovaskulär händelse) kan vara ett skäl för omedelbart utsättande.

Biokemiska faktorer som kan tyda på ärftlig eller förvärvad predisposition för arteriell- eller venös tromboembolism är APC-resistens, hyperhomocysteinemti, antitrombin III-brist, protein C-brist, protein S-brist, antifosfolipidantikroppar (kardiolipinantikroppar, lupusantikoagulant).

Vid bedömning av risker och fördelar ska det beaktas att lämplig behandling av tillståndet kan minska risken för associerad trombos och att risken förknippad med graviditet är högre än för kombinerade hormonella preventivmedel som innehåller en låg dos (< 0,05 mg etinylestradiol).

Tumörer

Den viktigaste riskfaktorn för cancer i livmoderhalsen är långvarig papillomvirus infektion (HPV-infektion).

I vissa epidemiologiska studier har en förhöjd risk för cancer i livmoderhalsen rapporterats i samband med långvarig användning av kombinerade hormonella preventivmedel, men det råder fortsatt motstridiga åsikter om i vilken utsträckning det här resultatet anses bero på andra faktorer som screeningsundersökningar av livmoderhalsen och sexuellt beteende inklusive användning av preventivmetoder för att förhindra gravitet.

En meta-analys av 54 epidemiologiska studier visade på en något ökad relativ risk (RR = 1,24) att få bröstcancer diagnosticerad hos kvinnor som använder kombinerade hormonella preventivmedel. Den ökade risken minskar successivt under 10 år efter att användningen av kombinerade hormonella preventivmedel har upphört. Eftersom bröstcancer är sällsynt hos kvinnor under 40 år, är det ökade antalet bröstcancerdiagnoser hos aktuella och tidigare användare av kombinerade hormonella preventivmedel litet i förhållande till risken för bröstcancer under en livstid. Dessa studier dokumenterar inte orsakssamband. Det observerade mönstret på ökad risk kan bero på en tidigare bröstcancerdiagnos hos användare av kombinerade hormonella preventivmedel, de biologiska effekterna av kombinerade hormonella preventivmedel eller en kombination av båda. Bröstcancer som diagnostiseras hos användare av kombinerade hormonella preventivmedel tenderar att vara mindre kliniskt avancerad än bröstcancer som diagnostiseras hos icke-användare.

Maligna tumörer kan vara livshotande eller leda till döden.

Övriga tillstånd

Kvinnor med hypertriglyceridemi eller med sådan historik i familjen kan ha en förhöjd risk för pankreatit vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel.

Även om små höjningar av blodtrycket har rapporterats hos många kvinnor som använder kombinerade hormonella preventivmedel, är kliniskt relevanta höjningar sällsynta.

Om trots allt en klinisk relevant hypertension observeras vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel ska användningen av dessa avbrytas och blodtrycket behandlas. Användning av kombinerade hormonella preventivmedel kan återupptas om normala blodtrycksvärden uppnås med blodtryckssänkande behandling.

Följande tillstånd har rapporterats förekomma eller förvärras både i samband med graviditet och användning av kombinerade hormonella preventivmedel, men det finns inte övertygande bevis för ett samband med användning av kombinerade hormonella preventivmedel: gulrot och/eller klåda som är kopplat till gallstas, gallsten, porfyri, SLE, hemolytiskt-uremiskt syndrom, Sydenhams korea, herpes gestationis, otosklerosrelaterad hörselnedsättning.

Hos kvinnor med hereditärt angioödem kan användning av östrogener framkalla eller förvärra symptom på angioödem.

Akuta eller kroniska störningar av leverfunktionen kan göra det nödvändigt att avbryta behandlingen med kombinerade hormonella preventivmedel tills värdena för leverfunktionen återgår till de normala. Vid återinsjuknande i kolestatisk gulrot och/eller kolestasrelaterad klåda som tidigare inträffat under graviditet eller vid tidigare användning av könshormoner ska behandlingen med kombinerade hormonella preventivmedel avbrytas.

Användning av kombinerade hormonella preventivmedel har förknippats med Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Förhöjning av ALAT

Vid kliniska prövningar på patienter som behandlades för hepatit C-virusinfektioner med läkemedel innehållande en kombination av ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir med eller utan ribavirin förekom en förhöjning av transaminas (ALAT) som var större än 5 gånger den övre

normalgränsen (upper limit of normal, ULN) betydligt mer frekvent hos kvinnor som använder läkemedel innehållande etinylestradiol (såsom kombinerade hormonella preventivmedel). Då noretisteron delvis metaboliseras till etinylestradiol gäller denna varning kvinnor som använder noretisteron (se avsnitt 4.3 och 4.5).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Observera: För att identifiera eventuella interaktioner ska samtliga produktresuméer kontrolleras för läkemedel som tas samtidigt.

Effekter av andra läkemedel på Primolut Nor

Interaktioner kan förekomma med läkemedel som inducerar leverenzym, vilket kan resultera i ökad clearance av könshormoner och kan leda till förändringar i blödningsmönstret och/eller nedsatt behandlingseffekt.

Enzyminduktion kan observeras redan efter några dagars behandling. Maximal enzyminduktion uppnås normalt inom några veckor. Efter att behandlingen har avslutats kan enzyminduktionen fortgå i ca 4 veckor.

Substanser som ökar clearance av könshormoner (minskad effekt på grund av enzyminduktion):
Fenytoin, barbiturater, bosentan, primidon, karbamazepin, rifampicin och HIV-läkemedlen ritonavir, nevirapin och efavirenz och möjligens även oxkarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin och produkter som innehåller johannesört (*Hypericum perforatum*).

Substanser med varierande effekt på clearance av könshormoner:

Många HIV/HCV-proteashämmare och omvänt transkriptashämmare av icke-nukleosid typ kan öka eller minska plasmakoncentrationerna av östrogen och progestin när de administreras samtidigt som könshormoner. Dessa förändringar kan i vissa fall vara kliniskt relevanta.

Substanser som minskar clearance av könshormoner (enzymhämmare):

Den kliniska relevansen för möjliga interaktioner mellan enzymhämmare och könshormoner är okänd. Starka och måttliga CYP3A4-hämmare såsom azol-antimykotika (t.ex. itrakonazol, vorikonazol, flukonazol), verapamil, makrolider (t.ex. klaritromycin, erytromycin), diltiazem och grapefruktjuice kan öka plasmakoncentrationerna av östrogen och/eller progestin.

Doser av etoricoxib om 60 till 120 mg per dag har visat sig öka plasmakoncentrationerna av etinylestradiol 1,4 till 1,6 gånger när dessa tas samtidigt med ett kombinerat hormonellt preventivmedel som innehåller 0,035 mg etinylestradiol.

Effekter av Primolut Nor på andra läkemedel

Progestiner kan störa metabolismen hos andra läkemedel. Som en följd av detta kan plasma- och vävnadskoncentrationer antingen öka (t.ex. ciklosporin) eller minska (t.ex. lamotrigin).

Kliniska data tyder på att etinylestradiol hämmar clearance av CYP1A2-substrat vilket leder till en svag (t.ex. teofyllin) eller måttlig (t.ex. tizanidin) ökning av koncentrationen i plasma.

Farmakodynamiska interaktioner

Samtidig användning av läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir, med eller utan ribavirin, kan öka risken för en ALAT-stegring (se avsnitt 4.3 och 4.4). Behandling med Primolut Nor kan återupptas 2 veckor efter avslutad behandling med denna kombinationsbehandling.

Övriga interaktioner

Laboratorieundersökningar

Användning av progestiner kan påverka resultatet av vissa laboratorietester, t.ex. biokemiska parametrar för lever-, sköldkörtel-, binjure- och njurfunktion, plasmanivåer av (bärar-) proteiner (t.ex. kortikosteroidbindande globulin och lipid/lipoproteinfractioner), parametrar för kolhydratmetabolism och parametrar för koagulation och fibrinolys. Förändringarna ligger vanligtvis inom normala laboratorieintervaller.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Läkemedlet ska inte användas under graviditet.

Amning

Läkemedlet ska inte användas under amning.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier på läkemedlets effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

4.8 Biverkningar

Biverkningar är vanligare under de första månaderna efter att behandlingen påbörjats och minskar med behandlingstidens varaktighet. Utöver de biverkningarna som nämns i avsnitt 4.4 (Varningar och försiktighet) har de biverkningar som nämns i nedanstående tabell rapporterats vid användning av Primolut Nor, men orsakssambandet med läkemedlet har inte alltid kunnat fastställas.

Tabellen nedan anger en sammanfattning av biverkningarna enligt MedDRA-systemets organklassificering. Frekvenserna är baserade på data efter marknadsintroduktion och studieresultat.

Organsystem-klass (MedDRA)	Mycket vanliga (≥1/10)	Vanliga (≥1/100, <1/10)	Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)	Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)	Mycket sällsynta (<1/10 000)
Immunsystemet				Överkänslig- hetsreaktioner	
Centrala och perifera nervsystemet		Huvudvärk	Migrän		
Ögon					Synstörningar
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum					Dyspné
Magtarmkanalen		Illamående			
Hud och subkutan vävnad				Urtikaria Hudutslag	
Reproduktionsorgan och bröstkörtel	Uterin och vaginal blödning inklusive stänkblödning* Hypomenorré*	Amenorré*		Ömma bröst Förändrad libido	

Organsystem-klass (MedDRA)	Mycket vanliga (≥1/10)	Vanliga (≥1/100, <1/10)	Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)	Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)	Mycket sällsynta (<1/10 000)
Allmänna symptom och/eller symptom vid administreringsstället		Ödem			

* inom indikationen endometrios

I tabellen används den mest lämpliga MedDRA-termen för att beskriva en viss biverkning och dess synonymer och andra sjukdomsrelaterade tillstånd.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

4.9 Överdosering

Baserat på studier gällande akut toxicitet finns ingen risk för akuta biverkningar i händelse av oavsiktligt multipelt intag av den terapeutiskt dagliga dosen av noretisteronacetat.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Könshormoner och modulatorer av könsorgan, gestagener, östrenderivat
ATC-kod: G03DC02

Noretisteron är ett starkt progestin. Hos kvinnor som får lämplig östrogenbehandling uppnås fullständig omvandling av livmoderslembhinnan från proliferationsfas till sekretionsfas med orala doser om 100–150 mg noretisteron. Effekten av Primolut Nor vid behandling av blödningsstörningar, primär och sekundär amenorré och endometrios är baserad på progestinets effekt på livmoderslembhinnan.

Gonadotropinsekretion och ovulation kan hämmas med en daglig dos på 0,5 mg noretisteronacetat. De positiva effekterna av behandling med Primolut Nor på premenstruella symptom baseras på hämning av äggstocksfunktionen.

På grund av effekterna på livmoderslembhinnan kan noretisteron användas för uppskjutning av menstruation.

Likt progesteron höjer noretisteron basaltemperaturen.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Oralt administrerat noretisteronacetat absorberas snabbt och fullständigt över ett brett intervall av doser. Under absorption och leverns förtaspassagemetabolism hydrolyseras noretisteronacetat till den aktiva substansen noretisteron samt ättiksyra. Noretisterons maximala plasmakoncentration (cirka 18 ng/ml efter en 5 mg dos av noretisteronacetat och cirka 25 ng/ml efter en 10 mg dos) uppnås cirka 2 timmar efter administrering av en Primolut Nor tablett. Studier avseende relativ biotillgänglighet har visat fullständig frisättning av substansen från tabletten.

Distribution

Noretisteron binder till serumalbumin och till könshormonbindande globulin (SHBG). Endast 3–4 % av de totala serumkoncentrationerna av den aktiva substansen förekommer som fri steroid och 35 % är bundet till SHGB och 61 % till albumin. Distributionsvolymen för noretisteron är $4,4 \pm 1,3 \text{ l/kg}$. Efter oral administration minskar serumkoncentrationen av läkemedlet bifasiskt med halveringstider på 1–3 timmar och cirka 5–13 timmar.

Noretisteron utsöndras i bröstmjölk och dess koncentration i bröstmjölk är cirka 10 % av koncentrationen i moderns plasma, oavsett administreringsväg. Om det antas att den genomsnittliga maximala koncentrationen av läkemedlet i moderns serum är cirka 16 ng/ml, och barnet intar dagligen cirka 600 ml mjölk, kan maximalt cirka 1 mikrogram av läkemedlet (0,02 % av moderns dos) komma in i barnets blodomlopp.

Metabolism

Noretisteron metaboliseras huvudsakligen genom att A-ringens dubbelbindning mättas och 3-ketogruppen reduceras till en hydroxylgrupp som återföljs av konjugering till motsvarande sulfater och glukuronider. Vissa metaboliter utsöndras relativt långsamt från plasma ($t_{1/2}$ cirka 67 timmar) och ackumuleras därför i plasma när noretisteron används dagligen under lång tid.

Noretisteron eller noretisteronacetat metaboliseras delvis till etinylestradiol efter oral administrering hos människor. Denna omvandling motsvarar en ekvivalent dos av 4–6 mikrogram etinylestradiol per 1 mg noretisteron/noretisteronacetat (oralt administrerat).

Eliminering

Märkbara mängder av oförändrat noretisteron utsöndras inte. Främst metaboliter som uppstår genom reducering och hydroxylering av A-ringen samt deras konjugat (glukuronider och sulfat) utsöndras via urin och faeces i förhållandet 7:3. Metaboliter som främst utsöndras via njurarna utsöndras inom 24 timmar och deras halveringstid är cirka 19 timmar.

Steady state

Även om flera doser av noretisteron administrerades dagligen, är det inte sannolikt att det ackumuleras i kroppen på grund av dess relativt korta halveringstid. Vid samtidig administrering av SHBG-inducerande substanser såsom etinylestradiol kan serumkoncentrationen av noretisteron öka på grund av dess bindning till SHBG.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Data om noretisteron och dess estrar, baserade på gängse studier avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för mänskliga utöver vad som redan rapporteras i andra avsnitt. Könshormoner kan dock påverka tillväxt av vissa hormonberoende vävnader och tumörer.

Reproduktionstoxikologiska- och utvecklingstoxikologiska studier visar en risk för maskulinisering av honor under fosterstadiet vid administrering av höga doser vid tidpunkten för utveckling av externa genitalier. Epidemiologiska studier har visat att denna effekt även är relevant för människa vid höga doser, och därfor ska det tas i beaktas att Primolut Nor kan orsaka virilisering av flickfoster om läkemedlet administreras under det hormonkänsliga stadiet för somatisk sexualdifferentiering (från dag 45 och framåt under graviditeten). Studier visar dock att substansen inte har några teratogena effekter.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpmänne n

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Povidon 25 000

Talk

Magnesiumstearat

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

5 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara blistern i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

6.5 Förpacknings typ och inne håll

30 tabletter i blister (PVC/Aluminium).

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

Förvara alla läkemedel på ett lämpligt sätt och utom syn- och räckhåll för barn.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer Oy
Pansiovägen 47
20210 Åbo

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

4840

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 19.7.1967

Datum för den senaste förnyelsen: 24.6.2008

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

7.6.2021