

PAKKAUSSELOSTE

Bayvantic vet[®] paikallisvaleluliuos koirille

1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Saksa

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
24106 Kiel
Saksa

2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bayvantic vet[®] paikallisvaleluliuos enintään 4 kg painaville koirille
Bayvantic vet[®] paikallisvaleluliuos koirille 4-10 kg
Bayvantic vet[®] paikallisvaleluliuos koirille 10-25 kg
Bayvantic vet[®] paikallisvaleluliuos koirille 25-40 kg

3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Vaikuttavat aineet:

Imidaklopridi: 100 mg/ml
Permetriini: 500 mg/ml

Apuaine:

Butyylihydroksitolueeni (E321): 1,0 mg/ml

Yksi pipetti sisältää:

	Pipetti	Imidaklopridi	Permetriini	E321
Bayvantic vet [®] koirille enintään 4 kg	0,4 ml	40 mg	200 mg	0,4 mg
Bayvantic vet [®] koirille >4 kg - ≤10 kg	1,0 ml	100 mg	500 mg	1,0 mg
Bayvantic vet [®] koirille >10 kg - ≤25 kg	2,5 ml	250 mg	1250 mg	2,5 mg
Bayvantic vet [®] koirille >25 kg - ≤40 kg	4,0 ml	400 mg	2000 mg	4,0 mg

Yli 40-kiloisille koirille tulee käyttää sopivaa pipettiyhdistelmää.

4. KÄYTTÖAIHEET

Koirien kirpputartuntojen (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*.) ehkäisyyn ja hoitoon sekä koirien väivetartunnan (*Trichodectes canis*) hoitoon.

Koirassa olevat kirput kuolevat vuorokauden sisällä hoidosta. Yksi hoitokerta riittää estämään uudet kirpputartunnat neljäksi viikoksi. Valmistetta voidaan käyttää osana kirppuallergian aiheuttaman ihotulehduksen (FAD) hoitoa.

Valmisteella on neljä viikkoa kestävä puutiaisia tappava sekä karkoittava vaikutus *Rhipicephalus sanguineus* ja *Ixodes ricinus* -puutiaisia vastaan. Valmisteen teho *Dermacentor reticulatus* -puutiaisia

vastaa kestää kolme viikkoa.

Hoitoa aloitettaessa koiraan jo kiinnittyneinä olleet puutiaiset eivät mahdollisesti kuole kahden päivän kuluessa hoidosta ja saattavat pysyä kiinnittyneinä ja näkyvillä. Tästä syystä on suositeltavaa poistaa koirassa jo olevat puutiaiset hoitoa aloitettaessa ja estää näin niiden kiinnittyminen ja veren imeminen.

Yhden hoitokerran karkoitevaikutus (hyönteisten pistämisen esto) kestää *Phlebotomus papatasi* -hietasääskeä vastaan kaksi viikkoa ja *Phlebotomus perniciosus* -hietasääskeä vastaan kolme viikkoa, hyttysiä vastaan lajista riippuen kaksi (*Aedes aegypti*) tai neljä viikkoa (*Culex pipiens*) sekä pistokärpäsiä (*Stomoxys calcitrans*) vastaan neljä viikkoa.

Hietasääsket	(<i>Phlebotomus perniciosus</i>)	3 viikkoa
	(<i>Phlebotomus papatasi</i>)	2 viikkoa
Hyttysset	(<i>Aedes aegypti</i>)	2 viikkoa
	(<i>Culex pipiens</i>)	4 viikkoa
Pistokärpäset	(<i>Stomoxys calcitrans</i>)	4 viikkoa

5. VASTA-AIHEET

Ei saa käyttää alle seitsemän viikon ikäisille tai alle 1,5 kg:n painoisille koiranpennuille, koska tutkimustuloksia näiden eläinryhmien hoidosta ei ole esitetty. Annostus valitaan koiran painon mukaan, katso annostustaulukko.

Ei saa käyttää koirille, jotka ovat yliherkkiä valmisteeseen vaikuttaville aineille tai apuaineille.

Ei saa käyttää kissoille.

6. HAITTAVAIKUTUKSET

Hyvin harvinaisissa tapauksissa koiralla voi ilmetä ohimeneviä iho-oireita (lisääntyneitä paikallista kutinaa, raapimista, hieromista, karvanlähtöä ja punoitusta lääkkeen annostelukohdassa) tai väsymystä. Nämä oireet häviävät yleensä itsestään.

Hyvin harvinaisissa tapauksissa koiralla saattaa ilmetä käyttäytymismuutoksia (kiihtyneisyyttä, rauhattomuutta, ulvomista tai pyörimistä), maha-suolistovaivoja (oksentamista, ripulia, lisääntyneitä syljeneritystä tai ruokahalun vähenemistä) ja hermosto-oireita, kuten epävakaita liikkeitä tai lihasten nykimistä, jos koirat ovat herkkiä permetriinille. Nämä oireet häviävät yleensä itsestään.

Myrkytys voi seurata tapauksissa, joissa koira pääsee tahattomasti syömään valmistetta, mutta näin tapahtuu erittäin harvoin. Tällaisessa tapauksessa koira voi saada hermosto-oireita, kuten vapinaa tai väsymystä. Tällöin hoidon tulisi olla oireenmukaista. Erityistä vastalääkettä ei ole.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7. KOHDE-ELÄINLAJIT

Koira

8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Pienin suositeltu annos:

10 mg imidaklopridiä elopainokiloa kohti ja 50 mg permetriiniä elopainokiloa kohti.

Bayvantic vet -valmisteen annosteluohje:

Koirat (kg)	Kauppanimi	Tilavuus (ml)	Imidaklopridi (mg/kg)	Permetriini (mg/kg)
-------------	------------	---------------	-----------------------	---------------------

Enintään 4 kg	Bayvantic vet [®] koirille enintään 4 kg	0,4 ml	vähintään 10	vähintään 50
Yli 4–10 kg asti	Bayvantic vet [®] koirille yli 4 kg – 10 kg asti	1,0 ml	10–25	50–125
Yli 10–25 kg asti	Bayvantic vet [®] koirille yli 10 kg – 25 kg asti	2,5 ml	10–25	50–125
Yli 25–40 kg asti	Bayvantic vet [®] koirille yli 25 kg – 40 kg asti	4,0 ml	10–16	50–80

Yli 40-kiloisille koirille tulee käyttää sopivaa pipettiyhdistelmää.


Uusintatartuntojen vähentämiseksi on suositeltavaa käsitellä kaikki samassa taloudessa elävät koirat. Myös kotitalouden muut lemmikit tulisi hoitaa niille sopivalla tuotteella. Loisen kiertokulun katkaisemiseksi koiran elinympäristössä suositellaan lisäksi jotakin sopivaa aikuisiin kirppuihin sekä kirppujen toukka-asteisiin tehoavaa toimenpidettä.

Valmiste ei menetä tehoaan, vaikka eläin kastuisi, mutta pidempiaikaista vedessä oleskelua tulisi kuitenkin välttää. Mikäli eläin kuitenkin kastuu usein, voi valmisteen tehoaika lyhentyä. Eläintä ei näissäkään tapauksissa tule käsitellä valmisteella useammin kuin kerran viikossa. Mikäli koira on pestävä pesuaineella, se pitäisi tehdä ennen valmisteen antoa tai vähintään kaksi viikkoa annon jälkeen, jotta varmistetaan valmisteen teho.

Väivetartunnan yhteydessä suositellaan uutta eläinlääkärintarkastusta 30 päivän kuluttua hoidon antamisesta, koska jotkut eläimet voivat vaatia toisen hoitokerran.

Antotapa:

Ota pipetti pakkauksesta. Pidä annostelupipettiä pystyasennossa, kierrä korkki auki ja irrota se. Käännä korkki ympäri ja aseta sen toinen pää takaisin pipetin päähän. Riko suojus kiertämällä korkkia ja irrota sitten korkki pipetistä.



Koirat 10 kg asti:

Tee paikallaan seisovan koiran turkkiin jakaus lapaluiden väliin niin, että iho näkyy. Pane pipetin kärki ihoa vasten ja purista pipettiä lujasti useita kertoja niin, että se tyhjenee suoraan koiran iholle.



Koirat yli 10 kg

Jaa pipetin koko sisältö tasaisesti neljään eri kohtaan selän korkeimmalle kohdalle lapaluiden ja hännäntyven välissä sijaitsevalle alueelle koiran seistessä paikallaan. Tee jokaisessa kohdassa karvapeitteeseen jakaus siten, että iho näkyy. Aseta pipetin kärki iholle ja purista pipettiä varovasti niin, että osa sisällöstä valuu iholle.



9. ANNOSTUSOHJEET

Vain ulkoiseen käyttöön.

Käytä valmistetta vain terveelle iholle.

Älä levitä suurta liuosmäärää sellaiseen kohtaan, josta liuos helposti valuu pois koiran kyljille.

10. VAROAIKA

Ei oleellinen.

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Ei saa jäätyä.

Säilytä avatussa alumiinipussissa olevat pipetit alle 30 °C.

Käytä 24 kuukauden kuluessa alumiinipussin avaamisesta ja joka tapauksessa ennen EXP-päivämäärää.

Ei saa käyttää pipetissä, alumiinipussissa ja kotelossa mainitun EXP-päivämäärän jälkeen.

12. ERITYISVAROITUKSET

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet

Varo ettei pipetin sisältöä joudu hoidettavien koirien silmiin tai suuhun.

Annostele valmiste huolellisesti kohdan 8 Annostus, antoreitit ja antotavat mukaisesti. Huolehdi erityisesti ettei hoidettava eläin tai sen kanssa kosketuksissa olevat eläimet pääse nuolemaan valmisteen annostelupaikkaa eivätkä täten nielemään valmistetta.

Ei saa käyttää kissoille.



Valmiste on erittäin myrkyllistä kissoille ja sen käyttö voi johtaa kissan kuolemaan. Kissojen ainutlaatuisesta fysiologiasta johtuen niiden aineenvaihdunta ei pysty käsittelemään tuotteen tiettyjä ainesosia perimetriini mukaan luettuna. Kissojen tahattoman altistumisen estämiseksi tulee valmisteella käsitellyt koirat pitää erossa kissoista, kunnes annostelukohta on täysin kuiva. On tärkeää varmistaa, ettei kissa pääse nuolemaan valmisteella hoidettua koiraannostelukohtaa. Edellä mainitussa tapauksessa ota välittömästi yhteys eläinlääkäriin.

Neuvottele eläinlääkärin kanssa ennen kuin käytät valmistetta sairaille ja heikkokuntoisille koirille.

Valmiste on vaarallista vesielioille eikä koiraa tule missään tapauksessa päästää uimaan tai kahlaamaan ennen kuin annostelusta on kulunut vähintään 48 tuntia.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava

Vältä valmisteiden joutumista iholle, silmiin tai suuhun.

Älä syö, juo tai tupakoi annostuksen aikana.

Pese kädet huolellisesti käytön jälkeen.

Jos valmistetta roiskuu vahingossa iholle, pese iho välittömästi saippualla ja vedellä.

Herkkäihoiset ihmiset voivat olla valmisteelle erityisen herkkiä.

Erittäin harvinaisissa tapauksissa pääasiallisina kliinisinä oireina voi esiintyä ohimenevää ihon pistelyä, polttavaa tunnetta iholla tai ihon tunnottomuutta.

Jos valmistetta joutuu vahingossa silmiin, huuhtelee silmät huolellisesti vedellä. Mikäli iho- tai silmäoireet jatkuvat tai jos valmistetta on vahingossa nieltä, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä valmisteiden pakkausseloste.

Varsinkaan lasten ei saa antaa käsitellä juuri hoidettua koiraa ennen kuin annostelukohta on täysin kuiva. Tästä voidaan varmistua käsittelemällä eläimet valmisteella esim. iltaisin. Tässä tapauksessa juuri hoidettujen koirien ei saa antaa nukkua yhdessä omistajien eikä varsinkaan lasten kanssa.

13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Aseta korkki takaisin käytön jälkeen. Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

10.10.2016

15. MUUT TIEDOT

Bayvantic vet on ulkoloislääke paikalliseen käyttöön. Se sisältää imidaklopridiä ja permetriiniä. Tämä yhdistelmä toimii hyönteismyrkkinä, akarisiidinä ja karkoitteena.

Imidaklopridi tehoaa aikuisiin ja toukka-asteella oleviin kirppuihin. Teho on todistettu sekä aikuisissa että toukka-asteella olevissa kirpuissa myös hoidetun eläimen ympäristössä. Toukka-asteet kuolevat joutuessaan hoidetun eläimen kanssa yhteyteen.

Tuotteella on kuitenkin karkoitevaikutus (pistämisen esto) puutiaisia, hietasääskeä ja hyttysiä vastaan estäen näiden veriaterian ja siten tuotteen vaikutus vähentää koiran vektorivälitteisten tautien tarttumista (esim. borrelioosi, riketsioosi, ehrlichioosi, leismanioosi (ripsieläintauti)).

Koska yksittäisten puutiaisten kiinnittymistä sekä yksittäisten hietasääskien tai hyttysten pistoksia saattaa esiintyä, näiden loiseläinten kantamien sairauksien leviämistä ei epäsuotuisissa olosuhteissa voida täydellisesti estää.

Tuotetta voidaan käyttää tiineille ja imettäville eläimille.

Bayvantic vet -valmisteessa käytetty liuotin saattaa tahrata joitakin materiaaleja, esimerkiksi nahkaa, kankaita, muovia ja viimeistelyjä pintoja. Anna antokohdan kuivua, ennen kuin päästät eläimen kosketuksiin tällaisten materiaalien kanssa.

Pakkauskoost: 0,4 ml, 1 ml, 2,5 ml ja 4 ml pipetti. Pakkaus sisältää 1, 2, 3, 4, 6 tai 24 yksittäistä pipettiä.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta:

ORION PHARMA Eläinlääkkeet
PL 425, 20101 Turku
Puh: 010 4261

BIPACKSEDEL

Bayvantic vet[®] spot-on, lösning till hund

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Tyskland

Tillverkare:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
24106 Kiel
Tyskland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Bayvantic vet[®] spot-on, lösning till hund upp till 4 kg
Bayvantic vet[®] spot-on, lösning till hund 4-10 kg
Bayvantic vet[®] spot-on, lösning till hund 10-25 kg
Bayvantic vet[®] spot-on, lösning till hund 25-40 kg

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Aktiva innehållsämnen:

Imidaklopid: 100 mg/mg
Permetrin: 500 mg/ml

Hjälpämne:

Butylhydroxitoluen (E321): 1,0 mg/ml

En pipett innehåller:

	Enhet	Imidaclopid	Permetrin	E321
Bayvantic vet [®] till hund upp till 4 kg	0,4 ml	40 mg	200 mg	0,4 mg
Bayvantic vet [®] till hund >4 kg - ≤10 kg	1,0 ml	100 mg	500 mg	1,0 mg
Bayvantic vet [®] till hund >10 kg - ≤25 kg	2,5 ml	250 mg	1250 mg	2,5 mg
Bayvantic vet [®] till hund >25 kg - ≤40 kg	4,0 ml	400 mg	2000 mg	4,0 mg

För hund över 40 kg skall lämplig kombination av pipetter användas.

4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För att förebygga och behandla angrepp av loppor (*C. canis*, *C. felis*) och pälsätande löss (*Trichodectes canis*).

Loppor på hund dör inom ett dygn efter behandling. En behandling förhindrar nya loppangrepp under 4 veckor. Produkten kan användas som en del av en behandlingsstrategi mot allergisk dermatit (FAD).

Produkten har en kvarstående arkadisidisk effekt mot fästingar (mot *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus* under fyra veckor och mot *Dermacentor reticulatus* under tre veckor).

Fästingar som finns på hunden vid behandlingstillfället kanske inte dör inom två dagar utan förblir sittande kvar och är synliga. Därför rekommenderas det att ta bort synliga fästingar redan vid behandlingstillfället för att förhindra att de biter sig fast och suger blod.

En behandling tillhandahåller bortstötande (förhindrar blodsugning) effekt, mot sandflugor (*Phlebotomus papatasi* under två veckor och *Phlebotomus perniciosus* under tre veckor), mot myggor beroende på art under 2 veckor (*Aedes aegypti*) eller 4 veckor (*Culex pipiens*) och mot stickflugor (*Stomoxys calcitrans*) under 4 veckor.

Sandflugor	(<i>Phlebotomus perniciosus</i>)	3 veckor
	(<i>Phlebotomus papatasi</i>)	2 veckor
Myggor	(<i>Aedes aegypti</i>)	2 veckor
	(<i>Culex pipiens</i>)	4 veckor
Stickflugor	(<i>Stomoxys calcitrans</i>)	4 veckor

5. KONTRAINDIKATIONER

Eftersom det inte finns undersökningsresultat skall valpar yngre än 7 veckor eller mindre än 1,5 kg ej behandlas. Doseringen skall anpassas enligt hundens vikt, se doseringstabellen.

Använd inte vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot några hjälpämnen.

Får inte användas på katt.

6. BIVERKNINGAR

I mycket sällsynta fall kan man hos hund se en övergående känslighet (inkluderat ökad klåda, klösande, gnuggande, håravfall eller rodnad på applikationsstället) eller trötthet. De här symtomen är generellt övergående.

I mycket sällsynta fall kan beteendestörningar (rastlöshet, orolighet, ylande eller rullande), besvär i mag- och tarmkanalen (kräkningar, diarré, ökad salivation eller aptitlöshet) eller neurologiska symtom (ostadiga rörelser eller muskeltremor) förekomma, om hunden är överkänslig mot permetrin. De här symtomen är generellt övergående.

Förgiftning som följd av oavsiktligt oralt intag hos hund är föga troligt. Efter oavsiktligt oralt intag kan neurologiska tecken så som tremor och trötthet förekomma. Om detta skulle inträffa bör symptomatisk behandling sättas in av veterinär. Det finns ingen känd specifik antidot.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Hund

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Den rekommenderade minimumdosen är:

10mg/kg kroppsvikt imidacloprid och 50 mg/kg kroppsvikt permetrin.

Doseringsschema för Bayvantic vet:

Hund (kg kroppsvikt)	Produktnamn	Volym (ml)	Imidacloprid mg/ kg kroppsvikt	Permetrin mg/ kg kroppsvikt
Upp till 4 kg	Bayvantic vet [®] till hund upp till 4 kg	0,4 ml	min. 10	min. 50
Över 4 kg – upp till 10 kg	Bayvantic vet [®] till hund över 4 kg – upp till 10 kg	1,0 ml	10-25	50-125
Över 10 kg – upp till 25 kg	Bayvantic vet [®] till hund över 10 kg – upp till 25 kg	2,5 ml	10-25	50-125
Över 25 kg – upp till 40 kg	Bayvantic vet [®] till hund över 25 kg – upp till 40 kg	4,0 ml	10-16	50-80

För hund över 40 kg skall lämplig kombination av pipetter användas.


För att reducera återangrepp av nya loppor, rekommenderas det att behandla alla hundar i samma hushåll. Andra djur som lever i samma hushåll bör behandlas med en passande produkt. För att ytterligare sanera omgivningen rekommenderas ett bekämpningsmedel verksamt mot vuxna loppor och dess utvecklingsstadier.

Effekten kvarstår även om djuret blir vått. Långvarig och intensiv utsättning för vatten skall undvikas. Om djuret simmar eller badas ofta kan den kvardröjande effekten reduceras. I dessa fall skall behandlingen dock ej upprepas oftare än en gång i veckan. Om det är nödvändigt att schamponera hunden, rekommenderas detta före appliceringen av Bayvantic vet eller minst två veckor efter för att säkra en optimerad effekt av produkten.

Ett nytt veterinärbesök rekommenderas 30 dagar efter behandling av pälsätande löss eftersom en del hundar kan behöva en behandling till.

Adminstreringssätt:

Tag ut pipetten ur förpackningen. Håll pipetten upprätt. Vrid och dra av huven. Vänd huven och sätt den på pipetten. Vrid om och avlägsna förseglingen från pipetten.



Hund upp till 10 kg:

Hunden skall stå upp. Dela pälsen mellan skulderbladen så att huden blir synlig. Placera pipettens topp på huden och kläm pipetten flera gånger tills innehållet är tömt direkt på huden.



Hund över 10 kg

Hunden skall stå upp. Pipettens innehåll appliceras på 4 ställen utmed ryggen från skulderbladen till svansroten. Dela pälsen vid varje ställe så att huden blir synlig. Placera pipettens topp på huden och kläm lätt på pipetten för att pressa ut en del av innehållet direkt på huden.



9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Endast för utvärtes bruk.

Applicera endast på oskadad hud.

Undvik att applicera för stora mängder på sådana ställen varifrån lösningen lätt rinner ner på sidan av hunden.

10. KARENSTID

Ej relevant

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Får ej frysas.

Förvaras vid högst 30 °C efter öppning av foliepåsen.

Alla pipetter skall användas inom 24 månader efter det att foliepåsen har öppnats eller före utgångsdatum på pipetten om det är kortare.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen.

12. SÄRSKILDA VARNINGAR

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Försiktighet skall iakttas för att undvika att innehållet i pipetten kommer i kontakt med djurets ögon eller mun.

Det är viktigt att administrera produkten korrekt. Se avsnitt 8 Dosering för varje djurslag och administreringsätt. Nybehandlade djur skall förhindras från att putsa sig själva eller varandra på applikationsstället.

Använd inte på katt.



På grund av kattens unika fysiologi och dess oförmåga att metabolisera vissa ämnen, inklusive permetrin, är denna produkt extremt giftig för katter och användning kan leda till kattens död. För att förhindra att katter av misstag exponeras för produkten skall behandlade hundar hållas borta från dessa tills applikationsstället är torrt. Det är viktigt att försäkra sig om att katten inte slickar en hund som nyligen behandlats med denna produkt. Om detta händer kontakta veterinär omedelbart.

Kontakta din veterinär innan du använder produkten på sjuka eller försvagade hundar.

Låt under inga omständigheter behandlade hundar vistas i slutna vattenmiljöer under 48 timmar efter behandlingen, eftersom produkten är skadlig för vattenlevande organismer.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:

Undvik att pipettens innehåll kommer i kontakt med hud, ögon och mun.

Intag av mat och dryck samt rökning skall undvikas vid behandlingstillfället

Tvätta händerna noggrant efter behandling.

Vid hudkontakt tvätta omedelbart med tvål och vatten.

Personer med känd hudkänslighet kan vara extra känsliga mot produkten.

Kliniska symtom som i dessa sällsynta fall kan förekomma innebär övergående hudirritation; stickande eller brinnande känsla i huden eller känslolöshet i huden,

Om produkten kommer i ögonen av misstag skall dessa sköljas omsorgsfullt med vatten. Om hud- eller ögonirritation kvarstår eller om produkten oavsiktligt svalts skall läkare kontaktas omedelbart och bipacksedeln visas.

Barn skall inte handskas med behandlade djur förrän applikationsstället har torkat. Detta kan förhindras genom att t.ex. behandla djuren på kvällen. Vid sådana tillfällen skall nybehandlade hundar inte tillåtas att sova tillsammans med sina ägare, särskilt inte barn.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Efter användning sätt huven på pipetten. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

10.10.2016

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Bayvantic vet är en ektoparasitocid substans för topical användning, som innehåller imidacloprid och permethrin. Denna kombination är insekticid, arkadacid och bortstötande mot myggor, sandflugor och stickflugor hos hund.

Imidacloprid är effektivt mot fullvuxna loppor samt loppor i larvstadie. Imidacloprid har ytterligare en dödande effekt mot vuxna loppor och loppori i larvstadie i den behandlade hundens omgivning. Loppor i larvstadie dör i hundens omedelbara omgivning, när de kommer i kontakt med den.

Produkten har en bortstötande verkan mot fästingar, sandflugor och myggor genom att förhindra parasiterna att ta ett blodmål och således förminskar risken att få en vektorförmedlad sjukdom (CVBD-infektion som borreliosis, rickettsiosis, ehrlichsiosis eller leishmaniosis.)

Enstaka bett av fästingar, sandflugor eller mygg kan emellertid förekomma. Infektioner förmedlade genom dessa parasiterna kan därför inte uteslutas i ogynnsamma omständigheter.

Produkten kan användas under dräktighet och laktation.

Lösningen Bayvantic vet kan ge fläckar på vissa ämnen inklusive produkter av läder, plast och behandlade ytor. Låt appliceringsstället torka innan kontakt med dessa material.

Förpackningsstorlekar: 0,4 ml, 1 ml, 2,5 ml och 4 ml per pipett. Det finns förpackningar med 1, 2, 3, 4, 6 eller 24 engångsdospipetter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

ORION PHARMA Eläinlääkkeet
PB 425, 20101 Åbo
Tel: 010 4261