

PAKKAUSSELOSTE:

Quiflox vet 5 mg tabletti kissolle ja koirille

1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenia

Valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Saksa
KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Kroatia

2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Quiflox vet 5 mg tabletti kissolle ja koirille
Marbofloksasiini

3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Yksi tabletti sisältää 5 mg marbofloksasiinia.

Vaalean rusehtavankeltainen, pyöreä, kaksoiskupera, marmoroidut, viistoreunainen tabletti, jossa voi olla tummia ja valkoisia laikkuja. Tabletin toisella puolella on jakouurre. Tabletti voidaan puolittaa.

4. KÄYTÖAIHEET

Quiflox vet -valmistetta käytetään lääkevalmisteen vaikuttavalle aineelle marbofloksasiinille herkkien mikrobikantojen aiheuttamien tulehdusten hoitoon. Marbofloksasiini kuuluu mikrobilääkeryhmään, josta käytetään nimeä fluorokinolonit.

Koirat:

- iho- ja pehmytkudostulehdut (ihopoimun märkäinen tulehdus (pyoderma), märkärupi (impetigo), karvatupentulehdus (follikuliitti, furunkuloosi), ihonalaiskudoksen voimakas tulehdus (selluliitti))
- virtsatietulehdut, joihin voi liittyä eturauhastulehdus tai lisäkivistulehdus
- hengitystietulehdut.

Kissat:

- iho- ja pehmytkudostulehdut (haavat, paiseet, ajotulehdut)
- ylempien hengitysteiden tulehdut.

5. VASTA-AIHEET

Ei saa käyttää alle 12 kuukauden ikäisille koirille, tai alle 18 kk ikäisille koirille, jos kyseessä on

poikkeuksellisen suurikokoinen koirarotu (kuten tanskandoggi, briardi, berninpaimenkoira, bouvier ja mastiffi), jonka kasvukausi on pidempi.

Ei saa käyttää alle 16 viikon ikäisille kissoille.

Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle, muille (fluoro)kinoloneille tai apuaineille.

Ei saa käyttää kinoloniiresistenttien infektioiden hoitoon, koska fluorokinolonien välillä esiintyy (lähes) täydellistä ristiresistenssiä.

6. HAITTAVAIKUTUKSET

Lieviä haittavaikutuksia, kuten oksentelua, ulosteiden pehmenemistä, janontunteen muutoksia tai aktiivisuuden ohimenevää lisääntymistä voi esiintyä hyvin harvinaisissa tapauksissa. Nämä vaikutukset häviävät itsestään hoidon jälkeen eivätkä ne edellytä hoidon lopettamista.

Haittavaikutusten esiintyvyys määritellään seuraavasti:

- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua eläintä saa haittavaikutuksen)
- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10/100 hoidettua eläintä)
- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10/1000 hoidettua eläintä)
- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10/10.000 hoidettua eläintä)
- hyvin harvinainen (alle 1/10.000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset)

Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet sitä mieltä että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7. KOHDE-ELÄINLAJIT

Kissa ja koira.

8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Suun kautta.

Eläinlääkäri määräää sopivan annostuksen eläimellesi. Suositeltava annostus on 2 mg marboflokssiaania/kg(paino)/vrk (1 tabletti/2,5 kg (paino)/vrk) kerta-annoksen. Koirilla voidaan tarvittaessa yhdistellä eri vahvuisia (5 mg, 20 mg tai 80 mg) kokonaisia tai puolikkaita tabletteja tarkan annostuksen saavuttamiseksi.

Eläimen paino (kg)	Tablettien lukumäärä (vahvuus: 5 mg)	Likimääräinen annos (mg/kg)
1–1,5	0,5	1,7–2,5
1,5–2,5	1	2,0–3,3
2,5–3,5	1,5	2,1–3,0
3,5–5,0	2	2,0–2,9
5,0–7,0	3	2,1–3,0
7,0–9	4	2,2–2,9

Oikean annoksen varmistamiseksi ja liian pienen annoksen välittämiseksi elopaino on määritettävä mahdollisimman tarkasti.

Hoidon kesto

Koirat:

Iho- ja pehmytkudostulehduksissa hoidon kesto on vähintään 5 vuorokautta ja taudin kulusta riippuen hoitoa voidaan jatkaa enintään 40 vuorokauden ajan.

Virtsatietulehduksissa hoidon kesto on vähintään 10 vuorokautta ja taudin kulusta riippuen hoitoa voidaan jatkaa enintään 28 vuorokauden ajan.

Hengitystietulehduksissa hoidon kesto on vähintään 7 vuorokautta ja taudin kulusta riippuen hoitoa voidaan jatkaa enintään 21 vuorokauden ajan.

Kissat:

Iho- ja pehmytkudostulehduksissa (haavat, paiseet, ajotulehdukset) hoidon kesto on 3–5 vuorokautta. Ylempien hengitysteiden tulehduksissa hoidon kesto on 5 vuorokautta.

9. ANNOSTUSOHJEET

Ei oleellinen.

10. VAROAIKA (VAROAJAT)

Ei oleellinen.

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei saa käyttää pakkauksen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärään (EXP) jälkeen. Erääntymispäivällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

Puolitettujen tablettejen kestoaika: 5 vuorokautta.

12. ERITYISVAROITUKSET

Tietty fluorokinolonit voivat suurina annoksina aiheuttaa epilepsiaa. Varovaisuus on suositeltavaa hoidettaessa koiria tai kissuja, joilla on todettu epilepsia. Suositellulla hoitoannoksilla ei kuitenkaan ole odotettavissa vakavia haittavaikutuksia koirilla tai kissoilla. Fluorokinolonioiden on osoitettu aiheuttavan nivelruston syöpymää nuorilla koirilla, joten annos on määritettävä huolellisesti etenkin hoidettaessa nuoria eläimiä. Suositellulla annoksilla tehdyissä klinisissä tutkimuksissa ei havaittu nivelaarioita.

Virtsan matala pH-arvo voi heikentää marbofloksasiinin tehoa. Märkäinen ihotulehdus on useimmiten toissijainen perussairauteen nähdyn, ja siksi on suositeltavaa selvittää perussyy ja hoitaa eläintä sen mukaisesti.

Tätä eläinlääkevalmistetta käytettäessä on huomioitava mikrobilääkkeiden käyttöä koskevat viranomaishohjeet ja paikalliset ohjeet.

Fluorokinoloneja tulisi käyttää vain sellaisten tilojen hoidossa, joihin muut mikrobilääkkeet eivät ole tehonneet tai joihin niiden odotetaan tehoavan huonosti. Aina kun mahdollista, fluorokinoloneja tulee käyttää herkkyysmäärityn ja perustellun. Valmisteylehteenvedon ohjeista poikkeava käyttö saattaa johtaa (fluoro)kinoloneille vastustuskykyisten bakteerien esiintyvyyden lisääntymiseen ja saattaa heikentää muiden kinolonioiden tehoa mahdollisen ristiresistenssin vuoksi.

Laboratoriolutkimuksissa (rotta, kaniini) ei ole löydetty näyttöä epämuidostumia aiheuttavista, sikiötoksista tai emälle toksista vaikutuksista käytettäessä marbofloksasiinia hoitoannoksilla. Marbofloksasiinin turvallisutta ei ole arvioitu tiineillä tai imettävillä kissoilla tai koirilla. Voidaan käyttää tiineille ja imettäville eläimille ainoastaan hoidosta vastaavan eläinlääkärin tekemään hyötyhaitta-arvion perustella.

Fluorokinoloneilla tiedetään olevan yhteisvaikutus suun kautta annosteltavan alumiinin, kalsiumin, magnesiumin ja raudan kanssa. Tämä voi pienentää marbofoksasiinin hyötyosuutta. Teofylliniä sisältävien lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö voi johtaa teofylliinin puhdistuman estymiseen.

Yliannostuksen akuutteina oireina voi esiintyä hermostollisia häiriöitä, joita tulee hoitaa oireenmukaisesti.

Varoitukset käyttäjälle

Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä (fluoro)kinoloneille tulee välttää kosketusta eläinlääkevalmisteen kanssa.

Otetessa valmistetta vahingossa, on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä talle pakkausselostetta tai myyntipäällystä.

Pese kädet käytön jälkeen.

13. ERITYiset varotoimet käyttämättömän valmisten tai jätemateriaalin hävittämiseksi

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokseen.

Kysy eläinläkäriäsi neuvoa tarpeellomaksi käyneiden lääkeaineiden hävittämisestä. Nämä toimet on tarkoitettu ympäristön suojelemiseksi.

14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

12.11.2024

15. MUUT TIEDOT

Yksi läpipainopakkaus (kylmämuovattu polyvinyylikloridi-alumiini-orientoitu polyamidi/alumiini-läpipainopakkaus) sisältää 10 tablettia.

10 tabletin ja 100 tabletin pakaus, joka sisältää pakkausselosten.

Kaikkia pakkauksia ei välttämättä ole markkinoilla.

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta:

KRKA Finland Oy

Puh: + 358 20 754 5330

info.fi@krka.biz

BIPACKSEDEL:

Quiflox vet 5 mg tabletter för katt och hund

**1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR
FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV
TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV
TILLVERKNINGSSATS, OM OLika**

Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA, d.d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenien

Tillverkare

KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland
KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Kroatien

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Quiflox vet 5 mg tabletter för katt och hund
Marbofloxacin

3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Varje tablett innehåller 5 mg marbofloxacin.

Ljust gulbruna, runda, bikonvexa, marmoreraade tabletter med fasade kanter, möjligtvis mörka och ljusa fläckar samt med brytskåra på ena sidan.

Tabletten kan delas i två halvor

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Quiflox vet används vid behandling av infektioner orsakade av mikroorganismer som är känsliga för den aktiva substansen marbofloxacin. Marbofloxacin tillhör läkemedelsgruppen fluorokinolon-antibiotika.

Hund:

- infektioner i hud och mjukdelar (bakteriell hudinfektion (pyodermi) i hudveck), svinkoppor (impetigo), inflammation eller infektion i hårsäckar (follikulit, furunkulos), kraftig inflammation i vävnaden under huden (cellulit);
- urinvägsinfektioner (UVI) ibland förknippat med inflammation av blåshalskörtel (prostatit) och bitestikel (epididymit);
- luftvägsinfektioner.

Katt:

- infektioner i hud och mjukdelar (sår, varbölder (abscesser), kraftig inflammation med sönderfall av vävnad (flegmoner)
- övre luftvägsinfektioner

5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte till hund under 12 månaders ålder, eller till hund under 18 månaders ålder för speciellt stora hundraser med längre tillväxtperiod såsom grand danois, briard, berner sennen, bouvier och mastiff.

Använd inte till katt under 16 veckors ålder.

Använd inte vid överkänslighet mot marbofloxacin eller andra (fluoro)kinoloner eller mot något hjälpmämne.

Använd inte vid resistens mot kinoloner eftersom det finns en nästan fullständig korsresistens mot andra fluorokinoloner.

6. BIVERKNINGAR

Milda biverkningar såsom kräkning, lös avföring, förändrad törst samt övergående aktivitetsökning kan i mycket sällsynta fall förekomma. Dessa symtom upphör spontant då behandlingen avslutats och kräver inte att behandlingen avbryts.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)
- vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)
- mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)
- sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)
- mycket sällsynta (färra än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

7. DJURSLAG

Katt och hund

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För intag via munnen (oral administrering).

Veterinären kommer att bestämma korrekt dosering för ditt djur. Den rekommenderade dosen är 2 mg marbofloxacin/kg kroppsvikt/dag (1 tablet per 2,5 kg kroppsvikt per dag) med dosering en gång per dag.

Om det är lämpligt, dock endast till hundar, kan en kombination av hela och halva tabletter i olika styrkor (5 mg, 20 mg eller 80 mg) användas för att uppnå korrekt dosering.

Djurets kroppsvikt (kg)	Antal tabletter (styrka: 5 mg)	Ungefärligt dosintervall (mg/kg)
1 – 1,5	0,5	1,7 – 2,5
1,5 – 2,5	1	2,0 – 3,3
2,5 – 3,5	1,5	2,1 – 3,0
3,5 – 5,0	2	2,0 – 2,9
5,0 – 7,0	3	2,1 – 3,0
7,0 – 9	4	2,2 – 2,9

För att säkerställa en korrekt dosering bör kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt för att undvika för låg dosering.

Behandlingstid

Hund:

För infektioner i hud och mjukdelar är behandlingstiden minst 5 dagar och kan beroende på sjukdomsutvecklingen pågå i upp till 40 dagar.

För urinvägsinfektioner är behandlingstiden minst 10 dagar och kan beroende på sjukdomsutvecklingen pågå i upp till 28 dagar.

För luftvägsinfektioner är behandlingstiden minst 7 dagar och kan beroende på sjukdomsutvecklingen pågå i upp till 21 dagar.

Katt:

För infektioner i hud och mjukdelar (sår, abscesser, flegmoner) är behandlingstiden 3-5 dagar.

För övre luftvägsinfektioner är behandlingstiden 5 dagar.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Inga.

10. KARENSTID(ER)

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet för delad tablet: 5 dagar.

12. SÄRSKILDA VARNINGAR

Höga doser av vissa fluorokinoloner kan ha epilepsiutlösande effekt. Försiktighet rekommenderas vid behandling av hund och katt med diagnosen epilepsi. Vid rekommenderade doser förväntas inga grava biverkningar hos hund eller katt. Fluorokinoloner har visats inducera erosion av ledbrosk hos unga hundar. Därför måste dosen bestämmas noggrant särskilt hos unga djur. Inga skador på lederna har påträffats i kliniska studier vid rekommenderad dosering.

Ett lågt pH i urinen kan ha en hämmande effekt på aktiviteten av marbofloxacin. Pyoderma är oftast sekundärt till andra underliggande sjukdomar och det är därför lämpligt att bestämma den underliggande sjukdomen och behandlat djuret därefter.

Officiella och lokala riktlinjer för antibiotika bör beaktas när veterinära läkemedel används.

Fluorokinoloner bör endast användas då andra typer av antimikrobiell behandling har visat eller kan förväntas visa dålig effekt mot sjukdomstillståndet. Om möjligt ska behandling med fluorokinoloner baseras på känslighetstest. Om läkemedlet används på ett sätt som avviker från instruktionerna i produktresumén finns en risk att bakterier som är resistenta mot (fluoro)kinoloner ökar, vilket kan minska effekten av andra kinoloner på grund av möjlig korsresistens.

Studier på laboratoriedjur (råtta, kanin) visade inte på någon skadande effekt på embryo, foster eller modern av marbofloxacin vid rekommenderade doser. Marbofloxacins säkerhet har inte utvärderats

hos dräktiga eller digivande katter eller hundar. Används endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Det är känt att fluorokinoloner interagerar med intag via munnen av aluminium, kalcium, magnesium eller järn. I sådana fall kan tillgängligheten av marbofloxacin i kroppen minska. Samtidig administrering av läkemedel som innehåller teofyllin kan leda till en hämmad utsöndring av teofyllin.

Överdoser kan orsaka akuta symptom som neurologiska störningar och bör behandlas symptomatiskt.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Personer som är överkänsliga mot (fluoro)kinoloner ska undvika kontakt med läkemedlet.

Vid oavsiktligt intag av läkemedlet uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Tvätta händerna efter användning.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Ej använt veterinärläkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

12.11.2024

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Varje blister (kallformat orienterad polyvinylchlorid-aluminium polyamid/aluminium blister) innehåller 10 tablett(er).

Kartongen innehåller bipacksedel och 10 eller 100 tablett(er)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

KRKA Finland Oy

Tel: + 358 20 754 5330

info.fi@krka.biz