

NEMAVET VET 50 MG/G JAUHE SIOILLE

Nemavet-jauhe on laajakirjoinen matolääke sikojen sisäloisten häätämiseksi. Nemavet-jauhe tehoaa sikojen ruoansulatuskanavassa loisiviin pyörömatoihin ja keuhkomatoon. Se tappaa madot häiritsemällä niiden energia-aineenvaihduntaa.

Koostumus:

1 gramma jauhetta sisältää vaikuttavaa ainetta fenbendatsolia 50 mg sekä lisäksi glukosimonohydraattia 949 mg ja piidioksidia 1 mg.

Annostusohje:

Ohjeannos on 0,1 g Nemavetia (5 mg fenbendatsolia) elopainokiloa kohti rehuun sekoitettuna. Valmis lääkerehu saadaan sekoittamalla 2 kg Nemavetia/1000 kg rehua (= 100 mg fenbendatsolia/kg rehuseosta). Pakkaus sisältää 20 g mittalusikan. 1 tasainen mittalusikka (20 g) Nemavet-jauhetta on 200 kg emakon annos. Näin saatua rehuseosta annostellaan seuraavasti:

Sian ikä/elopaino	Rehun syöntimäärä päivässä
-------------------	----------------------------

7-8 viikkoa/20 kg	1 kg
12 viikkoa/30 kg	1,5 kg
16 viikkoa/60 kg	3 kg

Valmisteen täydellisen sekoittumisen varmistamiseksi Nemavet vet. 50 mg/g jauhe tulee sekoittaa ensin pienempään rehuerään (esim. 2 kg Nemavetia ja 20 kg rehua) ennen lopulliseen rehumäärään sekoittamista.

Hoitosuositus:

Emakot ja ensikot	Viikko ennen porsituskarsinaan siirtoa.
Porsaat	7 viikon iässä.
Ensikot	Testauksessa hyväksytyt.
Karjut	4 kertaa vuodessa.
Lihasiat	Yleensä tarpeetonta. Jos olosuhteista johtuen on odotettavissa jatkuvia loisongelmia (esim. puru- ja maapohjasikalat), suositellaan hoitoa heti porsaiden tultua sikalaan. Hoito voidaan uusia kuukauden kuluttua.

Käyttöohje:

Rehua, joka sisältää Nemavet-jauhetta, ei tule rakeistaa.

Valmistetta käsiteltäessä on vältettävä pölyn hengittämistä ja on suositeltavaa käyttää kasvosuojainta. Ihokosketusta tulisi välttää. Käytön jälkeen tulee pestä kädet sekä muut ihoalueet, jotka ovat olleet tuotteen kanssa kosketuksissa.

Käyttö tiineyden ja imetyksen aikana:

Valmiste on turvallinen käytettäväksi tiineyden ja imetyksen aikana.

Varoaika:

Teurastus 6 vrk.

Säilytys ja kesto aika:

Ei lasten ulottuville. Säilytä alle 25 °C, kuivassa paikassa, hyvin suljetussa astiassa, valolta suojassa. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty purkin etikettiin, valmistetta ei tule käyttää tämän ajankohdan jälkeen. Valmis rehuseos tulee käyttää 4 viikon kuluessa sekoittamisesta. Käyttämätön valmiste tulee toimittaa apteekkiin hävitettäväksi.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:

Univet Ltd., Tullyvin, Cootehill, Co. Cavan, Irlanti.

Tiedotus ja markkinointi Suomessa:

Vetcare Oy, PL 99, 24101 Salo.

Pakkausselosteen päiväys:

20.2.2014

NEMAVET VET 50 MG/G PULVER FÖR SVIN

Nemavet -pulver är ett avmaskningsmedel med brett spektrum för behandling av endoparasiter hos svin. Nemavet -pulver är effektivt mot parasiterande rundmask och lungmask i matsmältningskanalen hos svin. Det dödar maskarna genom att störa deras energiomsättning.

Innehåll:

1 gram pulver innehåller 50 mg fenbendazol som verksamt substans samt därtill 949 mg glukosmonohydrat och kolloidal, vattenfri kiseldioxid 1 mg.

Doseringsrekommendation:

Rekommenderad dos är 0,1 g Nemavet (5 mg fenbendazol) per 1 kg kroppsvikt blandat i fodret. Färdig foderblandning erhålls genom att blanda 2 kg Nemavet/1000 kg foder (= 100 mg fenbendazol/kg foderblandning). Förpackningen innehåller en 20 g:s doseringssked. En struken dossked (20 g) Nemavet pulver är dosen för en 200 kg:s sugga. På så sätt erhållen foderblandning doseras på följande sätt:

Svinets ålder/kroppsvikt	Fodermängden som intas per dag
7-8 veckor/20 kg	1 kg
12 veckor/30 kg	1,5 kg
16 veckor/60 kg	3 kg

För att kunna garantera att preparatet fullständigt blandas bör Nemavet vet. 50 mg/g pulver först blandas i en mindre mängd foder (t.ex. 2 kg Nemavet och 20 kg foder) innan det blandas i den slutliga fodermängden.

Behandlingsrekommendation:

Suggor och gyltor	En vecka före överföring till grisningskätte.
Grisar	I 7 veckors ålder.
Gyltor	Vid testning godkända.
Galtar	4 gånger i året.
Köttsvin	I allmänhet onödigt. Om fortgående parasitproblem på grund av omständigheterna är att vänta (t.ex. sågspån- och marksvingårdar), rekommenderas en behandling genast efter att grisarna kommit till svingården. Behandlingen kan upprepas om en månad.

Bruksanvisning:

Foder, som innehåller Nemavet -pulver, bör inte granuleras.

Vid hanteringen av preparatet bör man undvika att andas in av dammet och användning av ansiktsskydd rekommenderas. Hudkontakt borde undvikas. Efter användning bör man tvätta händerna liksom övriga hudområden, som varit i kontakt med preparatet.

Användning under dräktighet och digivning:

Produkten kan tryggt användas under dräktighet och digivning.

Karenstid:

Slakt 6 dygn.

Förvarning och hållbarhet:

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras vid högst 25 °C, på torrt ställe, i tätt sluten förpackning, skyddad mot ljus. Utgångsdatum har antecknats på burkens etikett, preparatet bör inte användas efter detta datum. Färdig foderblandning bör användas inom 4 veckor från att den tillräts. Ett oanvänt preparat bör returneras till apotek för att förstöras.

Innehavare av försäljningstillstånd och tillverkare:

Univet Ltd., Tullyvin, Cootehill, Co. Cavan, Irland.

Information och marknadsföring i Finland:

Vetcare Oy, PB 99, 24101 Salo.

Bipacksedelns datum:

20.2.2014