

## **Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle**

### **Atropin Abboxia 0,5 mg/ml injektioneste, liuos Atropin Abboxia 1 mg/ml injektioneste, liuos**

atropiinisulfaatti

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

**Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Atropin Abboxia on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Atropin Abboxia -valmistetta
3. Miten Atropin Abboxia -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Atropin Abboxia -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Atropin Abboxia on ja mihin sitä käytetään**

Atropin Abboxia kuuluu lääkeryhmään, josta käytetään nimitystä antikolinergit. Atropin Abboxia -valmisteen vaikuttava aine atropiinisulfaatti estää tilapäisesti joidenkin hermopäätteiden toiminnan. Tämä vähentää rauhasen eritystä, rentouttaa joitakin lihaksia (esimerkiksi suoliston lihaksia) ja nopeuttaa sykettä. Atropin Abboxia -valmistetta käytetään

- maha-suolikanavan lihasten rentouttamiseen kouristusten aikana
- syljen, keuhkoputkieritteiden ja/tai mahanesteiden vähentämiseen
- hitaan sydämen sykkeen hoitoon
- lääkitykseksi leikkauksen aikana.

Atropiinisulfaattia, jota Atropin Abboxia sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Atropin Abboxia -valmistetta**

**Älä käytä Atropin Abboxia -valmistetta**

- jos olet allerginen atropiinisulfaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on virtsaamisvaikeuksia (esimerkiksi jos olet mies ja sinulla on suurentunut eturauhanen)
- jos sinulla on kohonnut silmänpaine (glaukooma)
- jos sinulla on suolitukos tai suoliston halvaus
- jos sinulla on vaikea paksusuolitulehdus (haavainen paksusuolitulehdus) tai paksusuolitulehduksen komplikaatioita.

Nämä vasta-aiheet eivät päde henkeä uhkaavissa tilanteissa.

#### **Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin sinulle annetaan Atropin Abboxia -valmistetta. Erityistä varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa potilaita, joilla on

- tiettyjä sydänsairauksia (tiheälyöntinen rytmihäiriö, sydämen vajaatoiminta tai sepelvaltimotauti)
- korkea verenpaine
- suolisto- tai mahavaivoja, kuten mahalaukun ja ohutsuolen välisen aukon ahtauma (mahanportin ahtauma), mahahaava, närästys tai mahansisällön takaisinvirtaus (refluksi), ripuli tai tulehdus, hiatusyrä (mahalaukun luiskahtaminen osittainen palleassa olevan aukon läpi)
- kohonnut ruumiinlämpö
- maksa- tai munuaisongelmia
- kilpirauhasen liikatoiminta
- oireita, jotka johtuvat verenpainetta, sykettä, suolen ja rakon tyhjentymistä, ruoansulatusta ja muita elintoimintoja säätelevien hermojen vauriosta (autonominen neuropatia)
- kirurgisesti luotu keinotekoinen aukko ohut- tai paksusuolella (sykkyräsuoliavanne tai paksusuoliavanne)
- krooninen keuhkosairaus
- vaikea lihasheikkous (myasthenia gravis).

### **Lapset**

Atropin Abboxia -valmistetta on käytettävä varoen lapsille, sillä he ovat muita herkempiä valmisteen vaikutuksille.

### **Ikäkkäät**

Atropin Abboxia -valmistetta on käytettävä varoen ikäkkäille, sillä he ovat muita herkempiä valmisteen vaikutuksille. Annosta voi olla tarpeen muuttaa ikäkkäille.

### **Muut lääkevalmisteet ja Atropin Abboxia**

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Tämä koskee myös

- trisyklisiä antidepressantteja (käytetään masennuksen hoitoon)
- kouristuslääkkeitä (käytetään suolistovaivojen ja lihaskouristusten tai kramppien lievittämiseen)
- amantadiinia tai vastaavia lääkevalmisteita (käytetään Parkinsonin taudin hoitoon)
- tiettyjä antihistamiineja (heinänuhan ja allergioiden hoitoon)
- fentiatsiineja (käytetään ahdistuneisuuden tai vaikeiden psyykkisten sairauksien hoitoon)
- disopyramidia ja kinidiiniä (sydämen rytmin hallintaan käytettäviä lääkkeitä).

### **Raskaus ja imetys**

Jos olet raskaana tai imetat, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

#### Raskaus

Vähäiset tiedot atropiinin käytöstä raskauden aikana eivät viittaa siihen, että atropiinilla olisi haitallisia vaikutuksia raskauteen tai sikiön/vastasyntyneen terveyteen. Atropiini läpäisee istukkaesteen. Atropiinin anto laskimoon raskauden aikana tai synnytysshetkellä voi aiheuttaa sikiölle ja äidille takykardiaa (nopeaa sydämensykettä). Atropin Abboxia -valmistetta saa käyttää raskauden aikana vasta sen jälkeen, kun hoidon hyödyt ja riskit on arvioitu huolellisesti.

#### Imetys

Vähäisiä määriä atropiinia saattaa erittyä rintamaitoon. Imeväiset ovat erityisen herkkiä atropiinin antikolinergisille vaikutuksille. Atropiini saattaa estää rintamaidon tuotantoa, etenkin toistuvassa käytössä. Lääkäri arvioi imetyksen ja hoidon hyödyt. Imetys on lopetettava, jos hoitoa päätetään antaa. Jos kuitenkin päätetään jatkaa imetystä hoidon aikana, lääkäri tekee imeväiselle ylimääräisiä tutkimuksia.

### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Lähinäön heikkeneminen ja silmän mukautumiskyvyn heikkeneminen ovat yleisiä tähän lääkevalmisteeseen liittyviä haittavaikutuksia. Tämä tulee ottaa huomioon kuljetettaessa moottoriajoneuvoa.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

### **Atropin Abboxia sisältää natriumia**

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per millilitra injektionestettä, liuosta, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

## **3. Miten Atropin Abboxia-valmistetta käytetään**

Atropin Abboxia annetaan pistoksena, jonka antaa lääkäri tai erikoiskoulutuksen saanut sairaanhoitaja. Pistos voidaan antaa ihon alle tai suoraan verenkiertoon (laskimoon). Lääkäri päättää sinulle sopivan annoksen.

### **Jos sinulle annetaan enemmän Atropin Abboxia -valmistetta kuin pitäisi**

Tämä lääkevalmisteen antaa vain lääkäri tai sairaanhoitaja, joten on epätodennäköistä, että sinulle annetaan tätä lääkevalmistettä enemmän kuin pitäisi. Jos epäilet, että sinulle on annettu lääkevalmistettä liikaa, kerro siitä välittömästi lääkärille tai sairaanhoitajalle.

Atropin Abboxia -valmisteen yliannostus voi aiheuttaa limakalvojen tai ihon kuivumista, janoa, kasvojen punoitusta, epäsäännöllistä sydämensykeä, nopeaa hengitystä, mustuaisten laajenemista, näön hämärtymistä, kuumetta, virtsaamisvaikeuksia, levottomuutta, krampeja, kiihtyneisyyttä, aistiharhoja (olemattomien asioiden näkemistä tai kuulemistä), tajuttomuutta, verenpaineen nousua sekä vaikeissa tapauksissa verenkierron pettämisen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaisissa tapauksissa saattaa ilmetä allerginen reaktio. Se saattaa aiheuttaa ihottumaa, vaikeaa kutinaa, ihon hilseilyä, kasvojen turvotusta (etenkin huulten ja silmien alueella), kurkun turvotusta ja hengitys- tai nielemisvaikeuksia, kuumetta, elimistön kuivumista, sokin ja pyörtyymisen. Nämä kaikki ovat hyvin vakavia haittavaikutuksia. Kerro lääkärille **välittömästi**, jos sinulla ilmenee tällaisia haittavaikutuksia.

Yleisin haittavaikutus on suun kuivuminen, jota ilmenee useimmilla potilailla. Suun kuivumiseen liittyy hammas- ja limakalvovaurioiden vaara pitkäaikaisessa käytössä.

Haittavaikutukset riippuvat annetusta annoksesta.

### Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)

- mustuaisten laajeneminen, näön hämärtyminen, valonarkuus
- ummetus
- närästys (refluksi)
- pahoinvointi
- oksentelu
- vatsan pingotus
- keuhkoputkien vähentynyt erityys
- hikoilun väheneminen
- ihottuma
- nokkosihottuma

#### Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä 1 käyttäjällä 10:stä)

- nopea sydämen syke
- kiihtyneisyys
- sekavuus
- aistiharhat (suuria annoksia käytettäessä)
- katseen tarkentamisen vaikeudet
- suun kuivuminen
- virtsaamisvaikeudet
- epäsäännöllinen sydämen syke
- elimistön ylikuumentuminen
- kasvojen ja kaulan punoitus

#### Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä 1 käyttäjällä 100:sta)

- psykoottiset reaktiot

#### Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

- allergiset reaktiot
- kohtaukset (kouristuskohtaukset)
- uneliaisuus

#### Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä 1 käyttäjällä 10 000:sta)

- epäsäännöllinen sydämen syke, mukaan lukien kammiovärinä
- rintakipu
- verenpaineen äkillinen nousu
- vaikea yliherkkyysoireyhtiö

#### Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

- epävakaata kävelyä ja tasapaino-ongelmat
- päänsärky

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

## **5. Atropin Abboxia-valmisteen säilyttäminen**

Ei erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

### **Mitä Atropin Abboxia sisältää**

- Vaikuttava aine on atropiinisulfaatti.
- Muut aineet ovat rikkihappo (pH:n säätämiseen), natriumkloridi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkausko (koot)**

Lasiampulli: 5 x 1 ml, 10 x 1 ml, 20 x 1 ml, 50 x 1 ml, 100 x 1 ml

### **Myyntiluvan haltija**

Abboxia AB  
Box 50  
431 21 Mölndal  
Ruotsi

### **Valmistaja**

Laboratoire Renaudin  
Z.A Errobi  
F-64 250 Itxassou  
Ranska

### **Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi**

18.01.2024

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Atropin Abboxia 0,5 mg/ml injektionsvätska, lösning Atropin Abboxia 1 mg/ml injektionsvätska, lösning**

atropinsulfat

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande :**

1. Vad Atropin Abboxia är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Atropin Abboxia
3. Hur du använder Atropin Abboxia
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Atropin Abboxia ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Atropin Abboxia är och vad det används för**

Atropin Abboxia tillhör en grupp av läkemedel som kallas för antikolinergika. Atropinsulfat, den aktiva substansen i Atropin Abboxia, blockerar tillfälligt vissa nervändar. Detta minskar körtelutsöndringar, gör att vissa muskler (t.ex. i tarmarna) slappnar av och att hjärtat slår snabbare.

Atropin Abboxia används:

- för avslappning av muskler i mag-tarmkanalen vid kramper
- för att minska utsöndring av saliv, lungsekret och/eller magsaft
- för behandling av långsamma hjärtslag
- som medicinering under operation.

Atropin som finns i Atropin Abboxia kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

#### **2. Vad du behöver veta innan du använder Atropin Abboxia**

**Använd inte Atropin Abboxia**

- om du är allergisk mot atropinsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har svårt att kissa (t.ex. om du är man och har förstörd prostata)
- om du har ökat tryck i ögat (glaukom)
- om du har blockering i tarmarna eller stillastående tarm
- om du lider av allvarlig inflammation i tjocktarmen (ulcerös kolit) eller komplikation av inflammation i tjocktarmen

Dessa kontraindikationer gäller inte vid livshotande tillstånd.

**Varningar och försiktighet**

Tala med läkare innan du ges Atropin Abboxia.

Särskild försiktighet ska iakttas hos patienter med:

- vissa hjärtsjukdomar (takarytmier, hjärtinsufficiens eller kranskärlssjukdom)

- högt blodtryck
- tarm- eller magproblem, t.ex. förträngning av öppningen mellan magsäcken och tunntarmen (pylorusstenos), magsår, halsbränna eller reflux, diarré eller infektion, hiatusbräck (när en del av magsäcken faller ut genom mellangärdet)
- förhöjd temperatur
- lever- eller njurproblem
- överaktiv sköldkörtel
- symtom från skada på de nerver som reglerar blodtryck, hjärtfrekvens, tömning av tarm och blåsa, matsmältning och annan kroppsfunction (autonom neuropati)
- kirurgiskt skapad konstgjord öppning i tunn- eller tjocktarmen (ileostomi eller kolostomi)
- kronisk lungsjukdom
- svår muskelsvaghet (myasthenia gravis)

### **Barn**

Atropin Abboxia ska användas med försiktighet till barn eftersom de är känsligare för produktens effekter.

### **Äldre**

Atropin Abboxia ska användas med försiktighet till äldre patienter eftersom de är känsligare för produktens effekter. Dosreduktion kan vara nödvändig hos äldre.

### **Andra läkemedel och Atropin Abboxia**

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Dessa innefattar:

- tricykliska antidepressiva (för behandling av depression)
- kramplösande medel (används för att lindra tarmsmärta och muskelspasmer eller kramper)
- amantadin eller liknande läkemedel (för behandling av Parkinsons sjukdom)
- vissa antihistaminer (för behandling av hösnuva och allergier)
- fentiaziner (för behandling av ångest eller mer allvarliga mentala sjukdomar)
- disopyramid och kinidin (läkemedel som används för att styra hjärtrytmen).

### **Graviditet och amning**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du ges detta läkemedel.

#### Graviditet

Data från ett begränsat antal exponerade graviditeter tyder inte på några negativa effekter av atropin på graviditet eller på fostrets/det nyfödda barnets hälsa. Atropin passerar placentabarriären. Intravenös administrering av atropin under graviditet eller vid fullgången graviditet kan orsaka takykardi (snabb hjärtfrekvens) hos fostret och modern. Atropin Abboxia bör endast användas under graviditet efter noggrant övervägande av nyttan och riskerna med behandlingen.

#### Amning

Små mängder atropin kan passera över i bröstmjölken. Spädbarn har en ökad känslighet för de antikolinerga effekterna av atropin. Atropin kan hämma amning, särskild vid upprepad användning. Läkaren kommer att överväga fördelarna med amning jämfört med fördelarna med behandlingen. Amning bör avbrytas om beslutet att använda behandlingen vidhålls. Läkaren kommer dock att utföra extra undersökningar på barnet om det under behandlingen beslutas att fortsätta amma.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

En vanlig biverkan av detta läkemedel är försämrat närseende och dimsyn vilket bör beaktas vid bilkörning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **Atropin Abboxia innehåller natrium**

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per ml injektionsvätska, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

## **3. Hur du använder Atropin**

Atropin Abboxia ges som en injektion av en läkare eller en specialutbildad sjuksköterska. Injektionen kan ges under huden eller direkt i blodet (i en ven). Läkaren kommer att avgöra vilken dos som är lämplig för dig.

### **Om du har givits för stor mängd av Atropin Abboxia**

Det är osannolikt att du kommer få för stor mängd av detta läkemedel då det endast ges av en läkare eller sjuksköterska. Om du misstänker att du har givits för mycket ska du tala om det för läkaren eller sjuksköterskan omedelbart.

Överdoser av Atropin Abboxia kan orsaka torra slemhinnor och hud, törst, ansiktsrodnad, rytmrubbning i hjärtat, snabb andning, utvidgning av pupiller, dimsyn, feber, svårigheter att kissa, rastlöshet, kramper, uppjagat sinnestillstånd, hallucinationer (att se och höra något som inte finns), medvetlöshet, förhöjt blodtryck samt cirkulationskollaps i svåra fall.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

I sällsynta fall kan en allergisk reaktion utvecklas. Den kan orsaka hudutslag, svår klåda, fjällning av huden, svullnad i ansiktet (speciellt runt läpparna och ögonen), svullnad i halsen och svårighet att andas eller svälja, feber, uttorkning, chock och svimning. Alla dessa biverkningar är mycket allvarliga.

**Tala omedelbart** om för läkare om du får någon av dessa biverkningar.

Den vanligaste biverkningen är muntorrhet och drabbar de flesta patienterna. Muntorrhet innebär risk för tand- och slemhinneskador vid längre tids bruk.

Biverkningarna beror på den dos du ges.

### Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos mer än 1 av 10 användare)

- vidgade pupiller, suddigt seende, oförmåga att tolerera ljus
- förstoppning
- halsbränna (reflux)
- illamående
- kräkningar
- uppsvälldhet
- minskad utsöndring av slem i luftrören
- förlust av förmågan att svettas
- utslag
- näselfeber

### Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- snabba hjärtslag
- uppjagad känslöstämning



- förvirring
- hallucinationer (vid höga doser)
- svårigheter att fokusera ögonen
- muntorrhet
- svårigheter att kissa
- oregelbundna hjärtslag
- överhettad kropp
- blodvallning

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

- psykotiska reaktioner

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

- allergiska reaktioner
- anfall (kramper)
- sömnhet

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10000 användare)

- oregelbundna hjärtslag, inklusive kammarflimmer
- bröstsmärta
- tillfällig kraftigt förhöjt blodtryck
- allvarlig överkänslighetsreaktion

Inga kända (kan inte beräknas från tillgängliga data)

- ostadig gång och balansproblem
- huvudvärk

**Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

**Finland**

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

**Sverige**

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

[www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

**5. Hur Atropin Abboxia ska förvaras**

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är atropinsulfat.
- Övriga innehållsämnen är svavelsyra (för pH-justering), natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Glasampull: 5 x 1 ml, 10 x 1 ml, 20 x 1 ml, 50 x 1 ml, 100 x 1 ml

### **Innehavare av godkännande för försäljning**

Abboxia AB  
Box 50  
431 21 Mölndal  
Sverige

### **Tillverkare**

Laboratoire Renaudin  
Z.A Errobi  
F-64 250 Itxassou  
Frankrike

### **Denna bipacksedel ändrades senast**

18.01.2024