

Pakkausseloste: Tie toa käyttäjälle

Ebetrex 20 mg/ml injektioneste, liuos, esityyty ruisku

metotreksaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännny lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro näistä lääkärille tai apteekkikenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Ebetrex on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ebetrex -valmistetta
3. Miten Ebetrex -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Ebetrex -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Ebetrex on ja mihin sitä käytetään

Ebetrex on lääke, jolla on seuraavia ominaisuuksia:

- se ehkäisee tiettyjen nopeasti lisääntyvien solujen kasvua kehossa (kasvainten kasvua ehkäisevä lääke)
- se vähentää kehon puolustusmekanismin epätoivottuja reaktioita (immuunireaktioita vähentävä aine)
- se on anti-inflammatoryinen eli tulehdusta estävä aine.

Ebetrexia käytetään

- aktiivisen nivereuman hoitoon aikuisilla
- vaikean aktiivisen lasten idiopaattisen moninivelreuman (kun reuma on vähintään viidessä nivelessä) hoitoon, kun tulehduskipulääkkeet (NSAID:t) eivät tehoa tarpeeksi hyvin.
- vaikean, vaikeahoitoisen, vammauttavan psoriaasin hoitoon, kun muut hoidot, kuten valohoitot, PUVA-hoito ja retinoidit eivät tehoa riittävästi, ja vaikean nivelporiaasin hoitoon aikuisilla.

Metotreksaattia, jota Ebetrex sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkikenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ebetrex -valmistetta

Jos sinulla on kysyttävää Ebetrexista, kysy ennen käytön aloittamista lääkäriltä tai apteekkikenkilökunnalta.

Älä käytä Ebetrex -valmistetta

- jos olet allerginen metotreksaatiille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on merkittävä munuaissairaus (lääkäri arvioi sairauden vakavuuden)
- jos sinulla on merkittävä maksasairaus (lääkäri arvioi sairauden vakavuuden)

- jos sinulla on verta muodostavan järjestelmän häiriötä
- jos käytät paljon alkoholia
- jos sinulla on heikentynyt immuunijärjestelmä
- jos sinulla on vaikea tai aktiivinen infektio, kuten tuberkuloosi ja HIV
- jos sinulla on aktiivisia ruoansulatuskanavan haavaumia (suuontelon haavaumat mukaan lukien)
- jos olet raskaana tai imetät (ks. kohta ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys”)
- jos saat samanaikaisesti rokotuksia, joissa käytetään eläviä rokotteita.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Ebetrex -valmistetta, jos

- sinulla on diabetes mellitus, jota hoidetaan insuliinilla
- sinulla on epäaktiivinen, pitkittynyt infektio (esim. tuberkuloosi, hepatiitti B tai C, vyöruusu eli herpes zoster)
- sinulla on tai on ollut jokin maksa- tai munuaissairaus
- sinulla on ongelmia keuhkojen toiminnassa
- sinulla on epänormaalit nesteen kertymisiä vatsaan tai keuhkojen ja rintakehän seinämän väliseen tilaan (askites, pleuraeffusiot)
- olet kuivunut (dehydroitunut) tai kärsit vaivoista, jotka voivat johtaa kuivumiseen (oksentelu, ripuli, suutulehdus).

Akuutista keuhkoverenvuotoa on raportoitu metotreksaattia käytettäessä niillä potilailla, joilla on taustalla reumatologinen sairaus. Jos sinulla on oireina veren sylkemistä tai yskemistä, ota yhteyttä lääkäriisi välittömästi.

Hoitoa annetaan **ke rran viikossa.**

Metotreksatin väärä annostelu voi aiheuttaa vakavia, myös mahdollisesti kuolemaan johtavia haittavaikutuksia.

Lue tarkkaan tämän pakkausselosten kohta 3.

Jos sinulla on ollut iho-ongelmiä sädehoidon (säteilyn aiheuttama dermatiitti) ja auringonpolttaman jälkeen, nämä ongelmat voivat ilmaantua uudelleen metotreksattioidon aikana.

Jos huomaat tai kumppani tai sinua hoitava henkilö huomaa uusia tai pahentuneita neurologisia oireita, kuten yleistä lihasheikkoutta, näköhäiriötä tai ajattelussa, muistissa tai orientoitumisessa tapahtuvia muutoksia, jotka aiheuttavat sekavuutta ja persoonallisuuden muutoksia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, koska nämä voivat olla oireita erittäin harvinaisesta ja vakavasta aivotulehdusta nimeltä progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia (PML).

Laps et ja nuoret

Annostus riippuu potilaan painosta. Käyttöä alle 3-vuotiaille lapsille ei suositella, koska kokemukset tällä ikäryhmällä ovat riittämättömät.

Alan erikoislääkärin tulee tarkkailla erityisen huolellisesti Ebetrex-hoitoa saavia lapsia, jotta mahdolliset haittavaikutukset voitaisiin huomata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Iäkkääät potilaat

Lääkärin on seurattava huolellisesti metotreksattihoitoa saavia iäkkääitä potilaita, jotta mahdolliset haittavaikutukset voidaan havaita mahdollisimman varhain.

Metotreksaattiannoksen on oltava suhteellisen pieni, sillä iän myötä maksan ja munuaisten toiminta heikkenevät ja foolihappo-vitamiinin varastot elimistössä pienenevät.

Psoriaasin aiheuttamat iho-oireet voivat pahentua Ebetrex-hoidon aikana, jos samanaikaisesti tapahtuu altistumista UV-säteilylle.

Suositellut seurantatutkimukset ja varotoimet:

Vakavia haittavaiktuksia voi esiintyä myös pienien Ebetrex-annosten käytössä. Jotta ne huomattaisiin ajoissa, lääkärin tulee tehdä seurantatutkimuksia ja laboratoriokokeita.

Ennen hoidon aloittamista:

Ennen hoidon aloittamista verestäsi tutkitaan, onko sinulla riittävästi verisolua. Verikokeella tutkitaan myös maksasi toiminta ja selvitäään, onko sinulla hepatiitti (maksainfekti). Myös seerumin albumiinipitoisuus (veressä esiintyvä proteiini), hepatiittitilanne (maksainfekti) ja munuaistointiminta tutkitaan. Lääkäri saattaa myös määräätä muita maksakokeita. Nämä voivat olla mm. maksan kuvantaminen ja pienen kudosnäytteen otto maksasta tarkempaa tutkimusta varten. Lääkäri voi myös tutkia, onko sinulla tuberkuloosi, ja ottaa keuhkokuvan tai tehdä keuhkojen toimintakokeen.

Hoidon aikana:

Lääkäri voi tehdä tai määräätä seuraavat tutkimukset:

- suuontelon ja nielun tutkimus limakalvomuutosten, kuten tulehduksen tai haavaumien, varalta
- verikoe/verenkuva, joka sisältää verisolujen määrän ja seerumin metotreksaattipitoisuuden mittauksen
- verikoe maksan toiminnan seuraamiseksi
- kuvantamistutkimukset maksan tilan seuraamiseksi
- pienien kudosnäytteen otto maksasta tarkempaa tutkimusta varten
- verikoe munuaistominnan seuraamiseksi
- hengitysteiden seuranta ja tarvittaessa keuhkojen toimintakoe.

On erittäin tärkeää mennä määräättyihin tutkimuksiin.

Jos jonkin kokeen tulokset ovat poikkeavia, lääkäri muuttaa hoitoa tulosten mukaisesti.

Ebetrex-valmisteen käyttöön liittyviä erityisvarotoimenpiteitä

Metotreksaatti vaikuttaa ohimenevästi sperman ja munasolujen tuotantoon, mutta vaikutus on useimmissa tapauksissa ohimenevä. Metotreksaatti voi aiheuttaa keskenmenon tai vaikeita synnynnäisiä vikoja. Jos olet nainen, sinun on vältettävä raskaaksi tulemista, kun saat metotreksaattia, ja vähintään kuusi kuukautta hoidon jälkeen. Jos olet mies, sinun on vältettävä lapsen sijttämistä, kun saat metotreksaattia, ja vähintään kolme kuukautta hoidon jälkeen. Katso myös kohta ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys”.

Muut lääkevalmisteet ja Ebetrex

Kerro lääkärille tai apteekkikenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käytänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Muista kertoa lääkärille Ebetrex-hoidostasi, jos sinulle määräätään muuta lääkettä Ebetrex-hoidon vielä jatkussa.

On erityisen tärkeää kertoa lääkärille, jos käytät:

- muita nivereumaan tai psoriaasiin tarkoitettuja lääkkeitä, kuten leflunomidia, sulfasalatsiinia (käytetään myös haavaiseen paksusuolitulehdukseen), asetyylisalisyylihappoa, fenylibutatsonia tai aminofenatsonia
- alkoholia (käyttöä on vältettävä)
- eläviä taudinaheuttajia sisältäviä rokotteita
- atsatiopriinia (käytetään estämään hylkimisreaktioita elinsiirron jälkeen)
- retinoideja (käytetään psoriaasin ja muiden ihotautien hoitoon)
- antikonvulsanteja (kouristuksia estäviä lääkkeitä)
- syöpähoidoja
- barbituraatteja (unilääkkeitä)
- rauhoittavia lääkkeitä
- ehkäispillereitä
- probenesidia (kihtilääke)
- antibiootteja
- penisilliinit voivat vähentää metotreksaatin eritymistä ja saattavat täten lisätä haittavaiktuksia
- pyrimetamiinia (käytetään malarian ehkäisyyn ja hoitoon)
- vitamiinivalmisteita, jotka sisältävät foolihappoa

- protonipumpun salpaajia (käytetään vaikeaan närästykseen tai mahahaavaan)
- teofylliiniä (käytetään astman hoitoon).

Ebetrex ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Ebetrex-hoidon aikana sinun on välttävä alkoholin käyttöä sekä liallista kahvin, kofeinia sisältävien virvoitusjuomien tai mustan teen juontia.

Varmista myös, että juot runsaasti nesteitä Ebetrex-hoidon aikana, koska kuivuminen voi lisätä Ebetrexin myrkkyisyyttä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Ebetrex-valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana tai jos harkitset raskaaksi tulemista. Metotreksaatti voi aiheuttaa synnynnäisiä vikoja, sikiön vahingoittumisen ja keskenmenon. Se on yhteydessä kallon, kasvojen, sydämen ja verisuonten, aivojen sekä raajojen epämuodostumiin. Siksi on tärkeää, ettei sitä käytetä raskaana olevien tai raskautta harkitsevien potilaiden hoitoon. Jos potilas on nainen, joka voi tulla raskaaksi, raskauden mahdollisuus on suljettava pois ennen hoidon aloittamista asianmukaisin menetelmin, kuten raskaustestin avulla. Metotreksaattihoitoa saavan potilaan on välttävä raskaaksi tulemista hoidon aikana ja vielä kuuden kuukauden ajan hoidon päättymisen jälkeen. (katso myös kohta ”Varoituksen ja varotoimet”).

Jos tulet raskaaksi hoidon aikana tai epäilet olevasi raskaana, käänny lääkärin puoleen mahdollisimman pian. Lääkärin on kerrottava hoitoon liittyvistä lapsen kohdistuvien haitallisten vaikutusten riskeistä.

Jos haluat tulla raskaaksi, puhu siitä lääkäriksi kanssa, joka voi ohjata sinut erikoislääkäriille ennen hoidon suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Imetys

Älä imetä hoidon aikana, koska metotreksaatti kulkeutuu äidinmaitoon. Jos lääkäriksi mielestä metotreksaattihoito on vältämätöntä, sinun on lopetettava imetys.

Miesten hedelmällisyys

Saatavilla oleva näyttö ei viittaa suurentuneeseen epämuodostumiin tai keskenmenon riskiin, jos isä ottaa metotreksaattia alle 30 mg/viikko. Riskiä ei voida kuitenkaan täysin poissulkea. Metotreksaatti voi olla genotoksista. Se tarkoittaa sitä, että lääke voi aiheuttaa geenimutaatiota. Metotreksaatti voi vaikuttaa sperman tuontaan ja mahdollisesti aiheuttaa synnynnäisiä vikoja. Tämän vuoksi miesten pitää välttää on välttävä lapsen siittämistä metotreksaattioidon aikana ja vähintään 3 kuukauden ajan hoidon lopettamisen jälkeen.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Haittavaikutuksia, jotka vaikuttavat keskushermostoon, kuten väsymystä ja huimausta, saattaa ilmetä Ebetrex-hoidon aikana. Joissakin tapauksissa ajokyky ja/tai koneiden käyttökyky voi olla alentunut. Jos tunnet väsymystä tai huimausta, älä aja tai käytä koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioda, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastuksesesi. Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Ebetrex sisältää natriumkloridia ja natriumhydroksidia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per viikkoannos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten Ebetrex -valmistetta käytetään

Tärkeä Ebetrex-valmisten (metotreksaatti) annostukseen liittyvä varoitus:

Käytä Ebetrex-valmistetta **vain kerran viikossa** nivereuman, lasten idiopaattisen moninivelreuman ja psoriaasin hoitoon. Liian suuri määrä Ebetrex-valmistetta (metotreksaattia) voi johtaa kuolemaan. Lue tämän selosten kohta 3 erittäin huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävä, keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Ebetrexia saavat määrästä vain lääkärit, jotka tuntevat tämän lääkevalmisteen ominaisuudet ja sen vaikutustavan.

Käytä tätä läkettä juuri siten kuin lääkäri on määäränyt. Tarkista ohjeet lääkäristä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ebetrexia annetaan **vain kerran viikossa**. Voit päättää yhdessä lääkärin kanssa, minä viikonpäivänä saat pistoksen.

Ebetrexin väärä annostelu voi aiheuttaa vakavia, myös mahdollisesti kuolemaan johtavia haittavaikutuksia.

Tavanomainen annos on:

Nivelreumaa sairastavat potilaat

Suositeltu metotreksaatin aloitusannos **7,5 mg kerran viikossa** annetaan kerta-annoksesta pistoksesta ihon alle, lihakseen tai laskimoon (katso kohta ”Antotapa ja hoidon kesto”).

Jos teho ei ole riittävä ja siedät läkettä hyvin, annosta saatetaan lisätä. Keskimääräinen viikkoannos on 15–20 mg. Yleensä viikoittaista annosta 25 mg Ebetrexia ei tule ylittää. Kun toivottu hoitovaikutus on saavutettu, annosta tulee – jos mahdollaista – vähitellen pienentää mahdollisimman pieneen tehokkaaseen ylläpitoannokseen.

Vaikaa aktiivista lasten idiopaattista moninivelreumaa sairastavat lapset ja alle 16-vuotiaat nuoret
Suositeltu annos on 10–15 mg/m² (kehon pinta-ala) viikossa. Jos tämä annos ei tehoa riittävästi, viikkoannos voidaan suurentaa 20 mg:aan/m² (kehon pinta-ala) viikossa. Säännöllisiä lääkärintarkastuksia on kuitenkin tehtävä useammin. Koska tämän lääkkeen annosta laskimoon lapsille ja nuorille on hyvin vähän tietoa, se on pistettävä ainoastaan ihon alle tai lihakseen.
Ebetrexin käyttöä alle 3-vuotiaille lapsille ei suositella, koska kokemukset tällä ikäryhmällä ovat riittämättömät.

Vaikaa psoriaasia tai nivelsoriaasia sairastavat aikuiset

Yksittäisen 5–10 mg:n testiannoksen antamista suositellaan mahdollisten haitallisten vaikutusten arvioimiseksi.

Tämä annos voidaan antaa ihon alle, lihakseen tai laskimoon.

Jos viikon jälkeen verenkuvassa ei huomata muutoksia, hoitoa jatketaan noin 7,5 mg:n annoksella. Annosta voidaan suurentaa vähitellen (5–7,5 mg:n viikoittaisin lisäyksin ja samalla tarkkaillen verenkuvaa), kunnes ihanteellinen hoitovaikutus saavutetaan. Yleensä haitalliset vaikutukset lisääntyvät huomattavasti, jos ylitetään annos 20 mg viikossa. 30 mg:n viikoittaista annosta ei tule ylittää.

Kun haluttu hoitovaikutus on saavutettu, annosta on pienennettävä viikoittain pienimpään mahdolliseen kyseiselle potilaalle tehoavaan ylläpitoannokseen.

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat saattavat tarvita tavallista pienemmän annoksen.

Antotapa ja hoidon kesto

Hoitava lääkäri päättää hoidon keston. Ebetrex pistetään **kerran viikossa!** On suositeltavaa valita tietty viikonpäivä ”pistospäiväksi”.

Ebetrex annetaan pistoksenä ihmisen alle, lihakseen tai laskimoon, mutta lapsille ja nuorille sitä ei saa antaa laskimoon.

Nivelreuman, lasten idiopaattisen moninivelreuman, psoriaasin ja nivelpsoriaasin hoito Ebetrexilla on pitkäkestoista hoitoa.

Nivelreuma

Yleensä oireiden helpottamista voidaan odottaa 4–8 viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Oireet voivat palata Ebetrexin käytön lopettamisen jälkeen.

Psoriaasin vaikeat muodot ja nivelpsoriaasi

Yleensä hoidon voidaan odottaa tehoavan 2–6 viikon kuluessa hoidon aloittamista. Oireiden vaikeudesta ja laboratorioarvoista riippuen hoitoa jatketaan tai se lopetetaan.

Hoidon alussa hoitohenkilökunta saattaa antaa Ebetrex-pistokset. Kuitenkin lääkäri saattaa päättää, että voit itse opetella, kuinka Ebetrexia pistetään ihmisen alle. Saat kunnon opastuksen tähän. Älä missään tapauksessa anna pistosta itsellesi, ellei ole saanut opastusta pistoksen antoon.

Jos käytät enemmän Ebetrex -valmistetta kuin sinun pitäisi

Käytä Ebetrexia lääkärin ohjeiden mukaan. Älä muuta annosta itse.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähohjeiden saamiseksi.

Metotreksaatin yliannos voi johtaa vaikeisiin myrkytysreaktioihin. Yliannostuksen oireita ovat mustelmiin ja verenvuotojen ilmeneminen tavallista helpommin, epätavallinen heikkous, suun haavat, pahoinvointi, oksentelu, mustat tai veriset ulosteet, verinen yskä tai kahvisumppimainen oksennus ja virtsaamisen vähentyminen. Katso myös kohta 4.

Ota lääkepakkaus mukaasi, jos menet lääkäriin tai sairaalaan.

Yliannostustapauksessa käytettävä vasta-aine on kalsiumfolinaatti.

Jos unohtat käyttää Ebetrex -valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvatakseen unohtamasi annoksen, vaan ota seuraavaksi määritetty annos normaaliihin tapaan. Kysy lääkäriltä neuvoa.

Jos lopetat Ebetrex -valmisteen käytön

Älä keskeytä tai lopeta Ebetrex-hoitoa, ellei ole keskustellut asiasta lääkäriksi kanssa. Jos epäilet saaneesi vaikeita haittavaiktuksia, ota välittömästi yhteys lääkäriin ja kysy neuvoa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaiktuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Kerro heti lääkärille, jos sinulla esiintyy yhtäkkiä hengityksen vinkumista, hengitysvaikeuksia, silmäluomien, kasvojen tai huulten turvotusta, ihottumaa tai kutinaa (erityisesti koko kehon laajuista) ja huimausta (nämä voivat olla oireita vakavasta allergisista reaktioista tai anafylaktisesta sokista).

Vakavat haittavaikutukset

Jos saat jonkin seuraavista haittavaiktuksista, ota välittömästi yhteys lääkäriin:

- keuhkovaivat (oireita voivat olla yleinen sairaudentunne, kuiva ärsytysyskä, hengenahdistus, hengästyneisyys levossa, rintakipu tai kuume)
- veren sylkeminen tai yskiminen

- vaikea ihmisen kuoriutuminen tai rakkuloituminen (voi ilmetä myös suussa, silmissä ja sukupuolielimissä)
- epätavallinen verenvuoto (mukaan lukien veren oksentaminen) tai mustelmien muodostus
- vaikea ripuli
- suun haavaumat
- mustat tai tervamaiset ulosteet
- verta virtsassa tai ulosteissa
- pienet punaiset pisteet ihmossa
- kuume
- ihmisen keltaisuus (keltatauti)
- kipu virtsatessa tai virtsaamisen vaikeus
- käsiin, jalkojen tai nilkkojen turpoaminen tai muutokset virtsaamistihedyssä tai virtsamäärässä vähentyminen tai virtsaa ei muodostu ollenkaan (munuaisvaurion oireita)
- jano ja/tai tihä virtsaaminen
- kouristukset
- tajunnammenetys
- sumentunut tai heikentynyt näkö.

Seuraavia haittavaikutuksia on myös raportoitu:

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

- ruokahaluttomuus, pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu
- suun ja kurkun tulehdus tai haavaumat
- maksentsyyymiarvojen nousu.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

- vähentynyt verisolujen muodostuminen, joka johtaa veren puna- ja/tai valkosolujen ja/tai verihiualeiden määrään vähennemiseen (leukopenia, anemia, trombosytopenia)
- päänsärky
- väsymys, unelaisuus
- ihmisen pistely, kutina tai polttelu, ihottuma, ihmisen punoitus, kutina
- keuhkotulehdus (pneumoniitti)
- ripuli.

Melko harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

- vyöruusu (herpes zoster)
- lymfooma (joka usein poistui spontaanisti Ebetrex-hoidon lopettamisen jälkeen)
- verisolujen ja verihiualeiden määrään vähenneminen
- vaikeat allergiset reaktiot
- diabetes
- masennus
- kehon koko vasemman tai oikean puolen heikitus
- pyörrytyksessä sekavuus
- kouristukset
- aivovaurot (leukoencefalopatia/encefalopatia), verisuonten tulehdus
- keuhkovaurio, nesteiden kertyminen keuhkojen ympärille
- ruoansulatuskanavan haavaumat ja verenvuoto
- haimatulehdus
- maksahäiriöt
- veren proteiinien vähenneminen
- nokkosihottuma (yksinään), valoherkkyyys, ruskea iho
- vaikeat toksiset ihoreaktiot, kuten rakkuloituminen ja ihmisen pintakerroksen irtoaminen (Stevens–Johnsonin oireyhtymä, Lyellin oireyhtymä)
- hiustenlähtö

- reumakyhmyjen lisääntyminen
- kivulias psoriaasi
- niveli- tai lihaskipu
- osteoporoosi (luumassan vähenneminen)
- virtsarikon tulehdus tai haavaumat (mahdollisesti myös verta virtsassa), kivulias virtsaaminen
- sikiön epämuodostumat
- emättimen tulehdus ja haavaumat
- poltteleva tunne tai kudosvaurio Ebetrex-valmisten lihakseen injektoimisen jälkeen.

Harvinainen(t) (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta):

- sepsis
- hyvin suuret punasolut (megaloblastinen anemia)
- mielialavaihtelut
- tilapäiset aistihäiriöt
- koko kehon tahdonalaisten liikkeiden heikkous
- puhehäiriöt
- vaikeat näköhäiriöt
- alhainen verenpaine
- verihyytymät
- kurkun arkuus
- hengityskatkokset
- ruoansulatuskanavan tulehdus, veriset ulosteet
- ikenien tulehtuminen
- akuutti hepatiitti (maksatulehdus)
- kynsien värimuutos, kynsien irtoaminen
- akne, pienverisuonten vuodon aiheuttamat punaiset tai purppuranväriset pisteet
- rasitusluunmurtuma
- elektrolyyttihäiriöt
- keskenmeno
- sperman muodostuksen häiriöt
- kuukautishäiriöt.

Hyvin harvinainen(t) (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

- yskänrokko (herpes simplex)
- hepatiitti
- luuytimen vaikea vajaatoiminta
- immuunipuutos (hypogammaglobulinemia)
- kipu
- lihasheikkous
- makuaistin muutokset (metallin maku)
- aivokalvotulehdus, joka aiheuttaa halvaantumista tai oksentelua
- silmien punoitus
- sydänpuissitulehdus, nesteen kertyminen sydänpussiin
- keuhkokkuume, hengitysvaikeudet, astma
- verioksennus
- maksan vajaatoiminta
- kynsivallin tulehdus, paiseet, pienet verisuonet ihossa
- valkuaisaineita virtsassa
- sikiökuolema
- munasolujen (naiset) ja siittiöiden (miehet) muodostumisen häiriöt
- seksuaalisen halukkuuden menetys
- erektilohäiriöt
- emätinerite
- hedelmättömyys

- lievät ihoreaktiot, jos Ebetrex annetaan ihan alle
- lymfoproliferatiiviset sairaudet (veren valkosolujen liikakasvu)
- puutumisen tai pistelyn tunne/normaalia alhaisempi vasta stimulaatioon.

Tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

- infektiot, jotka voivat joissakin tapauksissa johtaa kuolemaan
- imusolmukkeiden turvotus
- immuunijärjestelmän häiriöt
- kuume
- allergisesta reaktiosta johtuva pienten verisuonten tulehdus
- vatsakalvotulehdus
- haavojen hidas paraneminen
- verenvuoto keuhkoista
- leuan luuvaario (joka johtuu veren valkosolujen liikakasvusta)
- kudostuho injektiokohdassa
- ihan punoitus ja kesiminen
- turvotus.

Kun metotreksaattia annetaan lihakseen, pistoskohdan paikallisia haittavaikutuksia (polttelun tunne) tai injektiokohdan kudosvauriota (sterili abskessi, rasvakudoksen kato) voi esiintyä yleisesti. Ihan alle annettu metotreksaatti on paikallisesti hyvin siedetty. Vain lieviä paikallisia ihoreaktioita on havaittu ja ne vähenevät hoidon aikana.

Metotreksaatti voi aiheuttaa valkosolujen määän vähennemistä, ja infektoherkkyyys voi lisääntyä. Jos saat infektion, johon liittyy kuumetta ja yleiskunnon vakavaa laskua tai kuumetta ja paikallisia infektion oireita kuten kipeä kurkku/kipeä henkitöri/kipeä suu tai virtsaamisvaikeuksia, sinun tulisi välittömästi ottaa yhteyttä lääkäriin. Verikokeen avulla tarkistetaan mahdollinen valkosolujen määän vähenneminen (agranulosytoosi). On tärkeää, että kerrot lääkärillesi lääkkeestäsi.

Metotreksaatti voi aiheuttaa vakavia (joskus henkeä uhkaavia) haittavaikutuksia. Siksi lääkäri määräää tutkimuksia, joilla selvitetään verta muodostavan kudoksen toiminnanhäiriöt (esim. matala valkosolujen tai verihiuutaleiden määrä, lymfooma) sekä munuaisten tai maksan toiminnan muutokset.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

5. Ebetrex -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä pahvipakkauksessa ja esityytetyssä ruiskussa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.
Säilytä alle 25 °C.

Valmiste on käytettävä välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen.
Älä käytä Ebetrexia, jos liuos ei ole kirkas ja se sisältää hiukkasia.

Vain kertakäyttöön. Käytämätön valmiste on hävitettävä!

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ebetrex sisältää

Valkuttava aine on metotreksaatti.

1 ml injektionestettä sisältää 20 mg metotreksaattia (metotreksaattidinatriumina, jota on 21,94 mg).

Yksi esityytetty ruisku, jossa on 0,375 ml injektionestettä, sisältää 7,5 mg metotreksaattia.

Yksi esityytetty ruisku, jossa on 0,5 ml injektionestettä, sisältää 10 mg metotreksaattia.

Yksi esityytetty ruisku, jossa on 0,625 ml injektionestettä, sisältää 12,5 mg metotreksaattia.

Yksi esityytetty ruisku, jossa on 0,75 ml injektionestettä, sisältää 15 mg metotreksaattia.

Yksi esityytetty ruisku, jossa on 0,875 ml injektionestettä, sisältää 17,5 mg metotreksaattia.

Yksi esityytetty ruisku, jossa on 1 ml injektionestettä, sisältää 20 mg metotreksaattia.

Yksi esityytetty ruisku, jossa on 1,125 ml injektionestettä, sisältää 22,5 mg metotreksaattia.

Yksi esityytetty ruisku, jossa on 1,25 ml injektionestettä, sisältää 25 mg metotreksaattia.

Yksi esityytetty ruisku, jossa on 1,375 ml injektionestettä, sisältää 27,5 mg metotreksaattia.

Yksi esityytetty ruisku, jossa on 1,5 ml injektionestettä, sisältää 30 mg metotreksaattia.

Muut apuaineet ovat: natriumkloridi, natriumhydroksidi pH:n säätöön ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkauskoot

Ebetrex injektioneste, liuos on saatavilla esityytetyissä ruiskuissa kirkkaana, kellertävänä injektionesteenä.

Yksi laatikko sisältää yhden esityytetyn ruiskun, jossa on 0,375 ml, 0,5 ml, 0,625 ml, 0,75 ml, 0,875 ml, 1 ml, 1,125 ml, 1,25 ml, 1,375 ml tai 1,5 ml injektionestettä, kertakäytöisen injektioneulan turvaneulalla tai ilman ja alkoholipyyhkeit. Monipakkaukset sisältävät 4, 5, 6, 12 tai 30 esityytettyä ruiskua (1 esityytetty ruisku per pahvikotelo).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Itävalta

Valmistaja:

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Itävalta
tai

Fareva Unterach GmbH, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Itävalta
tai

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Saksa

Edustaja suomessa

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska

Tämä pakaus seloste on tarkistettu viimeksi 28.08.2023

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille:

Ebetrex 20 mg/ml injektioneste, liuos, esitytyssä ruiskussa

Ohjeet käytööä, käsittelyä ja hävittämistä varten

Liuoksen tulee olla kirkas ja partikkeliiton.

Valmistetta tulee käsitellä ja se tulee hävittää sytotoksisia lääkevalmisteita koskevien paikallisten vaatimusten mukaisesti. Raskaana olevat terveydenhuollon ammattilaiset eivät saa käsitellä ja/tai antaa Ebetrexia.

Vain kertakäytöön. Käyttämättä jäänyt liuos tulee hävittää.

Käyttämättä jäänyt valmiste tai jäte tulee hävittää sytotoksisia lääkevalmisteita koskevien paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensovimattomuustutkimusta ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Erityiset säilytysohjeet


Säilytä alkuperäis pakauksessa. Herkkä valolle.

Säilytä alle 25 °C.

Ohjeet askel askeleelta ihonalaista injektiota varten:

Vaihe 1:


- Ota rasiasta esiin sisäpakkaus, joka sisältää esitäytetyn ruiskun ja kanyylin, joka sisältää neulan.
- Avaa sisäpakkaus vetämällä nurkassa olevasta läpästä. Ota esitäytetty ruisku pois pakauksesta.
- Kierrä harmaa muovipäällysteinen kumisuojus irti ruiskusta koskematta esitäytetyn ruiskun aukkoon (ks. kuva 1).



Kuva 1.

Vaihe 2:


- Laita ruisku takaisin sisäpakaukseen. Keltainen liuos ei pääse valumaan ruiskusta.
- Tarkista neulan muovisuojuksen etiketti. Etiketin on oltava ehjä! (ks. kuva 2)



Kuva 2.

Vaihe 3:

- Poista neulan muovisuojuksen korkki ensin kiertämällä ja sitten vetämällä. Ks. kuva 3.1.
- Kierrä neulaa ja muovisuojusta varovasti ruiskuun niin pitkälle kuin se menee. Ks. kuva 3.2.




Kuva 3.1


Kuva 3.2

Vaihe 4:

- Valitse injektiokohta vatsan tai reiden alueelta ja pyyhi kohtaa alkoholipyyhkeellä. Älä koske alueeseen ennen pistämistä (ks. kuva 4.1 ja 4.2).



Kuva 4.1




Kuva 4.2

Vaihe 5:

- Poista suojakorkki kanyylistä. Laita suojakorkki syrjään.




- Älä koske steriiliin kanyyliin. Jos näin tapahtuu, kysy lääkäriltä tai apteekista, tarvitaanko uusi kanyyli. Muodosta ihopoimu kahden sormen avulla ja pistä siihen melkein pystysuoraan.




Vaihe 6:

- Paina kanyyli kokonaan ihopoimuun. Paina sitten mäntää hitaasti ja injektoi koko nestemäärä ihon alle.



Vaihe 7:

- Poista kanyyli varovasti ja taputa injektiokohtaa pyyhkeellä. Älä hiero, koska se voi ärsyttää injektiokohtaa.



- Tahattomien pistosten välttämiseksi käytetyt ruiskut on hävitettävä pistonkestävässä jäteastiassa.

Bipacksedel: Information till användaren

Ebetrex 20 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

metotrexat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I den här bipackse del finns information om följande

1. Vad Ebetrex är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ebetrex
3. Hur du använder Ebetrex
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ebetrex ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ebetrex är och vad det används för

Ebetrex är ett läkemedel med följande egenskaper:

- det hindrar tillväxten av vissa celler i kroppen som reproduceras snabbt (anti-tumörmedel)
- det minskar oönskade reaktioner i kroppens försvarsmekanism (immunosuppressivt medel) och
- det har anti-inflammatoriska effekter

Ebetrex används för behandling av:

- aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna
- polyartikulära former (när fem eller fler ledar är påverkade) av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit (JIA) när behandling med icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID) inte har gett tillräckligt bra resultat
- svår terapiresistent handikappande psoriasis, som inte förbättras tillräckligt av andra behandlingsformer som ljusterapi (PUVA) och retinoider, samt svår psoriasis som påverkar lederna (psoriasisartrit) hos vuxna patienter.

Metotrexat som finns i Ebetrex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följd alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ebetrex

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ebetrex om du har någon fråga.

Använd inte Ebetrex

- om du är allergisk mot metotrexat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har betydande njursjukdom (läkaren bestämmer hur svår sjukdomen är)
- om du har betydande leversjukdom (läkaren bestämmer hur svår sjukdomen är)
- om du har någon röubbning i blodbildningssystemet
- om du konsumeras stora mängder alkohol

- om funktionen i kroppens eget immunsystem är nedsatt
- om du har en svår eller aktuell infektion, t.ex. tuberkulos och HIV
- om du har sår i magtarmkanalen (inklusive sår i munhålan)
- om du är gravid eller om du ammar (se avsnitt ”Graviditet, amning och fertilitet”)
- om du samtidigt vaccineras med levande vacciner.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ebetrex om

- du har diabetes mellitus som behandlas med insulin
- du har inaktiva kroniska infektioner (som tuberkulos, hepatit B eller C, bältros (herpes zoster))
- du har eller har haft någon lever- eller njursjukdom
- din lungfunktion är nedsatt
- du har sjuklig ansamling av vätska i bukhålan eller i utrymmet mellan lungor och bröstvägg (ascites, pleurautgjutningar)
- du är uttorkad eller lider av tillstånd som leder till uttorkning (kräkning, diarré, stomatit).

Akut blödning från lungorna hos patienter med bakomliggande reumatisk sjukdom har rapporterats med metotrexat. Om du får symptom som blod i saliv eller blodiga upphostningar ska du omedelbart kontakta läkare.

Behandlingen ska ges **en gång per vecka**.

Felaktigt intag av metotrexat kan leda till allvarliga biverkningar, även eventuellt dödliga sådana. Läs avsnitt 3 i denna bipacksedel noggrant.

Om du tidigare har fått hudproblem efter strålningsterapi (strålningsinducerad dermatit) och brännskador i huden efter solning kan dessa besvär återkomma under metotrexatbehandling (återreaktion).

Om du, din partner eller din vårdgivare upptäcker nya eller förvärrade neurologiska symptom, såsom allmän muskelsvaghets-, synstörningar, förändringar i tankeförmåga, minne och orientering som leder till förvirring och personlighetsförändringar, ska du omedelbart kontakta din läkare eftersom detta kan vara symptom på en mycket sällsynt, allvarlig hjärninfektion som kallas progressiv multifokal leukoencefalopati (PML).

Barn och ungdomar

Doseringinstruktioner beror på patientens kroppsvekt. Användning rekommenderas inte till barn <3 år på grund av att tillräcklig erfarenhet saknas i denna åldersgrupp.

Barn som får Ebetrex-behandling ska följas särskilt noga av specialistläkare för att eventuella biverkningar ska kunna identifieras så tidigt som möjligt.

Äldre patienter

Äldre patienter som får behandling med metotrexat ska följas noga av läkare, så att eventuella biverkningar kan identifieras så tidigt som möjligt.

Metotrexatdosen ska vara relativt låg, eftersom lever- och njurfunktionen försämras och reserverna av vitaminet folsyra minskar i kroppen med stigande ålder.

Hudförändringar orsakade av psoriasis kan förvärras under behandling med Ebetrex vid samtidig UV-strålning.

Rekommenderade uppföljande undersökningar och försiktighetsåtgärder:

Även när Ebetrex används i låga doser kan allvarliga biverkningar uppstå. För att dessa ska kunna upptäckas tidigt måste läkaren göra uppföljande undersökningar och laboratorieprover.

Före behandlingsstart:

Innan behandlingen börjar kontrolleras ditt blod för att se om du har tillräckligt med blodkroppar. Blodprov tas också för att kontrollera leverfunktionen och ta reda på om du har hepatitis (leverinflammation). Därtill kontrolleras nivån av serumalbumin (ett protein i blodet), hepatitstatusen (leverinflammation) och njurfunktionen. Läkaren kan också komma att ordnara andra leverläkemedel. De kan innehålla bl.a. bildundersökning av levern och tagning av ett litet vävnadsprov från levern för närmare undersökning. Läkaren kan också undersöka om du har tuberkulos och röntga dina lungor eller göra ett lungfunktionstest.

Under behandlingen:

Läkaren kan göra eller ordnara följande undersökningar:

- undersökning av munhålan och svalget för eventuella slemhinneförändringar t.ex. inflammation eller sår bildning
- blodprov/blodbild, som innehåller antalet blodkroppar och mätning av metotrexatnivåerna i serum
- blodprov för övervakning av leverfunktionen
- bildundersökningar för övervakning av leverns tillstånd
- tagning av ett litet vävnadsprov från levern för närmare undersökning
- blodprov för övervakning av njurfunktionen
- kontroll av andningsvägarna samt vid behov lungfunktionstest.

Det är mycket viktigt att komma till de inplanerade undersökningarna.

Om något av testresultaten är avvikande kommer läkaren att göra ändringar i behandlingen utgående från dessa.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid behandling med Ebetrex

Metotrexat påverkar tillfälligt spermie- och äggproduktionen, en effekt som i de flesta fall går tillbaka efter avslutad behandling. Metotrexat kan orsaka missfall och allvarliga medfödda missbildningar. Om du är kvinna, måste du undvika att bli gravid när du använder metotrexat och i minst 6 månader efter avslutad behandling. Om du är man, måste du undvika att göra en kvinna gravid under tiden du får metotrexat och i minst 3 månader efter avslutad behandling med metotrexat. Se även avsnittet "Graviditet, amning och fertilitet".

Andra läkemedel och Ebetrex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Kom ihåg att tala om för läkaren att du behandlas med Ebetrex om du får utskrivet något annat läkemedel medan behandlingen pågår.

Det är särskilt viktigt att tala om för läkaren om du använder:

- annan behandling mot reumatoid artrit eller psoriasis, såsom leflunomid, sulfasalazin (används även mot ulcerös kolit), acetylsalicylsyra, fenylobutazon eller amidopyrin
- alkohol (bör undvikas)
- levande vacciner
- azatioprin (förebygger bortstötning vid organtransplantationer)
- retinoider (mot psoriasis och andra hudproblem)
- antikonvulsiva läkemedel (mot krämper)
- cancerbehandling
- barbiturater (sömnmedel)
- lugnande medel
- p-piller
- probenecid (mot gikt)
- antibiotika
- penicilliner kan minska utsöndringen av metotrexat, vilket kan leda till en ökning av biverkningar
- pyrimetamin (förebyggande och behandling av malaria)
- vitaminpreparat som innehåller folsyra
- protonpumpshämmare (mot svår halsbränna och magsår)
- teofyllin (mot astma).

Ebetrex med mat, dryck och alkohol

Du bör inte dricka någon alkohol under behandlingen med Ebetrex. Undvik att dricka alltför mycket kaffe, koffeininnehållande kalla drycker eller svart te. Se till att du dricker mycket vätska under behandlingen med Ebetrex eftersom uttorkning (minskning av kroppsvätska) kan öka de skadliga effekterna av Ebetrex.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Använd inte Ebetrex under graviditet eller om du försöker bli gravid. Metotrexat kan orsaka medfödda missbildningar, fosterskador och missfall. Det är förknippat med missbildningar i skallen, ansiktet, hjärtat och blodkärlen, hjärnan och armar och ben. Det är därför mycket viktigt att metotrexat inte ges till gravida patienter eller patienter som planerar att bli gravida. Hos fertila kvinnor måste graviditet uteslutas genom lämpliga åtgärder, t.ex. ett graviditetstest före behandlingsstart.

Du måste undvika att bli gravid medan du tar metotrexat och i minst 6 månader efter avslutad behandling genom att använda tillförlitliga preventivmetoder under denna tid (se även avsnittet ”Varningar och försiktighet”).

Om du blir gravid under behandlingen eller misstänker att du kan vara gravid ska du tala med din läkare så snart som möjligt. Du ska erbjudas medicinsk rådgivning om risken för skadliga effekter på barnet på grund av behandlingen.

Om du önskar bli gravid ska du rådgöra med din läkare, som kan hänvisa dig till specialistrådgivning före planerad behandlingsstart.

Amning

Ämna inte under behandlingen eftersom metotrexat passerar över i bröstmjölk. Om din behandlande läkare anser att behandling med metotrexat är absolut nödvändig under amningsperioden måste du sluta ämma.

Fertilitet hos män

Tillgängliga data tyder inte på någon ökad risk för missbildningar eller missfall om fadern tar mindre metotrexat än 30 mg/vecka. En risk kan dock inte fullständigt uteslutas. Metotrexat kan vara genotoxiskt. Detta betyder att läkemedlet kan orsaka genmutation. Metotrexat kan påverka spermieproduktionen och kan orsaka medfödda missbildningar. Därför ska du undvika att göra en kvinna gravid och att donera sperma medan du tar metotrexat och i minst 3 månader efter avslutad behandling.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar från centrala nervsystemet, såsom trötthet och yrsel, kan uppstå under behandling med Ebetrex. Därför kan i vissa fall förmågan att framföra fordon och/eller använda maskiner vara nedsatt. Om du känner dig trött eller yr ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ebetrex innehåller natriumklorid och natriumhydroxid

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per veckodos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3. Hur du använder Ebetrex

Viktig varning angående doseringen av Ebetrex (metotrexat):

Ebetrex får endast användas en gång i veckan vid behandling av reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit och psoriasis. Användning av för stor mängd Ebetrex (metotrexat) kan vara livshotande. Läs avsnitt 3 i denna bipacksedel mycket noga. Om du har några frågor, tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder läkemedlet.

Ebetrex ska endast ordinaras av läkare med tillräcklig erfarenhet av läkemedlets egenskaper och verkningsmekanism.

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ebetrex ges endast en gång per vecka. Du kommer överens med din läkare om en lämplig veckodag då du ska få din injektion.

Felaktigt intag av Ebetrex kan leda till allvarliga biverkningar, även eventuellt dödliga sådana.

Vanlig dos är:

Patienter med reumatoid artrit

Rekommenderad startdos är 7,5 mg metotrexat en gång i veckan. Ebetrex injiceras som engångsdos under huden, i en muskel eller i en ven (se avsnitt "Administreringssätt och behandlingens längd"). Om effekten fortfarande är otillräcklig kan doseringen av Ebetrex ökas om den tolereras väl. En genomsnittlig veckodos är 15-20 mg. I allmänhet bör en veckodos om 25 mg inte överskridas. Efter att önskat behandlingsmål har uppnåtts bör dosen, om möjligt, minskas till lägsta fortfarande effektiva underhållsdos.

Barn och ungdomar under 16 år med polyartikulära former av juvenil idiopatisk artrit

Rekommenderad dos är 10-15 mg/m² kroppsyta/vecka. Om den rekommenderade dosen inte är tillräcklig kan veckoden ökas, upp till 20 mg/m² kroppsyta/vecka. Emellertid ska regelbundna kontroller genomföras oftare.

Eftersom det endast finns begränsade data avseende intravenös (i en ven) användning hos barn och ungdomar ska administrering endast ske som subkutan injektion (under huden) eller intramuskulärt (i en muskel).

Användning rekommenderas inte till barn <3 år på grund av att tillräcklig erfarenhet saknas i denna åldersgrupp.

Vuxna med svåra former av psoriasis vulgaris eller psoriasisartrit

En testdos på 5-10 mg rekommenderas för att utvärdera eventuella skadliga effekter.

Denna dos kan injiceras subkutant (under huden), intramuskulärt (i en muskel) eller intravenöst (i en ven).

Om inga förändringar i blodbilden har observerats efter en vecka, fortsätts behandlingen med ca 7,5 mg. Dosen kan ökas gradvis (i steg om 5-7,5 mg per vecka samtidigt med uppföljning av blodbilden), tills optimalt behandlingsresultat uppnås. En veckodos på 20 mg kan i allmänhet associeras med signifikant ökning av toxiciteten. En veckodos på 30 mg bör inte överskridas. Efter att önskat behandlingsmål har uppnåtts ska dosen minskas veckovis, till lägsta fortfarande effektiva underhållsdos.

Patienter med nedsatt njurfunktion

För patienter med nedsatt njurfunktion kan dosen behöva minskas.

Administreringssätt och behandlingens längd

Behandlande läkare bestämmer hur länge behandlingen ska pågå. Ebetrex injiceras en gång i veckan! Det rekommenderas att du och din läkare bestämmer en fast veckodag för injektionen.

Ebetrex injiceras under huden, i en muskel eller i en ven, till barn och ungdomar får det inte ges intravenöst.

Behandling med Ebetrex vid reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit och psoriasis vulgaris eller psoriasisartrit är långtidsbehandling.

Reumatoid artrit

Behandlingssvar kan oftast förväntas 4-8 veckor efter behandlingsstart.

Symtomen kan återkomma efter att behandlingen med Ebetrex upphört.

Svåra former av psoriasis vulgaris och psoriasisartrit (psoriasis arthropatica)

Behandlingssvar kan oftast förväntas efter 2-6 veckor.

Beroende på den kliniska bilden och förändringar i laboratorievärden kan behandlingen därefter fortsätta eller avslutas.

I början av behandlingen injiceras Ebetrex av vårdpersonal. Men din läkare kan besluta att det är lämpligt att du lär dig hur du själv ska injicera Ebetrex under huden. Du kommer att få lämplig träning för att kunna göra detta. Du får under inga omständigheter försöka injicera dig själv om du inte har tränats att göra detta.

Om du har använt för stor mängd av Ebetrex

Följ läkarens doseringsrekommendationer. Ändra inte dosen på eget beväg.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdosering av metotrexat kan ge svåra skadliga effekter. Symtomen vid överdosering kan innefatta blåmärken eller blödningar, onormal svaghet, munsår, illamående, kräkningar, svart eller blodig avföring, blodiga upphostningar eller kräkningar som liknar kaffesump och minskad urinering. Se även avsnitt 4.

Ta med dig läkemedelsförpackningen om du uppsöker läkare eller sjukhus.
Motgift vid en överdosering är kalciumfolinat.

Om du har glömt att använda Ebetrex

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, men fortsätt att ta ordinerad dos. Fråga läkaren om råd.

Om du slutar att använda Ebetrex

Du ska inte avbryta eller avsluta behandlingen med Ebetrex om du inte har diskuterat det med din läkare. Kontakta omedelbart läkare om du misstänker allvarliga biverkningar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Informera läkaren omedelbart om du plötsligt får väsande andning, svårt att andas, svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar, utslag eller klåda (särskilt om det drabbar hela kroppen) och svimmingskänsla (detta kan vara tecken på allvarliga allergiska reaktioner eller anafylaktisk chock).

Allvarliga biverkningar

Om någon av följande biverkningar uppstår ska du omedelbart kontakta läkare:

- lungproblem (med symtom som allmän sjukdomskänsla, torr rethosta, andnöd, andfåddhet vid vila, bröstsmärta eller feber)

- blod i saliv eller upphostningar
- svåra blåsor eller flagande hud (detta kan även påverka din mun, ögon eller genitalier)
- onormal blödning (inklusive blodiga kräkningar) eller blåmärken
- svår diarré
- munsår
- svart eller tjärlíkande avföring
- blod i urinen eller avföringen
- knappnålsstora röda prickar i huden
- feber
- gulfärgning av huden (gulsot)
- svårt eller smärtsamt att urinera
- svullnad av händer, fotleder eller fötter eller förändringar av hur ofta du behöver urinera eller minskning eller avsaknad av urin (tecken på njursvikt)
- törst och/eller täta urinträngningar
- kramper
- medvetslöshet
- dimsyn eller nedsatt syn.

Följande biverkningar har också rapporterats:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

- aptitlöshet, illamående, kräkningar, buksmärta
- inflammation och sår i mun och hals
- ökning av leverenzymer.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- reducerad blodcellsbildning med minskat antal vita och/eller röda blodkroppar och/eller blodplättar (leukopeni, anemi, trombocytopeni)
- huvudvärk
- trötthet, dåsighet
- pirrande, kittlande, stickande eller bränrande känsla i huden, utslag, hudrodnad, klåda
- lunginflammation (pneumonit)
- diarré.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- bältros (herpes zoster)
- lymfom (som spontant gick tillbaka hos ett antal patienter så snart behandlingen med Ebetrex avbröts)
- minskning av antalet blodkroppar och blodplättar
- allvarliga allergiska reaktioner
- diabetes
- depression
- svaghet i hela vänster eller höger kroppshalva
- yrsel, förvirring
- kramper
- hjärnskada (leukoencefalopati/encefalopati)
- inflammation i blodkärl
- lungskada, vatten runt lungorna
- sår och blödningar i magtarmkanalen
- inflammation i bukspottkörteln
- leverproblem
- minskande blodproteiner
- nässelutslag (enbart), ljuskänslighet, brunfärgning av huden

- allvarliga toxiska hudreaktioner inklusive blåsbildning och avlossning av det översta hudlagret (Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom)
- håravfall
- ökning av reumatiska noduler (knölar under huden)
- smärtsam psoriasis
- led- eller muskelvärk
- osteoporos (minskad benmassa)
- inflammation och sår i urinblåsan, (eventuellt med blod i urinen), smärtsamma urineringar
- fostermissbildningar
- inflammation och sår i vagina
- brännande känsla eller skada i vävnad efter injektion av Ebetrex i muskeln.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- sepsis
- mycket stora röda blodkroppar (megaloblastisk anemi)
- humörsvängningar
- tillfälliga problem med perceptionen (sinnesintryck)
- försvagning av viljestyrda rörelser i hela kroppen
- problem att tala
- allvarliga problem med ögonen
- lågt blodtryck
- blodproppar
- ont i halsen
- andningsuppehåll
- inflammation i magtarmkanalen, blodig avföring
- inflammation i tandköttet
- akut hepatitis (leverinflammation)
- missfärgning av naglarna, nagelavlossning
- akne, röda eller lila prickar i huden orsakade av blödningar från blodkärl
- benfraktur på grund av ansträngning
- elektrolystörningar
- missfall
- defekt spermiebildning
- menstruationsstörningar.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- munsår (herpes simplex)
- hepatitis
- allvarlig benmärgssvikt
- immunbrist (hypogammaglobulinemi)
- smärta
- muskelsvaghet
- smakförändringar (metallisk smak)
- inflammation i hjärnhinnorna som leder till förlamning eller kräkningar
- röda ögon
- inflammation i säcken runt hjärtat, vätska i säcken runt hjärtat
- lunginflammation, andningsbesvär, astma
- blodkräkningar
- lever svikt
- infektion runt en fingernagel, bölder, små blodkärl i huden
- protein i urinen
- fosterdöd
- problem att bilda ägg (kvinnor) och spermier (män)
- nedsatt sexlust

- problem att få erekton
- flytning från slidan
- ofruktsamhet
- lätt lokala hudreaktioner om Ebetrex administreras under huden
- lymfoproliferativa störningar (onormal tillväxt av vita blodkroppar)
- känsla av domningar eller krypningar/lägre känslighet för stimulering än normalt.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- infektioner som i vissa fall kan vara dödliga
- svullna lymfkörtlar
- problem med immunsystemet
- feber
- inflammation i små blodkärl till följd av en allergisk reaktion
- inflammation i magslemhinnan
- långsam sårläkning
- blödning från lungorna
- benskada i käken (som följd av onormal tillväxt av vita blodkroppar)
- vävnadsförstörelse på injektionsstället
- hudrodnad och fjällande hud
- svullnad.

När metotrexat ges intramuskulärt är det vanligt att lokala biverkningar (brännande känsla) eller skador (bildande av steril abscess, destruktion av fettvävnad) uppträder på injektionsstället.

Subkutan applicering av metotrexat tolereras väl lokalt. Endast lindriga hudreaktioner har observerats, vilka avtar under behandlingens gång.

Metotrexat kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar och din motståndskraft mot infektion kan försvagas. Om du får en infektion med symptom såsom feber och allvarlig försämring av ditt allmäntillstånd, eller feber med lokala infektionssymtom såsom ont i halsen/ont i luftstrupen/ont i munnen eller problem med urineringen bör du omedelbart kontakta läkaren. Läkaren tar ett blodprov för att undersöka en eventuell minskning av antalet vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar läkaren om din medicin.

Metotrexat kan orsaka allvarliga (ibland livshotande) biverkningar. Därför gör läkaren tester för att kontrollera om det finns något onormalt i blodet (t.ex. lågt antal vita blodkroppar, lågt antal trombocyter, lymfom) och förändringar i njurar eller lever.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret PB55, 00034 FIMEA. Webbplats: www.fimea.fi.

5. Hur Ebetrex ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten på den fyllda sprutan och på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskäntligt.

Förvaras vid högst 25 °C.

Måste användas omedelbart efter öppnandet.

Använd inte Ebetrex om lösningen inte är klar eller innehåller partiklar.

Endast för engångsbruk. Oanvänt lösning ska kasseras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningsinnehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är metotrexat.

En ml injektionsvätska, lösning innehåller 20 mg metotrexat (som 21,94 mg metotrexatdinitrat).

En förfylld spruta med 0,375 ml injektionsvätska, lösning innehåller 7,5 mg metotrexat.

En förfylld spruta med 0,5 ml injektionsvätska, lösning innehåller 10 mg metotrexat.

En förfylld spruta med 0,625 ml injektionsvätska, lösning innehåller 12,5 mg metotrexat.

En förfylld spruta med 0,75 ml injektionsvätska, lösning innehåller 15 mg metotrexat.

En förfylld spruta med 0,875 ml injektionsvätska, lösning innehåller 17,5 mg metotrexat.

En förfylld spruta med 1 ml injektionsvätska, lösning innehåller 20 mg metotrexat.

En förfylld spruta med 1,125 ml injektionsvätska, lösning innehåller 22,5 mg metotrexat.

En förfylld spruta med 1,25 ml injektionsvätska, lösning innehåller 25 mg metotrexat.

En förfylld spruta med 1,375 ml injektionsvätska, lösning innehåller 27,5 mg metotrexat.

En förfylld spruta med 1,5 ml injektionsvätska, lösning innehåller 30 mg metotrexat.

Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumhydroxid för pH-justering och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ebetrex injektionsvätska, lösning, tillhandahålls i förfyllda sprutor som en klar, gulaktig lösning för injektion.

Varje kartong innehåller 1 förfylld spruta med 0,375 ml, 0,5 ml, 0,625 ml, 0,75 ml, 0,875 ml, 1 ml, 1,125 ml, 1,25 ml, 1,375 ml eller 1,5 ml injektionsvätska, injektionsnålar för engångsbruk med eller utan säkerhetskanyl och spritsuddar.

Multiförpackningar innehåller 4, 5, 6, 12 eller 30 förfyllda sprutor (1 förfylld spruta per kartong).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Österrike

Tillverkare

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Österrike
eller

Fareva Unterach GmbH, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Österrike
eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

Ombud

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

De nna bipacksedel ändrades senast 28.08.2023

Följande uppgifter är endast avsedda för helse- och sjukvårdspersonal:

Ebetrex 20 mg/ml injektionsvätska, lösning, i förfylld spruta

Instruktioner för användning och hantering och destruktion

Lösningen ska vara klar och utan partiklar.

Hantering och destruktion ska ske enligt lokala riktlinjer för cytotoxiska läkemedel. Gravid sjukvårdspersonal ska inte hantera och/eller administrera Ebetrex.

Endast för engångsbruk. Oanvänd lösning ska kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar för cytotoxiska läkemedel.

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Ljus känsligt.

Förvaras vid högst 25 °C.

Injicering under huden - Bruksanvisning steg för steg

Steg 1:

- Ta ut innerförpackningen som innehåller den förfyllda sprutan och kanylen som innehåller nålen ur kartongen.
- Öppna innerförpackningen genom att dra i hörnfliken. Ta ut den förfyllda sprutan.
- Vrid det grå gummitorken täckt av plast från sprutan utan att vidröra öppningen på den förfyllda sprutan (se bild 1).




Bild 1.

Steg 2:

- Lägg tillbaka sprutan i innerförpackningen. Den gula lösningen kan inte rinna ut.
- Kontrollera etiketten på plasthylsan som nålen finns i. Etiketten måste vara oskadad! (se bild 2)




Bild 2.

Steg 3:

- Ta bort korken på nålens plasthylsa genom att vrida och sedan dra. Se bild 3.1.
- Vrid försiktigt nålen tillsammans med plasthylsan på sprutan så långt det går. Se bild 3.2.




Bild 3.1

Bild 3.2

Steg 4:

- Välj ett injektionsställe i buk- eller lårrområdet och tvätta det med spritsudden. Vindrör inte området före injektionen (se bild 4.1 och 4.2).




Bild 4.1





Bild 4.2

Steg 5:

- Avlägsna förpackningen från kanylen. Lägg kanylförpackningen åt sidan.




- Du får inte vridröra den sterila kanylen. Om detta skulle hända, fråga läkare eller apotekspersonal om du behöver en ny kanyl. Ta tag i huden med tumme och pekfinger och stick nästan vertikalt.




Steg 6:

- Tryck in hela kanylen i hudvecket. Tryck sedan ner kolven och injicera all vätska under huden.



Steg 7:

- Ta försiktigt bort kanylen och badda injektionsstället med en sudd. Gnid inte, eftersom detta irriterar injektionsstället.



- För att undvika skador kasta sprutor i en behållare för vassa föremål.