

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Isopto Carpine 20 mg/ml ja 40 mg/ml silmätipat, liuos pilokarpiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Isopto Carpine on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Isopto Carpinea
3. Miten Isopto Carpinea käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Isopto Carpinen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Isopto Carpine on ja mihin sitä käytetään

Isopto Carpine sisältää vaikuttavana aineena pilokarpiinihydrokloridia.

Isopto Carpine kuuluu glaukoomalääkkeiden ja mioottien lääkeriikseen. Isopto Carpine vähentää silmänpainetta ja supistaa silmän mustuaista (pupillia) glaukooman hoidossa.

Pilokarpiinihydrokloridia, jota Isopto Carpine sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Isopto Carpinea

Älä käytä Isopto Carpinea

- jos olet allerginen pilokarpiinihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on silmän värikalvon (iiriksen) tai suonikalvoston (uvean) tulehdus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Isopto Carpine -silmatippoja.

Ole erityisen varovainen

- jos sinulla on joskus aiemmin irronnut verkkokalvo
- jos olet nuori ja likinäköinen
- jos sarveiskalvossasi tai muualla silmissäsi on jokin vaurio
- jos silmäsi ovat väritään tummat, sillä saatat siinä tapauksessa tarvita tästä lääkkeestä vahvemman version tai sinun on ehkä käytettävä tippoja useammin, jotta hoitotulokset olisivat halutut. Kysy neuvoa lääkäriltä, sillä tähän saattaa liittyä yliannostuksen riski.
- jos käytät muita lääkkeitä. Lue myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Isopto Carpine”.
- jos ajat pimeällä tai teet vaarallisia tehtäviä heikossa valaistuksessa, sillä Isopto Carpine saattaa aiheuttaa näön sumentumista ja valoherkkyyttä.

Kysy lääkäriltä neuvoa, jos sinulla on

- häiriöitä kammionesteen (silmän sisäisen nesteen) poistumisessa
 - sydänoireita
 - kohonnut tai matala verenpaine
 - astma
 - virtsaamisvaikeuksia tai virtsaamiskyvyttömyyttä
 - mahahaava (peptinen haava)
 - kilpirauhasen liikatoiminta
 - ruoansulatuskanavan spasmi (vatsa- tai suolistokrampit)
 - Parkinsonin tauti
 - äskettäinen sydäninfarkti,
- sillä nämä vaivat saattavat pahentua valmisteeseen käytön myötä.

Lapset

Tätä lääkettä ei saa antaa lapsille, koska Isopto Carpinen turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Isopto Carpine

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

On erityisen tärkeää ilmoittaa lääkärille, jos käytät

- paikallisesti käytettäviä tulehduskipulääkkeitä (NSAID-lääkkeitä) sillä ne saattavat heikentää Isopto Carpinen tehoa
- beetareseptorinsalpaajia, kuten atenololia, sillä se saattaa suurentaa sydänoireiden riskiä.

Jos käytät muita silmätippoja tai silmävoiteita, odota lääkkeen käytön jälkeen vähintään 5 minuuttia ennen toisen lääkkeen käyttöä. Silmävoide annostellaan viimeiseksi.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä käytä Isopto Carpinea raskauden tai imetyksen aikana, paitsi jos se on lääkärin mielestä tarpeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Isopto Carpinella on huomattava vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Isopto Carpine voi aiheuttaa näön sumentumista ja valoherkkyyttä. Älä aja autoa äläkä käytä koneita, ennen kuin näkösi on palautunut normaaliksi.

Isopto Carpine sisältää bentsalkoniumkloridia

Tämä lääkevalmiste sisältää bentsalkoniumkloridia 1 mg per 10 ml, joka vastaa 0,1 mg/ml.

Bentsalkoniumkloridi saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinssihin ja voi muuttaa niiden väriä. Poista piilolinssit (pehmeät tai kovat) ennen tämän lääkevalmisteeseen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin 15 minuutin kuluttua.

Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä erityisesti, jos sinulla on kuivat silmät tai sarveiskalvon sairauksia (silmän etuosan läpinäkyvä kerros). Jos silmäsi tulee poikkeavaa tunnetta, pistelyä tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

3. Miten Isopto Carpine a käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suosittelu annos on

Aikuiset (mukaan lukien iäkkäät potilaat):


2 tippaa 3 kertaa vuorokaudessa.

Lääkäri määrää annostuksen yksilöllisesti juuri sinulle sopivaksi.


Isopto Carpinea saa käyttää vain silmätippoina.

Isopto Carpine n käyttö oikein:


Jos avaamisen yhteydessä irtoava sinettirengas on löysällä korkin poistamisen jälkeen, se on irrotettava ennen valmisteen käyttämistä.




1



2



3



4

1. Ota Isopto Carpine -pullo esiin.
2. Pese kädet ja istu peilin eteen.
3. Kierrä tippapullon korkki irti.
4. Pidä pulloa ylösalaisin peukalon ja keskisormen välissä (kuva 1).
5. Kallista päätä taaksepäin. Vedä puhtaalla sormella alaluomea alaspäin, kunnes silmäluomen ja silmän väliin muodostuu ”tasku”. Tippa tiputetaan tähän taskuun.
6. Vie pullon kärki lähelle silmää. Käytä tarvittaessa peiliä.
7. Älä kosketa tiputuskärjellä silmää, silmäluomea, niitä ympäröiviä alueita tai muita pintoja. Muutoin pullossa olevat silmätipat voivat pilaantua.
8. Älä purista pulloa, sillä se on suunniteltu annostelevaan tippoja pienellä painalluksella pohjasta (kuva 2).
9. Paina kevyesti pullon pohjaa, jolloin saat pullosta yhden tipan kerrallaan (kuva 3).
10. Sulje silmäluomi ja paina varovasti sormella silmänurkkaa Isopto Carpinen käytön jälkeen. Paina 2 minuutin ajan. Tämä auttaa estämään valmisteen kulkeutumista muualle kehoon (kuva 4).
11. Jos käytät Isopto Carpinea molempiin silmiin, toista vaiheet 4–10 toiseen silmään.
12. Kierrä pullon korkki tiukasti kiinni heti käytön jälkeen.

Jos tippa ei osu silmään, yritä uudelleen.

Jos käytät muita silmätippoja tai silmävoiteita, odota lääkkeen käytön jälkeen vähintään 5 minuuttia ennen toisen lääkkeen ottoa. Silmävoiteita on käytettävä viimeiseksi.

Jos käytät enemmän Isopto Carpine a kuin sinun pitäisi

Huuhto kaikki neste pois lämpimällä vedellä. Älä tiputa uusia tippoja silmiin, ennen kuin on aika ottaa seuraava annos.

Jos valmistetta niellään vahingossa, ota yhteys lääkäriin.

Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, lisääntynyt syljeneritys, hikoilu, pyörtäminen, hidas sydämensyke, alhainen verenpaine, vatsakrampit, oksentelu, astmaoireet ja ripuli.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohtat ottaa Isopto Carpine -annoksen

Jos olet unohtanut ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat. Jos kuitenkin on jo melkein seuraavan annoksen aika, jätä unohtunut annos väliin.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Isopto Carpinen käytön

Älä lopeta tämän lääkkeen käyttämistä ennenaikaisesti, vaikka oireesi olisivatkin hävinneet. Jos lopetat lääkkeen käyttämisen liian aikaisin, oireesi voivat uusiutua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Isopto Carpine -valmisteen käytön yhteydessä on havaittu seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä):

- Silmävaikutukset: sumentunut näkö
- Muut haittavaikutukset: päänsärky

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä):

- Silmävaikutukset: näköhäiriöt, heikentynyt näöntarkkuus, silmäkipu, muutoksia näkökyvyssä, kellujia silmän sisäisessä nesteessä (näyttää pilkuilta näkökentässä), silmän ärsytys, silmän punoitus, epämukava tunne silmässä, lasiaissairaus
- Muut haittavaikutukset: huimaus, pahoinvointi, astmaoireet

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta):

- Silmävaikutukset: verkkokalvon repeämä, silmän sisäinen verenvuoto, silmäluomen turvotus, pienentynyt mustuainen, silmän sisäisen nesteen irtoaminen, häikäistyminen, epänormaali tunne silmässä, verkkokalvon irtoaminen
- Muut haittavaikutukset: keuhkosairaus

Harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla tuhannesta):

- Muut haittavaikutukset: allergia (yliherkkyys), kolinerginen oireyhtymä

Seuraavia haittavaikutuksia on lisäksi ilmoitettu lääkkeen markkinoille tulon jälkeen, mutta niiden yleisyyttä ei tiedetä:

Tuntematon esiintymistiheys (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

- Silmävaikutukset: suurentunut silmänpaine, sarveiskalvon turvotus
- Muut haittavaikutukset: oksentelu

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (katso yhteystiedot alta). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Isopto Carpine n säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Hävitä pullo 4 viikon kuluttua avaamisesta.

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Isopto Carpine 20 mg/ml ja 40 mg/ml sisältää

- Vaikuttava aine on pilokarpiinihydrokloridi.
- Muut apuaineet ovat bentsalkoniumkloridi (säilytysaine), hypromelloosi, boorihappo, natriumsitraatti, natriumhydroksidi ja/tai kloorivetyhappo (pH:n säätämistä varten) sekä puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkausko

Isopto Carpine on väritön tai vaalean kellertävä liuos, joka on pakattu kierrekorkillisiin 10 ml:n muovipulloihin.

Myyntiluvan haltija

Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FI-02130 Espoo

Valmistaja

S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
2870 Puurs
Belgia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.08.2022

Bipacksedel: Information till användaren

Isopto Carpine 20 mg/ml och 40 mg/ml ögondroppar, lösning pilokarpinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Isopto Carpine är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Isopto Carpine
3. Hur du använder Isopto Carpine
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Isopto Carpine ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Isopto Carpine är och vad det används för

Isopto Carpine innehåller den aktiva substansen pilokarpinhydroklorid.

Isopto Carpine tillhör en grupp läkemedel som kallas medel vid glaukom samt miotika. Isopto Carpine sänker trycket i ögat och drar ihop pupillen vid behandling av glaukom (grön starr).

Pilokarpinhydroklorid som finns i Isopto Carpine kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Isopto Carpine

Använd inte Isopto Carpine

- om du är allergisk mot pilokarpinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har en inflammation i iris eller uvea.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Isopto Carpine.

Var särskilt försiktig

- om du har haft näthinneavlossning
- om du är ung och närsynt (har myopi)
- om du har en skada på hornhinnan eller i andra delar av ögat
- om du har mörka ögon kan du i så fall behöva högre koncentrationer av det här läkemedlet eller du kan behöva ta det oftare för att få den nödvändiga effekten. Fråga läkaren om råd, eftersom det kan finnas en risk för överdosering
- om du tar andra läkemedel. Läs även avsnittet ”Andra läkemedel och Isopto Carpine”
- när du kör bil i mörker eller utför riskfyllda uppgifter i dålig belysning, eftersom Isopto Carpine kan ge upphov till dimsyn och ljuskänslighet.

Fråga din läkare till råds om du har

- problem med utflödet av kammarvatten (vätskan inuti ögat)
- hjärtproblem

- förhöjt eller lågt blodtryck
- astma
- oförmåga eller problem med att urinera
- magsår
- hypertyreoidism (överfunktion i sköldkörteln)
- gastrointestinal spasm (kramp i mage eller tarmar)
- Parkinsons sjukdom
- nyligen haft en hjärtinfarkt

på grund av risken för att förvärra dessa tillstånd.

Barn

Ge inte detta läkemedel till barn eftersom säkerhet och effekt av Isopto Carpine hos barn inte har fastställts.

Andra läkemedel och Isopto Carpine

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Tala särskilt om för läkaren om du tar:

- topikala NSAID-preparat (icke-steroidala antiinflammatoriska läkemedel), vilka kan minska effekten av Isopto Carpine
- betablockerare, t.ex. atenolol, vilka kan öka risken för hjärtsjukdomar.

Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor ska du vänta minst 5 minuter mellan varje läkemedel. Ögonsalvor ska användas sist.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Använd inte Isopto Carpine under graviditet eller amning, såvida inte läkaren anser att det är nödvändigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Isopto Carpine har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Isopto Carpine kan ge upphov till dimsyn och ljuskänslighet. Kör inte bil och använd inte maskiner förrän detta har försvunnit.

Isopto Carpine innehåller bensalkoniumklorid

Detta läkemedel innehåller 1 mg bensalkoniumklorid per 10 ml motsvarande 0,1 mg/ml.

Bensalkoniumklorid kan tas upp av mjuka kontaktlinser och kan missfärga kontaktlinserna. Ta ut kontaktlinser (hårda eller mjuka) innan du använder läkemedlet och vänta minst 15 minuter innan kontaktlinserna sätts in igen.

Bensalkoniumklorid kan vara irriterande för ögon, särskilt om du har torra ögon eller problem med hornhinnan (den klara hinnan längst fram i ögat). Om du känner irritation, stickningar eller smärta i ögat efter att ha använt läkemedlet, kontakta läkare.

3. Hur du använder Isopto Carpine

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är

Vuxna och äldre:


2 droppar 3 gånger dagligen.

Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig.


Använd Isopto Carpine endast för att droppa i dina ögon.

Hur du använder Isopto Carpine på rätt sätt:


Om säkerhetskragen är lös när locket har avlägsnats ska kragen tas bort innan produkten används.




1



2



3



4

1. Ta fram flaskan med Isopto Carpine.
2. Tvätta händerna och sätt dig framför en spegel.
3. Skruva av korken.
4. Håll flaskan upp och ner mellan tummen och långfingret (bild 1).
5. Luta huvudet bakåt. Dra ner det nedre ögonlocket med ett rent finger så att det bildas en "ficka" mellan ögonlocket och ögat. Droppen ska hamna här.
6. Håll flaskspetsen nära ögat. Använd en spegel om det underlättar.
7. Vidrör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med droppspetsen. Det kan förorena ögondropparna i flaskan.
8. Kläm inte på flaskan: den är utformad så att det bara behövs ett lätt tryck på botten (bild 2).
9. Tryck lätt på droppflaskans botten för att droppa en droppe Isopto Carpine åt gången (bild 3).
10. När du har använt Isopto Carpine blundar du och trycker försiktigt med ett finger i ögonvrån i 2 minuter. Det förhindrar att Isopto Carpine kommer ut i resten av kroppen (bild 4).
11. Om du använder Isopto Carpine i båda ögonen upprepar du stegen från 4 till 10 för det andra ögat.
12. Skruva på locket ordentligt direkt efter användning.

Om en droppe missar ögat så försök igen.

Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor ska du vänta minst 5 minuter mellan varje läkemedel. Ögonsalvor ska administreras sist.

Om du har använt för stor mängd av Isopto Carpine

Skölj ut allt med varmt vatten. Tag inga fler droppar förrän det är dags för din nästa ordinarie dos.

Vid oavsiktlig förtäring, kontakta läkare.

Symtom på överdos kan innefatta: huvudvärk, salivavsöndring, svettning, svimning, långsam hjärtrytm, sänkt blodtryck, magkramper, kräkningar, astma och diarré.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Isopto Carpine

Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för din nästa dos hoppar du över den glömda dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Isopto Carpine

Sluta inte att använda det här läkemedlet i förtid, även om dina symtom har försvunnit. Om du slutar att använda läkemedlet för tidigt kan dina symtom komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har setts med Isopto Carpine:

Mycket vanliga (kan uppkomma hos fler än 1 av 10 personer):

- Effekter i ögonen: dimsyn
- Allmänna effekter: huvudvärk

Vanliga (kan uppkomma hos upp till 1 av 10 personer):

- Effekter i ögonen: synnedsättning, nedsatt synskärpa, ögonsmärta, onormal syn, grumlingar i vätskan inne i ögat (prickar och fläckar i synfältet), ögonirritation, rodnad i ögat, obehag och störning i glaskroppen
- Allmänna effekter: yrsel, illamående och astma

Mindre vanliga (kan uppkomma hos upp till 1 av 100 personer):

- Effekter i ögonen: näthinneruptur, blödning inuti ögat, ögonlockssvullnad, minskad pupillstorlek, avlossning av vätskan inuti ögat, bländning, onormal känsla i ögat och näthinneavlossning
- Allmänna effekter: lungsjukdom

Sällsynta (kan uppkomma hos upp till 1 till av 1 000 personer):

- Allmänna effekter: allergi (överkänslighet), kolinergt syndrom

Ytterligare biverkningar med okänd frekvens som rapporterats efter godkännandet för försäljning:

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

- Effekter i ögonen: förhöjt tryck i ögat och svullnad av hornhinnan
- Allmänna effekter: kräkningar

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Isopto Carpine ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Kassera flaskan 4 veckor efter öppnandet.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är pilokarpinhydroklorid
- Övriga hjälpämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), hypromellos, borsyra, natriumcitrat, natriumhydroxid och/eller saltsyra (för pH-justering) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Isopto Carpine är en färglös till ljusgul lösning som tillhandahålls i en plastflaska om 10 ml med ett skruvlock.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Finland Oy
Skogsjungfrugränden 10
FI-02130 Esbo

Tillverkare

S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
2870 Puurs
Belgien

Denna bipacksedel ändrades senast 25.08.2022