

## Pakkausseloste: Tie toa potilaalle

### Meloxicam Orion 15 mg tabletti meloksikaami

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännä lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkikenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

#### Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Meloxicam Orion on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Meloxicam Orion -tabletteja
3. Miten Meloxicam Orion -tabletteja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Meloxicam Orion -tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### 1. Mitä Meloxicam Orion on ja mihin sitä käytetään

Meloxicam Orion -tablettien vaikuttava aine on meloksikaami. Meloksikaami kuuluu ei-steroidisten tulehduskipulääkkeiden ryhmään. Näitä lääkeitä käytetään vähentämään tulehdusta ja kipua niveliissä ja lihaksissa.

Meloxicam Orion -tabletteja käytetään:

- lyhytaikaiseen hoitoon niveliikon pahanemisvaiheessa
- pitkääikaiseen hoitoon
  - nivelreumassa
  - selkärankareumassa.

#### 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Meloxicam Orion -tabletteja

#### Älä ota Meloxicam Orion -tabletteja

- viimeisen raskauskolmanneksen aikana
- jos olet lapsi tai alle 16-vuotias nuori
- jos olet allerginen meloksikaamille, asetyylisalisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille
- jos olet allerginen tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on ollut seuraavia haittavaikutuksia asetyylisalisyyliapon tai muiden tulehduskipulääkkeiden oton yhteydessä:
  - vinkuvaa hengitystä, kiristystä rinnassa, hengenahdistusta (astmaa)
  - nenän limakalvojen turvotuksen aiheuttamaa nenän tukkoisuutta (nenäpolyypit)
  - ihottumaa tai nokkosihottumaa (urtikaria)
  - ihmisen tai limakalvojen äkillistä turpoamista, kuten silmänympäristen, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turpoamista, mikä mahdollisesti vaikeuttaa hengittämistä (angioneuroottinen edeema)
- jos sinulla on aikaisemman tulehduskipulääkyksen jälkeen ilmennyt
  - verenvuotoa vatsassa tai suolistossa
  - haavauma vatsassa tai suolistossa
- jos sinulla on haavauma tai verenvuoto vatsassa tai suolistossa
- jos sinulla on tai on toistuvasti ollut mahan tai maha-suolikanavan haavauma tai verenvuoto

- jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta
- jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, jota ei hoideta dialyysillä
- jos sinulla on äskettäin ollut verenvuoto aivoissa
- jos sinulla on jokin verenvuotohäiriö
- jos sinulla on vaikea sydämen vajaatoiminta.

Jos olet epävarma, koskeeko mikään yllämainituista sinua, ota yhteys lääkäriin.

## **Varoitukset ja varotoimet**

### **Varoitukset**

Meloxicam Orion -tablettien kaltaisten lääkkeiden käyttöön voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suurta lääkeannosta ja lääketä pitkään käytettäessä. Älä ylitä suositeltua annosta. Älä käytä Meloxicam Orion -tabletteja pidempään kuin lääkärisi on määritnyt (ks. kohta 3 ”Miten Meloxicam Orion -tabletteja otetaan”).

Jos sinulla on sydänsairaus tai aiemmin sairastettu aivohalvaus, tai jos luulet, että sinulla on näille sairauksille altistavia riskitekijöitä sinun tulee keskustella hoidostasi lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Esimerkiksi jos:

- sinulla on korkea verenpaine
- sinulla on korkeat veren sokeriarvot (diabetes)
- sinulla on korkea veren kolesteroli (hypercholesterolemia)
- tupakoit.

Lopeta Meloxicam Orion -tablettien käyttö välittömästi, jos huomaat verenvuotoja (aiheuttaa ulosten tummumista) tai ruuansulatuskanavan verenvuotoja (aiheuttaa vatsakipuja).

Mahdollisesti hengenvaarallisia ihoreaktioita (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi), on raportoitu Meloxicam Orion -tablettien käytön yhteydessä. Ne ilmenevät aluksi punertavina, rengasmaisina tai pyöreinä laikkuina vartalolla ja niiden keskellä on usein rakkuloita. Muita löydöksiä, joita kannattaa etsiä voivat olla haavaumat suussa, nielussa, nenässä tai sukupuolielimissä sekä sidekalvotulehdus (silmien punoitus ja turvotus). Nämä mahdolliset hengenvaaralliset ihoreaktiot liittyvät usein flunssan kaltaisiin oireisiin. Ihottuma voi levitä laajoiksi rakkulamuodostelmiksi tai ihmisen pinnan kuoriutumiseksi.

Suurin riski vakavien ihoreaktioiden ilmenemiselle on ensimmäisten hoitoviikkojen aikana. Jos sinulle on kehittynyt Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekrolyysi Meloxicam Orion -tablettien käytön yhteydessä, et saa koskaan aloittaa Meloxicam Orion -tablettien käyttöä enää uudelleen.

Jos sinulle kehittyy ihottuma tai edellä mainittuja iho-oireita, lopeta Meloxicam Orion -tablettien käyttö, hakeudu nopeasti lääkärin vastaanotolle ja kerro, että käytät tästä lääkettä.

Meloxicam Orion -tabletit eivät sovi äkillisen kivun hoitoon.

Meloxicam Orion -tabletit voivat peittää taustalla olevan tulehduksen oireita (esim. kuume). Jos epäilet, että sinulla on tulehdus, ota yhteys lääkäriisi.

### **Ole erityisen varovainen Meloxicam Orion -tablettien suhteen ja keskustele lääkärin kanssa:**

- jos sinulla on aiemmin ollut astma
- jos sinulta otetaan veri- tai virtsakoe, kerro meloksikaamihoidostasi
- jos sinulla on joskus esiintynyt toistopunoittumaa (pyöreitä tai soikeita punoittavia läiskiä ja ihoturvotusta, jotka ilmestyvät yleensä uudelleen samaan kohtaan / samoihin kohtiin, rakkulanmuodostusta, nokkosihottumaa ja kutinaa) meloksikaamin tai muiden oksikaamien (esim. piroksikaamin) ottamisen jälkeen.

## **Käyttöön liittyvät varotoimet**

Koska hoidon muuttaminen on tarpeen, on tärkeää, että kysyt lääkäriltäsi neuvoa ennen kuin otat Meloxicam Orion -tabletteja seuraavissa tapauksissa:

- aikaisemmin sairastettu ruokatorvitulehdus (esofagiitti), mahatulehdus (gastriitti) tai joku muu aiemmin sairastettu ruuansulatuskanavan sairaus, esim. Crohnin tauti tai haavainen paksusuolitulehdus
- korkea verenpaine (hypertensio)
- korkea ikä
- sydän-, maksa- tai munuaissairaus
- korkeat veren sokeriarvot (diabetes)
- pienentynyt verimäärä (hypovolemia), mikä voi johtua vakavasta verenhukasta tai palovammasta, leikkauksesta tai vähäisestä nesteensaannista
- lääkäri on diagnostoinut, ettet siedä joitain sokereita, koska tämä lääke sisältää laktoosia
- lääkärin aiemmin toteama korkea kaliumpitoisuus veressä

Lääkäri tarkkailee vointiasi hoidon aikana.

### **Muut lääkevalmisteet ja Meloxicam Orion**

Koska Meloxicam Orion -tabletit voivat vaikuttaa muihin lääkkeisiin tai toisinpäin, kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkeitä.

Kerro erityisesti lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos otat/olet ottanut tai käytät joitakin seuraavista:

- muut tulehduskipulääkkeet
- veren hyytymistä estäävät lääkkeet
- verihyytymiä hajottavat lääkkeet
- sydän- ja munuaissairauksiin käytettävät lääkkeet
- kortikosteroidit – käytetään esim. tulehdusseen tai allergisiin reaktioihin
- siklosporiini/takrolimuusi – käytetään elinsiirtojen jälkeen, tai vakavissa ihosairauksissa, nivereumassa tai munuaissairaudessa
- diureetti (nesteenpoistolääke) Lääkäri saattaa tarkkailla munuaistesi toimintaa, jos käytät diureetteja.
- korkean verenpaineen hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. beetasalpaajat)
- litium – käytetään mielialahäiriöiden hoidossa
- selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI:t) – käytetään masennuksen hoidossa
- metotreksaatti – kasvainten tai vakavien hallitsemattomien ihosairauksien hoitoon ja akuuttiin nivereumaan
- kolestyramiini – kolesterolitasojen alentamiseen
- deferasiroksi – käytetään kehon korkean rautapitoisuuden hoidossa
- pemetreksedi – käytetään kasvainten hoidossa
- suun kautta otettavat diabeteslääkkeet (sulfonyliureat, nateglinidi) – käytetään diabeteksen hoidossa.

Lääkärin tulee seurata tarkasti verensokeriarvojasi hypoglykemian varalta.

Meloksikaamin käyttö samanaikaisesti seuraavien lääkkeiden kanssa voi aiheuttaa korkeaa kaliumpitoisuutta ( $K^+$ ) veressä:

- kaliumsuolat
- kalumia sästäväät diureetit
- angiotensiinikonvertaasentsymin (ACE) estäjät, angiotensiini II -reseptorin salpaajat
- tulehduskipulääkkeet
- (pienimolekyyliset tai fraktioimattomat) hepariinit
- siklosporiini, takrolimuusi
- trimetopriimi

Haittavaikutusten kehittyminen saattaa riippua muista riskitekijöistä.

Jos olet epävarma, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

## Raskaus, imetyks ja hedelmällisyys

### Raskaus

Mikäli tulet raskaaksi Meloxicam Orion -hoidon aikana, ota yhteys lääkäriin.

Älä ota Meloxicam Orion -tabletteja, jos olet viimeisellä raskauskolmanneksella, sillä ne voivat vahingoittaa syntymätöntä lastasi tai aiheuttaa ongelmia synnytyksessä. Se voi aiheuttaa munuais- ja sydänongelmia syntymättömälle lapselleesi. Se voi vaikuttaa sinun ja vauvasi verenvuotajaipumukseen ja aiheuttaa sen, että synnytys viivästyttää tai pitkittyy. Sinun ei pidä ottaa Meloxicam Orion -tabletteja raskauden ensimmäisten 6 kuukauden aikana, ellei se ole ehdottoman vältämätöntä ja lääkärin ohjeistamaa. Jos tarvitset hoitoa tänä aikana tai kun yrität tulla raskaaksi, on käytettävä pienintä annosta mahdollisimman lyhyen ajan. Jos Meloxicam Orion -tabletteja käytetään usean päivän ajan 20. raskausviikosta alkaen, ne voivat aiheuttaa syntymättömälle lapsellesi munuaisongelmia, jotka voivat johtaa vauvaa ympäröivän lapsiveden vähäiseen määräeen (oligohydranion) tai vauvan sydämessä olevan *ductus arteriosus* -nimisen verisuonen kaventumiseen. Jos tarvitset hoitoa muutamaa päivää pidempäään, lääkäri voi suositella lisäseurantaa.

### Imetyks

Tätä lääkettä ei suositella käytettävän imetyksen aikana.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

### He delmällisyys

Meloxicam Orion voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Sinun tulee kertoa lääkärillesi, jos suunnittelet raskaaksi tulemista tai jos sinulla on vaikeuksia tulla raskaaksi.

### Ajamine ja koneiden käyttö

Näköhäiriötä, kuten näön hämärtymistä, heitehuimausta, uneliaisuutta, kiertohuimausta tai muita keskushermostohäiriötä saattaa ilmetä käytettäessä tästä valmistetta. Jos huomaat tällaisia vaikutuksia, älä aja autoa tai käytä koneita.

### Meloxicam Orion sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

## 3. Miten Meloxicam Orion -tabletteja otetaan

Ota tästä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

### Nivelrikon pahe nemisvaihe

7,5 mg (puolikas 15 mg:n tabletti) kerran vuorokaudessa. Annosta voidaan nostaa yhteen 15 mg:n tablettiin kerran vuorokaudessa.

### Nivelreuma

Yksi 15 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa. Annosta voidaan vähentää 7,5 mg:aan (puolikas 15 mg:n tabletti) kerran vuorokaudessa.

### Selkärankareuma

Yksi 15 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa. Annosta voidaan vähentää 7,5 mg:aan (puolikas 15 mg:n tabletti) kerran vuorokaudessa.

## **Antotapa**

Suun kautta.

Tabletti on nieltävä veden tai muun juoman kanssa, ruokailun yhteydessä.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Älä ylitä suositeltua maksimiannosta 15 mg/vuorokausi.

Jos joku kohdassa **"Varoituks et ja varotoimet"** mainittu asia koskee sinua, lääkäri voi rajoittaa annostasi 7,5 mg:aan kerran vuorokaudessa.

## **Iäkkääät**

Pitkääikaishoidossa suositeltu annos iäkkäillä nivereuma- ja selkärankareumapotilailla on 7,5 mg (puolikas 15 mg:n tabletti) vuorokaudessa.

## **Potilaat, joilla haittavaikutus te n riski on lisääntynyt**

Potilailla, joilla on ollut maha-suolikanavan sairaus tai joilla on sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, lääkäri aloittaa hoidon 7,5 mg:n (puolikas 15 mg:n tabletti) vuorokausiannoksella.

## **Munuaisten vajaatoiminta**

Dialyysihoitoa saavilla potilailla, joilla on vakava munuaisten vajaatoiminta, annos ei saisi ylittää 7,5 mg/vuorokausi (puolikas 15 mg:n tabletti). Annoksen pienentämistä ei vaadita lievää tai kohtalaista munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

## **Maksan vajaatoiminta**

Lievää tai kohtalaista maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annosta ei tarvitse pienentää.

## **Käyttö lapsille ja nuorille**

Meloxicam Orion -tabletteja ei saa antaa lapsille ja alle 16-vuotiaille nuorille

Jos tunnet, että Meloxicam Orion -tablettien vaiketus on liian voimakas tai liian heikko, tai et usean päivän jälkeen huomaa mitään kohentumista kunnossasi, keskustele lääkärin tai apteekkikenkilökunnan kanssa.

## **Jos otat enemmän Meloxicam Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi**

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 0800 147 111), riskien arvioimiseksi ja lisähjeiden saamiseksi.

## **Tavallisia akutista tulehduskipulääkeyliannostuksesta seuraavia oireita ovat:**

- voimattomuus
- väsymys
- pahoilvointi ja oksentelu
- vatsan alueen kipu.

Nämä oireet paranevat yleensä, kun lopetat Meloxicam Orion -tablettien käytön. Sinulle voi tulla mahan tai suoliston verenvuotoa (ruuansulatuskanavan verenvuodot).

## **Vakava myrkytys voi aiheuttaa seuraavia vakavia haittavaiktuksia (katso kohta 4):**

- korkea verenpaine
- akutti munuaisten vajaatoiminta
- maksan toiminnan häiriö
- heikentynyt/pinnallinen hengitys tai hengityksen pysähtyminen (hengityslama)

- tajuttomuus
- kouristukset
- verenkierron romahtaminen
- sydämenpysähdyks
- allergiset (yliperkkyys-) reaktiot, jotka voivat aiheuttaa:
  - pyörtymistä
  - hengenahdistusta
  - ihoreaktioita.

#### **Jos unohdat ottaa Meloxicam Orion -tabletti**

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Ota seuraava annos normaaliiin aikaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkien henkilökunnan puoleen.

#### **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

#### **Lopeta Meloxicam Orion -tablettien otto ja ota välittömästi yhteys lääkäriisi tai lähimpään sairaalaan, jos huomaat:**

Allergisia reaktioita, jotka saattavat aiheuttaa seuraavia oireita:

- ihoreaktiot, kuten kutina, rakkulamuodostus tai ihmisen hilseileminen, jotka voivat olla hengenvaarallisia (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi), pehmytkudosvauriot (limakalvovauriot) tai punavihoittuma (ks. kohta 2). Punavihoittuma on vakava allerginen ihoreaktio, joka aiheuttaa läiskiä, punaisia juovia tai purppuranpunaisia alueita tai rakkuloita. Se voi myös vaikuttaa suuhun, silmiin ja muihin kosteisiin kehon pintoihin.
- ihmisen tai limakalvojen yhtäkkinen turpoaminen, kuten silmänympärysysten, kasvojen, huuften, suun tai kurkun turpoaminen, mikä mahdollisesti vaikeuttaa hengittämistä, turvonneet nilkat tai jalat (alarajojen turpoaminen)
- hengenahdistus tai astmakohtaus
- maksatulehdus (hepatitti). Tämä voi aiheuttaa oireita kuten:
  - ihmisen tai silmämunien keltaisuus
  - vatsakipu
  - ruokahaluttomuus

Ruuansulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia, erityisesti:

- verenvuotoja (aiheuttaa ulosten tummumista)
- ruuansulatuskanavan haavaumia (aiheuttaa vatsakipuja)

Ruuansulatuskanavan verenvuodot, haavaumat ja puhkeamat voivat joskus olla vakavia ja jopa kuolemaan johtavia, erityisesti iäkkäillä.

Jos sinulla on aiemmin ollut ruuansulatuskanavan oireita pitkääikaisen tulehduskipulääkkeiden käytön takia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, etenkin jos olet iäkäs. Lääkäri saattaa tarkkailla sinua hoidon aikana.

Jos sinulla ilmenee näköhäiriötä, älä aja autoa tai käytä koneita.

#### **Yleiset tulehduskipulääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset**

Joidenkin tulehduskipulääkkeiden käyttöön voi liittyä suurentunut valtimoverisuonitukosken riski, esim. sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski, etenkin suurina annoksina ja pitkääikaisessa käytössä.

Nesteen kertymistä, korkeaa verenpainetta ja sydämen vajaatoimintaa on raportoitu tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä.

Yleisimmin havaitut haittavaikutukset kohdistuvat ruuansulatuskanavaan:

- mahan ja ohutsuolen ylempien osien haavaumat
- mahasuolikanavan puhkeama tai ruuansulatuskanavan verenvuoto (joskus kuolemaan johtava, erityisesti jäkkäillä)

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä:

- pahoinvohti ja oksentelu
- ripuli
- ilmavaivat
- ummetus
- ruuansulatushäiriöt
- mahakipu
- tummuneet ulosteet johtuen verenvuodosta ruuansulatuskanavaan
- verioksennus
- tulehdus, johon liittyy haavaumia suussa
- ruuansulatuskanavan tulehuksen paheneminen (koliitin tai Crohnin taudin paheneminen)

Joissain tapauksissa on havaittu mahatulehdusta.

### **Meloxicam Orion -tablettien sisältämän meoksikaamin haittavaikutukset**

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

- ruuansulatuskanavan haittavaikutukset, kuten ruuansulatushäiriöt (dyspepsia), pahoinvohti ja oksentelu, vatsakipu, ummetus, ilmavaivat, löysät ulosteet (ripuli)

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

- päänsärky

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

- huimaus (heitehuimaus)
  - kiertohuimaus
  - uneliaisuus
  - anemia (veren hemoglobiinipitoisuuden lasku)
  - verenpaineen nousu
  - punastuminen (kasvojen ja kaulan väliaikainen punoitus)
  - natriumin ja veden kertyminen elimistöön
  - veren kaliumpitoisuuden kohoaminen.
- Tämä voi aiheuttaa oireita, kuten:
- muutoksia sydämen rytmiseen
  - sydämen tykytystä
  - lihasheikkoutta
- röyhtäily
  - mahatulehdus
  - ruuansulatuskanavan verenvuoto
  - suutulehdus
  - allergiset (yliherkkyys-) reaktiot
  - kutina
  - ihottuma
  - nesteen kertymisen aiheuttama turpoaminen, mukaan lukien turvonneet nilkat/jalat (alaraajojen edeema)
  - ihmisen tai limakalvojen äkillinen turpoaminen, kuten silmän ympäristen, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turpoaminen, mahdollisesti vaikeuttaen hengittämistä (angioneuroottinen edeema)
  - maksa-arvojen muutokset (esim. kohonneet maksan entsyymit, kuten transaminaasit tai sappiväriaine bilirubiinin nousu). Lääkäri voi huomata nämä verikokeiden avulla.

- munuaisarvojen häiriöt laboratoriokokeissa (esim. kohonnut kreatiniini tai urea)

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

- mielialahäiriöt
- painajaisunet
- muuttuneet veriarvot, kuten:
  - verisolujen epänormaalit arvot erittelylaskennassa
  - valkosolujen lukumääärän väheneminen (leukosytopenia)
  - verihiutaleiden lukumääärän väheneminen (trombosytopenia)

Nämä haittavaikutukset voivat lisätä tulehdusen ja oireiden, kuten mustelmien ja nenäverenvuodon, riskiä.
- korvien soiminen (tinnitus)
- sydämentykytys (palpitaatio)
- mahan ja ohutsuolen ylempien osien haavaumat
- ruokatorvitulehdus
- astmakohtaus (esiintyy potilailla, jotka ovat allergisia asetyylisalisylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille)
- vakava ihon rakkulamuodostus tai hilseily (Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen nekrolyysi)
- nokkosihottuma
- näköhäiriöt, kuten:
  - hämärtynyt näkökyky
  - sidekalvotulehdus (silmämunan tai –luomen tulehdus)
- paksusuolitulehdus (koliitti)

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

- ihmisen rakkulareaktiot (vesikelloreaktiot) ja punavihoittuma. Punavihoittuma on vakava allerginen ihoreaktio, joka aiheuttaa läiskiä, punaisia juovia tai purppuranpunaisia alueita tai rakkuloita. Se voi myös vaikuttaa suuhun, silmiin ja muihin kosteisiin kehon pintoihin.
- maksatulehdus (hepatiitti). Tämä voi aiheuttaa oireita kuten:
  - ihmisen tai silmämunien keltaisuutta
  - vatsakipua
  - ruokahaluttomuutta
- munuaisten äkillinen vajaatoiminta erityisesti potilailla, joilla on riskitekijöitä, kuten sydänsairaus, diabetes tai munuaissairaus.
- maha-suolikanavan puhkeama

Esiintymistilheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

- pankreatiitti (haimatulehdus)
- sekavuus
- ajan ja paikan tajun hämärtyminen
- hengenahdistus ja ihoreaktiot, auringonvalon aiheuttamat ihottumat (valonherkkyyssreaktiot)
- sydämen vajaatoimintaa on raportoitu tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä
- tiettyjen valkosoluyyppien täydellinen katoaminen (agranulosytoosi), erityisesti potilailla, jotka käyttävät Meloxicam Orion -tabletteja yhdessä muiden lääkkeiden kanssa, jotka mahdollisesti vaikuttavat luuytimeen. Tämä voi aiheuttaa:
  - äkillistä kuumetta
  - kurkkukipua
  - tulehdusia
- naisten hedelmättömyys, ovulaation viivästyminen
- Selvästi erottuva allerginen ihoreaktio, jota kutsutaan toistopunoittumaksi ja joka ilmestyy yleensä uudelleen samaan kohtaan / samoihin kohtiin, kun altistut lääkkeelle uudelleen. Se voi ilmetä pyöreinä tai soikeina punoittavina läiskinä ja ihoturvotuksena, rakkulanmuodostuksena (nokkosihottumana) ja kutinana.

**Tulehduskipulääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset, joita ei ole vielä havaittu Meloxicam Orion -tablettien ottamisen jälkeen**

Munuaisten rakenteen muutokset, jotka johtavat äkilliseen munuaisten vajaatoimintaan:

- erittäin harvinaisissa tapauksissa munuaistulehdus
- joidenkin munuaissolujen kuolema
- valkuaisen erittyminen virtsaan

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkienkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

## **5. Meloxicam Orion -tablettien säilyttäminen**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä läpipainopakkauksessa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuheteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## **6. Pakkausen sisältö ja muuta tietoa**

Mitä Meloxicam Orion sisältää

- Vaikuttava aine on meloksikaami. Yksi tabletti sisältää meloksikaamia 15 mg.
- Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, natriumsitraatti, vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti.

### **Lääkevalmisten kuvaus ja pakauskoot**

Vaaleankeltainen pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

**Pakauskoot:** 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 tai 1 000 tablettia (kaikkia pakauskokoja ei vältämättä ole myynnissä).

### **Myyntiluvan haltija**

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

### **Valmistaja**

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

**Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.12.2023.**

## Bipacksedel: Information till patienten

### Meloxicam Orion 15 mg tablett meloxikam

**Läs nog i genom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läke medel. Den inne håller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I den här bipackse del finns information om följande:**

1. Vad Meloxicam Orion är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Meloxicam Orion
3. Hur du tar Meloxicam Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Meloxicam Orion ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Meloxicam Orion är och vad det används för**

Meloxicam Orion innehåller det aktiva ämnet meloxikam. Meloxikam tillhör gruppen av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), som används för att minska inflammation och smärta i ledar och muskler.

Meloxicam Orion används för:

- korttidsbehandling av tillfällig försämring vid ledförslitning (artros)
- långtidsbehandling av
  - ledgångsreumatism (reumatoid artrit)
  - stelhet i ryggraden (ankyloserande spondylit).

#### **2. Vad du behöver veta innan du tar Meloxicam Orion**

##### **Ta inte Meloxicam Orion**

- under den tredje trimestern av graviditeten
- om du är barn eller ungdom under 16 år
- om du är allergisk mot meloxikam, acetylsalicylsyra eller några andra antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)
- om du är allergisk mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har haft något av följande symptom vid användning av acetylsalicylsyra eller andra NSAID:
  - pipande andning, tryck över bröstet, andningssvårigheter (astma)
  - nästäppa p.g.a. svullna nässlemhinnor (näspolyper)
  - hudutslag/nässelutslag (urtikaria)
  - plötslig svullnad av hud och slemhinnor, som svullnad runt ögon, ansikte, läppar, mun eller svalg, eventuellt med andningssvårigheter (angioneurotiskt ödem)
- om du vid tidigare användning av NSAID haft symptomen
  - blödning i mage eller tarm
  - sår i mage eller tarm
- om du har sår eller blödning i mage eller tarm

- om du har eller någon gång haft återkommande sår eller blödning i mage eller mag-tarmkanalen
- om du har allvarligt nedsatt leverfunktion
- om du har allvarlig njursvikt som inte behandlas med dialys
- om du nyligen haft hjärnblödning
- om du har någon typ av blödningsrubbning
- om du har allvarlig hjärtsvikt.

Kontakta din läkare om du är osäker på om något av ovanstående gäller för dig.

## **Varningar och försiktighet**

### **Varningar:**

Läkemedel som Meloxicam Orion kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken är större vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Ta inte mer än rekommenderad dos. Använd inte Meloxicam Orion under en längre tid än din läkare ordinerat (se avsnitt 3 ”Hur du tar Meloxicam Orion”).

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd. Till exempel om du

- har högt blodtryck
- har hög sockerhalt i blodet (diabetes)
- har högt kolesterolvärde i blodet (hyperkolesterolmi)
- om du röker.

Du ska omedelbart sluta använda Meloxicam Orion vid blödning (leder till svartfärgad avföring) eller sår i mag-tarmkanalen (leder till magsmärtor).

Hudreaktioner, som kan vara livshotande (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekroly), har rapporterats vid användning av Meloxicam Orion. Det kan börja som rödvioletta måltavleliknande eller runda fläckar med blåsbildning i mitten, ofta symmetriskt utbredda, på bålen. Ytterligare tecken att vara uppmärksam på är sår i munnen, hals, näsa, könsorgan eller ögoninflammation (röda och svullna ögon). Hudreaktionerna, som kan vara livshotande, följs ofta av influensaliknande symptom. Utslagen kan utvecklas till blåsor över stora områden eller hudavlossning.

Risken för allvarliga hudreaktioner är störst under de första veckorna av behandlingen. Om du drabbats av Stevens-Johnson syndrom eller toxisk epidermal nekroly när du använt Meloxicam Orion får du aldrig använda Meloxicam Orion igen.

Om du får utslag eller tecken på ovan nämnda hudreaktioner ska du genast sluta ta Meloxicam Orion, omedelbart kontakta läkare och berätta att du tar detta läkemedel.

Meloxicam Orion är inte lämpligt vid behandling av akut smärta.

Meloxicam Orion kan dölja symptom på en underliggande infektion (t. ex. feber). Kontakta därför din läkare om du tror att du har en infektion.

### **Var särskilt försiktig med Meloxicam Orion och tala med läkare :**

- om du tidigare har haft astma
- vid blod- eller urinprov, berätta om din behandling med meloxicam
- om du någon gång har utvecklat ett fixt läkemedelsutslag (runda eller ovala fläckvisa rodnader och svullnader på huden som kommer tillbaka på samma ställe, blåsor, nässelutslag eller kliande utslag) efter att du tagit meloxicam eller någon annan oxikam (t.ex. piroxikam).

## **Försiktighet**

Eftersom det är nödvändigt att anpassa behandlingen, är det viktigt att du ber din läkare om råd innan du tar Meloxicam Orion i följande fall:

- om du tidigare haft inflammation i matstrupen (esofagit), inflammation i magen (gastrit) eller om du tidigare haft annan sjukdom i mag-tarmkanalen som t. ex. Crohns sjukdom eller ulcerös kolit
- högt blodtryck (hypertension)
- hög ålder
- sjukdomar i hjärta, lever eller njurar
- höga nivåer socker i blodet (diabetes)
- minskad blodvolym, som kan bero på en kraftig blodförlust eller svår brännskada, kirurgiskt ingrepp eller lågt vätskeintag
- din läkare har diagnostiserat att du inte tål vissa sockerarter, eftersom läkemedlet innehåller laktos
- höga halter kalium i blodet fastställt av läkare

Din läkare kommer att följa med ditt tillstånd under behandlingen.

### **Andra läkemedel och Meloxicam Orion**

Eftersom Meloxicam Orion kan påverka andra läkemedel eller vice versa, ska du tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Informera alltid din läkare eller apotekspersonal om du tar/har tagit eller använder något av följande läkemedel:

- andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)
  - läkemedel som motverkar bildning av blodproppar
  - läkemedel som löser blodproppar
  - läkemedel som används vid behandling av hjärt- och njursjukdom
  - kortikosteroider – används t. ex. mot inflammation eller allergisk reaktion
  - ciklosporin/takrolimus – används efter organtransplantation, för allvarliga hudåkommor, ledgångsreumatism eller njursjukdom
  - vätskedrivande läkemedel (diureтика)
  - Din läkare kan komma att följa din njurfunktion om du använder diureтика.
  - läkemedel för högt blodtryck (t. ex. beta-blockerare)
  - lithium – används för behandling av humörvängningar
  - selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) – används vid behandling av depression
  - metotrexat – för behandling av tumörer eller allvarliga hudsjukdomar och akut ledgångsreumatism
  - kolestyramin – för att sänka kolesterolnivån
  - deferasirox – används för behandling av höga järnnivåer i kroppen
  - pemetrexed – används för behandling av tumörer
  - perorala antidiabetika (sulfonylurea, nateglinid) – används för behandling av diabetes.
- Läkaren måste följa din blodsockernivån för hypoglykemi.

Samtidig användning av meloxikam med följande läkemedel kan leda till hög kaliumhalt ( $K^+$ ) i blodet:

- kaliumsalter
- kaliumsparande diureтика
- angiotensinkonverterande enzym (ACE) hämmare, angiotensin II receptorblockerare
- antiinflammatoriska läkemedel
- (lägmolekylärt eller ofraktionerat) heparin
- ciklosporin, takrolimus
- trimetoprim

Utvecklingen av biverkningar kan bero på andra riskfaktorer.

Om du är osäker, fråga din läkare eller apotekspersonal.

## **Graviditet, amning och fertilitet**

### **Graviditet**

Om du blir gravid under behandling med Meloxicam Orion, ska du meddela din läkare.

Ta inte Meloxicam Orion-tabletter under graviditetens sista trimester, eftersom de kan skada ditt ofödda barn eller orsaka problem vid förlossningen. Det kan orsaka njur- och hjärtproblem hos ditt ofödda barn. Det kan påverka din och barnets benägenhet att blöda och göra att förlossningen sker senare eller tar längre tid än förväntat. Du ska inte ta Meloxicam Orion under graviditetens 6 första månader om det inte är absolut nödvändigt och sker på din läkares inrådan. Om du behöver behandling under den här perioden eller medan du försöker att bli gravid, ska du använda den lägsta möjliga dosen under så kort tid som möjligt. Från och med 20:e graviditetsveckan kan Meloxicam Orion orsaka njurproblem hos ditt ofödda barn, om du tar det under längre tid än några dagar, vilket kan leda till låga nivåer fostervatten (oligohydramnios) eller till att ett blodkärl (*ductus arteriosus*) i barnets hjärta blir smalare. Om du behöver längre behandling än några dagar, kan din läkare rekommendera ytterligare övervakning.

### **Amning**

Detta läkemedel rekommenderas inte vid amning.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

### **Fertilitet**

Meloxicam Orion kan göra det svårare att bli gravid. Informera din läkare om du planerar en graviditet eller om du har problem att bli gravid.

### **Körförståiga och användning av maskiner**

Synstörningar inkluderat dimsyn, svindel, trötthet, yrsel eller andra störningar på centrala nervsystemet kan förekomma med detta läkemedel. Om du observerar sådana symtom, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

### **Meloxicam Orion innehåller laktos**

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

## **3. Hur du tar Meloxicam Orion**

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

### **Förvärrade symtom vid ledförslitning**

7,5 mg (en halv 15 mg tablett) en gång per dag. Dosen kan höjas till en 15 mg tablett en gång per dag.

### **Ledgångsreumatism**

En 15 mg tablett en gång per dag. Dosen kan sänkas till 7,5 mg (en halv 15 mg tablett) en gång per dag.

## **Ryggradsreumatism**

En 15 mg tablett en gång per dag. Dosen kan sänkas till 7,5 mg (en halv 15 mg tablett) en gång per dag.

## **Administreringssätt**

Oral användning

Svälg tabletterna med vatten eller annan dryck, i samband med måltid.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Överskrid inte den rekommenderade maximidosen på 15 mg/dygn.

Om något av påståendena under rubriken **"Varningar och försiktighet"** stämmer in på dig, kan din läkare sänka dosen till 7,5 mg en gång per dag.

## **Äldre patienter**

Rekommenderad dos för långtidsbehandling av ledgångsreumatism och stelhet i ryggraden hos äldre patienter är 7,5 mg (en halv 15 mg tablett) en gång per dag.

## **Patienter med förhöjd risk för biverkningar**

Patienter med tidigare gastrointestinal sjukdom eller riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar bör starta behandling med 7,5 mg (en halv 15 mg tablett) per dag.

## **Nedsatt njurfunktion**

Hos dialyspatienter med svår njurinsufficiens bör dosen 7,5 mg/dag (en halv 15 mg tablett) inte överskridas. Dosjustering är inte nödvändigt för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion.

## **Nedsatt leverfunktion**

Dosjustering är inte nödvändigt hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion.

## **Användning för barn och ungdomar**

Meloxicam Orion ska inte ges till barn eller ungdomar under 16 år.

Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du tycker att effekten av Meloxicam Orion är för stark eller för svag, eller om du efter flera dagar inte märker någon förbättring i ditt tillstånd.

## **Om du har tagit för stor mängd av Meloxicam Orion**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

## **Vanliga symtom på akut överdosering med NSAID är:**

- energilöshet
- dåsighet
- illamående och kräkningar
- magmärter.

Dessa symtom är i allmänhet övergående om du slutar använda Meloxicam Orion. Du kan få blödningar från mage eller tarm (gastrointestinal blödning).

## **Allvarlig forgiftning kan leda till allvarliga biverkningar (se avsnitt 4):**

- högt blodtryck
- akut njursvikt
- nedsatt leverfunktion

- försvårad/ytlig andning eller andningsstopp (andningsförlamning)
- medvetslöshet
- kramper
- kollaps av blodcirculationen
- hjärtstillestånd
- allergisk (överkänslighets-) reaktion som kan orsaka:
  - svimning
  - andningssvårighet
  - hudreaktioner.

#### **Om du har glömt att ta Meloxicam Orion**

Ta inte dubbeldos för att kompensera för glömd dos. Ta i stället nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

#### **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

#### **Sluta använda Meloxicam Orion och kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du lägger märke till:**

Allergiska reaktioner, som kan ha följande symptom:

- hudreaktioner, som klåda, blåsbildning eller fjällande hud, som kan vara livshotande (Stevens-Johnsons Syndrom, toxisk epidermal nekrolys), mjukvävnadsskador (slemhinneskador) eller erythema multiforme (se avsnitt 2). Erythema multiforme är en allvarlig allergisk hudreaktion som leder till fläckar, röda strimmor eller purpurfärgade områden eller blåsor. Det kan också påverka munnen, ögonen och övriga fuktiga kroppsytor.
- svullnad i hud eller slemhinnor, som svullnad runt ögon, ansikte och läppar, mun och svalg, eventuellt med andningssvårigheter, svullna anklor eller ben (ödem i benen)
- andfåddhet eller attack av astma
- inflammation i levern (hepatit). Detta kan orsaka symptom som:
  - gulfärgning av hud eller ögonvita (gulsot)
  - buksmärta
  - nedsatt appetit

Biverkningar i mag-tarmkanalen, i synnerhet:

- blödningar (medför svartfärgad avföring)
- sår i mag-tarmkanalen (medför magsmärta)

Blödningar i mag-tarmkanalen, bildningar av sår eller hål i mag-tarmkanalen (perforation) kan i vissa fall vara allvarliga och även dödliga, särskilt hos äldre.

Om du tidigare har haft symptom i mag-tarmkanalen vid långvarigt bruk av antiinflammatoriska läkemedel, ta omedelbart kontakt med läkare, i synnerhet om du är äldre. Läkaren kan följa med ditt tillstånd under behandlingens gång.

Undvik att köra bil eller hantera maskiner om du får synstörningar.

**Allmänna biverkningar förorsakade av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)**  
 Användningen av vissa NSAID kan ha samband med en liten ökad risk för proppar i arteriella blodkärl t ex hjärtattack eller stroke (slaganfall), särskilt vid höga doser och långtidsbehandling.

Vätskeansamlingar i vävnaderna (ödem), högt blodtryck (hypertension) och hjärtsvikt har rapporterats i samband med behandling med NSAID.

De vanligaste biverkningarna som observerats kommer från mag-tarmkanalen:

- sår i magen och övre delen av tunntarmen
- hål i tarmväggen eller blödning i mag-tarmkanalen (ibland dödlig, särskilt hos äldre)

Följande biverkningar har rapporterats efter behandling med NSAID:

- illamående och kräkningar
- diarré
- väderspänningar
- förstopning
- magbesvär (dyspepsi)
- magsmärta
- svartfärgad avföring p.g.a. blödning i magtarmkanalen
- blodkräkningar
- inflammation med sår bildning i munnen
- försämring av inflammation i mag-tarmkanalen (t. ex. försämring av kolit eller Crohns sjukdom)

Inflammation i magen (gastrit) har observerats vid några tillfällen.

### Biverkningar förorsakade av me loxikam som ingår i Meloxicam Orion

Mycket vanliga (*kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare*):

- gastrointestinala biverkningar, som matsmältningsbesvär (dyspepsi), illamående och kräkningar, magsmärta, förstopning, väderspänningar, lös avföring (diarré)

Vanliga (*kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare*):

- huvudvärk

Mindre vanliga (*kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare*):

- yrsel
- svindel
- dåsighet (trötthet)
- anemi (minskning av hemoglobinvärde i blodet)
- förhöjt blodtryck
- blodvallningar (tillfällig rödnad av ansikte och hals)
- retention av natrium och vatten
- förhöjd kaliumnivå i blodet.  
Detta kan leda till symptom som
  - ändrad hjärtrytm (arytmia)
  - hjärtklappning
  - muskelsvaghet
- rapningar
- inflammation i magen (gastrit)
- blödning från mag-tarmkanalen
- inflammation i munslémhinnan
- allergisk (överkänslighets-) reaktion
- klåda
- hudutslag
- vätskeansamlingar i vävnaderna (ödem), inklusive ödem i anklor/underben
- plötslig svullnad av hud eller slemhinnor, som svullnad runt ögon, ansikte, läppar, mun och svalg, eventuellt med andningssvårigheter (angioneurotiskt ödem)
- förändring av levervärdet (t.ex. förhöjda leverenzymvärden såsom transaminaser eller förhöjt bilirubin (gallfärgämne)). Din läkare kan upptäcka detta genom att ta ett blodprov.

- förändrade njurfunktionsprover (t.ex. förhöjda kreatinin- eller ureavärden)

Sällsynta (*kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare*):

- humörförändring
- mardrömmar
- förändrade blodvärden, som
  - avvikande differentialblodbild
  - minskat antal vita blodkroppar (leukocytopeni)
  - minskat antal trombocyter (trombocytopeni)
 De här kan medföra ökad infektionsrisk och risk för symptom, som blåmärken och näsblod.
- öronsusningar (tinnitus)
- hjärtklappning (palpitation)
- sår i övre delarna av magen och tunnarmen
- inflammation i matstrupen
- attacker av astma (förekommer hos personer som är allergiska mot acetylsalicylsyra eller andra NSAID)
- svår blåsbildning i huden eller fjällning (Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys)
- nässelutslag
- synstörningar, som
  - dimsyn
  - konjunktivit (inflammation i ögongloben eller ögonlocket)
- inflammation i tjocktarmen (kolit)

Mycket sällsynta (*kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare*):

- blåsbildning i huden (bullösa reaktioner) och erythema multiforme. Erythema multiforme är en allvarlig hudreaktion som orsakar fläckar, röda strimmor eller purpurfärgade områden eller blåsor. Det kan också påverka munnen, ögonen och andra fuktiga kroppsnytor
- leverinflammation (hepatit) som kan orsaka symptomen:
  - gulfärgning av huden eller ögonvitan (gulsot)
  - smärta i buken
  - nedsatt aptit
- akut njursvikt hos patienter med riskfaktorer som hjärtsjukdom, diabetes eller njursjukdom
- hål i tarmväggen (perforation)

Har rapporterats (*förekommer hos ett okänt antal användare*):

- pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)
- förvirring
- desorientering
- andningssvårigheter och hudreaktioner, hudutslag som utlöses av solljus (photosensitivitet)
- hjärtsvikt har rapporterats vid behandling med NSAID
- total förlust av vissa vita blodkroppar (agranulocytos), speciellt hos patienter som använder Meloxicam Orion tillsammans med andra läkemedel, som kan eventuellt påverka benmärgen. Detta kan orsaka:
  - plötslig feber
  - halsont
  - infektioner
- kvinnors infertilitet, fördräjning av ovulation
- En karakteristisk allergisk hudreaktion som kallas fixt läkemedelsutslag, som vanligtvis återkommer på samma ställe varje gång patienten exponeras för läkemedlet och kan se ut som runda eller ovala fläckvisa rodnader och svullnader på huden, blåsor (nässelutslag) eller kliande utslag.

**Biverkningar med andra NSAID, som ännu inte har noterats med Meloxicam Orion**

Förändringar i njurens struktur som leder till akut njursvikt:

- mycket sällsynta fall av njurinflammation
- vävnadsdöd av vissa njurceller
- protein i urinen

### Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

## 5. Hur Meloxicam Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistern och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är meloxicam. En tablett innehåller 15 mg meloxicam.
- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, pregelatinisrad majsstärkelse, laktosmonohydrat, majsstärkelse, natriumcitrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.

### Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ljusgul rund tablett med brytskåra på ena sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

**Förpackningsstorlekar:** 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 eller 1 000 tablett(er) (eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras).

### Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

### Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1  
FI-02200 Esbo  
Finland

**De nna bipacksedel ändrades senast 15.12.2023.**