

Pakkausseloste: Tie toa käyttäjälle

Nutriflex peri infusione ste, liuos

aminohapot / glukoosi / elektrolyytit

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Nutriflex peri on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nutriflex peri -infusionestettä
3. Miten Nutriflex peri -infusionestettä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Nutriflex peri -infusionesteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Nutriflex peri on ja mihin sitä käytetään

Valmiste sisältää aminohapoiksi kutsuttuja aineita (ravintoaineita), suoloja (elektrolyyttejä) ja hiilihydraatteja (glukoosia), jotka ovat vältämättömiä elimistön kasvulle tai palautumiselle. Valmiste sisältää myös energiavirtaa hiilihydraattien muodossa.

Tätä valmistetta annetaan sinulle tiputuksena (infusiona) laskimoon tilanteissa, joissa et pysty syömään riittävästi tai letkuruokinta ei ole mahdollista.

Nutriflex peri on erityisesti tarkoitettu aikuisille ja 2–17-vuotiaille lapsille, joilla on lievä tai keskivaikea katabolia. Katabolia on tila, jossa potilas kuluttaa mm. energia- ja proteiinivarastonsa nopeammin kuin elimistö pystyy ne korvaamaan.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nutriflex peri -infusionestettä

Älä käytä Nutriflex peri -infusionestettä

- jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on synnynnäinen aminohappoaineenvaihdunnan häiriö, jonka vuoksi sinun on noudatettava erityistä proteiinipitoista ruokavaliota
- jos sinulla on poikkeuksellisen suuri veren sokeripitoisuus, jonka hallintaan tarvitaan insuliinia yli 6 yksikköä/tunti
- jos happamien aineiden pitoisuus veressäsi on poikkeuksellisen korkea (asidoosi)
- jos sinulla on kallon- tai selkäytimensäinen verenvuoto
- jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta
- jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta etkä saa keinomunuaishoittoa (hemofiltratio- tai dialyysihoitoa).

Kuten muitakaan tämän tyypisiä lääkevalmisteita, Nutriflex peri -infusionestettä ei saa antaa, jos sinulla on:

- sydänkohtauksen tai aivohalvauksen akuutti vaihe

- huonossa hoitotasapainossa oleva metabolinen häiriö, esimerkiksi tajuttomuustila (kooma), jonka syytä ei tunneta tai kudosten riittämätön hapensaanti tai huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes
- henkeä uhkaavia verenkiertohäiriöitä, joita voi esiintyä esimerkiksi pyörtymisen tai sokin yhteydessä, jos keuhkoihisi on kertynyt nestettä (keuhkopöhö) tai jos elimistösi nestetasapaino on häiriintynyt.

Nutriflex peri -infusionestettä ei saa antaa vastasyntyneille, vauvoille eikä alle 2-vuotiaalle pikkulapsille.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Nutriflex peri -infusionestettä:

- jos sydämesi tai munuaistesi toiminta on heikentynyt
- jos sinulla on neste-, suola- tai hoppo-emästasapainon häiriöitä, esimerkiksi liian vähän nestettä ja suolaa elimistössä (hypotoninen dehydraatio) tai pieni veren natrium- tai kaliumpitoisuus
- jos verensokeri on poikkeuksellisen korkea.

Vuorokausiannosta säädetään ja seurataan erityisen huolellisesti, jos munuaisten, maksan, lisämunuaisen, sydämen tai keuhkojen toiminta on heikentynyt.

Lääkäri noudattaa erityistä varovaisuutta myös, jos veri-aivoeste on vahingoittunut, koska tällöin tämä lääke voi aiheuttaa kallon- tai selkäytimensäisen paineen nousua.

Jos sinulla on vaikea aliravitsemustila, laskimonsisäisen ravitsemuksen lisääminen asteittain toteutetaan erityisen huolellisesti ja samalla huolehditaan riittävästä seurannasta sekä tarvittavien elektrolyyttilien, etenkin kaliumin, magnesiumin ja fosfaatin, annosta.

Tämä lääkevalmiste sisältää glukoosia (sokeria), joten se voi vaikuttaa veren sokeripitoisuuteen. Verensokerin seuraamiseksi voidaan ottaa verikokeita.

Jos infusio on vahingossa keskeytynyt äkillisesti, myös veren sokeripitoisuus voi pienentyä äkillisesti. Lääkäri ottaa tämän huomioon, etenkin jos glukoosiaineenvaihduntasi on heikentynyt (esimerkiksi jos sinulla on diabetes) tai jos tästä infusionestettä annetaan alle 3-vuotiaalle lapselle. Tämän vuoksi veren sokeripitoisuutta seurataan tarkkaan etenkin infusio lopettamisen jälkeen.

Myös veren suolojen pitoisuksien, neste- ja hoppo-emästasapainon, verenkuvan, veren hyytymisen sekä munuaisten ja maksan toiminnan seuranta on tarpeen.

Lääkäri varmistaa myös elimistön neste- ja elektrolyyttitarpeiden täyttymisen. Sinulle annetaan Nutriflex peri -valmisteen lisäksi muita ravintoaineita, joilla katetaan ravitsemukselliset tarpeet.

Infusio anto ääreislaskimoihin voi aiheuttaa verisuonitulehduksen, johon liittyy veritulppa. Lääkäri seuraa infusiokohtaa päivittäin.

Kuten kaikkia laskimoon annettavia liuoksia käytettäessä, myös Nutriflex peri -infusion annossa on noudatettava tarkkaa aseptiikkaa.

Lapset ja nuoret

Veren sokeripitoisuuden äkillinen lasku infusio keskeytyessä vahingossa äkillisesti, ks. myös edellä kohta Varoitukset ja varotoimet.

Lääkäri ei anna Nutriflex peri -valmistetta alle 2-vuotiaalle lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Nutriflex peri

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käytänyt tai saatat käyttää muita lääkeitä.

Nutriflex peri -valmisteella saattaa olla yhteisvaikutuksia joidenkin muiden lääkkeiden kanssa. Kerro lääkärille, jos käytät joitakin seuraavista lääkeistä:

- tulehdusen hoitoon käytettävät lääkkeet (kortikosteroidit)
- hormonivalmisteet, jotka vaikuttavat nestetasapainoon (kortikotropiini eli ACTH)
- virtsaneritystä lisäävät lääkkeet (nesteenpoistolääkkeet), kuten spironolaktoni, triamtereeni tai amiloridi
- korkean verenpaineen hoitoon käytettävät lääkkeet (ACE:n estäjät), kuten kaptopriili ja enalapriili
- korkean verenpaineen tai sydänvaivojen hoitoon käytettävät lääkkeet (angiotensiini II -reseptorin salpaajat), kuten losartaani ja valsartaani
- elinsiirtojen jälkeen käytettävät lääkkeet, kuten siklosporiini ja takrolimuusi.

Raskaus, imetyks ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Jos olet raskaana, sinulle annetaan tästä valmistetta vain, jos lääkäri pitää sitä ehdottoman vältämättömänä toipumisesi kannalta.

Imetyks

Imetystä ei suositella, jos äiti tarvitsee laskimoon annettavaa ravitsemushoitoa.

Hedelmällisyys

Tietoja ei ole saatavissa.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Tätä lääkettä annetaan yleensä vuodepotilaille sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa, jolloin ajaminen tai koneiden käyttö ei tule kyseeseen. Lääkkeellä ei kuitenkaan ole itsessään vaikutusta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

3. Miten Nutriflex peri -infusionestettä käytetään

Tätä lääkettä annetaan infuusiona (tipituksena) laskimoon eli pienen putken kautta suoraan suoneen. Tätä lääkettä voidaan antaa pieneen laskimoon (ääreislaskimoon) tai suureen laskimoon (keskuslaskimoon).

Ennen infuusiota liuoksen on aina annettava lämmetä huoneenlämpöiseksi.

Lääkäri päättää, kuinka paljon tästä lääkettä tarvitset ja miten kauan hoito kestää.

Aikuisten suositeltu vuorokausiannos on enintään 40 ml infusionestettä/kg. Lääkäri määrittää täsmällisen annoksen.

Käyttö lapsille ja nuorille

2–17-vuotiaille lapsille ja nuorille on olemassa erityiset annostusta koskevat suositukset. Lääkäri tuntee suositukset ja määrittää annoksen niiden mukaisesti.

Jos saat enemmän Nutriflex peri -infusionestettä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähjeiden saamiseksi.

Kun valmistetta annetaan asianmukaisesti, on epätodennäköistä, että saat yliannostuksen tästä lääkettä. Jos sinulle kuitenkin annetaan liikaa tästä lääkettä, se voi aiheuttaa:

- poikkeuksellisen suuren elimistön nestepitoisuuden (ylinesteyts)

- poikkeuksellisen suuria virtsamääriä (runsasvirtsaisuus)
- elimistön suolatasapainon häiriötä (elektrolyytitasapainon häiriötä)
- nesteen kertymisen keuhkoihin (keuhkopöhö)
- aminohappojen eritymistä virtsaan ja aminohappotasapainon häiriötä
- happamien aineiden kertymistä vereen (metabolinen asidoosi)
- pahoinvointia, oksentelua, vilunväristyksiä, päänsärkyä
- suuren veren typpipitoisuuden (hyperammonemia)
- poikkeuksellisen suuren veren sokeripitoisuuden (hyperglykemia)
- glukoosin eritymisen virtsaan (sokerivirtsaisuus)
- nestevajauksen (kuivumisen)
- paljon normaalista väkeväämän veren (hypersosmolaliteetti)
- erittäin suuresta veren sokeripitoisuudesta johtuvan tajuttomuuden (hyperglykeemis-hyperosmolaarinen kooma).

Jos sinulla ilmenee jokin näistä oireista, infiuusion antaminen lopetetaan välittömästi. Lääkäri päätää tarvittavista lisähoidoista. Infusiota ei aloiteta uudelleen ennen kuin olet toipunut.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset johtuvat pääasiassa yliannostuksesta tai liian nopeasta infuusiossa. Haittavaikutukset häviäävät tavallisesti infuusion keskeyttämisen jälkeen.

Yleiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

- verisuoniärsytsys, verisuonen seinämän tulehdus infuusiodihdassa (laskimotulehdus, laskimotukkotulehdus).

Harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

- pahoinvointi, oksentelu ja heikentyntä ruokahalu.

Jos näitä haittavaikutuksia esiintyy, hoito on lopetettava tai lääkärin päätöksen mukaan hoitoa voidaan jatkaa pienemmällä annoksella.

Jos verisuoniärsytyksen tai verisuonen seinämän tulehdusen oireitä ilmenee, lääkäri voi vaihtaa infuusiokohtaa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Nutriflex peri -infusioneesteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Pidä pussi ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tästä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämääärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nutriflex peri sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat aminohappoja, glukoosi ja elektrolyttejä.

Yksi pussi sisältää sekoittamisen jälkeen:

	1000 ml	2000 ml
Isoleusiini	2,34 g	4,68 g
Leusiini	3,13 g	6,26 g
Lysiinihydrokloridi vastaan lysiinia	2,84 g 2,27 g	5,68 g 4,54 g
Metioniini	1,96 g	3,92 g
Fenyylialaniini	3,51 g	7,02 g
Treoniini	1,82 g	3,64 g
Tryptofaani	0,57 g	1,14 g
Valiini	2,60 g	5,20 g
Arginiinimonoglutamaatti vastaan arginiinia vastaan glutamiinihappoa	4,98 g 2,70 g 2,28 g	9,96 g 5,40 g 4,56 g
Histidiinihydrokloridimonohydraatti vastaan histidiinia	1,69 g 1,25 g	3,38 g 2,50 g
Alaniini	4,85 g	9,70 g
Asparagiinihappo	1,50 g	3,00 g
Glutamiinihappo	1,22 g	2,44 g
Glyysiini	1,65 g	3,30 g
Proliini	3,40 g	6,80 g
Seriini	3,00 g	6,00 g
Magnesiumasetaattitetrahydraatti	0,86 g	1,72 g
Natriumasetaattitrihydraatti	1,56 g	3,12 g
Kaliumdivetyfosfaatti	0,78 g	1,56 g
Kaliumhydroksidi	0,52 g	1,04 g
Natriumhydroksidi	0,50 g	1,00 g
Glukoosimonohydraatti vastaan glukoosia	88,0 g 80,0 g	176,0 g 160,0 g
Natriumkloridi	0,17 g	0,34 g
Kalsiumklorididihydraatti	0,37 g	0,74 g

- Muut aineet ovat sitruunahappomonohydraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Elektrolytit:	1000 ml	2000 ml
Natrium	27,0 mmol	54,0 mmol
Kalium	15,0 mmol	30,0 mmol
Kalsium	2,5 mmol	5,0 mmol
Magnesium	4,0 mmol	8,0 mmol
Kloridi	31,6 mmol	63,2 mmol
Fosfaatti	5,7 mmol	11,4 mmol
Asetaatti	19,5 mmol	39,0 mmol

	1000 ml	2000 ml
Aminohapot	40 g	80 g
Typpi	5,7 g	11,4 g
Hilihydraatit	80 g	160 g

	1000 ml	2000 ml
Aminohappoenergia [kJ (kcal)]	670 (160)	1340 (320)
Hilihydraattienergia [kJ (kcal)]	1340 (320)	2679 (640)
Kokonaisenergia [kJ (kcal)]	2009 (480)	4019 (960)
Teoreettinen osmolariteetti [mOsm/l]	900	900
pH	4,8–6,0	4,8–6,0

Lääke valmis teen kuvaus ja pakkauskoot

Tämä lääke on infuusioneste, ts. se annetaan pienen putken kautta laskimoon.

Nutriflex peri on saatavana infuusiopussissa, jossa on kaksi kammiota. Alakammio sisältää glukoosia ja yläkammio aminohappoliusta. Glukoosi- ja aminohappoliukset ovat kirkkaita ja väritömiä tai vaaleankeltaisia.

Valmiste on saatavana muovisissa 2-kammiopusseissa, jotka sisältävät:

- 1000 ml (400 ml aminohappoliusta + 600 ml glukoosiliusta)
- 2000 ml (800 ml aminohappoliusta + 1200 ml glukoosiliusta)

Pakkauskoot: 5 × 1000 ml, 5 × 2000 ml

Kaikkia pakkauskokoja ei välittämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen, Saksa

Postiosoite:

34209 Melsungen, Saksa

Paikallinen edustaja:

B. Braun Medical Oy

Karvaamokuja 2b

00380 Helsinki

Tämä pakkaus seloste on tarkistettu viimeksi 13.10.2022

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilalisille:

Liuoksen on aina annettava lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen infuusiota.

Nutriflex peri -valmistetta saa käyttää vain, jos liuos on kirkasta ja pussi on vahingoittumaton. Infuusion jälkeen jäljelle jäädynnä liuosta ei saa säilyttää myöhempää käytöö varten.

Liuoksen sekoittaminen

Juuri ennen käytöö kammioiden välinen sisäsauma on avattava, jotta kammioiden sisällöt sekoittuvat aseptisesti.

Poista infuusiopussi suojaruukista ja jatka seuraavasti:

- Suorista pussi ja aseta se tukevalle alustalle.

- Avaa sauma painaan molemmilla käsillä.
- Sekoita kammioiden sisällöt nopeasti keskenään.

Nutriflex peri sisältää lisäysportin lisättävien aineiden sekoittamiseksi.

Lisättäessä Nutriflex peri -infusionesteesseen muita liuoksia tai rasvaemulsiota on noudatettava tarkkaa aseptiikkaa. Rasvaemulsioiden lisäys seokseen on helppoa erityisen siirtolaitteen avulla

Suurin sallittu infuusionopeus

Suurin sallittu infuusionopeus aikuisten sekä 2–17-vuotiaiden lasten ja nuorten hoidossa on 2,5 ml/kg/tunti.

Säilytys sisällön sekoittamisen jälkeen

Kammioiden sisältöjen sekoittamisen jälkeen Nutriflex peri on annettava mieluiten heti. Jos valmistetta ei voida antaa välittömästi, sitä voidaan poikkeustapauksessa säilyttää huoneenlämmössä enintään 7 vuorokautta tai jäärakkipissa 2–8 °C:n lämpötilassa enintään 14 vuorokautta (sisältää infuusioajan). Osittain käytettyjä pakkauksia ei saa säilyttää myöhempää käyttöä varten.

Bipacksedel: Information till användare

Nutriflex peri infusionsvätska, lösning

aminosyror / glukos / elektrolyter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I den här bipackselet finns information om följande:

1. Vad Nutriflex peri är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Nutriflex peri
3. Hur du använder Nutriflex peri
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nutriflex peri ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nutriflex peri är och vad det används för

Denna produkt innehåller substanser (näringsämnen) vid namn aminosyror, salter (elektrolyter) och kolhydrater (glukos) som är nödvändiga för kroppens tillväxt eller återhämtning. Den innehåller även energi i form av kolhydrater.

Produkten ges till dig som dropp i en ven (infusion) på grund av att du inte kan äta tillräckligt eller inte kan sondmatas.

Nutriflex peri är avsett särskilt för vuxna och barn i åldern 2–17 år med mild till medelsvår katabolism, ett tillstånd som innebär att patienterna förbrukar sina lager av bl.a. energi och protein snabbare än dessa lager byggs upp igen.

2. Vad du behöver veta innan du använder Nutriflex peri

Använd inte Nutriflex peri

- om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har en medfödd rubbning i ämnesomsättningen av aminosyror som gör att du behöver en särskild proteindiet
- om du har onormalt höga blodsockervärden som kräver mer än 6 enheter insulin per timme för att hållas under kontroll
- om du har onormalt höga halter av sura ämnen i blodet (acidos)
- om du har blödning inuti skallen eller ryggmärgen
- om du har svårt nedsatt leverfunktion
- om du har svårt nedsatt njurfunktion och inte behandlas med konstgjord njure (hemofiltration eller dialys).

Liksom andra läkemedel av denna typ ska Nutriflex peri inte ges om du har:

- akut fas av en hjärtattack (hjärtinfarkt) eller stroke
- någon metabolisk rubbning som är dåligt kontrollerad, t.ex. medvetslösstillstånd (koma) utan känd orsak eller otillräcklig syretillförsel till vävnaderna eller diabetes som är dåligt kontrollerad

- livshotande cirkulationsstörningar som kan förekomma t.ex. vid kollaps- eller chocktillstånd, ansamling av vätska i lungorna (lungödem) eller störningar i vätskebalansen.

Nutriflex peri ska inte ges till nyfödda, spädbarn eller småbarn under 2 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Nutriflex peri:

- om du har nedsatt hjärt- eller njurfunktion
- om du har rubbningar i vätske-, salt- eller syra-basbalansen, t.ex. för lite vätska och salt i kroppen (hypoton dehydrering) eller låga halter av natrium eller kalium i blodet
- om du har onormalt högt blodsocker.

Särskild försiktighet kommer att iakttas vid justering och övervakning av den dagliga dosen om du har nedsatt funktion i njurar, lever, binjurar, hjärta eller lungor.

Läkaren kommer även att iaktta särskild försiktighet om din blod-hjärnbarriär är skadad, eftersom läkemedlet i sådana fall kan öka trycket inuti skallen eller ryggmärgen.

Om du är svårt undernärd kommer särskild uppmärksamhet att iakttas för att bygga upp din intravenösa näringstillförsel gradvis, åtföljt av tillräckliga kontroller och nödvändig tillförsel av elektrolyter, i synnerhet kalium, magnesium och fosfat.

Detta läkemedel innehåller glukos (socker) vilket kan påverka din blodsockerhalt. Du kan behöva lämna blodprov för att kontrollera detta.

Om infusionen av misstag avbryts plötsligt kan även blodsockerhalten sjunka plötsligt. Läkaren kommer att ta detta i beaktande särskilt om din förmåga att omsätta glukos är försämrat (t.ex. om du har diabetes) eller om barn under 3 år får detta läkemedel. Därför kommer blodsockerhalten att övervakas noggrant särskilt efter att infusionen avbrutits.

Därtill behöver salthalten i blodet, vätskebalansen, syra-basbalansen, blodbild, blodkoagulation samt njur- och leverfunktion kontrolleras.

Läkaren ser även till att ditt behov av vätska och elektrolyter täcks. Utöver Nutriflex peri kommer du även att få andra näringssämnen för att fullständigt täcka dina näringssbehov.

Infusion i perifera vene kan orsaka veninflammation med blodproppsbildning. Läkaren kontrollerar infusionsstället dagligen.

Såsom för alla lösningar som ges i en ven ska strikta aseptiska försiktighetsåtgärder iakttas vid infusion av Nutriflex peri.

Barn och ungdomar

Gällande plötslig sänkning av barnets blodsockerhalt om infusionen av misstag avbryts, se även avsnitt Varningar och försiktighet ovan.

Läkaren kommer inte att ge Nutriflex peri till barn under 2 år.

Andra läkemedel och Nutriflex peri

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Nutriflex peri och vissa andra läkemedel kan påverka varandras effekt. Tala om för läkaren om du använder något av följande läkemedel:

- läkemedel för behandling av inflammation (kortikosteroider)
- hormonpreparat som påverkar vätskebalansen (adrenokortikotrop hormon, ACTH)
- läkemedel som ökar urinutsöndringen (diureтика) såsom spironolakton, triamteren eller amilorid
- läkemedel för behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare) såsom kaptopril och enalapril

- läkemedel för behandling av högt blodtryck eller hjärtproblem (angiotensin-II-receptorantagonister) såsom losartan och valsartan
- läkemedel som används efter organtransplantation såsom ciklosporin och takrolimus.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Om du är gravid kommer du att få detta läkemedel endast om läkaren anser det vara absolut nödvändigt för din återhämtning.

Amning

Amning rekommenderas inte till kvinnor som behöver intravenös näringstillförsel.

Fertilitet

Inga data finns tillgängliga.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel ges vanligen till sängliggande patienter på t.ex. sjukhus eller klinik, vilket utesluter att patienten kör eller använder maskiner. Själva läkemedlet har dock ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

3. Hur du använder Nutriflex peri

Detta läkemedel ges till dig som en infusion (dropp) i en ven, d.v.s. genom ett litet rör direkt i en ven. Det kan ges i en mindre (perifer) eller i en större (central) ven.

Lösningen ska alltid uppnå rumstemperatur före infusionsen ges.

Läkaren ordinerar lämplig dos och behandlingslängd.

Hos vuxna är rekommenderad daglig dos upp till 40 ml infusionsvätska per kg kroppsvikt. Läkaren räknar ut exakt dos.

Användning för barn och ungdomar

Det finns särskilda doseringsriktlinjer för barn och ungdomar i åldern 2–17 år. Läkaren känner till dessa riktlinjer och bestämmer dosen i enlighet med dessa.

Om du har fått för stor mängd av Nutriflex peri

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Det är osannolikt att du skulle få en överdos av detta läkemedel vid korrekt användning. Om du trots allt får för stor mängd av läkemedlet kan detta leda till:

- onormalt hög halt av vätska i kroppen (övervätskning)
- onormalt stora urinmängder (polyuri)
- rubbningar i kroppens saltbalans (elektrolytrubbningsar)
- vätska i lungorna (lungödem)
- förlust av aminosyror i urinen och rubbningar i aminosyrabalansen
- ansamling av sura ämnen i blodet (metabolisk acidos)
- illamående, kräkningar, frossa, huvudvärk
- höga halter av kväve i blodet (hyperammonemi)
- onormalt högt blodsocker (hyperglykemi)

- glukos i urinen (glukosuri)
- vätskebrist (dehydrering)
- att blodet blir mycket mer koncentrerat än normalt (hyperosmolalitet)
- medvetlöshet som orsakas av extremt höga blodsockerhalter (hyperglykemisk hyperosmolär koma).

Om något av dessa symtom inträffar kommer infusionen att avbrytas omedelbart. Läkaren avgör om du behöver ytterligare behandling. Infusionen påbörjas inte pånytt innan du har återhämtat dig.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna orsakas huvudsakligen av överdos eller för snabb infusion. Biverkningarna försvinner vanligen när infusionen avbryts.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- irritation i venen, inflammation i venväggen vid infusionsstället (flebit, tromboflebit)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

- illamående, kräkningar och minskad aptit

Om dessa biverkningar inträffar bör behandlingen antingen avbrytas eller fortsätta med en lägre dos enligt läkarens instruktioner.

Om tecken på irritation i en ven eller inflammation i venväggen inträffar kan läkaren byta till ett annat infusionsställe.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Nutriflex periska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara påsen i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är aminosyror, glukos och elektrolyter.

Efter blandning innehåller en påse:

	1000 ml	2000 ml
Isoleucin	2,34 g	4,68 g
Leucin	3,13 g	6,26 g
Lysinhydroklorid motsvarande lysin	2,84 g 2,27 g	5,68 g 4,54 g
Metionin	1,96 g	3,92 g
Fenylalanin	3,51 g	7,02 g
Treonin	1,82 g	3,64 g
Tryptofan	0,57 g	1,14 g
Valin	2,60 g	5,20 g
Argininmonoglutamat motsvarande arginin motsvarande glutaminsyra	4,98 g 2,70 g 2,28 g	9,96 g 5,40 g 4,56 g
Histidinhydrokloridmonohydrat motsvarande histidin	1,69 g 1,25 g	3,38 g 2,50 g
Alanin	4,85 g	9,70 g
Asparaginsyra	1,50 g	3,00 g
Glutaminsyra	1,22 g	2,44 g
Glycin	1,65 g	3,30 g
Prolin	3,40 g	6,80 g
Serin	3,00 g	6,00 g
Magnesiumacetattetrahydrat	0,86 g	1,72 g
Natriumacetattrihydrat	1,56 g	3,12 g
Kaliumdivätefosfat	0,78 g	1,56 g
Kaliumhydroxid	0,52 g	1,04 g
Natriumhydroxid	0,50 g	1,00 g
Glukosmonohydrat motsvarande glukos	88,0 g 80,0 g	176,0 g 160,0 g
Natriumklorid	0,17 g	0,34 g
Kalciumkloriddihydrat	0,37 g	0,74 g

- Övriga innehållsämnen är citronsyraramonohydrat och vatten för injektionsvätskor.

Elektrolyter:	1000 ml	2000 ml
Natrium	27,0 mmol	54,0 mmol
Kalium	15,0 mmol	30,0 mmol
Kalcium	2,5 mmol	5,0 mmol
Magnesium	4,0 mmol	8,0 mmol
Klorid	31,6 mmol	63,2 mmol
Fosfat	5,7 mmol	11,4 mmol
Acetat	19,5 mmol	39,0 mmol

	1000 ml	2000 ml
Aminosyror	40 g	80 g
Kväve	5,7 g	11,4 g
Kolhydrater	80 g	160 g

	1000 ml	2000 ml
Energi i form av aminosyror [kJ (kcal)]	670 (160)	1340 (320)
Energi i form av kolhydrater [kJ (kcal)]	1340 (320)	2679 (640)
Total energimängd [kJ (kcal)]	2009 (480)	4019 (960)
Teoretisk osmolaritet [mOsm/l]	900	900
pH	4,8–6,0	4,8–6,0

Läke medlets utseende och förpackningsstorlekar

Detta läkemedel är en infusionsvätska, lösning, d.v.s. den ges genom ett litet rör i en ven.

Nutriflex peri kommer i en infusionspåse med två kammare. Den nedre kammaren innehåller glukos och den övre kammaren innehåller aminosyralösning. Lösningarna med glukos och aminosyror är klara och färglösa eller svagt gulaktiga.

Produkten kommer i en plastpåse med två kammare som innehåller:

- 1000 ml (400 ml aminosyralösning + 600 ml glukoslösning)
- 2000 ml (800 ml aminosyralösning + 1200 ml glukoslösning)

Förpackningsstorlekar: 5 x 1000 ml, 5 x 2000 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen, Tyskland

Postadress
34209 Melsungen, Tyskland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

B. Braun Medical Oy
Garverigränden 2b
00380 Helsingfors

Denna bipacks edel ändrades senast 13.10.2022

Följande uppgifter är endast avsedda för helseo- och sjukvårdspersonal:

Låt alltid lösningen uppnå rumstemperatur före infusionen ges.

Använd Nutriflex peri endast om lösningen är klar och påsen oskadad. Eventuell överbliven lösning får aldrig sparas för senare bruk.

Blandning av lösningen:

Förseglingen mellan de två kamrarna ska brytas omedelbart före användning så att innehållet blandas aseptiskt.

Ta ut påsen ur ytterpåsen och gör enligt följande:

- Räta ut påsen och placera den på ett stadigt underlag.
- Bryt förseglingen genom att pressa med båda händerna.

- Blanda snabbt innehållet i kamrarna.

Nutriflex peri har en separat port för tillsatser.

Tillsats av andra lösningar eller fettemulsioner till Nutriflex peri ska ske under strikt aseptiska förhållanden. Fettemulsioner kan enkelt tillsättas med hjälp av ett särskilt överföringsaggregat.

Maximal infusionshastighet:

Den maximala infusionshastigheten hos vuxna samt barn och ungdomar i åldern 2–17 år är 2,5 ml per kg kroppsvekt per timme.

Förvaring efter blandning av innehållet:

Nutriflex peri ska helst användas omedelbart efter att de två lösningarna har blandats. Om detta inte är möjligt kan lösningen i undantagsfall förvaras högst 7 dagar vid rumstemperatur och högst 14 dagar i kylnskåp vid 2–8 °C (inklusive infusionstiden). Delvis använda behållare får inte sparas för senare bruk.