

## Pakkausselostetiedot

**Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml infuusioneeste, liuos**  
**Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml infuusioneeste, liuos**  
**Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml infuusioneeste, liuos**

glukoosi

**Lue tämä pakkausselostetiedot huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausselostetiedot. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävä, käännny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselostetiedossa. Ks. kohta 4.

**Tässä pakkausselostetiedotessa kerrotaan:**

1. Mitä Glucos Fresenius Kabi on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Glucos Fresenius Kabi -infusionestettä
3. Miten Glucos Fresenius Kabi -infusionestettä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Glucos Fresenius Kabi -infusionesteen säilyttäminen
6. Pakauksen sisältö ja muuta tietoa

### 1. Mitä Glucos Fresenius Kabi on ja mihin sitä käytetään

Glucos Fresenius Kabi -infusionestetit ovat kirkkaita, väritömiä glukoosin vesiliuoksia laskimonsisäiseen infuusioon (hidas injektiotapaus), jota kutsutaan myös tiputukseksi laskimoon.

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml ja 100 mg/ml infusionestetit käytetään, kun keho on menettänyt liikaa nestettä (nestevajaus, dehydraatio).

Kaikkia vahvuksia voidaan antaa, kun tarvitaan laskimonsisäistä ravitsemusta, yleensä yhdistettyä aminohappoliuksiuun (proteiiniliuksiuun), vitamiineihin ja lipidiemulsioihin (rasvaemulsioihin).

Tämä pakkausselostetiedot kattaa kolme eri vahvuutta. Näihin liuoksiin viitataan tässä pakkausselostetiedossa yhteisnimellä glukoosiliuos.

### 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Glucos Fresenius Kabi -infusionestettä

**Älä käytä Glucos Fresenius Kabi -infusionestettä**

- jos olet allerginen glukoosille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Tai jos kärsit yhdestä tai useammasta seuraavassa luetelluista tiloista:

- kompensoimaton diabetes, diabeettinen kooma
- muu tunnettu glukoosi-intoleranssi
- tajuttomuuksia, joka johtuu korkeasta veren sokeripitoisuudesta (hyperosmolaarinen kooma)
- korkea veren sokeripitoisuus (hyperglykemia)
- matala veren kaliumpitoisuus (hypokalemia)
- liikaa hoppoja kehossa (metabolinen asidoosi)
- hoitamaton liian runsas virtsaneritys (*diabetes insipidus*)
- heikentynyt munuaisten toiminta ilman mahdollisuutta hemofiltratiaan tai dialyysiin

- verenvuoto aivoissa tai selkäytimessä
- alkoholivieroitus (*delirium tremens*), jos potilaalla on jo nestevajaus
- akuutti shokkitila ja pyörtyminen
- akuutti sydämen vajaatoiminta
- nesteen kertyminen keuhkoihin (keuhkoedeema)
- liikaa nestettä kehossa (hyperhydraatio)
- liian vähän nestettä kehossa ja matala verenpaine (hypotoninen dehydraatio).

Lääkäri tarkistaa nämä.

### **Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Glucos Fresenius Kabi -infusionestettä.

Veren glukoosi- ja elektrolyytipitoisuksia (erityisesti seerumin kalium- ja fosfaattipitoisuksia) ja nestetasapainoa tarkkaillaan säännöllisesti.

Tervydenhuollon ammattilaiset tarkkailevat sinua suuria nestemääriä annettaessa, jos elimistössäsi on liian paljon tai liian vähän nestettä, jos munuaistesi, sydämesi tai keuhkojesi toiminta on vaikea-asteisesti heikentynyt ja/tai jos virtsantuotantosi on vähentynyt.

Glukoosinsietokyky voi olla heikentynyt, jos munuaistesi toiminta on heikentynyt tai jos sinulla on diabetes. Tervydenhuollon ammattilaiset tarkkailevat veresi glukoosi- ja elektrolyytipitoisuutta valmisten annon aikana, jos sinulla on diabetes tai jos munuaistesi toiminta on heikentynyt. Insuliinin ja/tai kaliumin tarve voi olla muuttunut. Lääkäri tarkistaa nämä.

Glukoosilisä voi laukaista tiamiinin ( $B_1$ -vitamiinin) puutosoireyhtymän, jos kärsit aliravitsemuksesta.

Riski on erityisen merkittävä, jos aliravitsemuksen syynä on:

- alkoholin väärinkäyttö
- anoreksia
- pitkääikainen paastoaminen
- olet raskaana ja sinulla on vaikeaa pahoinvointia ja/tai oksentelua.

Lääkäri saattaa päättää antaa sinulle lisää  $B_1$ -vitamiinia ennen glukoosin antoa ja sen aikana.

Glukoosiliuoksen käyttöä ei suositella, jos:

- jonkin aivojen osan verensaanti on heikentynyt (akuutti iskeeminen aivohalvaus), koska korkean veren sokeripitoisuuden on ilmoitettu pahentavan aivovauriota ja estävän paranemista
- olet saanut päävamman viimeksi kuluneen 24 tunnin aikana.

Tervydenhuollon ammattilaiset seuraavat veren sokeripitoisuutta tarkasti sellaisten jaksojen aikana, jolloin aivojen verenpaine on korkea.

Erityistä varovaisuutta noudatetaan, jos antidiureettisen eli nesteiden määrää säätelevän hormonin pitoisuudet elimistössäsi voivat olla korkeat. Antidiureettista hormonia voi olla elimistössäsi liikaa esimerkiksi, jos

- olet äkillisesti ja vakavasti sairastunut
- sinulla on kipuja
- olet ollut leikkauksessa
- sinulla on tulehdusia, palovammoja tai aivosairaus
- sinulla on sydämeen, maksaan, munuaisiin tai keskushermostoon liittyvä sairaus
- otat tiettyjä lääkkeitä.

Tämä voi lisätä veren matalan natriumpitoisuuden riskiä ja aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, kouristuksia, horrostilan (letargia), kooman, aivoturvotusta ja kuoleman. Aivoturvotus lisää kuoleman ja aivovamman riskiä. Aivoturvotuksen riski on suurempi

- lapsilla
- naisilla (etenkin hedelmällisessä iässä olevilla)
- henkilöillä, joilla on ollut aivonesteen määrään liittyviä ongelmia esimerkiksi aivokalvontulehuksen, kallonsisäisen verenvuodon tai aivovamman takia.

### **Muut lääkevalmisteet ja Glucos Fresenius Kabi**

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

On erityisen tärkeää, että kerrot lääkärille, jos käytät antidiureettiseen hormoniin vaikuttavia lääkkeitä.

Tällaisia lääkkeitä voivat olla:

- diabeteslääkeet (klooripropamidi)
- kolesterolilääkkeet (klofibraatti)
- epilepsialääkkeet (karbamatsepiini)
- amfetamiinia muistuttavat valmisteet
- jotkin syöpälääkkeet (vinkristiini, ifosfamidi, syklofosfamidi)
- selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (käytetään masennuksen hoitoon)
- psykoosilääkkeet
- vaikean kivun hoitoon käytettävä opioidit
- tulehduskipulääkkeet (ei-steroidaaliset tulehduskipulääkkeet)
- antidiureettisen hormonin vaikutusta jäljittelevät tai voimistavat lääkkeet, kuten desmopressiini (käytetään lisääntyneen janontunteen ja virtsaamisen hoitoon), terlipressiini (käytetään ruokatorven verenvuodon hoitoon) ja oksitosiini (käytetään synnytyksen käynnistämiseen).

Muita hyponatremian riskiä lisääviä lääkevalmisteita ovat diureetit (nesteenpoistolääkkeet) ja epilepsialääkkeet, kuten okskarbatsepiini.

### **Raskaus ja imetyks**

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Glukoosin katsotaan olevan turvallista annossuositusten mukaan käytettynä.

Erityistä varovaisuutta on noudatettava hyponatremian riskin vuoksi, kun tästä lääkevalmistetta annetaan raskaana oleville naisille synnytyksen aikana erityisesti, jos sitä annetaan yhdessä oksitosiimin (hormoni, jota saatetaan antaa synnytyksen käynnistämiseksi ja verenvuodon hillitsemiseksi) kanssa.

### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Glucos Fresenius Kabi ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

### **3. Miten Glucos Fresenius Kabi -infusionestettä käytetään**

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa sinulle glukoosiliuosta. Se annetaan tipituksena laskimoon (laskimonsisäinen infuusio) tai injektiona ihmelle riippuen siitä, mitä glukoosiliuoksen vahvuutta käytetään.

Lääkäri päättää sinulle sopivan annoksen sekä milloin ja kuinka se annetaan. Lääkäri ottaa päätöksessään huomioon ikäsi, painosi, fyysisen tilasi ja muut saamasi hoidot.

Ennen infuusiota ja sen jälkeen lääkäri seuraa elimistöi nestemäärästä, veren ja virtsan happopitoisuutta ja veren elektrolyytipitoisuutta (erityisesti natriumpitoisuutta) (pääasiassa potilailla, joilla antidiureettisen hormonin pitoisuus elimistössä on korkea tai jotka käyttävät muita antidiureettisen hormonin toimintaa voimistavia lääkevalmisteita).

## **Jos käytät enemmän Glucos Fresenius Kabi -infusioneesta kuin sinun pitäisi**

Terveydenhuollon ammattilaiset antavat sinulle glukoosiliuosta ja siksi on epätodennäköistä, että saisit suuremman annoksen kuin sinun pitäisi. Jos sinulle annetaan vahingossa yliannos, valmisteen anto lopetetaan ja saat oireista riippuvaa hoitoa.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Osmoottista diureesia (lisääntynyt virtsaamista), joka voi johtaa elimistön kuivumiseen, voi esiintyä, jos annossuositukset ylitetään.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia:

### **Tunte maton (saatavilla oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)**

- lisääntynyt virtsantuotanto (polyuria)
- korkea veren sokeripitoisuus (hyperglykemia), nestevajaus (dehydraatio) ja elektrolyyttiepätasapaino, kuten veren matala kaliumpitoisuus (hypokalemia), magnesiumpitoisuus (hypomagnesemia) ja fosfaattipitoisuus (hypofosfatemia)
- antotekniikkaan liittyvät haittavaikutukset, kuten kehon lämpötilan nousu, injektiokohdan tulehdus, paikallinen kipu tai reaktio, laskimon ärsytys, laskimon tulehdus liuoksen antokohdassa (laskimotromboosi tai flebiitti), liuoksen antaminen vahingossa laskimon ulkopuolelle (ekstravasaatio, joka voi aiheuttaa kudoksen vaurioitumisen) tai kehon liiallinen nestemääärä (hypervolemia) ja nesteen kertyminen (edeema) yliannoksen vuoksi.
- Päänsärky, pahoinvointi, kouristukset, horrostila (letargia) ja oksentelu. Syynä voi olla veren alhainen natriumpitoisuus (hyponatremia). Alhainen natriumpitoisuus voi aiheuttaa aivovammaan ja kuolemaan johtavan aivoturvotuksen (ks. myös Varoitukset ja varotoimet).

Korkeita veren glukoosipitoisuuksia (hyperglykemia), glukoosia virtsassa (glukosuria) ja nestettä keuhkoissa (keuhkoedeema) voi ilmetä, jos liuosta annetaan liian nopeasti.

Hoidon aikana terveydenhuollon ammattilaiset saattavat tarkkailla sinua. Jos jokin haittavaiketus muuttuu vakavaksi, lääkäri tai sairaanhoitaja pystyy auttamaan sinua. Jos olet huolissasi haittavaikutuksista, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa.

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

## **5. Glucos Fresenius Kabi -infusioneen säilyttäminen**

*Freeflex-infusioipussi*

50 mg/ml: Säilytä alle 25 °C.

100 mg/ml: Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

200 mg/ml: Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

#### *Kabipac-infusiopiullo*

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä pussissa ja laatikossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärä EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tästä lääkettä, jos huomaat näkyviä hiukkasia tai pakkaus on vahingoittunut.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Nämä menetellen suojelet luontoa.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

### **Mitä Glucos Fresenius Kabi sisältää**

- Vaikuttava aine on glukoosi 50 mg/ml, 100 mg/ml tai 200 mg/ml (monohydraattina).
- Muut aineet ovat kloorivetyhappo (pH:n säättöön, vain 50 mg/ml ja 100 mg/ml), natriumhydroksidi (pH:n säättöön, vain 50 mg/ml ja 100 mg/ml) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot**

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml and 100 mg/ml ovat kirkkaita, värittömiä ja steriilejä liuoksia, joissa ei ole elektrolyttejä eikä näkyviä hiukkasia. 50 mg/ml on isotoninen, 100 mg/ml on hypertoninen.

Glukos Fresenius Kabi 200 mg/ml on kirkas, väritön tai kellertävä, hypertoninen ja steriili liuos, jossa ei ole elektrolyttejä eikä näkyviä hiukkasia.

Sitä on saatavilla seuraavissa pakkauksissa ja pakkausko'oissa:

#### Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml

*Polypropyleeni-infusiopiussi (Freeflex), jossa on injektioportti neulaa varten tai (Freeflex+), jossa on lisäysportti (luer lock) neulattomaan käyttöön:*

40 x 50 ml	40 x 100 ml	20 x 250 ml	15 x 500 ml	10 x 1000 ml
60 x 50 ml	50 x 100 ml	30 x 250 ml	20 x 500 ml	
65 x 50 ml	55 x 100 ml	35 x 250 ml		
70 x 50 ml	60 x 100 ml	40 x 250 ml		

*Polypropyleeni-infusiopiussi (Freeflex), jossa on injektioportti injektiopulloa varten (ProDapt):*

40 x 50 ml	40 x 100 ml	20 x 250 ml
60 x 50 ml	50 x 100 ml	30 x 250 ml
65 x 50 ml	55 x 100 ml	35 x 250 ml
70 x 50 ml	60 x 100 ml	40 x 250 ml

*Polyetyleenipullot (Kabipac):*

10 x 100 ml	10 x 250 ml	10 x 500 ml	10 x 1000 ml
40 x 100 ml	20 x 250 ml	20 x 500 ml	
	30 x 250 ml	30 x 500 ml	

#### Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml

*Polypropyleeni-infusiopiussi (Freeflex), jossa on injektioportti neulaa varten tai (Freeflex+), jossa on lisäysportti (luer lock) neulattomaan käyttöön:*

15 x 500 ml      10 x 1000 ml

20 x 500 ml

*Polyetyleenipullot (Kabipac):*

10 x 100 ml      10 x 250 ml      10 x 500 ml      10 x 1000 ml

40 x 100 ml      20 x 250 ml      20 x 500 ml  
30 x 500 ml

**Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml**

*Polypropyleeni-infusiopiussi (Freeflex), jossa on injektioportti neulaa varten:*

15 x 500 ml      10 x 1000 ml

20 x 500 ml

Kaikkia pakkauskokoja ei vältämättä ole myynnissä.

**Myyntiluvan haltija**

Fresenius Kabi AB, Uppsala, Ruotsi

**Valmistaja**

HP Halden Pharma AS, Halden, Norja tai

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, Saksa tai

Fresenius Kabi France, Louviers Cedex, Ranska tai

Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o., Kutno, Puola

**Tämä pakausselostet tarkistettu viimeksi 5.2.2024.**

---

**Seuraavat tiedot on tarkoitetut vain hoitoalan ammattilaistille:**

Nesteen ja energian tarve riippuu potilaan iästä, painosta sekä metabolisesta ja kliinisestä tilasta. Hoitavan lääkärin tulee määritellä annos ja antonopeus.

Aikuisille suositellaan suurimmaksi infuusionopeudeksi 0,25 g glukoosia/painokg/h, maksimiannos vuorokaudessa on 6 g glukoosia/painokg.

Lapsille suositellaan suurimmaksi infuusionopeudeksi 0,8–1,5 g glukoosia/painokg/h, päivään annos esitetään taulukossa.

**Suositeltu parenteraalinen glukoosiannos lapsille (g/painokg/vrk)**

Kehon paino (kg)	Päivä 1	Päivä 2	Päivä 3	Päivä 4
< 3	10	14	16	18
3–10	8	12	14	16–18
10–15	6	8	10	12–14
15–20	4	6	8	10–12
20–30	4	6	8	< 12
> 30	3	5	8	< 10

Glukoosi infuusionestettä ei saa antaa samalla nesteensiirtolaitteella samanaikaisesti veren kanssa tai ennen tai jälkeen sen annon.

Veren glukoosi ja elektrolyytipitoisuudet ja nestetasapaino on tarkistettava säännöllisesti. Seerumin

kaliumpitoisuuden sekä ja veren glukoosi- ja fosfaattipitoisuksien seuranta on erityisen tärkeää. Glukoosia sisältävän parenteraalisen ravitsemuksen ja matalan fosfaattipitoisuuden välillä on havaittu yhteys. Hypofosfatiemissa suositellaan ylimääräistä fosfaattilisää.

#### *Yleiset ohjeet*

Hyponatremian riskin vuoksi nestetasapainoa, seerumin glukoosin, seerumin natriumin ja muiden elektrolyyttien pitoisuksia voi olla tarpeen seurata ennen annostelua ja sen aikana erityisesti potilailla, joilla on lisääntynyt ei-osmoottinen antidiureettisen hormonin vapautuminen (antidiureettisen hormonin liikaerityshäiriö, SIADH), ja potilailla, jotka saavat samanaikaisesti vasopressiiniagonisteja. Seerumin natriumpitoisuuden seuranta on erityisen tärkeää valmisteilla, joiden natriumpitoisuus on alhaisempi kuin seerumin natriumpitoisuus. Glucos Fresenius Kabi -infuusion jälkeen glukoosin kuljetus soluihin tapahtuu nopeasti ja aktiivisesti. Tämä lisää vapaan veden määrää elimistössä ja saattaa johtaa vaikeaan hyponatremiaan.

## Bipacksedel: Information till användaren

**Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml infusionsvätska, lösning**  
**Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml infusionsvätska, lösning**  
**Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml infusionsvätska, lösning**

glukos

**Läs noga igenom den här bipackse delen innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I den här bipackse delen finns information om följande:**

1. Vad Glucos Fresenius Kabi är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Glucos Fresenius Kabi
3. Hur du använder Glucos Fresenius Kabi
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Glucos Fresenius Kabi ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### **1. Vad Glucos Fresenius Kabi är och vad det används för**

Glucos Fresenius Kabi infusionsvätska, lösning är en klar lösning av glukos i vatten för intravenös infusion (långsam injektion), även kallad dropp i en ven.

Glucos Fresenius Kabi 50 och 100 mg/ml används när kroppen har förlorat mycket vatten (dehydrering).

Alla styrkor kan ges när intravenös näring behövs, oftast i kombination med aminosyra- (protein-)lösningar, vitaminer och lipid- (fett-) emulsioner.

Denna bipacksedel omfattar tre olika styrkor. Dessa lösningar kommer kollektivt att benämnes Glucos Fresenius Kabi i denna bipacksedel.

### **2. Vad du behöver veta innan du använder Glucos Fresenius Kabi**

#### **Använd inte Glucos Fresenius Kabi**

- om du är allergisk mot glukos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Eller om du har av en eller flera av följande:

- Obehandlad diabetes, diabeteskoma
- Annan känd glukosöverkänslighet
- Medvetslöshet som följd av högt blodsocker (hyperosmolär koma)
- Högt blodsocker (hyperglykemi)
- Låga nivåer av kalium i blodet (hypokalemia)
- För mycket syra i kroppen (metabolisk acidosis)
- Obehandlad utsöndring av stora mängder urin (*diabetes insipidus*)

- Nedsatt njurfunktion utan möjlighet till hemofiltration eller dialys
- Blödning i hjärnan eller ryggraden
- Alkoholabstinens (*delirium tremens*) om patienten redan är uttorkad
- Akut chocktillstånd och kollaps
- Akut hjärtsvikt
- Vätskeansamling i lungorna (lungödem)
- För mycket vätska i kroppen (hyperhydrering)
- Inte tillräckligt med vätska i kroppen, med lågt blodtryck (hypotonhydrering).

### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Glucos Fresenius Kabi.

Blodsocker, elektrolyter (speciellt serumkalium och fosfat) och vätskebalans ska kontrolleras regelbundet.

Vårdpersonal kommer att övervaka dig vid infusion av stora volymer om du har för mycket eller inte tillräckligt med vätska i kroppen, kraftigt nedsatt funktion av njurar, hjärta och lungor och/eller minskad urinproduktion.

Glukostoleransen kan sjunka om du har nedsatt njurfunktion eller diabetes. Vårdpersonal kommer att övervaka dina glukosnivåer och elektrolyter under administrering om du är diabetiker eller har nedsatt njurfunktion. Dina behov av insulin och/eller kalium kan ändras. Din läkare kommer att kontrollera dessa.

Om du är undernärd kan infusion av kolhydrater utlösa ett tiaminbristsyndrom (vitamin B<sub>1</sub>). Detta gäller särskilt om orsaken till undernäring är:

- alkoholmissbruk
- anorexi
- fasta under en lång tid
- om du är gravid och har kraftigt illamående och/eller kräkningar.

Läkaren kan besluta att ge dig extra vitamin B<sub>1</sub> före och under administreringen av glukos.

Användning av glukoslösning rekommenderas inte om:

- tillförseln av blod till en del av hjärnan minskar (akut ischemisk stroke) eftersom högt blodsocker har rapporterats öka hjärnskador och försämra läkningen
- du har fått en huvudskada under de senaste 24 timmarna

Blodsockernivån kommer att övervakas noga av medicinsk personal vid högt blodtryck i hjärnan.

Särskild försiktighet kommer att iakttas om du har en sjukdom eller ett tillstånd som kan ge upphov till höga nivåer vasopressin, ett hormon som reglerar mängden vätska i kroppen. Du kan ha för mycket vasopressin i kroppen t.ex. om:

- du har drabbats av en plötslig och allvarlig sjukdom
- du har smärta
- du har genomgått en operation
- du har infektioner, brännskador eller en hjärnsjukdom
- du har sjukdomar som är förknippade med hjärtat, levern, njurarna eller centrala nervsystemet
- du tar vissa läkemedel.

Detta kan öka risken för låga natriumnivåer i blodet vilket kan orsaka huvudvärk, illamående, kramper, håglöshet, koma, svullnad i hjärnan och dödsfall. Svullnad i hjärnan ökar risken för dödsfall och hjärnskada. Följande patienter löper ökad risk för svullnad i hjärnan:

- barn
- kvinnor (framför allt i fertil ålder)

- patienter som har problem med vätskebalansen i hjärnan t.ex. på grund av hjärnhinneinflammation, blödning i skallen eller hjärnskada.

### **Andra läkemedel och Glucos Fresenius Kabi**

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du tar läkemedel som påverkar hormonet vasopressin. Sådana läkemedel kan vara:

- diabetesläkemedel (klorpropamid)
- kolesterolläkemedel (klofibrat)
- epilepsiläkemedel (karbamazepin)
- amfetaminliknande läkemedel
- vissa cancerläkemedel (vinkristin, ifosfamid, cyklofosfamid)
- selektiva serotoninåteruptagshämmare (använts för behandling av depression)
- antipsykotika
- opioider (morphinliknande läkemedel) som används för behandling av svår smärta
- läkemedel mot smärta och inflammation (så kallade icke-steroida antiinflammatoriska medel, NSAID)
- läkemedel som liknar eller förstärker vasopressins effekt, såsom desmopressin (använts för behandling av ökad törst och urinering), terlipressin (använts för behandling av blödning i matstrupen) och oxytocin (använts för igångsättning av förlossning).

Andra läkemedel som också ökar risken för låga natriumnivåer är diuretika (vätskedrivande läkemedel) och epilepsiläkemedel, såsom oxkarbazepin.

### **Graviditet och amning**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel. Glukos anses säkert när det används enligt rekommendationerna.

Detta läkemedel bör ges med särskild försiktighet till gravida kvinnor under förlossning, särskilt om det kombineras med oxytocin (ett hormon som kan användas för att framkalla värkar och kontrollera blödning) på grund av risken för låga natriumnivåer.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Glucos Fresenius Kabi har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

## **3. Hur du använder Glucos Fresenius Kabi**

Glucos Fresenius Kabi kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska. Det kommer att ges till dig som dropp i en ven (intravenös infusion) eller som en injektion under huden beroende på vilken styrka av Glucos Fresenius Kabi som används.

Din läkare kommer att bestämma den rätta dosen för dig och när den ska ges. Läkaren kommer att betänka din ålder, vikt, fysiska tillstånd och vilka andra behandlingar du får.

Före och efter infusionen kommer läkaren att följa upp kroppens vätskebalans, syranivån i blodet och urinen och elektrolytnivån (framför allt natrium) i blodet (huvudsakligen hos patienter som har höga nivåer av vasopressin eller som tar läkemedel som ökar dess effekter).

### **Om du använder mer Glucos Fresenius Kabi än du borde**

Glucos Fresenius Kabi ges av sjukvårdspersonal, det är därför osannolikt att du skulle få en större dos än vad du borde. Om du av misstag fått en överdos kommer administreringen att avbrytas och du kommer att få behandling beroende på symtomen.

#### **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om doseringsrekommendationerna överskrids kan osmotisk diures (ökad urinproduktion) som kan leda till uttorkning uppstå.

Andra eventuella biverkningar inkluderar:

##### **Har rapporterats (före kommer hos ett okänt antal användare)**

- Ökad urinproduktion (polyuri)
- Högt blodsocker (hyperglykemi), uttorkning och elektrolytbalans, t.ex. låga nivåer av kalium (hypokalemia), magnesium (hypomagnesemi) och fosfat (hypofosfatemi) i blodet
- Biverkningar relaterade till administreringsteknik inklusive feber, infektion vid injektionsstället, lokal smärta eller reaktion, venös irritation, inflammation i venen där lösningen ges (ventrombos eller flebit), oavsiktlig administrering av lösningen utanför venen (extravasation, som kan skada vävnaden) eller för mycket vätska i kroppen (hypervolemi) och vätskeansamling (ödem) som orsakas av överdosering.
- Huvudvärk, illamående, kramper, håglöshet och kräkningar. Detta kan orsakas av låg nivå av natrium i blodet (hyponatremi). Låg natriumnivå kan leda till hjärnskada och dödsfall till följd av svullnad i hjärnan (se även ”Varningar och försiktighet”).

Högt blodsocker (hyperglykemi), glukos i urinen (glukosuri) och vätska i lungorna (lungödem) kan förekomma om lösningen administreras för snabbt.

Du kan övervakas av sjukvårdspersonal under behandlingen. Om någon biverkan blir värre kommer läkaren eller sjuksköterskan att hjälpa dig. Om biverkningar oroar dig, prata med läkare eller sjuksköterska.

##### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

I Sverige  
Läkemedelsverket  
Box 26  
751 03 Uppsala  
[www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

I Finland  
webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)  
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea  
Biverkningsregistret  
PB 55  
00034 FIMEA

## **5. Hur Glucos Fresenius Kabi ska förvaras**

### *Freeflex-infusionspåse*

50 mg/ml: Förvaras vid högst 25 °C.

100 mg/ml: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

200 mg/ml: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

### *Kabipac-infusionsflaska*

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på påsen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om du ser synliga partiklar eller om behållaren är skadad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningsinnehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är glukos 50 mg/ml, 100 mg/ml eller 200 mg/ml (som glukosmonohydrat).
- Övriga innehållsämnen är saltsyra (pH-justering, endast 50 mg/ml och 100 mg/ml), natriumhydroxid (pH-justering, endast 50 mg/ml och 100 mg/ml), vatten för injektionsvätskor.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml och 100 mg/ml är klara, färglösa, och sterila lösningar utan elektrolyter och synliga partiklar. 50 mg/ml är isoton, 100 mg/ml är hyperton.

Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml är en klar, färglös till svagt gul, hyperton, och steril lösning utan elektrolyter och synliga partiklar.

Den finns i följande behållare och förpackningsstorlekar:

#### Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml

*Freeflex (påse av polypropen) med injektionsport för nål, alternativt Freeflex+ med injektionsport för luer-lock:*

40 x 50 ml	40 x 100 ml	20 x 250 ml	15 x 500 ml	10 x 1000 ml
60 x 50 ml	50 x 100 ml	30 x 250 ml	20 x 500 ml	
65 x 50 ml	55 x 100 ml	35 x 250 ml		
70 x 50 ml	60 x 100 ml	40 x 250 ml		

*Freeflex (påse av polypropen) med injektionsport för injektionsflaska (ProDapt):*

40 x 50 ml	40 x 100 ml	20 x 250 ml
60 x 50 ml	50 x 100 ml	30 x 250 ml
65 x 50 ml	55 x 100 ml	35 x 250 ml
70 x 50 ml	60 x 100 ml	40 x 250 ml

*KabiPac (flaska av polyetylen):*

10 x 100 ml	10 x 250 ml	10 x 500 ml	10 x 1000 ml
40 x 100 ml	20 x 250 ml	20 x 500 ml	
	30 x 250 ml	30 x 500 ml	

Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml

*Freeflex (påse av polypropen) med injektionsport för nål, alternativt Freeflex+ med injektionsport för luer-lock:*

15 x 500 ml      10 x 1000 ml  
20 x 500 ml

*KabiPac (flaska av polyetylen):*

10 x 100 ml	10 x 250 ml	10 x 500 ml	10 x 1000 ml
40 x 100 ml	20 x 250 ml	20 x 500 ml	
	30 x 500 ml		

Glucos Fresenius Kabi 200 mg/ml

*Freeflex (påse av polypropen) med injektionsport för nål:*

15 x 500 ml      10 x 1000 ml  
20 x 500 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

**Innehavare av godkännande för försäljning**

Fresenius Kabi AB, Uppsala, Sverige

**Tillverkare**

HP Halden Pharma AS, Halden, Norge eller  
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, Tyskland eller  
Fresenius Kabi France, Louviers Cedex, Frankrike eller  
Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o., Kutno, Polen

**Denna bipacksedel ändrades senast 5.2.2024.**

---

**Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:**

Behovet av vätskor och energi beror på patientens ålder, kroppsvekt, metabola status och kliniska tillstånd. Dosering och administreringshastighet bör bestämmas av den behandlande läkaren.

Till vuxna rekommenderas en maximal infusionshastighet på 0,25 g glukos/kg kroppsvekt/timme med en maximal daglig dos på 6 g glukos/kg kroppsvekt.

*Pediatrisk population*

Till barn rekommenderas en maximal infusionshastighet på 0,8–1,5 g glukos/kg kroppsvekt/timme och det dagliga behovet av glukos visas i tabellen.

Rekommenderad parenteral glukostillförseln för barn (g/kg kroppsvekt och dag)

Kroppsvekt (kg)	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4
< 3	10	14	16	18
3–10	8	12	14	16–18
10–15	6	8	10	12–14
15–20	4	6	8	10–12
20–30	4	6	8	< 12

> 30	3	5	8	< 10
------	---	---	---	------

Glucos Fresenius Kabi kan inte administreras genom samma infart som blod, inte före, under eller efter.

Blodsocker, elektrolyter och vätskebalans ska kontrolleras regelbundet. Övervakning av serumkalium, blodsocker och fosfat är särskilt viktigt. Ett samband mellan parenteral nutrition med glukos och låga fosfatsnivåer har observerats. Extra fosfat rekommenderas för patienter med hypofosfatemi.

#### *Allmänna råd*

Vätskebalans, serumglukos, serumnatrium och andra elektrolyter kan behöva kontrolleras före och under administrering, särskilt hos patienter med ökad icke-osmotiskt vasopressinfrisättning (inadekvat ADH-sekretion, SIADH) och hos patienter som samtidigt behandlas med vasopressinagonister på grund av risken för hyponatremi.

Kontroll av serumnatrium är särskilt viktigt vid behandling med intravenösa vätskor som har lägre natriumkoncentration än patientens serumnatrium. Efter infusion av Glucos Fresenius Kabi uppstår en snabb aktiv glukotransport in i kroppens celler. Detta tillstånd främjar en effekt som kan anses som tillförsel av fritt vatten och kan leda till svår hyponatremi.