

### **1.3.1 Pakkausseloste**

## **Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle**

### **Donaxyl 10 mg emätinpuikko, tabletti Dekvaliniumkloridi**

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

#### **Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Donaxyl on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Donaxyl-valmistetta
3. Miten Donaxyl-valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Donaxyl-valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. MITÄ DONAXYL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN**

Dekvaliniumkloridi, Donaxyl-emätinpuikon vaikuttava aine, kuuluu infektiolääkkeisiin ja antiseptisiin lääkkeisiin. Dekvaliniumkloridi tehoaa bakteereihin, jotka aiheuttavat emätininfektioita.

Donaxyl-valmistetta käytetään bakteerivaginoosin hoitamiseen. Se asetetaan emättimeen infektion paikallishoidoksi.

Dekvaliniumkloridia, jota Donaxyl sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

#### **2. MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT DONAXYL-VALMISTETTA**

##### **Älä käytä Donaxyl-valmistetta**

- jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle, dekvaiumkloridille, tai tämän lääkkeen jollekin muulle ainesosalle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on haavaumia emättimessä tai kohdunkaulassa
- jos sinulla ei ole vielä ollut ensimmäisiä kuukautisia.

##### **Varoitukset ja varotoimet**

Donaxyl-hoidon aikana ei ole suositeltavaa käyttää emättimen sisällä saippuota tai spermisidejä tai tehdä emätinhuuhteita.

Kuten kaikkien emätininfektioiden kohdalla, suojaamatonta yhdyntää Donaxyl-hoidon aikana ei suositella.

Donaxyl ei heikennä lateksikondomien toimintaa.

Tämä tuote saattaa heikentää lateksittomien kondomien tai pessaarien tehokkuutta. Sen vuoksi sinun on käytettävä muuta raskaudenehkäisyä vähintään 12 tunnin ajan hoidon jälkeen.

Donaxyl-valmistetta ei saa käyttää 12 tunnin sisällä ennen synnytystä, jotta saadaan minimoitua vastasyntyneen altistus dekaliniumkloridille. Kerro lääkärille, jos olet käyttänyt valmistetta 12 tunnin sisällä ennen synnytystä.

Hoito on keskeytettävä runsaan kuukautisvuodon ajaksi ja sitä on jatkettava sen jälkeen.

Keskustele lääkärin kanssa, jos oireet jatkuvat tai uusiutuvat hoidon päätyttyä.

### **Lapset ja nuoret**

Donaxylin käytöstä lapsilla ja alle 18-vuotiailla ei ole riittävästi kokemusta.

### **Yli 55-vuotiaat ja iäkkäät naiset**

Donaxylin käytöstä yli 55-vuotiailla naisilla ei ole riittävästi kokemusta.

### **Muut lääkevalmisteet ja Donaxyl**

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

### **Raskaus ja imetys**

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos imetät tai aiot imettää.

Aiemman kokemuksen ja Donaxyl-valmisteen paikallisen vaikutuksen perusteella haitallisia vaikutuksia raskauteen ja/tai syntymättömään lapseen tai imetettävään lapseen ei odoteta. Donaxyl-valmistetta pitäisi käyttää raskauden ja imetyksen aikana vain, jos se on lääketieteellisesti tarpeen.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Donaxyl ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa tai käyttää koneita. Tutkimuksia ei ole tehty.

## **3. MITEN DONAXYL-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suosittelun annos on 1 emätinpuikko päivittäin 6 vuorokauden ajan.

### **Käyttöohjeet**

- Käytä joka ilta ennen nukkumaanmenoa.
- Pese kätesi ennen läpipainopakkauksen avaamista.
- Asetu selinmakuulle jalat hieman koukussa. Työnnä yksi emätinpuikko syvälle emättimeen.
- Hoito on keskeytettävä runsaan kuukautisvuodon ajaksi ja sitä on jatkettava sen jälkeen.

- Älä lopeta hoitoa ennenaikaisesti, vaikkei sinulla olisikaan enää epämurkavaa tunnetta (esim. kutinaa, vuotoa tai hajua). Alle kuuden päivän hoito voi aiheuttaa oireiden uusiutumisen.
- Donaxyl sisältää ainesosia, jotka eivät liukene kokonaan, ja emätinpuikon jäänteitä löytyy ajoittain alusvaatteista. Tämä ei vaikuta hoidon tehokkuuteen. Emätinpuikko ei värjää alusvaatteita, mutta oman mukavuuden vuoksi voit käyttää terveysidettä tai pikkuhousunsuojaa.
- Jos emättimesi on kuiva, emätinpuikko ei ehkä liukene ja tulee ulos kokonaisuena. Tämän seurauksena hoito ei ole optimaalista. Tässä tapauksessa emätinpuikkoa voidaan kostuttaa vesitipalla ennen sen asettamista emättimeen.

Jos sinulla on vaikutelma, että Donaxyl-valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro siitä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

### **Jos käytät enemmän Donaxyl-valmistetta kuin sinun pitäisi**

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Suuremman vuorokausiannoksen käyttäminen tai suositellun keston pidentäminen voi suurentaa emättimen haavaumien vaaraa.

Jos olet vahingossa käyttänyt liian monta emätinpuikkoa, kerro asiasta lääkärille.

### **Jos unohtat käyttää Donaxyl-valmistetta**

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi emätinpuikon.

### **Jos lopetat Donaxyl-valmisteen käyttämisen**

Alle kuuden päivän hoito voi aiheuttaa oireiden uusiutumisen. Älä siis lopeta hoitoa ennenaikaisesti, vaikkei sinulla olisikaan enää epämurkavaa tunnetta (esim. kutinaa, vuotoa tai hajua).

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

## **4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Useimmat haittavaikutukset ovat lieviä ja lyhytkestoisia.

Joskus emätininfektioiden oireet (kuten kutina, polttelu ja vuoto) voivat pahentua hoidon alussa, ennen kuin oireet alkavat parantua. Jatka hoitoa, mutta jos oireet jatkuvat, kysy lääkäriltä neuvoa mahdollisimman pian.

### **Yleiset (voivat esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä)**

- Emätinvuoto, emättimen kutina tai emättimen polttelu
- Emättimen hiivatulehdus

### **Melko harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta)**

- Emättimen verenvuoto, emättimen kipu
- Tulehdus emättimessä ja ulkoisissa sukupuolielimissä
- Bakterivaginoosi
- Ihon sieni-infektio
- Päänsärky
- Pahoinvointi

### **Esiintymistiheys ei tiedossa (ei voida arvioida saatavilla olevien tietojen perusteella)**

- Emättimen limakalvon haavaumat, jos emättimen limakalvo oli vaurioitunut jo ennen hoitoa
- Kohtuverenvuoto
- Punoitus tai emättimen kuivuus
- Virtsarakkotulehdus
- Allerginen reaktio, johon liittyy sellaisia oireita kuin ihottuma, turvotus tai kutina.
- Kuume

### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle:

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

## **5. DONAXYL-VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pahvikotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei edellytä erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteen mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## **6. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA TIETOA**

### **Mitä Donaxyl sisältää**

Vaikuttava aine on dekvaliniumkloridi.

Yksi emätinpuikko sisältää 10 mg dekvaliniumkloridia.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, selluloosa, mikrokiteinen ja magnesiumstearaatti.

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)**

Donaxyl-emätinpuikot ovat valkoisia tai lähes valkoisia, soikeita ja kaksoiskuperia ja niiden likimääräinen pituus on 19 mm, leveys 12 mm ja paksuus 6,3 mm.

Emätinpuikkoja on saatavana pakkauksissa, joissa on 6 emätinpuikkoa sisältävä läpipainopakkaus.

### **Myyntiluvan haltija ja valmistaja**

#### **Myyntiluvan haltija:**

Campus Pharma AB

Karl Gustavsgatan 1A

41125 Göteborg

Ruotsi

**Valmistaja:**

Haupt Pharma Amareg GmbH  
Donaustauer Strasse 378  
93055 Regensburg  
Saksa

**Tällä lääkkeellä on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Pohjois-Irlannissa) seuraavilla kauppanimillä:**

Jäsenvaltio	-	Lääkevalmisteen nimi
Saksa	-	Fluomizin 10 mg Vaginaltableten
Tsekin tasavalta	-	Naxyl 10 mg vaginální tablety
Belgia	-	Fluomizin 10 mg tabletten voor vaginaal gebruik
Italia	-	Fluomizin 10 mg compresse vaginali
Luxemburg	-	Fluomizin 10 mg comprimés vaginaux
Itävalta	-	Fluomizin 10 mg Vaginaltableten
Puola	-	Fluomizin 10 mg tabletki dopochwowe
Slovakia	-	Fluomizin 10 mg vaginálne tablety
Espanja	-	Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales
Suomi-		Donaxyl 10 mg emätinpuikko, tabletti
Unkari	-	Fluomizin
Norja	-	Donaxyl 10 mg vaginaltabletter
Ruotsi	-	Donaxyl
Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)	-	Fluomizin 10 mg vaginal tablets
Viro	-	Donaxyl 10 mg vaginaalne tablett
Ranska	-	Fluomizin 10 mg comprimés vaginaux
Kroatia	-	Fluomizin 10 mg tablete za rođnicu
Liettua	-	Donaxyl 10 mg makšties tabletės
Latvia	-	Donaxyl 10 mg vaginālās tabletes
Slovenia	-	Fluomizin 10 mg vaginalne tablete

**Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 07.09.2022**

**Muut tiedonlähteet**

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean verkkosivulla [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi).

## BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

### Donaxyl 10 mg vaginaltabletter dekvaliniumklorid

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Donaxyl är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Donaxyl
3. Hur du använder Donaxyl
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Donaxyl ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### 1. VAD DONAXYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Dekvaliniumklorid, den aktiva substansen i Donaxyl tillhör familjen antiinfektösa och antiseptiska läkemedel. Dekvaliniumklorid är aktivt mot de bakterier som orsakar bakteriell vaginos.

Donaxyl används för behandling av bakteriell vaginos. Den förs in i slidan för behandling vid infektionsstället.

Dekvaliniumklorid som finns i Donaxyl kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

#### 2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER DONAXYL

**Använd inte Donaxyl**

- om du är allergisk mot dekvaliniumklorid eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har sår i slidan eller livmoderhalsen.
- om du ännu inte har fått din första mens.

**Varningar och försiktighet**

Användning av tvål, spermiedödande medel och vaginaldusch (vaginaltvätt) i slidan, rekommenderas inte under behandling med Donaxyl.

Som vid alla vaginala infektioner rekommenderas att man undviker att ha oskyddat samlag när man behandlas med Donaxyl.

Donaxyl minskar inte effektiviteten av latexkondomer.

Denna produkt kan minska effektiviteten av kondomer eller pessrar av annat material än latex, därför ska du använda alternativa preventivmedel i minst 12 timmar efter behandlingen.

Använd inte Donaxyl inom 12 timmar före förlossning för att minimera risken för att det nyfödda barnet utsätts för dekvalliniumklorid. Informera läkaren om du har använt läkemedlet.

Du bör avbryta behandlingen under perioden med störst blödning i menstruationscykeln och återuppta den efteråt.

Du bör tala med din läkare om symtomen kvarstår i slutet av behandlingen eller om symtomen återkommer.

### **Barn och ungdomar**

Det finns inte tillräckligt med erfarenhet av användning av Donaxyl hos barn och ungdomar under 18 år.

### **Kvinnor över 55 år och äldre**

Det finns inte tillräckligt med erfarenhet av användning av Donaxyl hos kvinnor över 55 år.

### **Andra läkemedel och Donaxyl**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

### **Graviditet och amning**

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Donaxyl.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du ammar eller planerar att amma.

Baserat på tidigare erfarenhet och eftersom Donaxyl verkar lokalt förväntas inga skadliga effekter på graviditet och/eller det ofödda eller ammade barnet. Donaxyl ska enbart användas under graviditet och amning om det finns ett medicinskt behov av detta.

Rådfråga läkaren eller apotekspersonalen innan du tar något läkemedel.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Donaxyl påverkar troligen inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Inga studier har genomförts.

## **3. HUR DU ANVÄNDER DONAXYL**

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den rekommenderade dosen är 1 vaginaltablett dagligen i 6 dagar.

### **Bruksanvisning**

- Använd varje kväll före sänggåendet.
- Tvätta dina händer innan du öppnar blisterförpackningen
- Ligg ner i vilande ställning med benen lätt uppdragna. För in en vaginaltablett djupt i slidan.
- Du bör avbryta behandlingen under perioden med störst blödning i menstruationscykeln och återuppta den efteråt.



- Avsluta inte behandlingen i förtid även om du inte längre upplever något obehag (t.ex. klåda, flytningar, lukt). Om behandlingen pågår i mindre än 6 dagar kan dessa sjukdomstecken återkomma.
- Donaxyl innehåller ingredienser som inte löses upp helt, och resterna av tablettens kan ibland hamna i underkläderna. Detta påverkar inte behandlingens effektivitet. Tabletten missfärgar inte underkläderna, men för din egen komfort kan du använda en binda eller ett trosskydd.
- Om slidan är torr kanske inte vaginaltablettens löses upp och kan då komma ut hel. Detta gör att behandlingen inte blir optimal. I så fall kan vaginaltablettens fuktas med en droppe vatten innan den förs in i slidan.

Om du känner att Donaxyl har för stor eller för liten verkan ska du tala med läkare eller apotekspersonal.

### **Om du använt för stor mängd av Donaxyl**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du tar en högre daglig dos eller använder läkemedlet längre tid än rekommenderat kan risken för sårbildning i slidan öka.

### **Om du glömmer att använda Donaxyl**

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.

### **Om du slutar använda Donaxyl**

Om behandlingen pågår i mindre än 6 dagar kan sjukdomstecknen återkomma. Avsluta därför inte behandlingen i förtid även om du inte längre upplever något obehag (t.ex. klåda, flytningar, lukt).

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

## **4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningar är milda och kortvariga.

Ibland kan tecken på vaginal infektion (som klåda, sveda och flytningar) förvärras i början av behandlingen innan de börjar förbättras. Du bör fortsätta med behandlingen, men om besvären kvarstår bör du snarast kontakta din läkare.

### **Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)**

- Flytningar, klåda eller sveda i slidan
- Vaginal svampinfektion

### **Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)**

- Blödning från slidan, smärta i slidan
- Inflammation i slidan (vaginit) och yttre könsorganen
- Bakteriell vaginos
- Svampinfektion i huden
- Huvudvärk
- Illamående

### **Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)**

- Sårbildning i slidans slemhinna, om den redan var skadad när behandlingen inleddes
- Blödning från livmodern
- Rodnad eller torrhet i slidan
- Inflammation i urinblåsan (blåskatarr)
- Allergisk reaktion med symtom som utslag, svullnad och klåda
- Feber

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi).

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea,  
Biverkningsregistret,  
PB 55,  
FI-00034 Fimea

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

## **5. HUR DONAXYL SKA FÖRVARAS**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

### **Innehållsdeklaration**

Den aktiva substansen är dekvaliniumklorid.

Varje vaginaltablett innehåller 10 mg dekvaliniumklorid.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, cellulosa, mikrokristallin och magnesiumstearat.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Donaxyl vaginaltabletter är vita eller nästan vita, ovala och bikonvexa med den ungefärliga dimensionen, längd: 19 mm, bredd: 12 mm, och tjocklek: 6,3 mm.

Vaginaltabletterna levereras i förpackningar som innehåller en blister med 6 tabletter.

### **Innehavare av godkännande för försäljning:**

Campus Pharma AB  
Karl Gustavsgatan 1A  
411 25 Göteborg  
Sverige

### **Tillverkare:**

Haupt Pharma Amareg GmbH  
Donaustauer Strasse 378  
93055 Regensburg  
Tyskland

**Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Förenade kungariket (Nordirland) under namnen:**

Namn på medlemsstat	-	Läkemedlets namn
Tyskland	-	Fluomizin 10 mg Vaginaltabletten
Tjeckien	-	Naxyl 10 mg vaginální tablety
Belgien	-	Fluomizin 10 mg tabletten voor vaginaal gebruik
Italien	-	Fluomizin 10 mg compresse vaginali
Luxemburg	-	Fluomizin 10 mg comprimés vaginaux
Österrike	-	Fluomizin 10 mg Vaginaltabletten
Polen	-	Fluomizin 10 mg tabletki dopochwowe
Slovakien	-	Fluomizin 10 mg vaginálne tablety
Spanien	-	Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales
Finland	-	Donaxyl 10 mg emätinpuikko, tabletti
Ungern	-	Fluomizin
Norge	-	Donaxyl 10 mg vaginaltabletter
Sverige	-	Donaxyl
Förenade kungariket (Nordirland)	-	Fluomizin 10 mg vaginal tablets
Estland	-	Donaxyl 10 mg vaginaalne tablett
Frankrike	-	Fluomizin 10 mg comprimés vaginaux
Kroatien	-	Fluomizin 10 mg tablete za rodnicu
Litauen	-	Donaxyl 10 mg makšties tabletės
Lettland	-	Donaxyl 10 mg vaginālās tabletes
Slovenien	-	Fluomizin 10 mg vaginalne tablete

**Denna bipacksedel ändrades senast den 07.09.2022**

**Övriga informationskällor**

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Fimeas webbplats [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi).