

## Pakkausseloste: Tie toa käyttäjälle

### Valorin 500 mg kalvopäälysteiset tabletit

valasikloviiri

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävästä, käännä lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro näistä lääkärille tai apteekkikenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

**Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Valorin on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Valorin-tabletteja
3. Miten Valorin-tabletit otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Valorin-tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### 1. Mitä Valorin on ja mihin sitä käytetään

Valorin kuuluu viruslääkkeiden ryhmään. Se vaikuttaa tappamalla *herpes simplex*- (HSV), *varicella zoster*- (VZV) ja sytomegaloviruksia (CMV) tai estämällä niiden kasvun.

Valorin-tabletteja voidaan käyttää:

- vyöruusun hoitoon (aikuisilla)
- ihmisen HSV-infektioiden ja sukuelinherpeksen hoitoon (aikuisilla ja yli 12-vuotiailla nuorilla). Sitä käytetään myös näiden infektioiden uusiutumisen estämiseen.
- yskänrokon hoitoon (aikuisilla ja yli 12-vuotiailla nuorilla)
- CMV-infektioiden ehkäisyyn elinsiirtojen jälkeen (aikuisilla ja yli 12-vuotiailla nuorilla)
- uusiutuvien silmän HSV-tulehdusten hoitoon ja estohoitoon (aikuisilla ja yli 12-vuotiailla nuorilla).

Valasikloviiriä, jota Valorin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäristä, apteekkikenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

#### 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Valorin-tabletteja

##### Älä otta Valorin-tabletteja

- jos olet **allerginen** valasikloviirille, asikloviirille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (luetteltu kohdassa 6)
- jos sinulle on koskaan valasikloviirin oton jälkeen kehittynyt laaja-alaista ihottumaa, johon on liittynyt kuumetta, imusolmukkeiden suurentumista, maksaentsyymiарvojen suurentumista ja/tai eosinofiliaa (lääkkeeseen liittyvä yleisoireinen eosinofilinen reaktio).

Älä otta Valorin-tabletteja, jos yllä oleva koskee sinua. Jos et ole varma, keskustele lääkärin tai apteekkikenkilökunnan kanssa, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.

## **Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin otat Valorin-tabletteja, jos:

- sinulla on munuaissairaus
- sinulla on maksasairaus
- olet yli 65-vuotias
- immuunijärjestelmäsi on heikko.

Jos et ole varma, koskeeko edellä mainittu sinua, keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.

### Ole erityisen varovainen valasikloviirin suhteen – Tärkeää tietoa

Valasikloviirin käytön yhteydessä on ilmoitettu lääkkeeseen liittyviä yleisoireisia eosinofilisia reaktioita (DRESS). DRESS alkaa flunssan kaltaisina oireina ja kasvoihottumana. Ihottuma laajenee, nousee korkea kuume, verikokeissa havaitaan suurentuneita maksaentsyymiä ja tietyntyyppisten valkosolujen lisääntymistä (eosinofilia) sekä imusolmukkeet suurenevat.

Jos sinulle kehittyy ihottumaa sekä nousee kuume ja imusolmukkeesi suurenevat, lopeta valasikloviirin käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai hakeudu välittömästi hoitoon.

### Estä sukuelinherpeksen tarttuminen muihin

Jos otat Valorin-tabletteja sukuelinherpeksen hoitona tai sen ehkäisyyn tai jos sinulla on aiemmin ollut sukuelinherpes, noudata turvaseksiä koskevia ohjeita ja käytä kondomeja. Tämä on tärkeää, ettet tartuta infektiota muihin. Älä ole sukupuoliyhteydessä, jos sinulla on haavaumia tai rakkuloita sukuelimissä.

## **Muut lääkevalmisteet ja Valorin**

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkeitä. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia lääkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista munuaisiin vaikuttavista lääkeistä. Tällaisia lääkeaineryhmiä ovat mm. aminoglykosidit, platinan orgaaniset yhdisteet, jodivarjoaineet, metotreksaatti, pentamidiini, foskarneetti, siklosporiini, takrolimuusi, simetidiini ja probenesidi.

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle muista lääkeistä, jos käytät Valorin-tabletteja vyöruusun hoitoon tai elinsiiron jälkeen.

### **Raskaus ja imetyys**

Valorin-tabletteja ei yleensä suositella käytettäväksi raskauden aikana. Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, älä käytä Valorin-tabletteja ilman etta keskustelet asiasta lääkärin kanssa. Lääkäri harkitsee lääkyksen hyödyn sinulle ja mahdollisen riskin lapsellesi, jos otat Valorin-tabletteja raskauden tai imetyksen aikana.

### **Ajamineen ja koneiden käyttö**

Valorin voi aiheuttaa ajokykyyn vaikuttavia haittavaiktuksia. Älä aja autoa tai käytä koneita, ellet ole varma, ettei sinulla ole tällaisia haittavaiktuksia.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioda, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaiktuksia ja haittavaiktuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

### **3. Miten Valorin-tabletit otetaan**

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määränyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annos, joka sinun tulee ottaa, määräytyy sen mukaan, miksi lääkäri on määränyt Valorin-tabletteja sinulle. Lääkäri keskustelee tästä kanssasi.

#### Vyöruusun hoito

- Tavanomainen annos on 1 000 mg (kaksi 500 mg:n tablettia) kolmesti vuorokaudessa.
- Ota Valorin-tabletteja seitsemän vuorokauden ajan.

#### Yskänrokon hoito

- Tavanomainen annos on 2 000 mg (neljä 500 mg:n tablettia) kahdesti vuorokaudessa.
- Toinen annos on otettava 12 tuntia (ei aiemmin kuin 6 tuntia) ensimmäisen annoksen jälkeen.
- Ota Valorin-tabletteja vain yhden vuorokauden ajan (kaksi annosta).

#### Ihon HSV-infektioiden ja sukuelinherpeksen hoito

- Tavanomainen annos on 500 mg (yksi 500 mg:n tabletti) kahdesti vuorokaudessa.
- Ota Valorin-tabletteja ensimmäisen infektion yhteydessä viiden vuorokauden ajan tai jopa kymmenen vuorokauden ajan, jos lääkäri niin määräää. Uusiutuvan infektion yhteydessä hoito kestää tavanomaisesti 3–5 vuorokautta.

#### HSV-infektioiden uusiutumisen ehkäisy

- Tavanomainen annos on yksi 500 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa.
- Sairauden uusiutuessa usein saattaa olla hyödyllistä ottaa puolikas 500 mg:n tabletti (250 mg) kahdesti vuorokaudessa.
- Ota Valorin-tabletteja, kunnes lääkäri kehottaa lopettamaan hoidon.

#### CMV (sytomegalovirus) -infektion ehkäisy

- Tavanomainen annos on 2 000 mg (neljä 500 mg:n tablettia) neljästi vuorokaudessa.
- Ota annokset noin kuuden tunnin välein.
- Valorin-hoito aloitetaan yleensä mahdollisimman pian leikkauksen jälkeen.
- Ota Valorin-tabletteja noin 90 vuorokauden ajan leikkauksen jälkeen siihen asti, kunnes lääkäri kehottaa lopettamaan hoidon.

#### Lääkäri voi muuttaa Valorin-tablettien annosta, jos

- olet yli 65-vuotias
- immuunijärjestelmäsi on heikko
- sinulla on munuaissairaus.

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin aloitat lääkkeen käytön, jos joku edellä mainituista koskee sinua.

#### **Lääkkeen ottaminen**

- Ota lääke suun kautta.
- Niele tabletit kokonaисina veden kera.
- Ota tabletit samaan kellonaikaan joka päivä.
- Ota tabletit lääkärin tai apteekkienkilökunnan ohjeiden mukaan.

#### **Yli 65-vuotiaat potilaat tai munuaisteiden vajaatoimintapotilaat**

#### **On erittäin tärkeää juoda vettä säännöllisesti vuorokauden mittaan Valorin-hoidon aikana.**

Säännöllinen veden juonti auttaa vähentämään haittavaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa munuaisiin tai hermostoon. Lääkäri tarkkailee sinua huolellisesti näiden haittavaikutusten oireiden varalta.

Hermostoon vaikuttavia haittavaikutuksia voivat olla sekava tai levoton olo tai epätavallisen unelias tai tokkuraiainen olo.

## **Jos otat enemmän Valorin-tabletteja kuin sinun pitäisi**

Valorin ei yleensä ole haitallista, ellet ota sitä liikaa useiden päivien ajan. Jos otat liian monta tablettia, saatat tulla pahoinvoivaksi, oksentaa, saada munuaisvaivoja, tuntea itsesi sekavaksi, levottomaksi tai vähemmän tietoiseksi. Voit myös nähdä asioita, joita ei ole olemassa tai menettää tajuntasi.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähohjeiden saamiseksi. Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

## **Jos unohtdat ottaa Valorin-tabletteja**

- Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.
- Älä korvaa unohtamaasi kerta-annosta ottamalla kaksinkertaista annosta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienkilokunnan puoleen.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

### **Haittavaikutuksia, joita sinun tulee seurata:**

**Lopeta Valorin-tablettien käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos havaitset jotain seuraavia oireita:**

**Vakavat allergiset reaktiot (*anafylaksiat*).** Nämä ovat harvinaisia Valorin-hoidon yhteydessä.

Nopeasti kehittyvä oireet, kuten

- punoitus, kutiava ihottuma
- hengitysvaikeuksia aiheuttava huulten, kasvojen, niskan ja kurkun turvotus (angioedeema)
- verenpaineen laskeminen, mikä voi johtaa pyörtymiseen.

**Ihottumat tai punoitus.** Ihon haittavaikutus voi ilmetä ihottumana rakkuloiden kanssa tai ilman. Ihon ärsytystä ja turvotusta (DRESS-oireyhtymä) sekä kuumeen ja flunssan kaltaisia oireita voi esiintyä.

### **Tämä lääke voi aiheuttaa seuraavia haittavaikutuksia:**

**Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):**

- päänsärky.

**Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):**

- pahoinvoointi
- huimaus
- oksentelu
- ripuli
- ihoreaktiot auringonvalolle altistumisen jälkeen (valoherkkyys)
- ihottuma
- kutina (pruritus).

**Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):**

- sekava olo
- näkö- tai kuuloharhat (aistiharhat)
- hyvin tokkurainen olo
- vapina
- levoton olo.

Näitä hermoston haittavaikutuksia esiintyy yleensä potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta, iäkkäillä potilailla tai elinsiirtopotilailla, jotka ottavat suuria 8 gramman tai tätäkin suurempia Valorin-annoksia vuorokaudessa. Haittavaikutukset häviävät yleensä, kun hoito lopetetaan tai annosta pienennetään.

Muita melko harvinaisia haittavaikutuksia:

- hengenahdistus (dyspnea)
- vatsavaivat
- ihottuma, toisinaan kutiava, nokkosihottuman kaltainen ihottuma (urtikaria)
- kipu alaslässä (munuaiskipu)
- verivirtsaisuus (hematuria).

Melko harvinaisia haittavaikutuksia, joita voi ilmetä verikokeissa:

- valkosolujen määän vähennyminen (leukopenia)
- veren hyytymistä edistävien verihiuhtaleiden määän vähennyminen (trombosytopenia)
- maksan tuottamien aineiden lisääntyminen.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

- tasapainottomuuksien kävellessä ja koordinaatiohäiriöt (ataksia)
- hidas, epäselvä puhe (dysartria)
- kouristuskohtaukset
- aivotoiminnan häiriöt (enkefalopatia)
- tajuttomuuksien (koomaan)
- sekavat tai levottomat ajatuksit (delirium).

Näitä hermoston haittavaikutuksia esiintyy yleensä potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta, iäkkäillä potilailla tai elinsiirtopotilailla, jotka ottavat suuria 8 gramman tai tätäkin suurempia Valorin-annoksia vuorokaudessa. Haittavaikutukset häviävät yleensä, kun hoito lopetetaan tai annosta pienennetään.

Muut harvinaiset haittavaikutukset:

- Munuaisten vajaatoiminta, jossa virtsaa erittyy vähän tai ei lainkaan.

Esiintymistihesys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

- lääkkeeseen liittyvä yleisoireinen eosinoofilinen reaktio (DRESS) eli lääkeyliherkkyysoireyhtymä, jonka merkkejä ovat laaja-alainen ihottuma, ruumiinlämmön kohoaaminen, maksaeentyyppiarvojen suurentuminen, poikkeavat veriarvot (eosinofilia), imusolmukkeiden ja mahdollisesti myös muiden sisälinten suurentuminen. Ks. myös kohta 2. munuaistulehdus (tubulointerstitiaalinefriitti).

**Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkikenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

**5. Valorin-tablettien säilyttäminen**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärään jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Nämä menetellä suojelet luontoa.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa**

### **Mitä Valorin sisältää**

- Vaikuttava aine on valasikloviiri. Yksi tabletti sisältää 500 mg valasikloviiria (valasikloviiri hydrokloridihydraattina).
- Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, krospovidoni (tyyppi A), povidoni K90, magnesiumstearaatti, opadry sininen 13B5057, (hypromelloosi, indigokarmiini alumiini lakkilaakka (E132), titaanidioksiidi (E171), makrogoli 400, polysorbaatti).

### **Lääkevalmisten kuvaus ja pakaus koot**

Sininen, kalvopäällysteinen, kapselinmuotoinen tabletti, jonka molemmilla puolilla on osittainen jakouurre. Tabletin toiselle puolelle on merkitty "F" ja toiselle puolelle "9" ja "3".  
Tabletti voidaan jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Kalvopäällystiset Valorin-tabletit on pakattu läpinäkyvään PVC/PVdC/alumiiniläpipa in opakkaukseen tai HDPE-pulloon.

#### *Läpipainopakkaus:*

500 mg: 5, 8, 10, 21, 24, 30, 42, 50, 90 ja 112 tablettia.

#### *Pullo:*

500 mg: 30 ja 500 tablettia.

Kaikkia pakauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

### **Myyntiluvan haltija**

Orion Corporation  
Orionintie 1  
02200 Espoo

### **Valmistaja**

Orion Corporation Orion Pharma  
Orionintie 1  
02200 Espoo

**Tämä pakausselosteksti on tarkistettu viimeksi 21.4.2023**

## Bipacksedel: Information till användaren

### Valorin 500 mg filmdragerade tablett(er)

valaciclovir

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I den här bipackselet finns information om följande:**

1. Vad Valorin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Valorin
3. Hur du tar Valorin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Valorin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Valorin är och vad det används för**

Valorin är ett läkemedel mot virusinfektioner. Det verkar genom att döda eller hämma virusets förmåga att föröka sig, mot virusinfektioner orsakade av *herpes simplex* (HSV), *varicella zoster* (VZV) och *cytomegalovirus* (CMV).

Valorin används för att:

- behandla bältros (hos vuxna)
- behandla HSV-hudinfektioner och genital herpes (hos vuxna och ungdomar över 12 år). Det används även förebyggande mot att dessa infektioner återkommer.
- behandla förkyllningsblåsor (munsår) (hos vuxna och ungdomar över 12 år)
- förebygga infektioner orsakade av *cytomegalovirus* (CMV) efter organtransplantation (hos vuxna och ungdomar över 12 år)
- behandla och förebygga HSV-ögoninfektioner som återkommer (hos vuxna och ungdomar över 12 år).

Valaciclovir som finns i Valorin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

#### **2. Vad du behöver veta innan du tar Valorin**

##### **Ta inte Valorin**

- om du är allergisk mot valaciclovir, aciclovir eller något annat innehållsstämme i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du någonsin har utvecklat utbredda utslag med feber, förstorade lymfknutor, ökade leverenzymnivåer och/eller eosinofili (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom) efter att du tagit valaciclovir.

Ta inte Valorin om något av detta gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valorin.

## **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Valorin om du:

- har nedsatt njurfunktion
- har nedsatt leverfunktion
- är äldre än 65 år
- har nedsatt immunförsvar.

Är du osäker på om detta gäller dig tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Valorin.

### Var särskilt försiktig med valaciklovir – Viktig information

Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats i samband med användning av valaciklovir. DRESS uppträder till en början med förkylningsliknande symtom och utslag i ansiktet, följt av utbredda utslag och hög feber, ökade leverenzymnivåer som ses i blodprov och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) samt förstorade lymfknutor.

Om du utvecklar utslag med feber och förstorade lymfknutor, sluta ta valaciklovir och kontakta läkare eller sök medicinsk hjälp omedelbart.

### Förhindra överföring av genital herpes till andra

Om du tar Valorin för att behandla eller förebygga genital herpes eller om du tidigare har haft genital herpes ska du ha säkert sex, inklusive använda kondom. Detta är viktigt för att förhindra överföring av virus till din partner. Du ska undvika sex om du har sår eller blåsor på könsorganen.

## **Andra läkemedel och Valorin**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana och naturläkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något läkemedel som påverkar njurarna. Hit hör t. ex. aminoglykosid, platinuminnehållande läkemedel, jodinnehållande kontrastmedel, metotrexat, pentamidin, foskarnet, ciklosporin, takrolimus, cimetidin och probenecid.

Tala alltid om för din läkare eller apotekspersonal vilka andra läkemedel du använder när du behandlas med Valorin mot bältros eller efter organtransplantation.

## **Graviditet och amning**

Valorin ska normalt inte användas under graviditet. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, ska du inte använda Valorin utan att ha rådfrågat läkare. Din läkare kommer att väga fördelar med behandlingen mot eventuella risker för barnet om du tar Valorin under graviditet eller amning.

## **Körförmåga och användning av maskiner**

Valorin kan orsaka biverkningar som påverkar förmågan att köra bil. Kör inte bil och använd inte maskiner om du upplever sådana biverkningar.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### **3. Hur du tar Valorin**

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen du ska ta beror på vad din läkare har förskrivit Valorin för. Läkaren diskuterar det med dig.

#### Behandling av bältros:

- Vanlig dos är 1000 mg (2 tablettter å 500 mg) tre gånger dagligen
- Ta Valorin i 7 dagar.

#### Behandling av förkylningsblåsor:

- Vanlig dos är 2000 mg (4 tablettter å 500 mg) två gånger dagligen
- Andra dosen ska tas 12 timmar (inte tidigare än 6 timmar) efter första dosen
- Ta Valorin i endast en dag (två doser).

#### Behandling av *herpes simplex*-virus (HSV) infektion av hud och genital herpes:

- Vanlig dos är 500 mg (1 tablett å 500 mg) två gånger dagligen
- Vid första infektionstillfället ska du ta Valorin i 5 dagar eller upp till 10 dagar om din läkare instruerar dig till det. Vid återkommande infektion är behandlingstiden normalt 3–5 dagar.

#### Förebyggande behandling av återkommande *herpes simplex*-virus (HSV) infektion:

- Vanlig dos är en 500 mg tablett en gång dagligen
- Vissa personer med ofta återkommande infektion kan få bättre behandlingsresultat av att ta en halv 500 mg tablett (250 mg) två gånger dagligen
- Ta Valorin tills din läkare säger att du ska sluta.

#### Förebyggande behandling av cytomegalovirus (CMV) infektion och sjukdom:

- Vanlig dos är 2000 mg (4 tablettter å 500 mg) 4 gånger dagligen
- Varje dos bör tas med ca 6 timmars mellanrum
- Behandlingen ska påbörjas så tidigt som möjligt efter organtransplantationen
- Ta Valorin under ca 90 dagar efter organtransplantationen, eller tills din läkare säger att du kan sluta.

#### Läkaren kan behöva anpassa dosen av Valorin om du:

- är äldre än 65 år
- har nedsatt immunförsvar
- har nedsatt njurfunktion.

Rådgör med din läkare innan du tar Valorin om något av detta berör dig.

#### **Användning av detta läkemedel**

- Ta detta läkemedel via munnen
- Tablettterna ska sväljas hela med riklig mängd vatten
- Ta Valorin vid samma tidpunkt varje dag
- Ta Valorin enligt de instruktioner din läkare eller apotekspersonal har givit dig.

#### **Patienter över 65 år med nedsatt njurfunktion**

#### **Det är mycket viktigt att vid behandling med Valorin dricka vattnet regelbundet under dagen.**

Det lindrar biverkningar som kan påverka njurarna och nervsystemet. Din läkare undersöker dig regelbundet för tecken på sådana. Biverkningar från nervsystemet kan innehålla förvirring eller upprördhet, eller känsla av ovanlig sömninghet eller dåsighet.

#### **Om du har tagit för stor mängd av Valorin**

Valaciclovir är normalt inte skadligt om du inte tar för mycket under flera dagar. Tar du för stor mängd kan du må illa, kräkas, få njurproblem, bli förvirrad, upprörd eller känna dig mindre medveten. Du kan också se saker som inte finns eller bli medvetslös.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen.

### **Om du har glömt att ta Valorin**

- Om du har glömt att ta en dos ta den så snart du kommer ihåg den. Är det snart dags för nästa dos, hoppa då över den glömda dosen.
- Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

### **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

#### **Tillsstånd som du behöver vara uppmärksam på:**

**Sluta ta Valorin och kontakta en läkare omedelbart om du märker något av följande symtom:**

**Svåra allergiska reaktioner (*anafylaxi*).** Dessa är sällsynta hos personer som tar Valorin. Tecken på detta kan vara plötslig uppkomst av följande symtom:

- rodnad, kliande hudutslag
- svullnad av läppar, ansikte, nacke och hals, svårigheter att andas (*angioödem*)
- blodtrycksfall som kan leda till kollaps.

**Utslag eller rodnad.** Hudbiverkningen kan visas som ett utslag med eller utan blåsor. Hudirritation, svullnad (DRESS-syndrom) och symtom som feber och influensa kan uppstå.

#### **Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:**

Mycket vanliga (*kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare*):

- huvudvärk.

Vanliga (*kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare*):

- sjukdomskänsla
- yrsel
- kräkningar
- diarré
- hudreaktioner av solljus (fotosensitivitet)
- hudutslag
- klåda (pruritus).

Mindre vanliga (*kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare*):

- förvirring
- se och höra överkliga saker (hallucinationer)
- mycket dåsig
- skakningar
- upprördhet.

Dessa biverkningar från nervsystemet uppkommer vanligtvis hos personer med nedsatt njurfunktion, hos äldre eller hos organtransplanterade personer som får doser om 8 g eller mer Valorin per dag. Vanligtvis blir det bättre om du slutar ta Valorin eller om dosen sänks.

### Övriga mindre vanliga biverkningar

- andnöd (dyspné)
- obehangskänsla i buken
- hudutslag, ibland kliande, utslag som liknar nässelutslag (urikaria)
- värv i nedre delen av ryggen (värv från njuren)
- blod i urinen (hematuri).

### Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprover

- onormalt minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)
- minskat antal blodplättar som leder till minskad förmåga hos blodet att levra sig (trombocytopeni)
- ökning av leverfunktionsvärdet.

### Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- ostadighet vid gång och koordinationssvårigheter (ataxi)
- långsamt, sluddrigt tal (dysartri)
- kramper, krampanfall
- hjärnpåverkan (encefalopati)
- medvetslöshet (koma)
- förvirring eller oroande tankar (delirium).

Dessa biverkningar från nervsystemet uppkommer vanligtvis hos personer med nedsatt njurfunktion, hos äldre eller hos organtransplanterade personer som får doser om 8 g eller mer Valorin per dag. Vanligtvis blir det bättre om du slutar ta Valorin eller om dosen sänks.

### Övriga sällsynta biverkningar

- nedsatt njurfunktion där liten mängd eller ingen urin utsöndras.

### Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom, även kallat DRESS, eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom som kännetecknas av utbredda utslag, feber, ökade leverenzymnivåer, blodavvikelser (eosinofili), utvidgning av lymfkörtorna och eventuellt andra inre organ. Se även avsnitt 2.
- inflammation i njurarna (tubulointerstitiell nefrit).

### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

## **5. Hur Valorin ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, burken eller blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## 6. Förpackningens inne håll och övriga upplysningar

### Inne hålls de klaration

- Den aktiva substansen är valaciklovir. Varje tablett innehåller 500 mg valaciklovir (som valaciklovirhydrokloridhydrat).
- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, krospovidon (typ A), povidon K90, magnesiumstearat, Opadry blue 13B5057 (hypromellos, indigokarmin (E132), titandioxid (E171), makrogol 400, polysorbat).

### Läke medlets utseende och förpackningsstorlekar

Blå, filmdragerad, kapselformad tablett med en brytskåra på båda sidor, märkt ”F” på ena sidan och ”9” och ”3” på den andra sidan. Tableten kan delas i två lika stora doser.

Valorin filmdragerade tablettter finns tillgängliga i blisterförpackningar av PVC/PVdC aluminiumfolie i eller i HDPE burkar.

#### *Blisterförpackning:*

500 mg: 5, 8, 10, 21, 24, 30, 42, 50, 90 och 112 tablettter

#### *Burk:*

500 mg: 30 och 500 tablettter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### Inne havare av godkännande för försäljning

Orion Corporation  
Orionvägen 1  
FI-02200 Esbo  
Finland

### Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma  
Orionvägen 1  
FI-02200 Esbo  
Finland

**Denna bipacksedel ändrade s senast 21.4.2023**