

Pakkaus seloste: Tie toa käyttäjälle

Metadon Abcur 5 mg tabletit Metadon Abcur 10 mg tabletit

metadonihydrokloridi

Lue tämä pakkaus seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkaus seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkaus selosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkaus selosteessa kerrotaan:

1. Mitä Metadon Abcur on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Metadon Abcur -tabletteja
3. Miten Metadon Abcur -tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Metadon Abcur -tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Metadon Abcur on ja mihin sitä käytetään

Metadon Abcur on morfiinin kaltainen lääkevalmiste, jota käytetään:

- vaikeiden kroonisten vain opioidianalgeettien avulla asianmukaisesti hallittavissa olevien kiputilojen hoitoon
- opiaattiriippuvisten potilaiden korvaushoitoon yhdessä lääkehoidon, psykologisen hoidon ja sosiaalisen kuntoutuksen kanssa.

Metadonia, jota Metadon Abcur sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkaus selosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäristä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Metadon Abcur -tabletteja

Älä käytä Metadon Abcur -tabletteja

- jos olet allerginen metadonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos käytät tai olet käyttänyt viimeisen kahden viikon aikana monoamiinioksidaasin estäjää (MAO:n estäjiä) (masennuksen ja Parkinsonin taudin hoidossa käytettäviä lääkkeitä)
- jos sinulla on hengityslama, johon liittyy hidas ja pinnallinen hengitys, tai muita äkillisiä hengitysvaikeuksia (akuutti obstruktivinen hengitystiesairaus).

Metadon Abcur -valmistetta EI saa antaa lapsille.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Metadon Abcur -tabletteja:

- jos sinulla on äkillisiä astmakohtauksia
- jos sinulla on keuhkosairaus tai hengitysvaikeuksia
- jos sinulla on sydänvaivoja tai iskeeminen sydänsairaus

- jos sinulla on maksasairaus tai maksan vajaatoiminta (mukaan lukien sappikivet)
- jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta (mukaan lukien munuaiskivet)
- jos sinulla on kilpirauhasen vajaatoiminta
- jos sinulla on iho- tai kudossairaus
- jos eturauhasesi on suurentunut tai virtsaputkesi on ahtautunut
- jos sinulla on ollut päävamma ja normaalia suurempi kallonsisäinen paine (tarkista asia lääkäriltäsi). Oireena voi olla voimakasta päänsärkyä.
- jos saat hoitoa huumeriippuvuuteen tai opioidiyliannostukseen
- jos sinulla on virtsaamisvaikeuksia
- jos sinulla on mahakipua, ripulia tai ummetusta
- jos veresi happipitoisuus on matala tai hiilidioksidi-pitoisuus korkea
- jos käytät muuta opioidityyppistä lääkettä (kipulääkettä), kuten morfiinia tai pentatsosiinia
- jos käytät rentouttavia lääkkeitä tai unilääkkeitä (barbituraatteja tai bentsodiatspiineja). Näiden lääkkeiden samanaikainen käyttö Metadon Abcur -valmisteen kanssa voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia (hengityslaman) ja kooman, ja se voi olla henkeä uhkaavaa. Jos lääkäri määrää sinulle bentsodiatspiineja, lääkärin voi olla syytä muuttaa annosta, hoidon kestoaa tai seurata tilaasi säännöllisesti.
- jos veresi kalium- tai magnesiumpitoisuus on matala.

Erityisesti suurina annoksina Metadon Abcur saattaa vaikuttaa sähköisiin impulsseihin, jotka saavat aikaan sydämen supistumisen. Kerro lääkärille, jos sinulla on ollut aiemmin sydänvaivoja.

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista oireista, kun käytät Metadon Abcur -valmistetta:

- heikotus, väsymys, ruokahaluttomuus, pahoinvointi, oksentelu tai alhainen verenpaine. Nämä voivat olla oireita siitä, että lisämuunaiset tuottavat liian vähän kortisolihormonia ja sinun on ehkä otettava hormonilisää.
- pitkääikainen käyttö voi aiheuttaa sukupuolihormonien määrän vähennemistä ja prolaktiinhormonin määrän lisääntymistä. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee heikentyneen sukupuolivietin, impotenssin tai kuukautisten puuttumisen (amenorrean) kaltaisia oireita.

Toleansi, riippuvuus ja addiktio

Tämä lääke sisältää metadonia, joka on opioidilääke. Opioidien toistuva käyttö voi heikentää lääkkeen tehoa (elimistösi tottuu lääkkeeseen eli sinulle kehittyy toleranssi). Metadon Abcur-valmisten toistuva käyttö voi johtaa myös riippuvuuteen, väärinkäyttöön ja addiktioon, jotka voivat johtaa henkeä uhkaavaan yliannostukseen. Suurempi annos ja hoidon pidempi kesto voivat suurentaa näiden haittavaikutusten riskiä.

Riippuvuus tai addiktio voivat aiheuttaa hallinnan tunteen menetystä sen suhteen, paljonko lääkettä tarvitset tai miten usein sinun tarvitsee ottaa sitä. Jos käytät lääkettä kivun hoitoon, sinusta saattaa tuntua, että sinun on jatkettava lääkkeen ottamista, vaikka se ei lievittäisi kipua.

Riippuvuuden tai addiktions kehittymisriski vaihtelee yksilöllisesti. Riski Metadon Abcur-riippuvuuden tai -addiktions kehittymiseen voi olla suurempi, jos:

- sinulla tai sukulaissellasi on joskus esiintynyt alkoholin, reseptilääkkeiden tai huumeiden väärinkäyttöä tai riippuvuutta tällaisista aineista (addiktio)
- tupakoit
- sinulla on joskus ollut mielialahäiriötä (masennusta, ahdistuneisuutta tai persoonallisuushäiriö) tai jos olet ollut psykiatrin hoidossa jonkin muun psyykkisen sairauden vuoksi.

Jos huomaat mitä tahansa seuraavista merkeistä Metadon Abcur -valmisten käytön aikana, sinulle on saattanut kehittyä riippuvuus tai addiktio.

- Sinun täytyy ottaa lääkettä pidempään kuin lääkäri on suositellut.
- Sinun täytyy ottaa suositeltua annosta enemmän lääkettä.

- Käytät lääkettä johonkin muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on määritty, esim. "rauhoittumiseen" tai "nukahtamisen avuksi".
- Olet yrittänyt toistuvasti lopettaa lääkkeen käytön tai saada sen käytön hallintaan siinä onnistumatta.
- Tunnet olosi huonoksi kun lopetat lääkkeen ottamisen, ja olosi paranee, kun jatkat lääkkeen käyttöä (vieroitusoireet).

Jos huomaat mitä tahansa näistä merkeistä, keskustele lääkärin kanssa siitä, mikä hoitostrategia toimisi sinulla parhaiten, milloin hoidon voi lopettaa ja miten se lopetetaan turvallisesti (ks. kohta 3, Jos lopetat Metadon Abcur-valmisteen oton).

Une naikaiset hengityshäiriöt

Metadon Abcur voi aiheuttaa unenaikaisia hengityshäiriöitä, kuten uniapneaa (unenaikaisia hengityskatkoksia) ja unenaikaista hypoksemiaa (veren vähähappisutta). Oireita voivat olla esimerkiksi unenaikaiset hengityskatkokset, hengenahdistuksesta johtuva heräily, katkonainen uni tai päivisin esiintyvä voimakas uneliaisuus. Jos sinä tai joku toinen henkilö havaitsette näitä oireita, ota yhteys lääkäriin. Lääkäri saattaa harkita annoksen pienentämistä.

Läkkääät

Liiän matalan verenpaineen ja pyörymisen riski on suurentunut läkkääillä potilailla.

Säilytä lasten ulottumattomissa

Lapset ovat aikuisia herkempia metadonille, minkä vuoksi myrkytys voi syntyä jo hyvin pienillä annoksilla. Jotta voidaan estää metadonimyrkytykset lapsilla, metadonia on kotihoidossa säilyttäävä lasten ulottumattomissa.

Muut lääkevalmisteet ja Metadon Abcur

Kerro lääkärlle tai apteekkikenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettään käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkeitä.

Kerro lääkärillesi, jos käytät jotakin seuraavista lääkeitistä:

- mielentilaan vaikuttavia lääkeitä (esim. tioridatsiini, perfenatsiini, risperidoni, haloperidoli ja sertindoli)
- ADHD:n hoitoon käytettäviä lääkeitä (atomoksetiini)
- monoamiinioksidaasin estäjiksi (MAO:n estäjiksi) kutsuttuja masennuslääkeitä, erityisesti jos olet ottanut niitä viimeisen kahden viikon kuluessa. Kerro lääkärlle myös, jos käytät muita masennuslääkeitä (kuten imipramiini, nefatsodoni, fluoksetiini, fluvoksamiini, paroksetiini ja sertraliini).
- trisyklisiä masennuslääkeitä (kuten klomipramiini, nortriptyliini, desipramiini)
- sydänsairauksien käytettäviä lääkeitä (verapamiili, kinidiini)
- rytmihäiriölääkeitä (kuten propafenoni ja flekainidi) ja beetasalpaajaa (metoprololi)
- rintasyövän hoidossa käytettäviä lääkeitä (tamoksifeeni)
- tulehduskipulääkeitä ja immuunivastetta vähentäviä lääkeitä (esim. deksametasoni ja siklosporiini)
- viruslääkeitä, kuten tiettyjä HIV-lääkeitä (esim. nevirapiini, tsidovudiini, efavirentsi, nelfinaviiri, delavirdiini, ritonaviiri, lopinaviiri ja ritonaviirin yhdistelmä, ritonaviirin ja sakinaviirin yhdistelmä, didanosiini ja stavudiini)
- makrolidiantibiootteja (bakteeri-infektioiden hoitoon käytettäviä lääkeitä) (esim. klaritromysiini, telitromysiini ja erytromysiini)
- rifampisiinia (tuberkuulosin hoitoon käytettävä lääke)
- sieni-infektioiden hoitoon käytettäviä lääkeitä (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli ja flukonatsoli)
- simetidiiniä (mahahaavojen hoitoon käytettävä lääke)
- naloksonia (hengitysvaikeuksien hoitoon käytettävä lääke)
- riippuvuuden hoitoon käytettäviä lääkeitä (esim. naltreksoni ja buprenorfiini)
- epilepsialääkeitä (esim. fenytoini, fenobarbitaali ja karbamatsepiini)
- vitamiinitabletteja, jotka sisältävät C-vitamiinia

- ripulilääkeitä (loperamidi ja difenoksylaatti)
- lääkeitä ja tuotteita, jotka tekevät virtsasta happamampaan, esim. ammoniumkloridi (salmiakki)
- nesteenpoistolääkeitä (spironolaktoni)
- unettavia lääkeitä
- mäkikuismaa sisältäviä rohdosvalmisteita.
- kannabidioli (kouristusohtausten hoitoon käytettävä lääke)
- gabapentiini ja pregabaliini (epilepsian, hermokivun tai ahdistuneisuuden hoitoon käytettäviä lääkeitä) voivat suurentaa opioidien yliannostuksen ja hengityslaman (hengitysvaikeuksien) riskiä, mikä voi olla hengenvaarallista.

Metadonin ja rauhoittavien lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien tai vastaanvalaisten lääkkeiden, samanaikainen käyttö lisää uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä, ja se voi olla henkeä uhkaavaa. Sen vuoksi samanaikaista käyttöä voidaan harkita vain, jos muut hoitovaihtoehdot eivät ole mahdollisia.

Jos lääkäri määräää sinulle Metadon Abcur -valmistetta samanaikaisesti rauhoittavien lääkkeiden kanssa, annosta ja samanaikaisen hoidon kestoja on rajoitettava.

Haittavaikutusten riski suurenee, jos käytät metadonia samanaikaisesti masennuslääkkeiden (kuten sitalopraamin, duloksetiinin, essitalopraamin, fluoksetiinin, fluvoksamiinin, paroksetiinin, sertraliinin, venlafaksiinin, amitriptyliinin, klomipramiinin, imipramiinin tai nortriptyliinin) kanssa. Ota yhteyttä lääkäriin, jos havaitset esimerkiksi seuraavia oireita:

- mielentilan muutokset (kuten kiihyneisyys, aistiharhat, kooma)
- nopea sydämen syke, epävakaa verenpaine, kuume
- refleksien kiihyneisyys, heikentynyt koordinaatiokyky, lihasjäykkyys
- ruoansulatuskanavan oireet (kuten pahoinvoindi, oksentelu ripuli).

Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi rauhoittavista lääkkeistä, ja noudata huolellisesti lääkäristä saamiasi annostussuosituksia. Voi olla hyödyllistä kertoa läheisille ylläkuvaluista oireista ja merkeistä. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu tällaisia oireita.

Muutkin ottamasi lääkkeet voivat vaikuttaa sydämen toimintaan (esim. sotaloli ja amiodaroni).

Kerro aina lääkärille muista ottamistasi lääkkeistä, koska ne saattavat olla vaarallisia samanaikaisesti metadonin kanssa käytettyä. Näissä tilanteissa lääkäri voi päättää käyttää EKG-tutkimusta sydämesi toiminnan seurantaan hoidon alussa, jottei tällaisia haittavaikutuksia syntyisi. Metadoni voi myös vaikuttaa joihinkin veri- ja virtsakokeisiin. Kerro lääkärille metadonin käytöstä ennen veri- tai virtsakokeen ottamista.

Metadon Abcur juoman ja alkoholin kanssa

Et saa juoda alkoholia Metadon Abcur -hoidon aikana, koska tästä voi seurata vakavia haittavaikutuksia. Älä juo greippimehua Metadon Abcur -hoidon aikana, koska se voi muuttaa lääkkeen vaikutusta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäristä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Metadon Abcur -valmisteen käyttöä synnytyksen aikana ei suositella.

Kerro lääkärille, jos imetät tai suunnittelet imettääsi samanaikaisesti kun käytät metadonia, sillä se saattaa vaikuttaa lapseesi. Tarkkaile lasta poikkeavien oireiden ja merkkien varalta. Tällaisia ovat esimerkiksi lisääntynyt uneliaisuus, hengitysvaikeudet tai velttous. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos havaitset jonkin näistä oireista.

Hedelmällisyys: Impotenssia on raportoitu miehillä pitkääkaisen metadonin käytön yhteydessä.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Metadoni vaikuttaa aivojen ja kehon liikkeiden koordinaatioon, mikä haittaa voimakkaasti ajokykyä ja koneiden käyttökykyä. Tämä vaikutus säilyy, kunnes lääkitys on vakiintunut tiettyyn annostasoon. Älä siis aja äläkää käytä koneita hoidon alkuvaiheessa. Ajankohta, jolloin potilas on kykenevä ajamaan ja käyttämään koneita, vaihtelee, ja se tulee määrittää yhdessä lääkärin kanssa.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioda, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Metadon Abcur sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Metadon Abcur -tabletteja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määritnyt. Tarkista ohjeet lääkärliltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ennen hoidon aloittamista ja säädöllisesti hoidon aikana lääkäri keskustelee kanssasi siitä, mitä Metadon Abcur-hoidon aikana on odotettavissa, milloin ja miten kauan lääkettä pitää ottaa, milloin sinun on otettava yhteyttä lääkäriin ja milloin hoito on lopetettava (ks. myös kohta Jos lopetat Metadon Abcur valmisten oton). On tärkeää, ettet otta suurempaa annosta kuin mitä lääkärisi on sinulle määritnyt. Yksilöllinen tarve voi vaihdella. Annosta ei saa muuttaa eikä hoitoa lopettaa keskustelematta lääkärin kanssa.

Tämä valmiste on tarkoitettu vain suun kautta otettavaksi, eikä sitä saa injektoida.

Huumeriippuvuus

Aikuiset:

Lääkäri sovittaa annostuksen tarpeidesi mukaan.

Tavanomainen aloitusannos on 10–30 mg. Potilaille, joilla on korkea sietokyky opioideille, aloitusannos on 25–40 mg. Tämän jälkeen annosta suurennetaan asteittain kolmen viikon aikana. Tavanomainen ylläpitoannos on 60–120 mg vuorokaudessa, mutta jokut potilaat tarvitsevat suurempia annoksia. Suurin vuorokausiannos huumeriippuvuuden hoidossa on enintään 150 mg. Metadon Abcur -valmiste otetaan tavallisesti kerran päivässä.

Vaikea kipu

Aikuiset:

Tavanomainen aloitusannos on 5 mg 1–3 kertaa vuorokaudessa. Tämän jälkeen annosta voidaan hitaasti suurentaa.

Potilaat, jotka ovat aiemmin käyttäneet opioideja, voivat aloittaa hoidon suuremmalla annoksella, 5–20 mg 2–3 kertaa vuorokaudessa, sillä heidän aiempi opioidien käyttönsä otetaan huomioon.

Tarvittaessa on saatavilla muita vahvuuskset Metadon Abcur -tableteista.

Hoitava lääkäri määrittää vuorokausiannokset, annosten jakamisen ja kaikki annosmuutokset hoidon aikana, ja ne määrätytyvät aiemman annoksen mukaan.

Suurin vuorokausiannos vaikean kivun hoidossa on enintään 100 mg.

Iäkkääät:

Aloitusannosta voidaan joutua pienentämään ja saatat tarvita tarkempaa seurantaa Metadon Abcur -hoidon aikana. Noudata lääkärin ohjeita.

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta:

Annosta saatetaan joutua pienentämään tai annosväliä pidentämään. Noudata lääkärin ohjeita.

Jos otat enemmän Metadon Abcur -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut läkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähjeden saamiseksi.

Metadon Abcur -valmisteen yliannostuksen oireita voivat olla:

- hengitysvaikeudet tai lyhyt hengityspysähdys
- äärimmainen uneliaisuus, pyöryminen tai kooma
- voimakkaasti supistuneet pupillit
- lihasheikkous
- kylmä, kostea ja kalpea iho
- hidas sydämensyke, matala verenpaine, sydänkohtaus tai shokki
- koordinaatiokyvyn heikkeneminen, kävelyvaikeudet, kasvojen roikkuminen, persoonaallisuuden muutokset tai puhevaikeudet (aivojen häiriö nimeltään toksinen leukoenkefopatia)
- vaikeissa tapauksissa kuolema
- alhainen verensokeri.

Ota yhteys lääkäriin, jos saat yllä mainittuja oireita.

Lapset ja iäkkääät ovat herkempia tämän lääkkeen vaiktuksille.

Jos unohtat ottaa Metadon Abcur -tabletteja

Älä otta kaksinkertaista annosta korvatakseen unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Metadon Abcur -tablettien käytön

Hoitoa ei saa keskeyttää tai lopettaa keskustelematta lääkärin kanssa. Metadon Abcur -tablettien käyttöä ei saa lopettaa äkillisesti, sillä se voi aiheuttaa vieroitusoireita, kuten unettomuutta, nuhua, silmien vuotamista, ruokahaluttomuutta, ripulia ja kipuja.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä):

- pahoinvoindi, oksentelu.

Yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

- painon nousu
- nesteen kertyminen elimistöön
- ummetus
- hyvänlolon tunne (euforia)
- harhojen kuuleminen tai näkeminen (hallusinaatiot)
- huimaus tai pyörrytyys
- näön sumentuminen
- pupillien voimakas supistuminen
- uneliaisuus
- ihottuma
- hikoilu
- väsymys.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta):

- ruokahaluttomuus

- hengitysvaikeudet (sekä yskä)
- suun kuivuminen
- kielitulehdus
- matala mieliala (dysforia)
- ahdistuneisuus
- nukkumisvaikeudet
- sekavuus
- seksuaalisen halukkuuden väheneminen
- päänsärky
- pyörtyily
- kutina, nokkosihottuma, ihottuma
- alaraajojen turvotus
- heikkous
- nesteen kertyminen elimistöön
- sappitehyeen kouristus (vatsakipu)
- kasvojen punoitus
- matala verenpaine
- virtsaamisongelmat
- vaikeus saavuttaa tai ylläpitää erektilio
- kuukautiskierron häiriöt.

Harvinainen haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta):

- sydänvaivat, sydämen rytmien hidastuminen, sydämentykytys.

Tunteeton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

- matala veren kalium- tai magnesiumpitoisuus
- pieni verihiutaleiden määrä
- mielialan vaihtelut
- voit tulla riippuvaiseksi Metadon Abcur-valmisteesta (lisätietoa on kohdassa 2, Varoitukset ja varotoimet)
- sydämenpysähdyks
- epäsäännöllinen sydämensyke, jonka oireita voi olla liian nopea tai liian hidat sydämensyke, tykytys rinnassa, hengenahdistus tai rintakipu
- verenpaineen lasku seisomaan nostessa, mikä aiheuttaa huimausta, heikotuksen tunnetta tai pyörtymisen
- äkillinen kuolema
- alhainen verensokeri
- uniapnea (unenaikeiset hengityskatkokset)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Metadon Abcur-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä tämä lääke turvallisessa paikassa, jossa muut henkilöt eivät pääse käsiksi siihen. Se voi aiheuttaa vakavaa haittaa tai kuoleman henkilölle, joille sitä ei ole määrätty.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä pakkaussessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkausen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Metadon Abcur sisältää

- Vaikuttava aine on metadonihydrokloridi 5 mg tai 10 mg.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, magnesiumstearaatti, talkki, povidoni (PVP K-25), kolloidinen, vedetön piidioksiidi.

Lääkevalmisten kuvaus ja pakauskoot

Metadon Abcur 5 mg on valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, litteä, viistoreunainen tabletti, jonka toisella puolella on koverrus ja jakouurre ja vastakkaisella puolella merkintä M5, tabletin koko 7 x 2,5 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Metadon Abcur 10 mg on valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, litteä, viistoreunainen tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja vastakkaisella puolella merkintä M10, tabletin koko 9 x 3,1 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Metadon Abcur 5 mg ja 10 mg -tablettien pakauskoot:

Lapsiturvallinen purkki: 25, 100, 200 tablettia

Läpipainopakkaus: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 tablettia.

Kaikkia pakauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Abcur AB

Box 1452

251 14 Helsingborg

Ruotsi

Valmistaja

Extractum Pharma Zrt.

6413 Kunfehértó, IV. körzet 6

Unkari

Tämä pakausseoste on tarkistettu viimeksi 18.9.2023

Bipacksedel: Information till användaren

Metadon Abcur 5 mg tabletter Metadon Abcur 10 mg tabletter

metadonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läke medel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I den här bipackse del finns information om följande:

1. Vad Metadon Abcur är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Metadon Abcur
3. Hur du tar Metadon Abcur
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Metadon Abcur ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Metadon Abcur är och vad det används för

Metadon Abcur är ett morfinliknande läkemedel som används för:

- behandling av svår kronisk smärta där endast opioida smärtstillande läkemedel ger tillräcklig effekt
- underhållsbehandling till opioidberoende patienter parallellt med medicinsk och psykologisk behandling och social rehabilitering.

Metadon som finns i Metadon Abcur kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Metadon Abcur

Ta inte Metadon Abcur

- om du är allergisk mot metadon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du använder eller har använt monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) under de senaste två veckorna (läkemedel som används mot depression och Parkinsons sjukdom)
- om du lider av andningsdepression med långsam och ytlig andning eller har andra akuta andningssvårigheter (akut obstruktiv lungsjukdom).

Metadon Abcur får INTE ges till barn.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Metadon Abcur om du:

- får akuta astmaanfall
- lider av lungsjukdom eller andningssvårigheter
- har hjärtproblem eller ischemisk hjärtsjukdom
- har leversjukdom eller nedsatt leverfunktion (inklusive gallsten)
- har nedsatt njurfunktion (inklusive njursten)

- har underaktiv sköldkörtel
- har hud- och vävnadssjukdomar
- har förstorad prostata eller förträngning av urinröret
- har drabbats av en huvudskada och trycket i hjärnan är högre än det bör vara (kontrollera detta med din läkare). Du skulle kunna drabbas av svår huvudvärk.
- behandlas för drogberoende eller överdosering av opioider
- har svårt att kissa
- har magsmärter, diarré eller förstopning
- har låg syrehalt eller hög koldioxidhalt i blodet
- tar andra läkemedel av opioidtyp (smärtstillande medel), som morfin och pentazocin
- tar andra läkemedel som får dig att slappna av och hjälper dig att sova (barbiturater och bensodiazepiner). Samtidig användning av bensodiazepiner och Metadon Abcur kan orsaka andningssvårigheter (andningsdepression) och koma och kan vara livshotande. Om din läkare ordinerar dig bensodiazepiner kan det vara nödvändigt för din läkare att ändra dosen eller behandlingens längd eller att övervaka ditt tillstånd regelbundet.
- har låga halter av kalium eller magnesium i blodet.

Metadon Abcur kan påverka de elektriska signalerna som styr hjärtats sammandragningar, särskilt vid höga doser. Tala om för din läkare om du tidigare har haft hjärtproblem.

Tala med läkare eller apotekspersonal om du får något av följande symtom medan du tar Metadon Abcur:

- svaghet, trötthet, aptitlöshet, illamående, kräkningar eller lågt blodtryck. Detta kan vara symtom på att binjurarna producerar för lite av hormonet kortisol, och du kan behöva ta hormontillskott.
- långvarig användning kan leda till minskade nivåer av könshormoner och ökade nivåer av hormonet prolaktin. Kontakta läkare om du får symtom som minskad sexlust, impotens eller utebliven menstruation.

Tolerans, beroende och missbruk

Detta läkemedel innehåller metadon som är ett opioidläkemedel. Upprepad användning av opioidläkemedel kan leda till att dess effekt minskar (du kan bli van vid det, vilket kallas tolerans). Upprepad användning av Metadon Abcur kan också leda till beroende och missbruk, vilket kan leda till livshotande överdosering. Risken för dessa biverkningar kan öka vid högre dos och längre behandlingstid.

Beroende eller missbruk kan göra att du känner att du inte längre har kontroll över hur mycket läkemedel du behöver ta eller hur ofta du behöver ta det. Vid användning för behandling av smärta kan du känna att du behöver fortsätta att ta läkemedlet, även om det inte hjälper till att minska din smärta.

Risken för beroende eller missbruk varierar från person till person. Du kan löpa större risk för beroende eller missbruk av Metadon Abcur om:

- Du eller någon i din familj någon gång har missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller olagliga droger ("beroende").
- Du röker.
- Du någon gång har haft problem med sinnesstämningen (depression, ångest eller personlighetsstörning) eller om du har behandlats av en psykiater för andra psykisk sjukdomar.

Om du märker något av följande tecken när du tar Metadon Abcur kan det vara ett tecken på att du har blivit beroende:

- Du behöver ta läkemedlet under längre tid än vad läkaren har ordinerat
- Du behöver ta mer än den rekommenderade dosen
- Du använder läkemedlet av andra skäl än de läkaren ordinerat, t.ex. för att "hålla dig lugn" eller "hjälpa dig sova".
- Du har gjort upprepade, misslyckade försök att sluta eller få kontroll över användningen av läkemedlet

- När du slutar att ta läkemedlet mår du dåligt, och du mår bättre när du tar läkemedlet igen ("utsätningssymtom")

Om du märker något av dessa tecken, tala med läkaren för att diskutera vilken behandling som är bäst för dig, inklusive när det är lämpligt att sluta och hur du ska sluta på ett säkert sätt (se avsnitt 3, Om du slutar att ta Metadon Abcur).

Sömnrelaterade andningsstörningar

Metadon Abcur kan orsaka sömnrelaterade andningsstörningar såsom sömnapné (andningsupphåll under sömnen) och sömnrelaterad hypoxemi (låg syrehalt i blodet). Symtomen kan vara andningsupphåll under sömnen, uppvaknande på natten på grund av andnöd, svårigheter att upprätthålla sömnen eller uttalad dåsighet under dagen. Om du eller någon annan person observerar dessa symtom, kontakta läkaren. Läkaren kan överväga att minska dosen.

Äldre

Äldre patienter har en ökad risk för lågt blodtryck och svimning.

Förvaras utom räckhåll för barn

Barn är känsligare för metadon än vuxna. Därför kan förgiftning uppkomma vid mycket låga doser. För att undvika att barn av misstag får i sig metadon när du använder det i hemmet ska du förvara det på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Andra läkemedel och Metadon Abcur

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala därför om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

- något läkemedel som påverkar ditt psykiska tillstånd (t.ex. tioridazin, perfentiazin, risperidon, haloperidol och sertindol)
- läkemedel för behandling av ADHD (atomoxetin)
- den typ av läkemedel mot depression som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), speciellt om du har tagit dem under de senaste två veckorna. Tala också om för din läkare om du använder andra läkemedel mot depression (t.ex. imipramin, nefazodon, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin och sertralin).
- den typ av läkemedel mot depression som kallas tricykliska antidepressiva (t.ex. klomipramin, nortriptylin, desipramin)
- läkemedel mot hjärtsjukdomar (verapamil, kinidin)
- antiarytmika (t.ex. propafenon och flekainid) och betareceptorblockerare (metoprolol)
- läkemedel mot brööstcancer (tamoxifen)
- antiinflammatoriska och immunsuppressiva medel (t.ex. dexametason och ciklosporin)
- antivirala läkemedel, inklusive vissa läkemedel mot HIV (t.ex. nevirapin, zidovudin, efavirenz, nelfinavir, delavirdin, ritonavir, kombination av lopinavir/ritonavir, kombination av ritonavir/saquinavir, didanosin och stavudin)
- antibiotika av makrolidtyp (läkemedel mot bakterieinfektioner) som klaritromycin, telitromycin och erytromycin
- rifampicin (ett läkemedel mot tuberkulos eller TBC)
- läkemedel mot svampinfektioner som ketokonazol, itrakonazol och flukonazol
- cimetidin (läkemedel mot magsår)
- naloxon (ett läkemedel mot andningssvårigheter)
- läkemedel mot drogberoende (t.ex. naltrexon och buprenorfin)
- läkemedel mot epilepsi (t.ex. fenytoin, fenobarbital och karbamazepin)
- vitamintabletter som innehåller C-vitamin
- läkemedel mot diarré (loperamid, difenoxylat)
- läkemedel och preparat som gör urinen surare, t.ex. ammoniumklorid (salmiak)
- urindrivande läkemedel (spironolakton)
- läkemedel som gör dig sömnig eller dåsig

- naturläkemedel som innehåller johannesört
- cannabidiol (ett läkemedel som används för att behandla krampanfall)
- gabapentin och pregabalin (läkemedel som används för att behandla epilepsi, nervsmärta eller ångest) kan öka risken för opiodöverdosering, andningsdepression (andningssvårigheter) och kan vara livshotande.

Samtidig användning av metadon och sedativa läkemedel, såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel, ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression) och koma vilket kan vara livshotande. På grund av detta bör samtidig användning endast övervägas av läkaren när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om läkaren förskriver Metadon Abcur samtidigt med sedativa läkemedel, bör dosen och behandlingstiden begränsas.

Risken för biverkningar ökar om du använder metadon samtidigt med antidepressiva läkemedel (t ex citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralín, venlafaxin, amitriptylin, klomipramin, imipramin och nortriptylin). Kontakta läkare om du får symtom som:

- påverkan på psykisk hälsa (t ex oro (agitation), hallucinationer eller koma)
- snabb hjärtrytm, instabilt blodtryck eller feber
- överdrivna reflexer, nedsatt koordination, muskelstelhet
- symtom från magtarmkanalen (t ex illamående, kräkningar eller diarré)

Berätta för läkaren om alla sedativa läkemedel som du tar och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om riskerna som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du får dessa symtom.

Andra läkemedel som du tar kan eventuellt också påverka hjärtat (t.ex. sotalol och amiodaron). Du måste berätta för din läkare om alla andra läkemedel som du tar, eftersom de eventuellt kan vara farliga om du tar dem tillsammans med metadon. I sådana situationer kan det hända att din läkare bestämmer att man måste övervaka ditt hjärta med hjälp av EKG i början av behandlingen för att kontrollera att det inte uppstår några sådana effekter. Metadon kan också påverka vissa blod- och urinprover. Tala om för läkaren att du tar metadon innan du lämnar några prover.

Metadon Abcur med dryck och alkohol

Du får inte dricka alkohol medan du tar Metadon Abcur eftersom det kan ge allvarliga biverkningar. Drick inte grapefruktsaft när du behandles med Metadon Abcur, eftersom det kan förändra effekten av läkemedlet.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det rekommenderas att inte använda Metadon Abcur under förlossningsarbete.

Tala med läkare om du ammar eller planerar att amma medan du tar metadon eftersom det kan påverka ditt barn. Övervaka ditt barn avseende onormala tecken och symtom som ökad dåsighet (mer än vanligt), andningssvårigheter eller muskelslapphet; om läkaren beslutat att du kan amma under behandlingen. Kontakta läkare omedelbart om du märker något av dessa symtom.

Fertilitet: Impotens hos män har rapporterats vid långvarig användning av metadon.

Körförstånd och användning av maskiner

Metadon påverkar koordinationen mellan hjärna och kroppsrörelser, så förmågan att köra bil eller använda maskiner kan vara allvarligt påverkade till dess att din medicinering har stabiliseras på en bestämd dosnivå. Du ska därför inte köra eller använda maskiner under den inledande perioden av behandlingen. Hur lång tid det dröjer innan man kan köra bil eller använda maskiner är mycket individuellt, så du bör bestämma tillsammans med din läkare.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Metadon Abcur inne håller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. Hur du tar Metadon Abcur

Ta alltid Metadon Abcur enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Innan du påbörjar behandlingen och regelbundet under behandlingen kommer läkaren att diskutera med dig vad du kan förvänta dig av användningen av Metadon Abcur, när och hur länge du behöver ta det, när du ska kontakta läkaren och när du behöver sluta med behandlingen (se även Om du slutar att ta Metadon Abcur). Det är viktigt att du inte tar mer än den dos som du och din läkare kommit överens om. Det individuella behovet kan vara olika. Ändring eller avbrytande av behandling ska endast ske i samråd med läkare.

Denna produkt är endast avsedd för oralt bruk, och får inte injiceras.

Vid drogberoende

Vuxna:

Läkaren anpassar dosen efter dina behov.

Vanlig startdos är 10-30 mg dagligen. Hos patienter med hög tolerans för opioider är startdosen 25-40 mg. Därefter ökas dosen stegvis i 3 veckor.

Vanlig underhållsdos är 60-120 mg dagligen men vissa patienter kan behöva högre doser.

Den dagliga maxdosen ska inte överskrida 150 mg vid behandling av drogberoende.

Metadon Abcur ges vanligen en gång dagligen.

Vid svåra smärtor

Vuxna:

Den vanliga startdosen är 5 mg 1-3 ggr/dag. Därefter kan dosen ökas långsamt.

Patienter som redan tidigare tagit opioider kan påbörja behandlingen med högre doser, 5-20 mg 2-3 ggr/dag, då tar man i beaktande deras tidigare erfarenhet av opioidbehandling. Om så krävs finns andra styrkor av Metadon Abcur tillgängliga.

Fortsatt bestämning av den dagliga dosen, uppdelningen av doserna och alla dosjusteringar under behandlingens gång genomförs av behandlande läkare och beror på den tidigare dosen.

Den dagliga maxdosen ska inte överskidra 100 mg vid behandling av svår smärta.

Äldre:

Det kan vara nödvändigt att ändra startdosen eller du kan behöva tätare kontroller när du tar Metadon Abcur. Följ läkarens anvisningar.

Nedsatt lever- eller njurfunktion:

Det kan vara nödvändigt att minska dosen eller förlänga doseringintervall. Följ läkarens anvisningar.

Om du har tagit för stor mängd av Metadon Abcur

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Tecken på att du tagit för stor mängd Metadon Abcur kan vara:

- andningsbesvär eller kortvarigt andningsstopp
- extrem trötthet, svimning eller koma
- små pupiller (knappnålspupiller)
- muskelsvaghet
- sval, fuktig och blek hud
- långsam puls, lågt blodtryck, hjärtinfarkt eller chock
- förlust av koordination, svårigheter att gå, hängande ansikte, personlighetsförändringar eller problem med att tala (tecken på en hjärnsjukdom som kallas toxisk leukoencefalopati)
- i allvarliga fall kan överdosering leda till döden
- låg blodsockernivå

Kontakta läkare om ovanstående symptom uppkommer.
Barn och äldre är mer känsliga för effekten av detta läkemedel.

Om du har glömt att ta Metadon Abcur

Ta inte dubbeldos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Metadon Abcur

Du ska endast avbryta eller avsluta behandlingen efter att du talat med din läkare. Du ska inte plötsligt sluta ta Metadon Abcur, eftersom du kan få abstinenssymtom som t.ex. sömlöshet, rinnande näsa, tårögdhet, aptitlöshet, diarré och smärtor.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Metadon Abcur orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

- illamående, kräkningar.

Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

- viktökning
- ansamling av vatten i kroppen
- förstopning
- upprymdhet (eufori)
- att man ser eller hör saker som inte är verkliga (hallucinationer)
- en känsla av yrsel eller att man snurrar
- dimsyn
- knappnålspupiller
- dåsighet
- hudutslag
- svettningar
- trötthet.

Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

- aptitlöshet
- andningssvårigheter (med hosta)
- munorrhett
- inflammation i tungan
- nedstämdhet (dysfori)
- ångest
- sömnsvårigheter

- förvirring
- minskad sexlust
- huvudvärk
- svimning
- klåda, nässelutslag, hudutslag
- svullna ben
- svaghet
- ansamling av vatten i kroppen
- kramp i gallvägarna (ger magont)
- ansiktsrodnad
- lågt blodtryck
- svårighet att kasta vatten
- svårighet att få eller bibehålla erekton
- menstruationsstörningar.

Sällsynta biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

- hjärtproblem, längsammare puls, hjärtklappning.

Har rapporterats: förekommer hos okänt antal användare

- för låg halt av kalium eller magnesium i blodet
- minskat antal blodplättar i blodet.
- humörsvängningar
- du kan bli beroende av Metadon Abcur (mer information finns i avsnitt 2, Varningar och försiktighet)
- hjärtstillestånd
- oregebunden hjärtrytm med symptom som för snabb eller för långsam puls, fladde i brösten, andfåddhet och bröstsmärter
- blodtrycksfall när man reser sig upp vilket orsakar yrsel eller svimning
- plötslig död
- låg blodsockernivå
- sömmapné (andningsuppehåll i sömnen)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Metadon Abcur ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara detta läkemedel på ett säkert ställe, där andra personer inte kan komma åt det. Det kan orsaka allvarlig skada och vara dödligt för personer när det inte har ordinerats till dem.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är metadonhydroklorid 5 mg eller 10 mg.
- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, magnesiumstearat, talk, povidon (PVP K-25), kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Läke medlets utseende och förpackningsstorlekar

Metadon Abcur 5 mg är en vit till benvit rund, platt tablet med fasade kanter, konkav med skåra på ena sidan och prägling "M5" på andra sidan, tablettstorlek 7 x 2,5 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Metadon Abcur 10 mg är en vit till benvit rund, platt tablet med fasade kanter, med skåra på ena sidan och prägling "M10" på andra sidan, tablettstorlek 9 x 3,1 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Metadon Abcur 5 och 10 mg finns i:

Barnskyddande burk: 25, 100, 200 tablettter

Blister: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 och 100 tablettter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Abcur AB

Box 1452

251 14 Helsingborg

Sverige

Tillverkare

Extractum Pharma Zrt.

6413 Kunfehértó, IV. körzet 6

Ungern

Denna bipacksedel ändrades senast 18.9.2023