

Pakkausseloste: Tie toa käyttäjälle

Cloxacillin Vital Pharma Nordic, 2 g, injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten

kloksasilliini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysytävä, käännny lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
- Tämä lääke on määritty vain sinulle, eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkienkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Cloxacillin Vital Pharma Nordic on ja mielin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Cloxacillin Vital Pharma Nordic -valmistetta
3. Miten Cloxacillin Vital Pharma Nordic -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Cloxacillin Vital Pharma Nordic -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Cloxacillin Vital Pharma Nordic on ja mielin sitä käytetään

Cloxacillin Vital Pharma Nordic sisältää vaikuttavaa ainetta kloksasilliinia, joka on penisillinaasiresistenttien penisilliinien lääkeryhmään kuuluva antibiootti.

Kloksasilliini estää bakteerin normaalien soluseinän kehittymisen. Ilman soluseinää bakteerit tuhoutuvat. Kloksasilliini tehoaa grampositiivisiin aerobisiin ja anaerobisiin bakteereihin, etenkin stafylokokkeihin.

Cloxacillin Vital Pharma Nordic -valmistetta käytetään penisillinaasia tuottavien stafylokokkien aiheuttamien infektioiden hoitoon: iho- ja pehmytkudosinfektiot, sydäntulehdus (endokardiitti), luuydintulehdus (osteomyeliitti) ja verenmyrkytys (sepsis).

Kloksasilliini, jota Cloxacillin Vital Pharma Nordic sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Cloxacillin Vital Pharma Nordic -valmistetta

Älä käytä Cloxacillin Vital Pharma Nordic -valmistetta

- jos olet allerginen kloksasilliinille
- jos olet allerginen muille penisilliineille
- jos olet allerginen kefalosporiineille.

Kefalosporiineille allergiset henkilöt voivat olla allergisia myös kloksasilliinille (niin kutsuttu ristiallergia).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Cloxacillin Vital Pharma Nordic -valmistetta

- jos olet aiemmin saanut allergisen reaktion mille tahansa antibiootille tai jonkin muun allergisen reaktion

- jos sinulle kehittyy vaikea ja pitkään kestävä ripuli tämän lääkkeen käytön aikana tai sen jälkeen. Se voi olla pseudomembranoottisen koliitin oire. Pseudomembranoottinen koliitti on antibioottioidon mahdollinen komplikaatio. Tällöin lääke tulee keskeytää, ja joskus asianmukainen komplikaation hoito on tarpeen.
- sinulla on heikentynyt munuaisten toiminta.
Cloxacillin Vital Pharma Nordic -valmiste voi muiden penisilliiniryhmän antibioottien tavoin aiheuttaa mielentilan muutoksia, jotka johtuvat aivojen sairaudesta, vauriosta tai toimintahäiriöstä (enkefalopatia), erityisesti annettaessa lääkevalmistetta yliannoksesta potilaille, joilla on heikentynyt munuaisten toiminta. Oireet vaihtelevat, mutta sinulle saattaa tulla kuumetta, niskajäykkyyttä ja/tai päänsärkyä. Sinulla voi olla myös vaikeuksia käsienvaivausten ja jalkojen käytössä tai puhumisessa tai saatat tuntea olosi sekavaksi. Jos tällaisia oireita esiintyy, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai apteekkichenkilökuntaan (ks. kohdat 3 ja 4).
- Pitkäkestoinen antibioottihoito voi aiheuttaa antibioottiresistenttien bakteerien tai sienten poikkeavaa kasvua. Jos hoidon aikana ilmenee uusien infektioiden oireita, keskeytä käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Cloxacillin Vital Pharma Nordic

Kerro lääkärille tai apteekkichenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkeitä, mukaan lukien ilman reseptiä saatavia lääkeitä.

On erityisen tärkeää kertoa lääkärille seuraavien valmisteiden käytöstä:

- Probenesidi (kihtilääke), sillä se saattaa vaikuttaa kloksasilliinin poistumiseen elimistöstä.
- Metotreksaatti (nivelerumalääke), sillä metotreksaatin samanaikainen käyttö voi heikentää metotreksaatin poistumista elimistöstä ja lisätä näin metotreksaatin tehoa/myrkyllisyyttä.
- Dikumarolivalmisteet (verenohennuslääkeitä), sillä samanaikainen kloksasilliinihoito saattaa heikentää dikumarolivalmisteiden tehoa.

Raskaus ja imetyks

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäristä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Pitkääikäinen kliininen kokemus viittaa siihen, että raskauteen, sikiöön tai vastasyntyneeseen kohdistuvien haitallisten vaikutusten riski on vähäinen.

Kysy kuitenkin neuvoa lääkäristä, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta.

Imetyks

Valmiste erittyy vähäisessä määrin rintamaitoon. On epätodennäköistä, että se vaikuttaisi imetettävään lapseen. Mahdollista ripulin, sammaksen tai ihottuman riskiä ei kuitenkaan voida sulkea pois. Kysy neuvoa lääkäristä, jos imetät.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Cloxacillin Vital Pharma Nordic ei oletettavasti vaikuta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioda, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkichenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Cloxacillin Vital Pharma Nordic sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää 96,6 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa). Tämä vastaa 5 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Tämän lääkevalmisten enimmäisvuorokausiannos sisältää 579,6 mg natriumia. Tämä vastaa 29 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Keskustele lääkäri tai apteekkienhenkilökunnan kanssa, jos käytät tästä valmistetta päivittäin pitkääikaisesti, erityisesti jos sinua on ohjeistettu noudattamaan vähäsuolaista ruokavaliota.

3. Miten Cloxacillin Vital Pharma Nordic -valmisteita käytetään

Kyseessä on terveydenhuollon ammattilaisten antama lääkevalmiste. Se voidaan antaa injektiona lihakseen tai injektiona tai infuusiona laskimoon.

Annostus

Aikuiset

Lihakseen annetaan 0,5–1 g neljä kertaa vuorokaudessa tai laskimoon 1–2 g kolmesta neljään kertaa vuorokaudessa infektion tyypistä ja vaikeudesta riippuen.

Toistoinfuusiot laskimoon (lyhyt infuusio): 2 g 4(–6) kertaa vuorokaudessa.

Jatkuva laskimoinfuusio: Tavallinen annos on 6 g vuorokaudessa. Vakavissa infektioissa annosta voidaan suurentaa 12 g:aan vuorokaudessa.

Käyttö lapsille

Lihakseen annetaan 50 mg/kg vuorokaudessa jaettuna 4 annokseen tai laskimoon 100 mg/kg vuorokaudessa (tai enemmän) jaettuna 4–6 annokseen infektion tyypistä ja vaikeudesta riippuen.

Käyttö potilaille, joiden munuaistoiminta on heikentynyt

Potilaiden, joiden munuaistoiminta on heikentynyt, tulee kertoa siitä lääkärille ennen Cloxacillin Vital Pharma Nordic -valmisteen käyttöä. Lääkäri määrittää annostuksen yksilöllisesti munuaisten vajaatoiminnan asteen mukaan (ks. kohta 2, Varoitus ja varotoimet).

Jos sinusta tuntuu tämän lääkkeen käytön aikana siltä, että lääkkeen teho on liian voimakas tai liian heikko, käänny lääkärin puoleen.

Katso ohjeet antoon ja käyttökuntoon saattamiseen pakkausselosten lopusta kohdasta ”Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaistolle”.

Jos käytät enemmän Cloxacillin Vital Pharma Nordic -valmisteita kuin sinun pitäisi

Tämän lääkkeen antaa sinulle lääkäri tai sairaanhoitaja. On epätodennäköistä, että saisit liian paljon tai liian vähän lääkettä.

Cloxacillin Vital Pharma Nordic -valmiste voi muiden penisilliiniryhmän antibioottien tavoin aiheuttaa mielentilan muutoksia, jotka johtuvat aivojen sairaudesta, vauriosta tai toimintahäiriöstä (enkefalopatia), erityisesti annettaessa lääkettä yliannoksena.

Oireet vaihtelevat, mutta sinulle saattaa tulla kuumetta, niskajäykkyttä ja/tai päänsärkyä. Sinulla voi olla myös hankaluksia käsiin ja jalkojen käytössä tai puhumisessa tai saatat tuntea olosi sekavaksi. Jos tällaisia oireita esiintyy, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai apteekkienhenkilökuntaan (ks. kohdat 2 ja 4).

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, puh. 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos lopetat Cloxacillin Vital Pharma Nordic -valmisten käytön

On tärkeää, että lääkettä käytetään suositellun hoitojakson ajan. Älä lopeta hoitoa sen vuoksi, että vointisi kohenee. Jos hoitojakso lopetetaan liian aikaisin, infektio voi uusiutua.

Jos vointisi heikkenee hoidon aikana tai jos vointisi on huono vielä pitkään suositellun hoitojakson päättyttyä, ota yhteyttä lääkäriin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista, mahdollisesti vakavista haittavaikutuksista:

Harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä 1 000:sta):

- Vaikeat, akuutit allergiset reaktiot (anafylaktinen reaktio). Tällainen reaktio voi olla hengenvaarallinen, ja siihen voi liittyä yksi tai useampi seuraavista oireista: punoitus, kutina tai ihottuma (nokkosihottuma), hengitysvaikeudet ja heitehuimaus.
- Cloxacillin Vital Pharma Nordic saattaa aiheuttaa veren granulosyyttisolujen määrään vähenemistä (agranulosytoosi), mikä heikentää vastustuskykyä infektiolle. Jos sinulle kehittyy infektio, johon liittyy esimerkiksi kuumetta ja yleiskunnon vakavaa heikkenemistä, tai kuumetta, johon liittyy paikallisia tulehdusoireita, kuten kurkku-, nielu- tai suukipua tai virtsatievaivoja, hakeudu välittömästi lääkärin. Veren granulosyyttisolujen määrään mahdollinen väheneminen (agranulosytoosi) tarkistetaan verikokeesta. On tärkeää kertoa lääkärille tämän lääkkeen käytöstä.
- Akuutti paksusuolitulehdus (pseudomembranoottinen koliitti).
- Superinfektiot (seurannaisinfektiot).

Tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

- Vaikkea iho-oireinen yliherkkyysoireyhtymä, johon voi liittyä ruumiinlämmön nousemista, väsymystä, kasvojen tai imusolmukkeiden suurentumista, eosinofiliin (eräs valkosolutyyppi) määräni kasvua ja vaikutuksia maksaan, munuaisiin tai keuhkoihin (DRESS-oireyhtymä).
- Quincken edeema (ihonalainen turvotus).
- Muuttunut mielentila aivojen sairauden, vaurion tai toimintahäiriön takia (enkefalopatia).

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Jos jokin seuraavista haittavaikutuksista muuttuu vakavaksi tai jos sinulla on haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, kerro niistä lääkärille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille.

Yleiset (voi esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä kymmenestä):

- huonovointisuus, ripuli
- ihottuma
- laskimotulehdus (laskimon tulehtuminen laskimoon annetun injektion jälkeen)

Melko harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä sadasta):

- tiettyjen veren valkosolujen (eosinofilit) määräni suureneminen
- nokkosihottuma (urtikaria)

Harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä 1 000:sta):

- veren valkosolujen määräni pieneneminen (leukopenia)
- maksavaurio
- munuaisvaurio

Tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

- veren punasolujen määräni pieneneminen (anemia)
- verisolujen vaurioituminen, kuten verihiutaleiden määräni pieneneminen (trombosytopenia)
- pahoinvoiointi

- oksentelu
- munuaistulehdus
- hiivan liikakasvu suussa ja naisen emättimessä

Lihakseen annettavan pistoksen alueella voi esiintyä paikallista kipua.

Haiittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkienkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

5. Cloxacillin Vital Pharma Nordic -valmisteen säilyttäminen

- Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
- Älä käytä tätä lääkettä injektiopullossa ja pahvipakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
- Säilyttäminen käyttökuntaan saattamisen jälkeen, ks. kohta ”Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille”.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cloxacillin Vital Pharma Nordic sisältää

- Vaikuttava aine on kloksasilliini. Yksi injektiopullo sisältää 2 g kloksasilliinia (kloksasilliininatriumina).
- Valmiste ei sisällä muita aineita.

Lääkevalmisten kuvaus ja pakauskoko

Cloxacillin Vital Pharma Nordic on valkoinen tai luonnonvalkoinen ja kiteinen jauhe.

Pakkauskoot: 1 injektiopullo tai 10 injektiopulhoa.

Myyntiluvan haltija

Vital Pharma Nordic ApS
Frederiksgade 11, st.th.

1265 København
Tanska

Valmistaja

NETPHARMALAB CONSULTING SERVICES, S.L.
Carretera de Fuencarral, 22
28108 Alcobendas (Madrid)

Espanja

Tällä lääkkeellä on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Tanska, Suomi, Islanti, Norja, Ruotsi: Cloxacillin Vital Pharma Nordic

Tämä pakaus seloste on tarkistettu viimeksi 31.08.2023

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille

Liuoksen valmistus

Liuoksen käyttökuntaan saattamisessa tulee noudattaa aseptista tekniikkaa.

Kuiva-aine on suositeltavaa liuottaa injektionesteisiin käytettävään veteen tai 0,9-prosenttiseen (9 mg/ml) natriumkloridi-injektionesteeseen annettavasta määristä riippuen.

Ohjeet injektiliukosille ja infuusionesteen (liuos) käyttökuntaan saattamiseen

Injektiliukseen

2 g liuotetaan 8 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä.

Injektilaskimoon

2 g liuotetaan 20 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä.

Lyhyt infuusiolaskimoon

2 g liuotetaan 8 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä ja sekoitetaan sopivanan infuusionesteeseen siten, että kokonaistilavuus on enintään 100 ml.

Liuos valmistetaan Minibag-muovipakkauksissa siirtolaitetta käytäen tai 100 ml:n pulloissa siirtokanyyllia käytäen.

Jatkuvan infuusiolaskimoon

2 g liuotetaan 8 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä ja sekoitetaan sopivanan infuusionesteeseen siten, että kokonaistilavuus on 50–500 ml. Pitoisuutta 40 mg/ml ei pidä ylittää.

Käyttökuntaan saatetun liuoksen pitää olla kirkasta. Älä käytä liuosta, jos siinä näkyy hiukkasia. Vedä ruiskuun vain yksi annos. Käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä.

Kloksasilliini on yhtensopiva seuraavien infuusionesteiden kanssa:

- injektionesteisiin käytettävä vesi
- 0,9-prosenttinen (9 mg/ml) natriumkloridi-injektioneste, liuos
- 5-prosenttinen glukoosi-injektioneste, liuos.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jälte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Kloksasilliinia sisältävä injektioneste (liuosta varten) säilyy kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina 12 tunnin ajan alle 25 °C:ssa ja infuusioneste (liuosta varten) 12 tunnin ajan alle 25 °C:ssa tai 48 tunnin ajan 2–8 °C:ssa (jääkaapissa).

Mikrobiologiselta kannalta valmiste on käytettävä välittömästi. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, käytönaikaiset säilytysajat ja -olooluheet ovat käyttäjän vastuulla eivätkä saisi tavallisesti ylittää 24 tuntia 2–8 °C:n lämpötilassa, ellei valmisten käyttökuntaan saattamista ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Yhteensopimattomuudet

Tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan edellä.

Bipacksedel: Information till användaren

Cloxacillin Vital Pharma Nordic 2 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

kloxacillin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läke medel. Den inne håller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I den här bipackse del finns information om följande:

1. Vad Cloxacillin Vital Pharma Nordic är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cloxacillin Vital Pharma Nordic
3. Hur du använder Cloxacillin Vital Pharma Nordic
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cloxacillin Vital Pharma Nordic ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cloxacillin Vital Pharma Nordic är och vad det används för

Cloxacillin Vital Pharma Nordic innehåller den aktiva substansen kloxacillin. Det är ett antibiotikum som hör till en grupp läkemedel som kallas penicillinasistenta penicilliner.

Kloxacillin verkar genom att hämma bakteriernas normala cellvägg. Utan cellvägg dör bakterier. Kloxacillin är aktivt mot grampositiva aeroba och anaeroba bakterier, särskilt stafylokocker.

Med Cloxacillin Vital Pharma Nordic behandlas infektioner som beror på penicillinasproducerande stafylokocker: Hud- och mjukdelsinfektioner, inflammation i hjärtat (endokardit), inflammation i benmärgen (osteomyelit) och blodförgiftning (sepsis).

Kloxacillin som finns i Cloxacillin Vital Pharma Nordic kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och fölж alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Cloxacillin Vital Pharma Nordic

Ta inte Cloxacillin Vital Pharma Nordic

- om du är allergisk mot kloxacillin
- om du är allergisk mot andra penicilliner
- om du är allergisk mot cefalosporiner.

Patienter som är allergiska mot cefalosporiner kan också vara allergiska mot kloxacillin (så kallad korsallergi).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Cloxacillin Vital Pharma Nordic

- om du tidigare fått en allergisk reaktion mot något antibiotikum eller annan allergisk reaktion.
- om du får svår och långvarig diarré under eller efter behandling med detta läkemedel. Det kan vara symptom på antibiotikaassocierad kolit (inflammation i tjocktarmen) som är en komplikation av antibiotikabehandling. Du måste då sluta ta läkemedlet och ibland även få behandling.

- om du har nedsatt njurfunktion.
Som med alla antibiotika som ingår i läkemedelsgruppen penicillin kan Cloxacillin Vital Pharma Nordic leda till ett förändrat psykiskt tillstånd på grund av sjukdom, skada eller funktionsstörning i hjärnan (encefalopati), särskilt vid överdosering till patienter med nedsatt njurfunktion.
Symtomen varierar men man kan få feber, nackstelhet och/eller huvudvärk. Man kan också få svårt att använda armarna och benen, svårt att tala eller känna sig förvirrad. Om sådana problem uppstår, kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart (se avsnitt 3 och 4).
- långvarig användning av antibiotika kan leda till onormal tillväxt av resistenta bakterier eller svamp. Om symptom på nya infektioner uppkommer under behandlingen ska du sluta ta läkemedlet och kontakta läkare.

Andra läkemedel och Cloxacillin Vital Pharma Nordic

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel.

Det är särskilt viktigt att informera läkaren om du har behandlats med

- probenecid (används för att behandla gikt), eftersom det kan påverka kroppens förmåga att göra sig av med kloxacillin
- metotrexat (används för att behandla reumatoid artrit), eftersom effekten av metotrexat och dess giftighet kan öka när det tas samtidigt med kloxacillin, på grund av att kroppens förmåga att göra sig av med metotrexat minskar
- läkemedel med dikumarol (har en blodförtunnande effekt), eftersom effekten av dessa kan minska om de används samtidigt med kloxacillin.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn ska du rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Lång erfarenhet tyder på att det är liten risk för skadliga effekter på graviditeten, fostret eller det nyfödda barnet.

Rådfråga ändå läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Amning

Läkemedlet utsöndras i bröstmjölk i små mängder. Det är inte sannolikt att läkemedlet har några effekter på det ammande barnet, men en risk för diarré, svampinfektion eller hudutslag inte kan uteslutas. Rådfråga läkare om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Cloxacillin Vital Pharma Nordic antas inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cloxacillin Vital Pharma Nordic innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 96,6 mg natrium (huvudkomponenten i bordssalt). Det motsvarar 5 % av det högsta rekommenderade dagliga intaget av natrium för vuxna.

Den maximala rekommenderade dagliga dosen av detta läkemedel innehåller 579,6 mg natrium. Det motsvarar 29 % av det rekommenderade högsta dagliga kostintaget av natrium för en vuxen.
Tala med läkare eller apotekspersonal om du behöver Cloxacillin Vital Pharma Nordic dagligen under en längre tid, särskilt om du har blivit rekommenderad saltfattig kost.

3. Hur du använder Cloxacillin Vital Pharma Nordic

Detta läkemedel ges till dig av hälso- och sjukvårdspersonal. Det kan ges som injektion i en muskel (intramuskulär injektion) eller som injektion i en ven (intravenös injektion) eller som dropp (intravenös infusion).

Dosering

Vuxna

Beroende på infektionens typ och svårighetsgrad ges 0,5–1 g 4 gånger/dygn intramuskulärt eller 1–2 g 3–4 gånger/dygn intravenöst.

2 g 4(–6) gånger/dygn kan ges som intravenös intermittent infusion (korttidsinfusion).

Normaldosen är 6 g/dygn som kontinuerlig intravenös infusion. Vid allvarliga infektioner kan dosen ökas till 12 g/dygn.

Användning till barn

Beroende på infektionens typ och svårighetsgrad kan 50 mg/kg/dygn fördelat på 4 doser ges intramuskulärt eller 100 mg/kg/dygn (eller mer) fördelat på 4–6 doser intravenöst.

Användning till patienter med nedsatt njurfunktion

Patienter med nedsatt njurfunktion ska informera läkare innan de använder Cloxacillin Vital Pharma Nordic. Dosen bestäms individuellt av läkaren beroende på graden av njursvikt (se ”Varningar och försiktighet” i avsnitt 2).

Om du medan du använder läke medlet får intrycket att läke medlet är för starkt eller för svagt, kontakta läkare.

Information om hur du administrerar och bereder lösningarna finns i slutet av denna bipacksedel, under rubriken ”Information endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal”.

Om du har använt för stor mängd av Cloxacillin Vital Pharma Nordic

Du får detta läkemedel av en läkare eller sjuksköterska. Det är osannolikt att du kommer att få för mycket eller för lite.

Som med alla antibiotika som ingår i läkemedelsgruppen penicillin kan Cloxacillin Vital Pharma Nordic leda till ett förändrat psykiskt tillstånd på grund av sjukdom, skada eller funktionsstörning i hjärnan (encefalopati), särskilt vid överdosering.

Symtomen varierar men man kan få feber, nackstelhet och/eller huvudvärk. Man kan också få svårt att använda armarna och benen, svårt att tala eller känna sig förvirrad. Om sådana problem uppstår, kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart (se avsnitt 2 och 4).

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 0800 147 111 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du slutar att använda Cloxacillin Vital Pharma Nordic

Det är viktigt att läkemedlet används enligt den rekommenderade behandlingscykeln. Avsluta inte behandlingen för att du känner dig bättre. Om behandlingscykeln avbryts för tidigt kan infektionen återkomma.

Om du mår sämre under behandlingen eller om du inte mår bra efter den rekommenderade behandlingen, tala med läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta läkare omedelbart om du får några av följande symtom:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

- svåra akuta allergiska reaktioner (anafylaktisk reaktion). En sådan reaktion kan vara livshotande. Ett eller flera av följande symtom kan förekomma: nässelutslag (rodnad, klåda eller hudutslag), andningssvårigheter och yrsel.
- Cloxacillin Vital Pharma Nordic kan orsaka en minskning av antalet granulocyter (agranulocytos) i blodet och motståndskraften mot infektioner kan då minska. Om du får en infektion med symtom som feber och kraftigt försämrat allmäntillstånd, eller feber med lokala infektionssymtom som ont i halsen, svalget eller munnen, eller urinvägsbesvär, ska du omedelbart kontakta läkare. Du får då ta ett blodprov för kontroll av en eventuell minskning av antalet granulocyter (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar läkaren om ditt läkemedel.
- akut inflammation i tjocktarmen (antibiotikaassocierad kolit)
- superinfektioner eller (sekundära) bakterieinfektioner

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

- allvarliga överkänslighetsreaktioner med svåra hudutslag, som kan åtföljas av feber, trötthet, ansiktssvullnad eller svullnad av lymfkörtorna, ökat antal eosinofiler (speciell typ av vita blodkroppar) och påverkan på levern, njurarna eller lungorna (en reaktion som kallas DRESS)
- svullnad under huden (angioödem)
- förändrat psykiskt tillstånd på grund av sjukdom, skada eller funktionsstörning i hjärnan (encefalopati)

Övriga eventuella biverkningar

Om någon av följande biverkningar blir svår, eller om du upptäcker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, ska du tala om det för läkaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

- illamående (sjukdomskänsla), diarré
- hudutslag
- inflammation i ett blodkärl efter intravenös injektion (tromboflebit)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

- ökat antal av en speciell typ av vita blodkroppar (eosinofiler)
- nässelfeber (urtikaria)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

- minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)
- leverskada
- njurskada

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

- minskat antal röda blodkroppar (anemi eller blodbrist)
- Skador på blodkroppar, till exempel minskning av blodplättar
- illamående
- kräkning
- inflammation av njurarna
- överväxt av jästsvamp i munnen och kvinnans slida

Lokal smärta kan förekomma vid intramuskulär injektion.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Hur Cloxacillin Vital Pharma Nordic ska förvaras

- Inga särskilda förvaringsanvisningar.
- Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
- Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och kartongen efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
- Förvaringsanvisningar efter beredning av detta läkemedel finns i avsnittet "Information endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal".

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är cloxacillin. En injektionsflaska innehåller 2 g cloxacillin (i form av cloxacillinnatrium).
- Detta läkemedel innehåller inga andra hjälpmitten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cloxacillin Vital Pharma Nordic är vitt till nästan vitt kristallint pulver i en endosinjektionsflaska.

Förpackningsstorlekar: 1 injektionsflaska eller 10 injektionsflaskor.

Innehavare av godkännande för försäljning

Vital Pharma Nordic ApS

Frederiksgade 11, st.th.

1265 København

Danmark

Tillverkare

NETPHARMALAB CONSULTING SERVICES, S.L.

Carretera de Fuencarral, 22

28108 Alcobendas (Madrid)

Spania

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbeotsområdet under namnen:

Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige: Cloxacillin Vital Pharma Nordic

Denna bipacksedel ändrades senast 31.08.2023

Information endast avsedd för häls o- och sjukvårdspersonal

Beredning av lösning

Aseptisk teknik ska användas vid beredning av lösningen.

Beroende på vilken mängd som ska administreras rekommenderas att vatten för injektionsvätskor eller natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning används för att lösa upp pulvret.

Anvisningar för beredning av injektions-/infusionsvätska, lösning

Intramuskulär injektion

Lös upp 2 g i 8 ml vatten för injektionsvätskor.

Intravenös injektion

Lös upp 2 g i 20 ml vatten för injektionsvätskor.

Intravenös korttidsinfusion

Lös upp 2 g injektionsflaska i 8 ml vatten för injektionsvätskor och blanda sedan med lämplig infusionsvätska, lösning, upp till 100 ml.

Lösningen ska beredas i minibag-behållare i plast med hjälp av en överföringsadapter eller i en 100 ml flaska med hjälp av en överföringskanyl.

Intravenös långtidsinfusion

Lös upp 2 g injektionsflaska i 8 ml vatten för injektionsvätskor och blanda sedan med lämplig infusionsvätska, lösning till en totalvolym på 50–500 ml. Det rekommenderas inte att överskrida koncentrationen 40 mg/ml.

Efter beredning ska lösningen vara klar. Använd inte lösningen om det finns synliga partiklar i lösningen. Dra endast upp en dos. Oanvänd lösning ska kasseras.

Kloxacillin är kompatibelt med följande infusionslösningar:

- vatten för injektionsvätskor
- natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning
- glukos 5 % injektionsvätska, lösning.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Den fysiotekniska stabiliteten för kloxacillinslösningar för injektion bibehålls i 12 timmar vid en temperatur under 25 °C och för infusionsvätska i 12 timmar vid en temperatur under 25 °C, eller i 48 timmar vid 2–8 °C (i kylskåp).

Ur mikrobiologisk synvinkel bör läkemedlet användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart är förvaringstider och förhållanden användarens ansvar och ska vanligen inte överstiga 24 timmar vid 2–8 °C, såvida inte lösningen har beretts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.