

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Nebivolol Orion 5 mg tabletit

nebivololi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Nebivolol Orion on, ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Nebivolol Orion -tabletteja
3. Miten Nebivolol Orion -tabletteja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Nebivolol Orion -tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Nebivolol Orion on ja mihin sitä käytetään

Nebivolol Orion sisältää nebivololia, joka on selektiivinen beetasalpaaja, minkä lisäksi se laajentaa verisuonia (vasodilaattori). Valmistetta käytetään kohonneen verenpaineen (hypertension) hoitoon.

Nebivolol Orion -tabletteja käytetään myös yli 70-vuotiaiden potilaiden kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon.

Nebivololia, jota Nebivolol Orion –tabletit sisältävät, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäristä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Nebivolol Orion -tabletteja

Älä ota Nebivolol Orion -tabletteja

- jos olet allerginen nebivololille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos verenpaineesi on matala (systolinen eli yläverenpaineesi on alle 90 mmHg)
- jos käsiesi tai jalkojesi verenkiero on huono
- jos sydämesi syke on hyvin hidas (alle 60 lyöntiä minuutissa ennen tämän lääkkeen käyttämisen aloittamista)
- jos sinulla on todettu synnynnäinen sydämen johtumishäiriö (kuten sairas sinus -oireyhtymä tai eteis-kammiokatkos), eikä sinulla ole käytössä toimivaa sydämentahdistinta
- jos sinulla on oirehtiva sydämen vajaatoiminta tai saat sydämen toimintaa tehostavaa lääkettä suoraan suoneen laskimonsisäisen ”tipan” kautta
- jos sinulla on vaikeita hengitysvaikeuksia tai hengityksen vinkunaa
- jos sinulla on lisämunuaisytimen kasvain (feokromosytooma)
- jos sinulla on vaikea maksasairaus tai maksan vajaatoiminta
- jos sinulla on ns. metabolinen asidoosi (kuten diabeetikoilla, kun verensokeri on noussut liian

- korkealle ja verestä on tullut liian hapanta)
- jos käytät floktafeniiniä tai sultopridiää sisältäviä lääkkeitä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin otat Nebivolol Orion -tabletteja, jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista:

- sydämen vajaatoiminta (sydän ei pysty pumpaamaan riittävästi verta elimistön tarpeisiin)
- lievä (ensimmäisen asteen) eteis-kammiokatkos sydämessä
- sepelvaltimoiden supistelun aiheuttama rintakiputaipumus (Prinzmetal-in angina eli varianttiangina)
- huono verenkierto käsissä tai jaloissa, esimerkiksi Raynaud'n tauti tai oireyhtymä tai kramppimaisia kipuja kävellessä
- pitkittynyt hengitysvaikeuksia
- diabetes: Nebivolol Orion ei vaikuta verensokeriin, mutta se voi peittää liian matalan verensokeripitoisuuden oireet (esimerkiksi vapinan tai nopean sykkeen)
- kilpirauhasen ylitoiminta: jos sinulla on todettuna tämä sairaus, Nebivolol Orion voi peittää sen oireista liian nopean sykkeen
- allergia, koska lääke voi voimistaa allergisia reaktioita ja niiden hoitamiseen voidaan tarvita enemmän tai vahvempia lääkkeitä
- psoriaasi, koska Nebivolol Orion voi pahentaa sen oireita
- käytät pöölolissejä, koska Nebivolol Orion voi vähentää kyynelten eritystä ja aiheuttaa silmien kuivumista.

Edellä mainituissa tapauksissa lääkäri voi joutua tarkistamaan lääkityksesi tai voit joutua käymään lääkärissä tavallista useammin.

Jos olet menossa leikkaukseen tai toimenpiteeseen, jossa käytetään nukutusta, on tärkeää kertoa leikkaavalle lääkärille tai hammaslääkärille, että käytät tätä lääkettä.

Jos sinulla on munuaisongelmia, älä käytä tätä lääkettä sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja kerro asiasta lääkärille.

Lapset ja nuoret

Nebivolol Orion -tabletteja ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Nebivolol Orion

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, joita saa ilman reseptiä, rohdosvalmisteita, vitamiineja tai hivenaineita.

Kerro lääkärille tai apteekkissa, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä Nebivolol Orion -tablettien lisäksi:

- diltiatseemia tai verapamiilia (käytetään kohonneen verenpaineen ja muiden sydänongelmien hoitoon). Nebivolol Orion -tablettien käytön aikana verapamiilia ei saa antaa suoneen.
- muita kohonneen verenpaineen ja muiden sydänongelmien hoitoon käytettäviä kalsiumkanavan salpaajia, kuten amlodipiinia, felodipiinia, lasidipiinia, nifedipiinia, nikardipiinia, nimodipiinia tai nitrendipiinia
- muita kohonneen verenpaineen hoitoon käytettäviä lääkkeitä tai rintakivun hoitoon käytettäviä nitraattivalmisteita eli ”nitroja”
- kohonneen verenpaineen hoitoon käytettävä klonidiinia, guanfasiinia, moksonidiinia, metyylidopaa tai rilmenidiinia
- sydämen rytmihäiriöiden (epäsäännöllisen sykkeen) hoitoon käytettäviä lääkeaineita, kuten kinidiiniä, hydrokinidiiniä, amiodaronia, kibentsoliinia, flekainidia, disopyramidia, lidokaiinia, meksiletiinia tai propafenonia

- trisykliisiä masennuslääkkeitä (masennukseen), fentiatsiineja (psykooseihin) tai barbituraatteja (epilepsiaan)
- diabeteksen hoitoon käytettäviä lääkeaineita (insuliineja tai suun kautta otettavia valmisteita)
- digoksiinia tai muita digitalisglykosideja (sydämen vajaatoiminnan hoitoon)
- tulehduskipulääkkeitä. Huomaa, että pieniä päivittäisiä annoksia asetyylisalisyylihappoa (esimerkiksi 50 tai 100 mg) voi käyttää turvallisesti Nebivolol Orion -tablettien kanssa veritulppien ehkäisemiseen.
- astman, tukkeutuneen nenän tai joidenkin silmäsairauksien, kuten glaukooman (kohonnut silmänpaine), hoitoon tai pupillien laajentamiseen käytettäviä lääkeaineita
- nukutusaineita: jos tarvitset leikkausta, jossa käytetään nukutusta, kerro aina anestesiäläkärille ennen nukutusta, että käytät Nebivolol Orion -tabletteja
- simetidiinia (vatsan liallisen hoppisuuden hoitoon). Ota Nebivolol Orion -tabletit ruoan kanssa ja haponestolääke aterioiden välillä.
- nebivololin elimistöstä poistumiseen vaikuttavia lääkeaineita, kuten terbinafiinia (sieni- tai hiivatulehduksiin), buproponia (tupakasta vieroitukseen), klorokiiniä (malariaan tai reumaan), levomepromatsiinia (psykooseihin), paroksetiinia, fluoksetiinia, tiroidatsiinia (masennukseen)
- amifostiinia (suoja-aine sytostaattioidon tai sädehoidon aikana)
- baklofeenia (lihasjännitystä laukaiseva lääke)
- meflokiinia (malariaan).

Nebivolol Orion -tabletit ruuan ja juoman kanssa

Nebivolol Orion -tabletit voi ottaa ennen ruokailua, ruokailun aikana tai ruokailun jälkeen. Lääkkeen voi ottaa myös ilman ruokaa. Tabletti tai sen osat otetaan veden tai muun nesteen kera.

Raskaus ja imetyks

Raskaus

Nebivolol Orion -tabletteja ei tule käyttää raskauden aikana, ellei lääkäri toisin määrää.

Imetyks

Nebivolol Orion -tableteja ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Valmisten vaikutuksia ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu.

Tämän lääkkeen käytöstä johtuva verenpaineen lasku voi aiheuttaa huimausta, uupumusta tai pyörrytystä. Jos näitä oireita ilmenee, ÄLÄ KÄYTÄ mitään työväliteitä tai koneita. Näitä vaikutuksia voi esiintyä erityisesti hoidon alussa tai annoksen suurentamisen jälkeen (ks. myös kohta 4).

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioda, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Nebivolol Orion -tabletit sisältävät laktoosia

Tuote sisältää laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, ettet siedä eräitä sokerityypejä, ota yhteyttä lääkäriin, ennen kuin alat käyttää tätä lääkevalmistetta.

3. Miten Nebivolol Orion -tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrannyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet

epävarma.

Kohonneen verenpaineen (hypertension) hoito

- Suositeltu annos on 1 tabletti päivässä.
- Iäkkäiden potilaiden ja potilaiden, joilla on munuaisten vajaatoiminta, lääkitys alkaa yleensä $\frac{1}{2}$ tabletin päiväännessellä.
- Täyden hoitovaikutuksen saamiseen saattaa kulua jopa 4 viikkoa.

Kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoito

- Hoito aloitetaan ja sitä jatketaan kokeneen lääkärin valvonnassa.
- Suositeltava aloitusannos on $\frac{1}{4}$ tablettia päivässä. 1–2 viikon jälkeen annostusta voidaan lisätä $\frac{1}{2}$ tablettiin päivässä, myöhemmin 1 tablettiin päivässä ja sen jälkeen 2 tablettiin päivässä, kunnes sopiva annostus on saavutettu.
- Suositeltu enimmäisannos on 10 mg (2 tablettia päivässä).
- Hoidon alussa ja joka kerta, kun annostusta lisätään, potilaan on oltava 2 tunnin ajan kokeneen lääkärin valvonnassa.
- Lääkäri voi tarvittaessa vähentää annosta. Hoitoa ei saa lopettaa yhtäkkiästi, koska se voi pahentaa sydämen vajaatoimintaa.
- Potilaiden, joilla on vaikeita munuaisongelmia, ei pidä käyttää tästä lääkettä.

Lääke otetaan kerran päivässä, mieluiten aina samaan aikaan päivästä.

Lääkäri voi määrätä potilaalle lisäksi muita lääkkeitä potilaan sairauksista riippuen.

Käytö lapsille ja nuorille

Nebivolol Orion -tabletteja ei suositella lapsille ja nuorille.

Jos otat enemmän Nebivolol Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren annoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostuksen seurauksena voi olla liian hidas syke, matala verenpaine tai muut sydänongelmat sekä hengitysvaikeudet tai hengenahdistus.

Jos unohdat ottaa Nebivolol Orion -tabletteja

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti, kun muistat asian, ja ota seuraava tabletti tavalliseen aikaan. Jos unohduksesta on kulunut jo pitkä aika (esimerkiksi huomaat unohduksen vasta seuraavana päivänä), jätä unohtunut annos väliin ja ota seuraava annos tavalliseen aikaan seuraavana päivänä. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Toistuvia annosten väliin jättäminen ei ole suositeltavaa.

Jos lopetat Nebivolol Orion -tablettien oton

Älä lopeta Nebivolol Orion -tablettien ottoa, ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa. Jos lääkkeen käytöö lopetetaan yhtäkkiästi, seurauksena voi olla potilaan oireiden merkittävä pahaneminen. Tämä koskee erityisesti potilaita, joilla on sepelvaltimotauti (*angina pectoris*).

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkikenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisiä haittavaikutuksia (saattaa ilmetä enintään 1 henkilöllä 10:stä), kun valmistetta käytetään kohonneen verenpaineen hoitoon:

- päänsärky
- huimaus
- väsymys
- epätavallinen kutinan tai kihelmöinnin tunne
- ripuli
- ummetus
- pahoinvohti
- hengitysvaikeudet
- käsi- tai jalkojen turvotus.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (saattaa ilmetä enintään 1 henkilöllä 100:sta), kun valmistetta käytetään kohonneen verenpaineen hoitoon:

- hidas syke ja muut sydänoireet
- alhainen verenpaine
- näköhäiriöt
- impotenssi (erekktiovaikudet)
- hetkellinen masennuksen tunne
- ruuansulatushäiriöt, kaasua vatsassa tai suolessa
- oksentelu
- ihottuma
- puristava tunne rinnassa, hengitysvaikeudet tai hengenahdistus
- painajaisunet.

Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia (saattaa ilmetä enintään 1 henkilöllä 10 000:sta), kun valmistetta käytetään kohonneen verenpaineen hoitoon:

- pyörrytys
- psoriaasin pahaneminen.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

- angioedeema
- yliherkkyyys
- ihottuma.

Kliinisessä tutkimuksessa potilailla, joilla oli krooninen sydämen vajaatoiminta, havaittiin seuraavat haittavaikutukset: hidas syke, huimaus, sydämen vajaatoiminnan pahaneminen, matala verenpaine (kuten pyörrytyksen tunne nostessa nopeasti pystyasentoon), lääkkeen huono sietokyky, epäsäännöllinen syke, turvotus (kuten turvonneet nilkat).

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienhenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Nebivolol Orion -tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä pakauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nebivolol Orion sisältää

- Vaikuttava aine on nebivololi. Yksi tabletti sisältää 5 mg nebivololia, mikä vastaa 5,45 mg nebivololihydrokloridia.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, krospovidoni (tyyppi A), poloksameeri 188, povidoni K30, mikrokiteinen selluloosa, magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkauskoot

Nebivolol Orion -tabletit ovat valkosia, pyöreitä, kaksoiskuperia tabletteja, joiden toisella puolella on ristikkäinen jakouurre. Tabletin läpimitta on noin 9 mm.

Tabletit voidaan jakaa neljään yhtä suureen osaan.

Tabletit on pakattu 10 tabletin PVC/PE/PVDC/alumiini-läpipainopakkauksiin.

Pakkauskoot: 30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Latvia, Liettua, Suomi, Tanska, Tshekki, Viro: Nebivolol Orion
Puola: Nebivor

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.9.2014

Bipackse del: Information till patienten

Nebivolol Orion 5 mg tabletter

nebivolol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipackse del finns information om följande:

1. Vad Nebivolol Orion är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Nebivolol Orion
3. Hur du tar Nebivolol Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nebivolol Orion ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nebivolol Orion är och vad det används för

Nebivolol Orion innehåller nebivolol som är en selektiv betablockerare. Det verkar blodkärlsvidgande. Det används för att behandla förhöjt blodtryck (hypertoni).

Nebivolol Orion används också för att behandla kronisk hjärtsvikt hos patienter från 70 år och uppåt.

Nebivolol som finns i Nebivolol Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Nebivolol Orion

Ta inte Nebivolol Orion

- om du är allergisk mot nebivolol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har lågt blodtryck (det systoliska eller ”övre” blodtrycket är mindre än 90 mmHg)
- om du har dålig cirkulation i armar eller ben
- om du har mycket låg puls (under 60 hjärtslag i minuten innan du börjar använda det här läkemedlet)
- om du har en diagnosticerad retleddningsrubbning i hjärtat (t. ex. sjuk sinusknuta eller atrioventrikulärt block) och inte har en fungerande pacemaker
- om du har akut hjärtsvikt eller får intravenös behandling (”dropp”) för att hjälpa ditt hjärta fungera
- om du har svåra andningssvårigheter eller väsande andning
- om du har en binjuretumör, s.k. feokromocytom
- om du har en svår leversjukdom eller nedsatt leverfunktion
- om du har metabolisk acidosis (t. ex. hos diabetespatienter när blodsockret har stigit för mycket och blodet har blivit för surt)
- om du använder läkemedel som innehåller floctafenin eller sultoprid.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekpersonal innan du tar Nebivolol Orion om du har eller utvecklar något av följande tillstånd:

- hjärtsvikt (hjärtat kan inte pumpa tillräckligt mycket blod för kroppens behov)
- ett milt atrioventrikulärt block (första graden) i hjärtat
- bröstsmärter som orsakas av kramp i kranskärlen (s.k. Prinzmetals angina eller variantangina)
- dålig cirkulation i armar eller ben, t. ex. Raynauds sjukdom eller syndrom, krampartade smärter när du går
- långvariga andningsproblem
- diabetes: Nebivolol Orion har ingen effekt på blodsockret, men kan maskera tecken på låg sockernivå (t. ex. darrningar, snabb puls).
- överaktiv sköldkörtel: Nebivolol Orion kan maskera tecken på abnormalt snabb puls som orsakas av tillståndet
- allergi, eftersom de allergiska reaktionerna kan bli starkare och det kan behövas fler läkemedel för att behandla dem
- hudsjukdomen psoriasis, eftersom Nebivolol Orion kan förvärra symptomen
- kontaktlinser, eftersom Nebivolol Orion kan minska tårproduktionen och göra ögonen torrare.

I sådana fall kan läkaren behöva anpassa behandlingen eller kontrollera dig oftare.

Om du måste opereras och behöver narkos, är det viktigt att du talar om för läkaren eller tandläkaren att du tar det här läkemedlet.

Om du har problem med njurarna, ska du inte ta det här läkemedlet för hjärtsvikt. Du bör dessutom informera läkaren.

Barn och ungdomar

Läkemedlet rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Nebivolol Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel, naturmedel och vitaminer och spårämnen.

Tala alltid om för läkaren eller apotekspersonalen om du använder eller får något av följande läkemedel förutom Nebivolol Orion:

- diltiazem eller verapamil (används för högt blodtryck och andra hjärtproblem). Under behandling med Nebivolol Orion bör verapamil inte ges intravenöst.
- andra medicinska produkter, s.k. kalciumentagonister, för högt blodtryck eller andra hjärtproblem, t.ex. amlodipin, felodipin, lacidipin, nifedipin, nikardipin, nimodipin, nitrendipin
- andra blodtryckssänkande medel eller preparat med nitrat dvs. "nitro" mot bröstsmärter
- klonidin, guanfacin, moxonidin, metyldopa, rilmenidin mot högt blodtryck
- läkemedel mot arytmia (oregulbunden hjärtrytm), t. ex. kinidin, hydrokinidin, amiodarone, cibenzolin, flekainid, disopyramid, lidokain, mexiletin, propafenon
- tricykliska antidepressiva mediciner (mot depression), fentiaziner (mot psykoser) eller barbiturater (mot epilepsi)
- läkemedel mot diabetes mellitus (insulin och orala preparat)
- digoxin eller andra s.k. digitalisglykosider (som behandling av hjärtsvikt)
- antiinflammatoriska analgetika (NSAID) mot smärta och inflammation – observera att små dagliga antitrombotiska doser av acetylsalicylsyra (t. ex. 50 eller 100 mg) kan användas säkert med Nebivolol Orion
- läkemedel mot astma, nästäppa eller vissa ögonsjukdomar som glaukom (ökat tryck i ögat) eller pupillförstöring
- bedövningsmedel: informera alltid anestesiläkaren att du tar Nebivolol Orion innan du får

- anestesi (allmän bedövning)
- cimetidin (för behandling av för mycket magsyra) – du bör ta Nebivolol Orion under måltiden och det syranedsättande läkemedlet mellan måltider
- läkemedel som påverkar utsöndringen av nebivolol ur kroppen, t. ex. terbinafin (mot svamp- eller jästinfektioner), bupropion (för att hjälpa patienten sluta röka), klorokin (mot malaria eller reumatoid artrit), levomepromazin (mot psykoser), paroxetin, fluoxetin, tioridiazin (mot depression)
- amifostin (ett skyddande medel vid cellgifts- eller cytostatikabehandling)
- baklofen (muskelavslappnande medel)
- meflokin (antimalariamedel).

Nebivolol Orion med mat och dryck

Nebivolol Orion tablett kan tas före, under och efter måltider, men du kan också ta dem utan mat. Du bör svälja tabletten eller dess delar med lite vatten eller annan vätska.

Graviditet och amning

Graviditet

Nebivolol Orion bör inte användas under graviditet annat än enligt läkares instruktioner.

Amning

Det rekommenderas inte att du ammar under behandling med Nebivolol Orion.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts. Läkemedlet kan orsaka yrsel, utmattning eller svimningsanfall som följd av det sänkta blodtrycket. Om detta inträffar ska du INTE köra fordon eller använda maskiner. Verkningarna uppträder mer sannolikt efter att behandlingen inletts eller dosen ökats (se även avsnitt 4).

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nebivolol Orion innehåller laktos

Produkten innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3. Hur du tar Nebivolol Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Behandling av högt blodtryck (hypertoni)

- Rekommenderad dosen är 1 tablett om dagen.
- Äldre patienter och patienter med njursjukdomar börjar vanligen med $\frac{1}{2}$ tablett om dagen.
- Det kan ta upp till 4 veckor innan läkemedlet får full effekt.

Behandling av kronisk hjärtsvikt

- Behandlingen inleds och övervakas av en erfaren läkare.
- Läkaren inleder behandlingen med $\frac{1}{4}$ tablett om dagen. Detta kan ökas efter 1–2 veckor till $\frac{1}{2}$ tablett om dagen, därefter till 1 tablett om dagen och sedan till 2 tablettar om dagen tills du har uppnått korrekt dos för dig.
- Den maximala rekommenderade dosen är 10 mg (2 tablettar om dagen).
- Du måste övervakas under 2 timmar av en erfaren läkare när du inleder behandlingen och varje gång du ökar dosen.
- Läkaren kan minska dosen vid behov. Du bör inte sluta tvärt eftersom detta kan förvärra hjärtsvikt.
- Patienter med allvarliga njurproblem bör inte ta läkemedlet.

Ta läkemedlet en gång om dagen, helst vid ungefär samma tid varje dag.

Läkaren kan välja att kombinera tabletterna med andra läkemedel beroende på dina sjukdomar.

Användning för barn och ungdomar

Nebivolol Orion rekommenderas inte för barn och ungdomar.

Om du har tagit för stor mängd av Nebivolol Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning. Överdosering kan det leda till långsam puls, lågt blodtryck eller andra hjärtproblem eller andningssvårigheter eller väsande andning.

Om du har glömt att ta Nebivolol Orion

Om du glömmer att ta läkemedlet men kommer ihåg det efter ett kort tag, tar du nästa tablett normalt när det är dags att ta den. Om det har gått en längre tid (t. ex. hela dagen) hoppar du över den dosen och tar nästa dos vid den vanliga tiden nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Du bör undvika att hoppa över dosen flera gånger.

Om du slutar att ta Nebivolol Orion

Sluta inte ta Nebivolol Orion utan att rådfråga läkaren först. Om medicineringen avbryts tvärt kan patientens symptom förvärras på ett farligt sätt. Detta gäller i synnerhet patienter med kärlkramp (*angina pectoris*).

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos högst 1 person av 10) vid användning mot högt blodtryck:

- huvudvärk
- yrsel
- trötthet
- ovanlig känsla av klåda eller stickningar
- diarré
- förstoppling
- illamående
- andnöd
- svullna händer eller fötter.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos högst 1 person av 100) vid användning mot högt blodtryck:

- långsam puls eller andra hjärtproblem
- lågt blodtryck
- synrubbningar
- impotens (svårighet att få erekton)
- depressiva känslor
- matsmältningsbesvär, gas i mage eller tarmar
- kräkningar
- hudutslag
- trånghetskänsla i bröstet, andningssvårigheter eller väsande andning
- mardrömmar.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos högst 1 person av 10 000) vid användning mot högt blodtryck:

- svimningsanfall
- förvärrad psoriasis.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data)

- angioödem
- överkänslighet
- hudutslag.

I en klinisk studie för kronisk hjärtsvikt var de observerade biverkningarna långsam puls, yrsel, förvärrad hjärtsvikt, lågt blodtryck (t.ex. svimningskänsla när man reser sig snabbt), oförmåga att tolerera läkemedel, oregelbunden hjärtrytm, svullnad (t.ex. svullna fotleder).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, måste du kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret

PB 55
FI-00034 Fimea

5. Hur Nebivolol Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är nebivolol. Varje tablett innehåller 5 mg nebivolol, vilket motsvarar 5,45 mg nebivololhydroklorid.
- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, krospovidon typ A, poloxamer 188, povidon K30, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nebivolol Orion tablett är vita, runda, bikonvexa tabletter med krysskåra på ena sidan och en diameter på ca 9 mm.

Nebivolol Orion kan delas i fyra lika stora delar.

Tabletterna tillhandahålls i blisterförpackning i PVC/PE/PVDC/aluminium med 10 tabletter.
Förpackningsstorlekar: 30 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation
Orionvägen 1
FI-02200 Esbo
Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma
Orionvägen 1
FI-02200 Esbo
Finland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbeotsområdet under namnen:

Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Tjeckien: Nebivolol Orion
Polen: Nebivor

Den här bipacksedeln ändrades senast 10.9.2014