

VALMISTEYHTEENVETO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi tabletti sisältää kerroksen, jossa on 6 mg solifenasiinisuksinaattia, mikä vastaa 4,5 mg:aa solifenasiinia, ja kerroksen, jossa on 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia, mikä vastaa 0,37 mg:aa tamsulosiinia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Säädellysti vapauttava tabletti

Tabletit ovat pyöreitä, niiden halkaisija on noin 9 mm, niissä on punainen kalvopäällyste ja painatus "6/0.4".

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Eturauhasen liikakasvuun liittyvien keskivaikeiden tai valkeiden virtsanpidätysvalkeuksien (äkillinen virtsaamispakko, tihentynyt virtsaamistarve) ja virtsaamiseen liittyvien oireiden hoito miehillä, joilla ei saavuteta riittävää vastetta yksilääkehoidolla.

4.2 Annostus ja antotapa

Aikuiset miehet, myös ikääntyneet

Yksi Urizia-tabletti (6 mg/0,4 mg) kerran päivässä suun kautta ruoan yhteydessä tai ilman ruokaa.

Enimmäisannos on yksi Urizia-tabletti (6 mg/0,4 mg) vuorokaudessa.

Tabletti on nieltävä kokonaisena. Sitä ei saa purra tai pureskella. Tablettia ei saa murskata.

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Munuaisten vajaatoiminnan vaikutusta Urizian farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu. Sen vaikutukset lääkkeen yksittäisiin vaikuttaviin aineisiin sen sijaan tunnetaan hyvin (ks. kohta 5.2).

Uriziaa voidaan käyttää potilailla, joilla on lievä tai keskivaikkea munuaisten vajaatoiminta

(kreatiiniipuhdistuma $> 30 \text{ ml/min}$). Jos potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta

(kreatiiniipuhdistuma $\leq 30 \text{ ml/min}$), hoidossa on oltava varovainen ja annostus saa olla enintään yksi Urizia-tabletti (6 mg/0,4 mg) vuorokaudessa (ks. kohta 4.4).

Maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Maksan vajaatoiminnan vaikutusta Urizian farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu. Sen vaikutukset lääkkeen yksittäisiin vaikuttaviin aineisiin sen sijaan tunnetaan hyvin (ks. kohta 5.2).

Uriziaa voidaan käyttää potilailla, joilla on lievä maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-pistemäärä ≤ 7). Jos potilaalla on keskivaikkea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-pistemäärä 7–9), hoidossa on oltava varovainen ja annostus saa olla enintään yksi Urizia-tabletti (6 mg/0,4 mg) vuorokaudessa. Urizian käyttö on vasta-

aiheista potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-pistemäärä > 9) (ks. kohta 4.3).

Kohtalaisen voimakkaat ja voimakkaat sytokromi P450 3A4:n estäjät

Urizian enimmäisannos on yksi tabletti (6 mg/0,4 mg) vuorokaudessa. Uriziaa on käytettävä varoen potilailla, joita hoidetaan samanaikaisesti kohtalaisen voimakkaille tai voimakkaille CYP3A4:n estäjillä, kuten verapamiililla, ketokonatsolilla, ritonaviirilla, nelfinaviirilla tai itrakonatsolilla (ks. kohta 4.5).

Pediatriset potilaat

Urizian käytölle lapsilla ja nuorilla ei ole olennaista käyttöäihetta.

4.3 Vasta-aiheet

- Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.
- Hemodialyysi (ks. kohta 5.2).
- Vaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohta 5.2).
- Vaikea munuaisten vajaatoiminta ja samanaikainen hoito voimakkaalla sytokromi P450 (CYP) 3A4:n estäjällä, kuten ketokonatsolilla (ks. kohta 4.5).
- Keskivaikea maksan vajaatoiminta ja samanaikainen hoito voimakkaalla CYP3A4:n estäjällä, kuten ketokonatsolilla (ks. kohta 4.5).
- Vaikeat maha-suolikanavan sairaudet (kuten toksinen megakoolon), myasthenia gravis tai ahdaskulmaglaukooma tai näiden sairauksien riski.
- Aiempi ortostaattinen hypotensio.

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Uriziaa on käytettävä varoen potilailla, joilla on

- vaikea munuaisten vajaatoiminta
- virtsaummen riski
- obstruktioisia maha-suolikanavan sairauksia
- maha-suolikanavan heikentyneen motilitetin riski
- hiatushernia / ruokatorven refluksi ja/tai muiden sellaisten lääkkeiden samanaikainen käyttö, jotka voivat aiheuttaa ruokatorvitulehdusta tai pahentaa sitä (kuten bisfosfonaatit)
- autonominen neuropatia

Potilas on tutkittava, jotta muut eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun kaltaisia oireita aiheuttavat tilat voidaan sulkea pois.

Ennen Urizia-hidon aloittamista tulisi arvioida tiheävirtsausuden muiden syiden mahdollisuus (sydämen vajaatoiminta tai munuaissairaus). Jos potilaalla on virtsatietulehdus, on aloitettava sopiva bakterilääkehoito.

QT-ajan pitenemistä ja kääntyvien kärkien takykardiaa on havaittu potilailla, joilla on riskitekijöitä, kuten olemassa oleva pitkä QT-oireyhtymä ja hypokalemia ja jotka saavat solifenasiiniä suksinaatihoitoa.

Joillakin solifenasiiniä suksinaatiota ja tamsulosiinia käytävillä potilailla on raportoitu angioedeema, johon liittyy ilmateiden tulkeutuminen. Jos angioedeemaa esiintyy, Urizia-hoito on lopetettava, eikä sitä saa aloittaa uudelleen, ja potilasta on hoidettava asianmukaisesti.

Joillakin solifenasiiniä suksinaatiota käytävillä potilailla on ilmoitettu anafylaktisia reaktioita. Jos potilaalle ilmaantuu anafylaktisia reaktioita, Urizia-hoito on keskeytettävä ja potilasta on hoidettava asianmukaisesti.

Kuten muitakin alfa₁-adrenoreseptorin antagonistteja käytettäessä, verenpaine voi yksittäistapauksissa laskea tamsulosiinihoidon aikana, mistä voi harvoissa tapauksissa seurata pyörtyminen. Urizia-hoidon aloittavia potilaita on neuvottava istumaan tai menemään makuulle, jos he huomaavat ortostaattisen hypotension ensioireita (huimausta, heikotusta), kunnes oireet ovat hävinneet.

Harmaakaihi- ja glaukoomaleikkauksen yhteydessä joillakin potilailla, jotka saavat tai ovat aiemmin saaneet tamsulosiinihydrokloridihoitoa, on todettu IFIS-oireyhtymä (Intra-Operative Floppy Iris Syndrome; pieni pupillin oireyhtymän muunnot). IFIS-oireyhtymä saattaa lisätä silmäkomplikaatioiden riskiä leikkauksen aikana ja sen jälkeen. Jos potilaalle on suunniteltu harmaakaihi- tai glaukoomaleikkausta, Urizia-hoidon aloittamista ei suositella. Urizian käytön lopettamista 1–2 viikkoa ennen harmaakaihi- tai glaukoomaleikkausta on pidetty hyödyllisenä, mutta hoidon keskeyttämisen hyötyjä ei ole vahvistettu. Suunniteltaessa harmaakaihi- tai glaukoomaleikkausta leikkaavan lääkärin ja hoitohenkilökunnan on selvitettävä, käyttääkö leikkaukseen tuleva potilas parhaillaan tai onko hän aiemmin käyttänyt Uriziaa, jotta asianmukaisiin toimenpiteisiin leikkauksen yhteydessä ilmenevän IFIS-oireyhtymän varalta voidaan varautua.

Uriziaa on käytettävä varoen voimakkaiden ja kohtalaisten voimakkaiden CYP3A4:n estäjien kanssa (ks. kohta 4.5). Uriziaa ei saa käyttää yhdessä voimakkaiden CYP3A4:n estäjien, kuten ketokonatsolin, kanssa potilaille, jotka ovat fenotyypiltään heikkoja CYP2D6-metabolooijia tai potilaille, jotka käyttävät voimakkaita CYP2D6:n estäjiä, kuten paroksetiinia.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Samanaikainen käyttö antikolinergisiä vaikutuksia omaavien lääkevalmisteiden kanssa saattaa johtaa lääkevaikutusten tehostumiseen ja haittavaikutuksiin. Urizia-hoidon lopettamisen jälkeen tulisi pitää noin viikon tauko ennen antikolinergisen hoidon aloittamista. Samanaikainen kolinergisten agonistien käyttö saattaa heikentää solifenasiihin terapeutista vaikutusta.

Yhteisvaikutukset CYP3A4:n ja CYP2D6:n estäjien kanssa

Annettaessa solifenasiiinia samanaikaisesti ketokonatsolin kanssa (voimakas CYP3A4:n estäjä) (200 mg/vrk) solifenasiiinin C_{max} -arvo suurenii 1,4-kertaiseksi ja AUC-arvo (area under the curve) 2,0-kertaiseksi. Ketokonatsoliannoksella 400 mg/vrk solifenasiiinin C_{max} -arvo suurenii 1,5-kertaiseksi ja AUC-arvo 2,8-kertaiseksi.

Annettaessa tamsulosiinia samanaikaisesti ketokonatsolin (400 mg/vrk) kanssa tamsulosiinin C_{max} -arvo suurenii 2,2-kertaiseksi ja AUC-arvo 2,8-kertaiseksi.

Koska samanaikainen annostelu voimakkaiden CYP3A4:n estäjien, kuten ketokonatsolin, ritonaviirin, nelfinaviirin ja itrakonatsolin kanssa, voi lisätä altistumista sekä solifenasiiille että tamsulosiinille, Uriziaa tulisi käyttää varovaisesti yhdessä voimakkaiden CYP3A4:n estäjien kanssa. Uriziaa ei tulisi antaa yhdessä voimakkaiden CYP3A4:n estäjien kanssa potilaille, jotka ovat fenotyypiltään heikkoja CYP2D6-metabolooijia tai jotka käyttävät jo voimakkaita CYP2D6:n estäjiä.

Urizian samanaikainen annostelu verapamiiliin (kohtalaisen voimakas CYP3A4:n estäjä) kanssa nosti tamsulosiinin C_{max} -arvon ja AUC-arvon noin 2,2-kertaiseksi ja solifenasiiinin C_{max} -arvon ja AUC-arvon noin 1,6-kertaiseksi. Uriziaa on käytettävä varoen yhdessä kohtalaisen voimakkaiden CYP3A4:n estäjien kanssa.

Tamsulosiinin samanaikainen annostelu simetidiiniin (400 mg 6 tunnin välein), heikon CYP3A4:n estäjän, kanssa nosti tamsulosiinin AUC-arvon 1,44-kertaiseksi, mutta C_{max} -arvossa ei tapahtunut merkitsevää muutosta. Uriziaa voidaan käyttää heikkojen CYP3A4:n estäjien kanssa.

Annettaessa tamsulosiinia samanaikaisesti paroksetiiniin (20 mg/vrk), voimakkaan CYP2D6:n estäjän, kanssa tamsulosiinin C_{max} -arvo suurenii 1,3-kertaiseksi ja AUC-arvo 1,6-kertaiseksi. Uriziaa voidaan käyttää CYP2D6:n estäjien kanssa.

Entsyymi-induktion vaikutuksia solifenasiiinin ja tamsulosiinin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu. Koska solifenasiiini ja tamsulosiini metaboloituvat CYP3A4:n välityksellä, farmakokineettiset yhteisvaikutukset CYP3A4-entsyymiä indusoivien lääkkeiden (esim. rifampisiinin) kanssa ovat mahdollisia, jolloin solifenasiiinin ja tamsulosiinin pitoisuudet plasmassa saattavat alentua.

Muut yhteisvaikutukset

Seuraavat tiedot perustuvat yksittäisiä vaikuttavia aineita koskeviin, käytettävissä oleviin tietoihin.

Solifenasiini

- Solifenasiini saattaa heikentää maha-suolikanavan motiliteettia stimuloivien lääkevalmisteiden, kuten metoklopramidin ja sisapridin, vaikutusta.
- *In vitro*-tutkimukset ovat osoittaneet, että terapeuttisina pitoisuksina solifenasiini ei estä entsyymejä CYP1A1/2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 tai 3A4. Siksi solifenasiiinin ja näiden CYP-entsyymien välityksellä metaboloituvien lääkkeiden väliset yhteisvaikutukset ovat epätodennäköisiä.
- Solifenasiiinin käyttö ei muuttanut R-varfariinin eikä S-varfariinin farmakokinetiikkaa eikä niiden vaikutuksia protrombiniinia ikaan.
- Solifenasiiinin käyttö ei vaikuttanut digoksiinin farmakokinetiikkaan.

Tamsulosiini

- Samanaikainen käyttö muiden alfa₁-adrenoreseptorin antagonistien kanssa voi aiheuttaa hypotensiota.
- Diatsepaami, propranololi, trikloorimetatsidi, klorimadinoni, amitriptyliini, diklofenaakki, glibenklamidi, simvastatiini tai varfariini eivät muuttaneet tamsulosiinin vapaata fraktiota ihmisen plasmassa *in vitro*. Tamsulosiini ei muuta diatsepaamin, propranololin, trikloorimetatsidin ja klorimadinonin vapaata fraktiota. Diklofenaakki ja varfariini saattavat kuitenkin lisätä tamsulosiinin eliminaationopeutta.
- Samanaikainen käyttö furosemidin kanssa pienentää tamsulosiinin pitoisuutta plasmassa, mutta koska pitoisuus pysyy normaalialueella, samanaikainen käyttö on hyväksyttyvä.
- *In vitro*-tutkimukset ovat osoittaneet, että terapeuttisina pitoisuksina tamsulosiini ei estä entsyymejä CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 tai 3A4. Siksi tamsulosiinin ja näiden CYP-entsyymien välityksellä metaboloituvien lääkkeiden väliset yhteisvaikutukset ovat epätodennäköisiä.
- Yhteisvaikutuksia ei ole havaittu, kun tamsulosiinia on annettu samanaikaisesti atenololin, enalapriiliin tai teofylliinin kanssa.

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Hedelmällisyys

Urizian vaikutusta hedelmällisyyteen ei ole varmistettu. Solifenasiiilla tai tamsulosiimilla tehdyissä eläinkokeissa ei ole havaittu haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen tai varhaiseen alkionkehitykseen (ks. kohta 5.3).

Ejakulaatiohäiriötä on todettu kliinisissä lyhyt- ja pitkääikaistutkimuksissa, joissa on käytetty tamsulosiinia. Ejakulaatiohäiriötä, retrogradista ejakulaatiota ja siemensöksyn puuttumista on raportoitu myyntiluvan myöntämisen jälkeen.

Raskaus ja imetys

Uriziaa ei ole tarkoitettu naisille.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia Urizian vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Potilaalle on kuitenkin kerrottava, että hoidon yhteydessä voi esiintyä huimausta, näön hämärtymistä, väsymystä ja melko harvoin uneliaisuutta. Nämä vaikutukset voivat heikentää potilaan ajokykyä tai koneiden käyttökykyä (ks. kohta 4.8).

4.8 Hattavaikutukset

Turvallisuusprofiiliin yhteenvedo

Urizia voi aiheuttaa antikolinergisiä hattavaikutuksia, jotka ovat vaikeusasteeltaan yleensä lieviä tai kohtalaisia. Urizian kehittämisvaiheen klinisissä tutkimuksissa yleisimmin raportoidut hattavaikutukset olivat suun kuivuminen (9,5 %), ummetus (3,2 %) ja ruuansulatushäiriöt (mukaan lukien vatsakipu; 2,4 %). Muita yleisiä hattavaikutuksia ovat pyörrytyys (mukaan lukien huimaus; 1,4 %), näön hämärtyminen (1,2 %), väsymys (1,2 %), ja ejakulaatiohäiriöt (mukaan lukien retrogradinen ejakulaatio; 1,5 %). Akuutti virtsaumpi (0,3 %, melko harvinainen) on vakavin klinisissä tutkimuksissa havaittu Urizia-hoitoon liittyvä hattavaikutus.

Taulukkomuotoinen luettelo hattavaikutuksista

Alla olevassa taulukossa sarake ”esiintyyvyys Urizialla” sisältää hattavaikutukset, jotka on havaittu Urizian kehittämisvaiheen kaksoissokkoutetuissa klinisissä tutkimuksissa (hoitoon liittyvät raportit hattavaikutuksista, joita on todettu vähintään kahdella potilaalla ja joiden esiintyyvyys kaksoissokkoutetuissa tutkimuksissa oli suurempi kuin lumeläkkeellä).

Sarakkeet ”esiintyyvyys solifenasiinilla” ja ”esiintyyvyys tamsulosiinilla” sisältävät hattavaikutukset, joita on raportoitu aiemmin Urizia-valmisteen yksittäisten vaikuttavien aineiden yhteydessä (sellaisena kuin ne on esitetty solifenasiiniin 5 ja 10 mg ja tamsulosiiniin 0,4 mg valmisteyhteenvedoissa) ja joita voi esiintyä myös Urizian käytön yhteydessä (joitakin näistä hattavaikutuksista ei ole havaittu Urizian klinisen kehitysohjelman aikana).

Hattavaikutusten esiintyyvyys on määritelty seuraavasti: hyvin yleinen ($\geq 1/10$), yleinen ($\geq 1/100, < 1/10$), melko harvinainen ($\geq 1/1\,000, < 1/100$), harvinainen ($\geq 1/10\,000, < 1/1\,000$), hyvin harvinainen ($< 1/10\,000$), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

MedDRA-elinjärjestelmäluku / suositeltu termi	Urizian kehityksen aikana havaittujen hattavaikutusten esiintyyvyys	Yksittäisillä vaikuttaviin aineisiin liittyvien hattavaikutusten esiintyyvyys	
		solifenasiini 5 mg ja 10 mg [#]	tamsulosiini 0,4 mg [#]
Infektiot			
Virtsatieinfektio		Melko harvinainen	
Kystütti		Melko harvinainen	
Immuunijärjestelmä			
Anafylaktinen reaktio		Tuntematon*	
Aineenvaihdunta ja ravitsamus			
Vähentynyt ruokahalu		Tuntematon*	
Hyperkalemia		Tuntematon*	
Psyykkiset häiriöt			
Aistiharhat		Hyvin harvinainen*	
Sekavuus		Hyvin harvinainen*	
Delirium		Tuntematon*	
Hermosto			
Huimaus	Yleinen	Harvinainen*	Yleinen
Uneliaisuus		Melko harvinainen	

MedDRA-elinjärjestelmäluokitus / suositeltu termi	Urizian kehityksen aikana havaittujen haittavaikutusten esiintyvyys	Yksittäisiin vaikuttaviin aineisiin liittyvien haittavaikutusten esiintyvyys	
		soli fenasiini 5 mg ja 10 mg[#]	tamsulosiini 0,4 mg[#]
Makuaistin häiriö		Melko harvinainen	
Päänsärky		Harvinainen*	Melko harvinainen
Pyörtyminen			Harvinainen
Silmät			
Näön hämärtyminen	Yleinen	Yleinen	Tuntematon*
IFIS-oireyhtymä			Tuntematon* *
Silmien kuivuminen		Melko harvinainen	
Silmänpainetauti		Tuntematon*	
Näön heikentyminen			Tuntematon*
Sydän			
Sydämentykytys		Tuntematon*	Melko harvinainen
Kääntyvien kärkien takykardia		Tuntematon*	
QT-ajan piteneminen EKG:ssä		Tuntematon*	
Eteisväriä		Tuntematon*	Tuntematon*
Rytmihäiriöt			Tuntematon*
Takykardia		Tuntematon*	Tuntematon*
Verisuonisto			
Ortostaattinen hypotensio			Melko harvinainen
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina			
Nuha			Melko harvinainen
Nenän limakalvojen kuivuminen		Melko harvinainen	
Hengenahdistus			Tuntematon*
Dysfonia		Tuntematon*	
Nenäverenvuoto			Tuntematon*
Ruoansulatuselimistö			
Suun kuivuminen	Yleinen	Hyvin yleinen	
Dyspepsia	Yleinen	Yleinen	
Ummetus	Yleinen	Yleinen	Melko harvinainen
Pahoinvointi		Yleinen	Melko harvinainen
Vatsakipu		Yleinen	
Ruokatorven refluksitauti		Melko harvinainen	
Ripuli			Melko harvinainen
Nielun kuivuminen		Melko harvinainen	
Oksentelu		Harvinainen*	Melko harvinainen
Paksusuolen obstruktio		Harvinainen	
Ulostetukkeuma		Harvinainen	

MedDRA-elinjärjestelmäluokitus / suositeltu termi	Urizian kehityksen aikana havaittujen haittavaikutusten esiintyyvys	Yksittäisiin vaikuttaviin aineisiin liittyviin haittavaikutusten esiintyyvys	solifenasiini 5 mg ja 10 mg[#]	tamsulosiini 0,4 mg[#]
Suolitukos		Tuntematon*		
Vatsavaivat		Tuntematon*		
Maksaja sappi				
Maksasairaus		Tuntematon*		
Poikkeavat maksan toimintakokeiden tulokset		Tuntematon*		
Iho ja ihonalainen kudos				
Kutina	Melko harvinainen	Harvinainen*	Melko harvinainen	
Ihon kuivuminen		Melko harvinainen		
Ihottuma		Harvinainen*	Melko harvinainen	
Nokkosihottuma		Hyvin harvinainen*	Melko harvinainen	
Angioedeema		Hyvin harvinainen*	Harvinainen	
Stevens-Johnsonin oireyhtymä			Hyvin harvinainen	
Erythema multiforme		Hyvin harvinainen*	Tuntematon*	
Kesivä ihottuma		Tuntematon*	Tuntematon*	
Luusto, lihakset ja sidekudos				
Lihasheikkous		Tuntematon*		
Munuaiset ja virtsatiet				
Virtsaumpi***	Melko harvinainen	Harvinainen		
Virtsaamisvaikeudet		Melko harvinainen		
Munuisten vajaatoiminta		Tuntematon*		
Sukupuolieimet ja rinnat				
Ejakulaatiohäiriöt mukaan lukien retrogradinen ejakulaatio ja siemensyöksyn puuttuminen	Yleinen		Yleinen	
Priapismi			Hyvin harvinainen	
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat				
Väsymys	Yleinen	Melko harvinainen		
Perifeerinen turvotus		Melko harvinainen		
Voimattomuuks			Melko harvinainen	

[#]: Taulukossa esitetty solifenasiiniin ja tamsulosiiniin haittavaikutukset on lueteltu kyseisiä aineita sisältävien tuotteiden valmisteyhteenvedoissa.

^{*}: Markkinoille tulon jälkeen saadut raportit. Koska spontaanisti ilmoitetut haittavaikutukset koskevat markkinoille tulon jälkeisiä kokemuksia kaikkialta maailmasta, vaikutusten esiintyyvyttä ja solifenasiiniin tai tamsulosiiniin roolia niiden aiheuttajina ei pystytä määrittämään luotettavasti.

^{**}: Markkinoille tulon jälkeen saadut raportit, havainnot kaihi- ja glaukoomaleikkauksen aikana.

^{***}: Ks. kohta 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Urizian pitkääikainen turvallisuus

Haittavaikutusprofiili oli enintään 1 vuoden kestäneessä hoidossa samanlainen kuin 12 viikon tutkimuksissa. Tuote on hyvin siedetty, eikä mikään haittavaikutus liity erityisesti sen pitkääikäiskäytöön.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Virsaumpi: Ks. kohta 4.4 Varoituksset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Ikääntyneet

Urizian käyttöäihe, eturauhasen hyvänlaatuiseen liikkavaisvuun liittyvien keskivaikeiden tai vaikeiden virtsanpidätsvaikeuksien (äkillinen virsaamispakko, tihentynyt virsaamistarve) ja virsaamiseen liittyvien oireiden hoito, on ikääntyneiden miesten sairaus. Urizian klininen kehitystyö on tehty 45–91-vuotiailla potilailla tutkittavien keski-iän ollessa 65 vuotta. Ikääntyneiden potilaiden keskuudessa haittavaikutukset olivat samankaltaisia kuin nuorempien.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisten hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Tervydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

4.9 Yliannostus

Oireet

Solifenasiinin ja tamsulosiinin yhdistelmän yliannostus saattaa aiheuttaa vakavia antikolinergisiä vaikutuksia ja akuuttia hypotensiota. Klinisissä tutkimuksissa suurin tahattomasti otettu annos vastasi 126 mg:aa solifenasiiniä ja 5,6 mg:aa tamsulosiinihydrokloridia. Tämä annos oli hyvin siedetty, ja ainoa ilmoitettu haittavaikutus oli lievä suun kuivuminen 16 päivän ajan.

Hoito

Solifenasiinin ja tamsulosiinin yliannostustapauksessa potilaalle on annettava lääkehiiltä. Vatsahuuhotelusta on hyötyä, jos se tehdään tunnin kuluessa, mutta potilasta ei tule oksennuttaa.

Kuten muidenkin antikolinergien yhteydessä, solifenasiinikomponentin yliannostusoireita voidaan hoitaa seuraavasti:

- Vaikeat sentraaliset antikolinergiset vaikutukset, kuten hallusinaatiot tai voimakas kiihottuneisuus: hoidetaan fysostigmiilla tai karbakolilla.
- Kouristukset tai voimakas kiihottuneisuus: hoidetaan bentsodiatsepiineilla.
- Hengitysvajaus: hoidetaan avustamalla hengitystä.
- Takykardia: hoidetaan tarvittaessa oireenmukaisesti.
Beetasalpaaja on käytettävä varoen, sillä samanaikainen tamsulosiiniyliannostus saattaa aiheuttaa voimakasta hypotensiota.
- Virsaumpi: hoidetaan katetroimalla.

Kuten muidenkin muskariniireseptorien salpaajien yhteydessä, yliannostustapauksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota potilaisiin, joilla tiedetään olevan QT-ajan pidentymisen riski (esim. hypokalemia, bradykardia ja QT-väliä pidentävien lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö) ja joilla on aiemmin todettu sydänsairaus (sydänlihaksen hapenpuute, rytmihäiriöt, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta).

Tamsulosiinikomponentin yliannostuksen jälkeistä mahdollista akuuttia hypotensiota on hoidettava oireenmukaisesti. Hemodialyyssistä ei ole todennäköisesti hyötyä, sillä tamsulosiini on voimakkaasti sitoutunut plasmaproteiineihin.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamika

Farmakoterapeutinen ryhmä: Adrenergisiä alfareseptoreita salpaavat lääkeaineet.

ATC-koodi: G04CA53

Vaikutusmekanismi

Urizia on kiinteäännoksinen yhdistelmätabletti, joka sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, solifenasiinia ja tamsulosiinia. Nämä lääkeaineet vaikuttavat toisistaan riippumatta ja toisiaan täydentäen, kun niillä hidetaan eturauhasen hyvänlaatuiseen liikakasvuun liittyviä alempien virtsateiden oireita, joihin liittyy virtsanpidätysvaikeuksia.

Solifenasiini on kilpailleva ja selektiivinen muskariinireseptorien antagonistti, jolla ei ole merkittävää vaikutusta muihin tutkittuihin reseptoreihin, entsyymeihiin ja ionikanaviin. Solifenasiinin affinitetti on suurin M₃-muskariinireseptoreihin ja sen jälkeen M₁- ja M₂-muskariinireseptoreihin.

Tamsulosiini on alfa₁-adrenoreseptorin antagonistti. Se sitoutuu selektiivisesti ja kilpailevasti postsynaptisiin alfa₁-adrenoreseptoreihin, erityisesti alatyypeihin alfa_{1A} ja alfa_{1D}. Se on voimakas antagonistti alempien virtsateiden kudoksissa.

Farmakodynamiset vaikutukset

Urizia-tabletit koostuvat kahdesta vaikuttavasta aineesta, jotka vaikuttavat toisistaan riippumatta ja toisiaan täydentäen, kun niillä hidetaan eturauhasen hyvänlaatuiseen liikakasvuun liittyviä alempien virtsateiden oireita, joihin liittyy virtsanpidätysvaikeuksia:

Solifenasiini parantaa virtsanpidätyssongelmia, jotka liittyvät virtsarakon M₃-reseptoreita aktivoivaan ei-neuronaalisesti vapautuvaan asetyylikoliiniin. Ei-neuronaalisesti vapautuva asetyylikoliini herkistää uroteelin toimintaa ja ilmenee virtsaamispakkona ja usein toistuvana virtsaamisenä.

Tamsulosiini parantaa virtsaamisoireita (se lisää virtsasuihkun enimmäisnopeutta), sillä se lievittää obstruktioa rentouttamalla eturauhasen, virtsarakon kaulan ja virtsaputken sileää lihasta. Lisäksi se parantaa virtsanpidätysvaikeuksia.

Kliininen teho ja turvallisuus

Teho osoitettiin vaiheen 3 avaintutkimuksessa potilailla, joilla oli eturauhasen hyvänlaatuiseen liikakasvuun liittyviä alempien virtsateiden oireita ja virtsarakon tyhjenemiseen liittyviä (obstruktioisia) oireita sekä vähintään seuraavat virtsanpidätykseen liittyvät (irritatiiviset) oireet: ≥ 8 virtsauskertaa / 24 tuntia ja ≥ 2 virtsaamispakkotapahtumaa / 24 tuntia.

Urizia tuotti lumelääkkeeseen verrattuna tilastollisesti merkitsevän parannuksen alkuvaiheesta tutkimuksen loppuun mennessä kahdessa ensisijaisessa päätetapahtumassa, jotka olivat IPSS- (International Prostate Symptom Score) kokonaispistemääriä ja Total Urgency and Frequency Score -pistemääriä, sekä toissijaisissa päätetapahtumissa, jotka olivat virtsaamispakko, virtsaamistihesys, keskimääräinen virtsan määrä virtsauskertaa kohden, nokturia, IPPS:n virtsaamista koskeva osapistemääriä, IPSS:n virtsanpidätystä koskeva osapistemääriä, IPSS elämänlaatu (quality of life, QoL) -pistemääriä, yliaktiivisen rakon kyselyn (OAB-q) Bother -pistemääriä ja OAB-q Health Related Quality of Life (HRQoL) -pistemääriä, mukaan lukien kaikki osapistemäärat (selviytyminen, huoli, uni ja sosiaalinen). Vertailussa Urizia tuotti tamsulosiini OCAS -valmistetta suuremman parannuksen Total Urgency and Frequency Score -pistemääressä sekä virtsaamistihedydessä, keskimääräisessä virtsan määrässä virtsauskertaa kohden sekä IPSS:n virtsanpidätystä koskevassa osapistemääressä. Lisäksi IPSS QoL- ja OAB-Q HRQoL -kokonaispistemääriä sekä kaikki osapistemäärat paranivat merkitsevästi. Odotetusti Urizia oli myös IPSS-kokonaispistemääressä vertailukelpoinen tamsulosiini OCAS -valmisteen kanssa ($p < 0,001$).

5.2 Farmakokinetiikka

Urizia

Seuraavat tiedot koskevat farmakokineettisiä parametreja toistuvien Urizia-annosten jälkeen. Toistuvien annosten suhteellista biologista hyötyosuutta koskevassa tutkimuksessa osoitettiin, että Urizian annostelu tuottaa altistuksen, joka on verrattavissa solifenasiiniin ja tamsulosiimi OCAS -valmisteen samanaikaiseen annosteluun erillisinä tabletteina yhtä suurilla annoksilla.

Imeityminen

Urizian toistuvan annostelon jälkeen solifenasiinin t_{max} -arvo oli eri tutkimuksissa 4,27–4,76 tuntia ja tamsulosiinin t_{max} -arvo oli 3,47–5,65 tuntia. Solifenasiinin vastaava C_{max} -arvo vaihteli välillä 26,5–32,0 ng/ml ja tamsulosiinin C_{max} -arvo välillä 6,56–13,3 ng/ml. Solifenasiinin AUC-arvot vaihtelivat välillä 528–601 ng.h/ml ja tamsulosiinin välillä 97,1–222 ng.h/ml. Solifenasiinin absoluuttinen biologinen hyötyosuus on noin 90 %, kun taas tamsulosiimista arvioidaan imeityvän 70–79 %.

Ruoan vaikutusta tutkittiin kerta-annoksen imeytymiseen annostelemalla Urizia paasto-olosuhteissa, vähärasvaisen ja vähäkalorisen aamiaisen jälkeen sekä runsasrasvaisen ja runsaskalorisen aamiaisen jälkeen. Urizian tamsulosiinikomponentin C_{max} -arvo suureni 54 % runsasrasvaisen ja runsaskalorisen aamiaisen jälkeen verrattuna paastotilanteeseen, ja AUC-arvo puolestaan suureni 33 %. Vähärasvainen ja vähäkalorinen aamiainen ei vaikuttanut tamsulosiiniin farmakokinetiikkaan. Vähärasvainen ja vähäkalorinen tai runsasrasvainen ja runsaskalorinen aamiainen ei vaikuttanut solifenasiinikomponenttiin farmakokinetiikkaan.

Solifenasiinin ja tamsulosiimi OCAS -valmisteen samanaikainen annostelu suurensi tamsulosiinin C_{max} -arvon 1,19-kertaiseksi ja AUC-arvon 1,24-kertaiseksi verrattuna AUC-arvoon, kun tamsulosiimi OCAS -tabletit annosteltiin yksinään. Tamsulosiimin ei havaittu vaikuttavan solifenasiinin farmakokinetiikkaan.

Eliminaatio

Urizian kerta-annoksen jälkeen solifenasiinin $t_{1/2}$ -aika vaihteli välillä 49,5–53,0 tuntia ja tamsulosiinin välillä 12,8–14,0 tuntia.

Urizian kanssa toistuvasti annosteltu verapamiili 240 mg q.d. suurensi solifenasiinin C_{max} -arvoa 60 % ja AUC-arvoa 63 %. Tamsulosiinin C_{max} -arvo suureni 115 % ja AUC-arvo 122 %. C_{max} - ja AUC-arvojen muutokset ei pidetä kliinisesti merkittävinä.

Populaatiofarmakokineettisessä vaiheen 3 tutkimusaineistojen analyysissä todettiin, että tamsulosiinin farmakokinetiikassa tapahtuva yksilöiden sisäinen vaihtelu liittyi iän, pituuden ja happaman α_1 -glykoproteiinien plasmapitoisuksien eroihin. Korkeampi ikä ja hapan α_1 -glykoproteiini liittyi AUC-arvon kasvuun, kun taas pituuden lisääntymisen liittyi AUC-arvon pienemiseen. Samat tekijät aiheuttivat vastaavankaltaiset muutokset solifenasiinin farmakokinetiikkaan. Lisäksi gammaglutamyltranspeptidaasin lisääntymisen liittyi korkeampiin AUC-arvoihin. Näitä AUC-arvojen muutoksia ei pidetä klienisesti merkittävinä.

Urizian farmakokineettisiä ominaisuuksia täydentävät tiedot valmisten yksittäisten vaikuttavien aineiden käytöstä erillisinä tuotteina:

Solifenasiimi

Imeytyminen

Solifenasiinitablettien osalta t_{max} ei ole riippuvainen annoksesta, ja se on 3–8 tuntia toistuvien annosten jälkeen. C_{max} - ja AUC-arvo suurenevat suhteessa annokseen, kun annos on 5–40 mg. Absoluuttinen biologinen hyötyosuus on noin 90 %.

Jakautuminen

Laskimonsisäisen annostelun jälkeen solifenasiinin ilmeinen jakaantumistilavuus on noin 600 l. Solifenasiimi sitoutuu suressa määrin (noin 98 %) plasman proteiineihin, pääasiassa happamaan α_1 -glykoproteiiniin.

Biotransformaatio

Solifenasiimilla on vähäinen ensikierron vaikutus ja aine metaboloituu hitaasti. Solifenasiini metaboloituu pääasiassa maksassa erityisesti CYP3A4:n välityksellä. On myös vaihtoehtoisia metaboliareittejä, jotka saattavat osallistua solifenasiinin metabolismaan. Solifenasiinin systeeminen puhdistuma on noin 9,5 l/h. Suun kautta tapahtuvan annostelun jälkeen plasmassa on todettu solifenasiinin lisäksi yksi farmakologisesti aktiivinen metaboliitti (*4R*-hydroksisolifenasiini) ja kolme ei-aktiivista metaboliittia (solifenasiinin *N*-glukuronidi, *N*-oksidi ja *4R*-hydroksi-*N*-oksidi).

Eliminaatio

Kun suun kautta annettiin 10 mg ^{14}C -merkittyä solifenasiinia kerta-annoksen, noin 70 % radioaktiivisuudesta mitattiin virtsasta ja 23 % ulosteesta 26 vuorokauden aikana. Noin 11 % radioaktiivisesti merkitystä lääkeaineesta erityi virtsaan muuttumattomassa muodossa, noin 18 % *N*-oksidimetaboliittina, 9 % *4R*-hydroksi-*N*-oksidimetaboliittina ja 8 % *4R*-hydroksimetaboliittina (aktiivinen metaboliitti).

Tamsulosiini

Imeytyminen

Tamsulosiini OCAS -valmisteen t_{max} on 4–6 tuntia toistuvan 0,4 mg/vrk annostelun jälkeen. C_{max} - ja AUC-arvo suurenevat suhteessa annokseen, kun annos on 0,4–1,2 mg. Absoluuttinen biologinen hyötyosuus on arviontulo noin 57 %.

Jakautuminen

Laskimonsisäisen annostelun jälkeen tamsulosiinin jakaantumistilavuus on noin 16 l. Keskimäärin 99 % tamsulosiinista on sitoutuneena plasman proteiineihin, pääasiassa happamaan α_1 -glykoproteiiniin.

Biotransformaatio

Tamsulosiinilla on vähäinen ensikierron vaikutus ja se metaboloituu hitaasti. Tamsulosiini metaboloituu pääasiassa maksassa erityisesti CYP3A4:n ja CYP2D6:n välityksellä. Tamsulosiinin systeeminen puhdistuma on noin 2,9 l/h. Suurin osa tamsulosiinista on plasmassa muuttumattoman aktiivisenä aineena. Yksikään metaboliiteista ei ole alkuperäistä yhdistettä aktiivisempi.

Eliminaatio

Kun suun kautta annettiin 0,2 mg ^{14}C -merkittyä tamsulosiinia kerta-annoksen, noin 76 % radioaktiivisuudesta mitattiin virtsasta ja 21 % ulosteesta 1 viikon jälkeen. Noin 9 % radioaktiivisesti merkitystä lääkeaineesta erityi virtsaan muuttumattomassa muodossa, noin 16 % o-de-etyloidun tamsulosiinin sulfaattina ja 8 % o-etoksifenoksietikkahappona.

Erityisryhmät

Ikääntyneet

Tutkittavien ikä vaihteli kliinisissä farmakologisissa ja biofarmaseuttisissa tutkimuksissa välillä 19–79 vuotta. Urizian annon jälkeen suurimmat keskimääräiset altistumisarvot todettiin ikääntyneillä tutkittavilla, vaikka arvot menivät lähes täysin päälekkään nuoremmilla tutkittavilla todettujen arvojen kanssa. Havainto vahvistettiin vaiheen 2 ja 3 tutkimusaineistojen populaatiofarmakineettisessä analyssissä. Uriziaa voidaan käyttää ikääntyneillä potilailla.

Munuaisten vajaatoiminta

Urizia

Uriziaa voidaan käyttää potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta, mutta sitä on käytettävä varoen potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta.

Urizian farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Seuraavat tiedot perustuvat yksittäisiä vaikuttavia aineita koskeviin, käytettävissä oleviin munuaisten vajaatoimintaan liittyviin tietoihin.

Solifenasiini

Solifenasiinin AUC- ja C_{max} -arvot eivät olleet merkittävästi erilaisia potilailla, joilla oli lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta terveisiin vapaaehtoisiin verrattuna. Potilailla, joilla oli vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiiniipuhdistuma $\leq 30 \text{ ml/min}$) solifenasiinialtistus oli merkittävästi suurempi kuin verrokeilla (C_{max} noin 30 %, AUC-arvo yli 100 % ja $t_{1/2}$ yli 60 % suurempi). Kreatiiniipuhdistuman ja solifenasiinipuhdistuman välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä suhde.

Farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu hemodialysisihoitoa saavilla potilailla.

Tamsulosiini

Tamsulosiinin farmakokinetiikkaa on vertailtu 6 tutkittavalla, joilla oli lievä tai keskivaikea ($30 \leq \text{kreatiiniipuhdistuma} < 70 \text{ ml/min}/1,73 \text{ m}^2$) tai vaikea ($< 30 \text{ ml/min}/1,73 \text{ m}^2$) munuaisten vajaatoiminta, sekä 6 terveellä tutkittavalla (kreatiiniipuhdistuma $> 90 \text{ ml/min}/1,73 \text{ m}^2$). Vaikka tamsulosiinin plasmapitoisuudessa havaittiin muutos, joka johtui happamaan α_1 -glykoproteiiniin sitoutumisen muutoksesta, vapaan (aktiivisen) tamsulosiinihydrokloridin pitoisuus sekä luontainen puhdistuma pysyivät jokseenkin vakiona. Valmistetta ei ole tutkittu potilailla, joilla on loppuvaiheen munuaissairaus (kreatiiniipuhdistuma $< 10 \text{ ml/min}/1,73 \text{ m}^2$).

Maksan vajaatoiminta

Urizia

Uriziaa voidaan käyttää potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta, mutta sen käyttö on vasta-aiheista potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta.

Urizian farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Seuraavat tiedot perustuvat yksittäisiä vaikuttavia aineita koskeviin, käytettävissä oleviin maksan vajaatoimintaan liittyviin tietoihin.

Solifenasiini

Potilailla, joilla oli keskivaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-pisteet 7–9), C_{max} ei muuttunut, AUC-arvo suurenne 60 %:lla ja $t_{1/2}$ kaksinkertaistui. Solifenasiinin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta.

Tamsulosiini

Tamsulosiinin farmakokinetiikkaa on vertailtu 8 tutkittavalla, joilla oli keskivaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-pistemääärä 7–9) ja 8 terveellä tutkittavalla. Vaikka tamsulosiinin plasmapitoisuudessa havaittiin muutos, joka johtui happamaan α_1 -glykoproteiiniin sitoutumisen muutoksesta, vapaan (aktiivisen) tamsulosiinin pitoisuus ei muuttunut merkitsevästi ja vapaan tamsulosiinin luontaisessa puhdistumassa tapahtui vain kohtalainen (32 %) muutos. Tamsulosiinia ei ole tutkittu potilailla, joilla on valkeaa maksan vajaatoiminta.

5.3 Pre kliniset tiedot turvallis uudesta

Uriziailla ei ole tehty ei-kliinisä tutkimuksia. Solifenasiinia ja tamsulosiinia on tutkittu erikseen laajalti eläimillä tehdynässä toksisuustutkimuksissa, joissa saadut havainnot ovat vastanneet tunnettua farmakologisia vaikutuksia. Ei-kliiniset tiedot eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmiselle perustuen konventionaalisiin turvallisuusfarmakologisiin, toistuvan annostelun toksisuutta koskeviin, hedelmällisyyttä tai alkion- tai sikiönkehitystä koskeviin ja genotoksisuus- ja karsinogeenisyyystutkimuksiin, eivätkä aiheuta huolta haittavaikutusten voimistumisen tai synergistisen vaikutuksen osalta, kun solifenasiinia ja tamsulosiinia annetaan samanaikaisesti.

6. FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaineet

Mannitoli (E421)

Maltoosi

Makrogoli 7.000.000

Makrogoli 8000

Magnesiumstearaatti (E470b)

Butylyhydroksitolueeni (E321)

Kolloidinen vedetön piidioksidi (E551)

Hypromelloosi (E464)

Punainen rautaoksidi (E172)

6.2 Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3 Kestoaika

3 vuotta.

6.4 Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

Alumiiniläpäinopakkaukset, joissa 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tai 200 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle

Käytämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7. MYYNTILUVAN HALTIJA

Astellas Pharma a/s
Arne Jacobsens Allé 15
2300 Kööpenhamina S
Tanska

8. MYYNTILUVAN NUMERO

31656

9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämispäivä: 29. tammikuuta 2014
Viimeisin uudistamispäivä: 6.5.2018

10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

1.8.2021

PRODUKTRESUMÉ

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Urizia 6 mg/0,4 mg tablett med modifierad frisättning.

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En tvåskiktstablett innehåller ett skikt med 6 mg solifenacinsuccinat motsvarande 4,5 mg solifenacin och ett skikt med 0,4 mg tamsulosinhydroklorid motsvarande 0,37 mg tamsulosin.

För fullständig förteckning över hjälpmännen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Tablett med modifierad frisättning

Tabletten är rund, ca 9 mm i diameter, röd filmdragerad och präglad med "6/0,4".

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Behandling av måttliga till svåra trängningar, ökad urineringsfrekvens och miktionsbesvär vid benign prostatahyperplasi (BPH) hos män som inte svarar tillfredsställande på behandling med monoterapi.

4.2 Dosering och administreringssätt

Vuxna män, även äldre

En tablett Urizia (6 mg/0,4 mg) en gång dagligen tas oralt med eller utan föda. Maximal dygnsdos är en tablett Urizia (6 mg/0,4 mg).

Tabletten ska sväljas hel, utan att bita i eller tugga den. Krossa inte tabletten.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Effekten av njurfunktionsnedsättning på farmakokinetiken för Urizia har inte studerats. Effekten på farmakokinetiken för de enskilda aktiva substanserna är dock välkänd (se avsnitt 5.2). Urizia kan användas av patienter med lätt till måttlig njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance > 30 ml/min). Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance ≤ 30 ml/min) bör behandlas med försiktighet och maximal dygnsdos hos dessa patienter är en tablett Urizia (6 mg/0,4 mg) (se avsnitt 4.4).

Patienter med nedsatt leverfunktion

Effekten av leverfunktionsnedsättning på farmakokinetiken för Urizia har inte studerats. Effekten på farmakokinetiken för de enskilda aktiva substanserna är dock välkänd (se avsnitt 5.2). Urizia kan användas av patienter med lätt leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh score ≤ 7). Patienter med måttlig leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh score 7-9) bör behandlas med försiktighet och maximal dygnsdos hos dessa patienter är en tablett Urizia (6 mg/0,4 mg). Hos patienter med svår leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh score > 9) är användningen av Urizia kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Måttliga och starka hämmare av cytokerom P450 3A4

Maximal dygnsdos bör begränsas till en tablett Urizia (6 mg/0,4 mg). Urizia bör användas med försiktighet av patienter som samtidigt behandlas med måttliga eller starka CYP3A4-hämmare, såsom verapamil, ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, itrakonazol (se avsnitt 4.5).

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant indikation för användning av Urizia hos barn och ungdomar.

4.3 Kontraindikationer

- Patienter med överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1
- Patienter som genomgår hemodialys (se avsnitt 5.2)
- Patienter med svår leverfunktionsnedsättning (se avsnitt 5.2)
- Patienter med svår njurfunktionsnedsättning som även behandlas med en kraftig cytokrom P450 (CYP) 3A4-hämmare, t ex ketokonazol (se avsnitt 4.5)
- Patienter med måttlig leverfunktionsnedsättning som även behandlas med en kraftig cytokrom P450 (CYP) 3A4-hämmare, t ex ketokonazol (se avsnitt 4.5)
- Patienter med svåra gastrointestinala tillstånd (inkluderande toxisk megakolon), myastenia gravis eller trångvinkelglaukom samt patienter med risk för dessa tillstånd
- Patienter med ortostatisk hypotension i anamnesen.

4.4 Varningar och försiktighet

Urizia bör användas med försiktighet av patienter med:

- svår njurfunktionsnedsättning
- risk för urinretention
- gastrointestinala obstruktiva sjukdomar
- risk för minskad gastrointestinal motilitet
- hiatus hernia/gastroesophageal reflux och/eller samtidigt intag av läkemedel (såsom bisfosfonater) som kan utlösa eller förvärra en esofagit
- autonom neuropati.

Patienten skall undersökas för att utesluta förekomst av andra tillstånd som orsakar liknande symtom som benign prostatahyperplasi.

Andra orsaker till frekventa miktioner (hjärtsvikt eller njursjukdom) bör bedömas innan behandling med Urizia påbörjas. Om en urinvägsinfektion förekommer, bör lämplig antibakteriell behandling sättas in.

QT-förlängning och torsade de pointes har observerats hos patienter med riskfaktorer, såsom tidigare QT-förlängningssyndrom och hypokalemia, som behandlas med solifenacinsuccinat.

Angioödem med luftvägsobstruktion har rapporterats hos vissa patienter som behandlats med solifenacinsuccinat och tamsulosin. Om angioödem uppträder, ska Urizia sättas ut och inte sättas in på nytt. Lämplig behandling och/eller åtgärder bör vidtas.

Anafylaktisk reaktion har rapporterats hos vissa patienter som behandlats med solifenacinsuccinat. Hos patienter som utvecklar anafylaktiska reaktioner ska Urizia sättas ut och lämplig behandling och/eller åtgärder bör vidtas.

Som gäller för andra alfa₁-adrenoceptorantagonister, kan en blodtryckssänkning förekomma i enstaka fall under behandling med tamsulosin, till följd av detta kan syncope förekomma i sällsynta fall. Patienter som påbörjar behandling med Urizia bör uppmanas att sätta eller lägga sig ner vid första tecken på ortostatisk hypotension (yrsel, svaghet) till dess symtomen har upphört.

IFIS (Intraoperative Floppy Iris Syndrome, en variant av liten pupill-syndrom) har observerats under katarakt- och glaukomkirurgi hos vissa patienter som behandlas eller tidigare behandlats med tamsulosinhydroklorid. IFIS kan öka risken för ögonkomplikationer under och efter operationen. Behandling med Urizia rekommenderas därför inte att påbörjas hos patienter för vilka katarakt- eller glaukomkirurgi planeras. Utsättning av Urizia 1-2 veckor innan katarakt- eller glaukomkirurgi har angetts vara till hjälp, nyttan av behandlingsutsättning har dock inte fastställts. Vid undersökning inför en planerad katarakt- eller glaukomoperation, bör kirurgen och oftalmologisk personal ta med i beaktande om patienter behandlas eller

har behandlats med Urizia för att tillförsäkra sig att lämpliga säkerhetsåtgärder kan vidtas för att ta hand om IFIS under operation.

Urizia bör användas med försiktighet då det ges tillsammans med måttliga och starka CYP3A4-hämmare (se avsnitt 4.5) och det bör inte användas tillsammans med starka CYP3A4-hämmare, t ex ketokonazol, hos patienter som enligt fenotyp är dåliga metaboliserares av CYP2D6 eller som använder starka CYP2D6-hämmare, t ex paroxetin.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig behandling med läkemedel med antikolinerga egenskaper kan resultera i mer uttalade terapeutisk effekter och oönskade effekter. Ett intervall på ungefär en vecka skall tillåtas efter att behandling med Urizia har avslutats, innan påbörjandet av en antikolinerg behandling. Den terapeutiska effekten av solifenacin kan minska vid samtidig administrering av kolinerga receptoragonister.

Interaktioner med CYP3A4- och CYP2D6-hämmare

Samtidig administrering av solifenacin och ketokonazol (en kraftig CYP3A4-hämmare) (200 mg/dygn) resulterade i en 1,4- och 2,0-faldig ökning i C_{max} och AUC för solifenacin, medan ketokonazol vid dosen 400 mg/dygn resulterade i en 1,5- och 2,8-faldig ökning i C_{max} och AUC för solifenacin.

Samtidig administrering av tamsulosin och ketokonazol vid dosen 400 mg/dygn resulterade i en 2,2- och 2,8-faldig ökning i C_{max} respektive AUC för tamsulosin.

Eftersom samtidig administrering med starka CYP3A4-hämmare, som ketokonazol, ritonavir, nelfinavir och itrakonazol kan ge upphov till ökad exponering för både solifenacin och tamsulosin, bör Urizia användas med försiktighet i kombination med starka CYP3A4-hämmare.

Urizia bör inte ges tillsammans med starka CYP3A4-hämmare hos patienter som dessutom enligt fenotyp är dåliga metaboliserares av CYP2D6 eller som redan står på starka CYP2D6-hämmare.

Samtidig administrering av Urizia och verapamil (en måttlig CYP3A4-hämmare) resulterade i en ca 2,2-faldig ökning i C_{max} och AUC (ytan under kurvan) för tamsulosin samt en ca 1,6-faldig ökning i C_{max} och AUC för solifenacin. Urizia bör användas med försiktighet i kombination med måttliga CYP3A4-hämmare.

Samtidig administrering av tamsulosin och den svaga CYP3A4-hämmaren cimetidin (400 mg var 6:e timme) resulterade i en 1,44-faldig ökning i AUC för tamsulosin, medan C_{max} inte ändrades signifikant. Urizia kan användas tillsammans med svaga CYP3A4-hämmare.

Samtidig administrering av tamsulosin och den starka CYP2D6-hämmaren paroxetin (20 mg/dygn) resulterade i en ökning i C_{max} och AUC för tamsulosin med 1,3- respektive 1,6 gånger. Urizia kan användas tillsammans med CYP2D6-hämmare.

Effekten av enzyminduktion på farmakokinetiken för solifenacin och tamsulosin har inte studerats. Eftersom solifenacin och tamsulosin metaboliseras via CYP3A4, är farmakokinetiska interaktioner med CYP3A4-inducerare (t ex rifampicin) möjliga och kan minska plasmakoncentrationen för solifenacin och tamsulosin.

Övriga interaktioner

Följande information finns tillgänglig för de enskilda aktiva substanserna.

Solifenacin

- Solifenacin kan minska effekten av läkemedel som stimulerar motiliteten i magtarmkanalen, t ex metoklopramid och cisaprid.
- In-vitrostudier med solifenacin har visat att vid terapeutiska koncentrationer, hämmar solifenacin inte CYP1A1/2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 eller 3A4. Inga interaktioner förväntas därför mellan solifenacin och läkemedel som metaboliseras av dessa CYP enzymer.

- Intag av solifenacin påverkade inte farmakokinetiken för *R*-warfarin eller *S*-warfarin med avseende på effekten på protrombintid.
- Intag av solifenacin påverkade inte farmakokinetiken för digoxin.

Tamsulosin

- Administrering tillsammans med andra alfa₁-adrenoceptorantagonister kan ge upphov till hypotensiva effekter.
- *In vitro*, påverkades inte den obundna fraktionen av tamsulosin i human plasma av diazepam, propranolol, triklormetiazid, klormadinon, amitriptyline, diklofenak, glibenzamid, simvastatin eller warfarin. Tamsulosin påverkade inte den obundna fraktionen av diazepam, propranolol, triklormetiazid eller klormadinon. Diklofenak och warfarin kan däremot öka elimineringshastigheten för tamsulosin.
- Administrering tillsammans med furosemid orsakar en nedgång i plasmanivåerna för tamsulosin, men eftersom nivåerna håller sig inom normalvärderna, kan samtidig användning accepteras.
- *In vitro*-studier med tamsulosin har visat att vid terapeutiska koncentrationer hämmar inte tamsulosin CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 eller 3A4. Inga interaktioner förväntas därför mellan tamsulosin och läkemedel som metaboliseras via dessa CYP-enzymmer.
- Inga interaktioner har setts när tamsulosin gavs tillsammans med atenolol, enalapril eller teofyllin.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Fertilitet

Effekten av Urizia på fertilitet har inte fastställts. Djurstudier med solifenacin eller tamsulosin tyder inte på skadliga effekter på fertilitet och tidig embryonal utveckling (se avsnitt 5.3).

Ejakulationsbesvär har observerats vid korta och långa kliniska studier med tamsulosin. Fall av ejakulationsbesvär, retrograd ejakulation och utebliven ejakulation har rapporterats efter att godkännandet för produkten erhållits.

Graviditet och amning

Urizia är inte indicerat för användning av kvinnor.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier avseende effekterna av Urizia på förmågan att köra bil eller använda maskiner har utförts. Patienter bör däremot informeras om att yrsel, dimsyn, trötthet och mindre vanligt sömnighet kan förekomma, vilket kan påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner negativt (se avsnitt 4.8).

4.8 Biverkningar

Sammanfattningsav säkerhetsprofilen

Urizia kan orsaka antikolinerga biverkningar med, i allmänhet, lätt till måttlig svårighetsgrad. De vanligast rapporterade biverkningarna under de kliniska studier som utförts i samband med utvecklingen av Urizia var munorrhett (9,5%), följt av konstipation (3,2%) och dyspepsi (inkluderande buksmärta; 2,4%). Andra vanliga biverkningar är yrsel (inkluderande vertigo; 1,4%), dimsyn (1,2%), trötthet (1,2%) och ejakulationsbesvär (inkluderande retrograd ejakulation; 1,5%). Akut urinretention (0,3%, mindre vanligt) är den mest allvarliga biverkningsreaktion som har observerats under behandling med Urizia i kliniska studier.

Tabell över biverkningar

I tabellen nedan i kolumnen över frekvensen biverkningar med Urizia anges biverkningar som har setts under de dubbel-blinda kliniska studier som utförts under utvecklingen av Urizia (baserade på rapporter avseende behandlingsrelaterade biverkningar, som rapporterats av minst två patienter och förekommit i högre frekvens än för placebo i de dubbel-blinda studierna).

I kolumnerna över biverkningsfrekvenserna för solifenacin respektive tamsulosin anges biverkningar som tidigare rapporterats för en av de enskilda komponenterna (som presenteras i produktresumén för solifenacin 5 och 10 mg respektive tamsulosin 0,4 mg) som kan förekomma då Urizia ges (några av dessa har inte observerats under det kliniska utvecklingsprogrammet för Urizia).

Frekvensen för biverkningarna definieras enligt följande: mycket vanliga ($\geq 1/10$); vanliga ($\geq 1/100$ till $< 1/10$); mindre vanliga ($\geq 1/1\,000$ till $< 1/100$); sällsynta ($\geq 1/10\,000$ till $< 1/1\,000$); mycket sällsynta ($< 1/10\,000$), inte känd (kan inte uppskattas från tillgängliga data).

Organsystemklass enligt MedDRA	Biverkningsfrekvens som observerats under utvecklingen av Urizia	Biverkningsfrekvens som observerats för de enskilda substanserna	
		Solifenacin 5 mg och 10 mg[#]	Tamsulosin 0,4 mg[#]
Infektioner och infestationer			
Urinvägsinfektion		Mindre vanlig	
Cystit		Mindre vanlig	
Immunsystemet			
Anafylaktisk reaktion		Inte känd *	
Metabolism och nutrition			
Minskad aptit		Inte känd *	
Hyperkalemi		Inte känd *	
Psykiska störningar			
Hallucination		Mycket sällsynt*	
Förvirringstillstånd		Mycket sällsynt*	
Delirium		Inte känd *	
Centrala och perifera nervsystemet			
Yrsel	Vanlig	Sällsynt*	Vanlig
Sömnighet		Mindre vanlig	
Dysgeusi		Mindre vanlig	
Huvudvärk		Sällsynt *	Mindre vanlig
Synkope			Sällsynt
Ögon			
Dimsyn	Vanlig	Vanlig	Inte känd *
IFIS (Intraoperative Floppy Iris Syndrome)			Inte känd **
Torra ögon		Mindre vanlig	
Glaukom		Inte känd *	
Hjärtat			
Palpitationer		Inte känd *	Mindre vanlig
Torsade de pointes		Inte känd *	
EKG QT-förlängning		Inte känd *	
Förmaksflimmer		Inte känd *	Inte känd *
Arytmia			Inte känd *
Takykardi		Inte känd *	Inte känd *
Blodkärl			
Ortostatisk hypotension			Mindre vanlig
Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum			
Rinit			Mindre vanlig
Torra nässlemhinnor		Mindre vanlig	
Dyspné			Inte känd *
Dysfoni		Inte känd *	
Epistaxis			Inte känd *
Magtarmkanalen			
Muntorrhett	Vanlig	Mycket vanlig	

Organsystemklass enligt MedDRA	Biverkningsfrekvens som observerats under utvecklingen av Urizia	Biverkningsfrekvens som observerats för de enskilda substanserna	
		Solifenacin 5 mg och 10 mg[#]	Tamsulosin 0,4 mg[#]
Dyspepsi	Vanlig	Vanlig	
Konstipation	Vanlig	Vanlig	Mindre vanlig
Illamående		Vanlig	Mindre vanlig
Buksmärta		Vanlig	
Gastroesophageal refluxsjukdom		Mindre vanlig	
Diarré			Mindre vanlig
Torr i halsen		Mindre vanlig	
Kräkning		Sällsynt*	Mindre vanlig
Obstruktion i kolon		Sällsynt	
Fecal impaktion		Sällsynt	
Ileus		Inte känd *	
Obehagskänsla i buken		Inte känd *	
Lever och gallvägar			
Leverrubbning		Inte känd *	
Avvikelse i leverfunktionstest		Inte känd *	
Hud och subkutan vävnad			
Pruritus	Mindre vanlig	Sällsynt*	Mindre vanlig
Torr hud		Mindre vanlig	
Utslag		Sällsynt*	Mindre vanlig
Urtikaria		Mycket sällsynt*	Mindre vanlig
Angioödem		Mycket sällsynt*	Sällsynt
Stevens-Johnsons syndrom			Mycket sällsynt
Erytema multiforme		Mycket sällsynt*	Inte känd *
Exfoliativ dermatit		Inte känd *	Inte känd *
Muskuloskeletal systemet och bindväv			
Muskelsvaghet		Inte känd *	
Njurar och urinvägar			
Urinretention***	Mindre vanlig	Sällsynt	
Miktionssvårighet		Mindre vanlig	
Njurfunktionsnedsättning		Inte känd*	
Reproduktionsorgan och bröstkörtel			
Ejakulationsbesvär inkluderande retrograd ejakulation och utebliven ejakulation	Vanlig		Vanlig
Priapism			Mycket sällsynt
Allmänna symptom och/eller symptom vid administreringsstället			
Trötthet	Vanlig	Mindre vanlig	
Perifert ödem		Mindre vanlig	
Asteni			Mindre vanlig

[#]: Biverkningarna för solifenacin och tamsulosin som finns med i denna tabell är de biverkningar som anges i produktresumén för de båda produkterna.

*: från rapportering efter marknadsföring. Eftersom dessa spontanrapporterade fall är från den internationella erfarenheten efter marknadsföring kan inte frekvenserna och den roll solifenacin eller tamsulosin haft för uppkomsten fastställas på ett tillförlitligt sätt.

**: från rapportering efter marknadsföring, observerade under katarakt- och glaukomkirurgi.

***: se avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet.

Långtidssäkerhet med Urizia

Den biverkningsprofil som setts vid behandling i upp till 1 år liknar den som setts i 12-veckorsstudierna.

Läkemedlet tolereras väl och inga särskilda biverkningar har satts i samband med långtidsanvändning.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Beträffande urinretention se avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet.

Äldre

Den terapeutiska indikationen för Urizia, måttliga till svåra lagringssymtom (trängningar, ökad urineringsfrekvens) och miktionsbesvär vid benign prostatahyperplasi (BPH), är en sjukdom som förekommer hos äldre män. Den kliniska utvecklingen av Urizia har utförts på patienter i åldersgruppen 45 till 91 år, genomsnittsalder var 65 år. Biverkningarna i den äldre populationen liknade de som förekommer i den yngre populationen.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

4.9 Överdosering

Symtom

Överdosering med kombinationen solifenacin och tamsulosin kan potentiellt resultera i svåra antikolinerga effekter plus akut hypotension. Den högsta dos som tagits av misstag under en klinisk studie motsvarar 126 mg solifenacinsuccinat och 5,6 mg tamsulosinhydroklorid. Denna dos tolererades väl, med lätt muntorrhet i 16 dagar som enda rapporterade biverkning.

Behandling

I händelse av överdos med solifenacin och tamsulosin, bör patienten behandlas med aktivt kol.

Ventralköljning kan tillämpas om den utförs inom 1 timme, kräkning bör däremot inte framkallas.

Som för andra antikolinerga läkemedel, kan symtom på överdosering orsakad av solifenacinkomponenten behandlas enligt följande:

- Svåra centrala antikolinerga effekter som t ex hallucinationer eller uttalad excitation: behandlas med fysostigmin eller karbakol.
- Konvulsioner eller uttalad excitation: behandlas med benzodiazepiner.
- Respiratorisk insufficiens: behandlas med konstgjord andning.
- Takykardi: behandlas symptomatiskt vid behov. Betablockerande medel bör användas med försiktighet, eftersom samtidig överdosering med tamsulosin potentiellt kan inducera svår hypotension.
- Urinretention: behandlas med kateterisering.

Som för andra läkemedel med antimuskarin effekt, i händelse av överdosering bör särskild uppmärksamhet fästas på patienter med en känd risk för QT-förlängning (t ex hypokalemia, bradykardi och samtidig administrering av läkemedel för vilka det är känt att de kan förlänga QT-intervallet) och relevanta befintliga hjärtsjukdomar (t ex ischemi i myokardiet, arytmia, hjärtsvikt).

Akut hypotension, som kan uppstå efter överdosering orsakad av tamsulosin, bör behandlas symptomatiskt. Hemodialys är troligtvis inte till hjälp eftersom tamsulosin i mycket hög grad binds till plasmaproteiner.

5. FARMAKOLOGISKA EGENDOMSVERK

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: alfa-adrenoreceptor antagonister

ATC-kod: G04CA53

Verkningsmekanism

Urizia är en fast kombination av två aktiva substanser, solifenacin och tamsulosin, i samma tablett. Dessa läkemedelssubstanser har oberoende och kompletterande verkningsmekanismer för behandling av LUTS (nedre urinvägssymtom) i samband med BPH, med lagringssymtom.

Solifenacin är en kompetitiv och selektiv antagonist hos muskarinreceptorer som saknar affinitet av betydelse för olika andra receptorer, enzymer och jonkanaler som testats. Solifenacin har den högsta affiniteten till muskarin M₃-receptorer, följt av muskarin M₁- och M₂-receptorer.

Tamsulosin är en alfa₁-adrenoreceptor (AR)-antagonist. Den binds selektivt och kompetitivt till postsynaptiska alfa₁-AR, särskilt till subtyperna alfa_{1A} och alfa_{1D} och är en potent antagonist i de nedre urinvägarnas vävnad.

Farmakodynamisk effekt

Urizia tablett består av två aktiva substanser med oberoende och kompletterande effekter vid LUTS i samband med BPH med lagringssymtom:

Solifenacin förbättrar lagringsfunktionsbesvär relaterade till icke-neuronal frisättning av acetylkolin som aktiverar M₃-receptorer i blåsan. Icke-neuronalt frisatt acetylkolin ökar sensiteten hos den uroteriala känselfunktionen som visar sig som urinträngning och ökad urineringsfrekvens.

Tamsulosin förbättrar miktionssymtom (ökar den maximala urinföldeshastigheten) genom att minska obstruktion genom relaxering av den mjuka muskulaturen i prostata, blåshalsen och urinrören. Det förbättrar även lagringssymtom.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekt visades i en pivotal fas-3 studie hos patienter med LUTS i samband med BPH med miktions-(obstruktiva) symtom med minst följande grad av lagrings- (irritativa) symtom: ≥ 8 miktioner/dygn och ≥ 2 episoder av urinträngning/dygn.

Urizia visade statistiskt signifikant förbättring från utgångsvärde till dess studien avslutades jämfört med placebo avseende de två primära endpointer, total International Prostate Symptom Score (IPSS) och Total Urgency and Frequency Score samt avseende de sekundära endpointer urinträngning, miktionsfrekvens, genomsnittlig volym per miktion, nocturi, IPSS Voiding sub-score, IPSS Storage sub-score, IPSS Quality of Life (QoL), Overactive Bladder questionnaire (OAB-q) Bother score och OAB-q Health Related Quality of Life (HRQoL) score inkluderande alla sub-scores (coping, oro, sömn och socialt). Urizia visade en avsevärd förbättring jämfört med tamsulosin OCAS (Oral Controlled Absorption System) avseende Total Urgency and Frequency Score, såväl som på miktionsfrekvens, genomsnittlig tömningsvolym per miktion och IPSS storage sub-score. Detta åtföljdes av signifikanta förbättringar av IPSS QoL och OAB-Q HRQoL total score inkluderande alla sub-scores. Urizia var därtill som förväntat inte sämre jämfört med tamsulosin OCAS avseende total IPSS ($p < 0,001$).

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Urizia

I informationen nedan presenteras de farmakokinetiska parametrarna efter multipel dosering med Urizia. En relativ biotillgänglighetsstudie med multipla doser visade att administrering av Urizia resulterar i jämförbar

exponering som den vid samtidig administrering via det oralt kontrollerade absorptionssystemet (OCAS) av två separata tablettor innehållande solifenacin respektive tamsulosin i motsvarande dos.

Absorption

Efter upprepad dosering med Urizia, varierade t_{max} för solifenacin mellan 4,27 timmar och 4,76 timmar i olika studier; t_{max} för tamsulosin varierade mellan 3,47 timmar och 5,65 timmar. Motsvarande C_{max} -värden för solifenacin varierade mellan 26,5 ng/ml och 32,0 ng/ml, medan C_{max} för tamsulosin varierade mellan 6,56 ng/ml och 13,3 ng/ml. AUC-värdena för solifenacin varierade mellan 528 ng.h/ml och 601 ng.h/ml och för tamsulosin mellan 97,1 ng.h/ml och 222 ng.h/ml. Den absoluta biotillgängligheten för solifenacin är ungefär 90%, medan för tamsulosin beräknas att 70% till 79% absorberas.

En enkeldosstudie avseende effekt av föda utfördes då Urizia gavs under fasta, efter en frukost med lågt fett- och lågt kaloriinnehåll samt efter en frukost med högt fett- och högt kaloriinnehåll. Efter frukosten med högt fett- och högt kaloriinnehåll sågs en 54%-ig ökning i C_{max} för tamsulosinkomponenten i Urizia jämfört med vid fasta medan AUC ökade med 33%. En frukost med lågt fett- och lågt kaloriinnehåll påverkade inte farmakokinetien för tamsulosin. Farmakokinetiken för solifenacinkomponenten påverkades inte av vare sig frukosten med lågt fett- och lågt kaloriinnehåll eller frukosten med högt fett- och högt kaloriinnehåll.

Samtidig administrering av solifenacin och tamsulosin OCAS (oral controlled absorption system) resulterade i en 1,19-faldig ökning i C_{max} och en 1,24-faldig ökning i AUC för tamsulosin i jämförelse med AUC för tamsulosin OCAS då enbart tablettor administrerades. Ingen indikation på en effekt av tamsulosin på farmakokinetiken för solifenacin.

Eliminering

Efter en enkel administrering av Urizia varierade $t_{1/2}$ för solifenacin mellan 49,5 timmar och 53,0 timmar och för tamsulosin mellan 12,8 timmar och 14,0 timmar.

Multipla doser verapamil 240 mg en gång per dag som gavs tillsammans med Urizia resulterade i en 60%-ig ökning i C_{max} och en 63%-ig ökning i AUC för solifenacin, medan för tamsulosin ökade C_{max} med 115% och AUC med 122%. Ändringarna i C_{max} och AUC bedöms inte vara kliniskt relevanta.

Populationsfarmakokinetisk analys av fas-3 data visade att den intra-individuella variabiliteten i farmakokinetiken för tamsulosin var relaterad till skillnader i ålder, längd och plasmakoncentration av α_1 -syrans glykoprotein. En ökning i ålder och α_1 -syrans glykoprotein associerades med en ökning i AUC, medan en ökning i längd förknippades med en minskning i AUC. Samma faktorer resulterade i liknande förändringar i farmakokinetiken för solifenacin. Dessutom var ökningar i gammaglutamyl-transpeptidas förenade med högre AUC värden. Dessa ändringar i AUC bedöms inte vara kliniskt relevant.

Information från de enskilda aktiva substanserna när de har använts som enskilda produkterkompletterar bilden av de farmakokinetiska egenskaperna för Urizia:

Solifenacin

Absorption

För solifenacin tablett är t_{max} oberoende av dosen och uppträder 3 till 8 timmar efter multipel dosering. C_{max} och AUC ökar dosproportionerligt vid doser mellan 5 och 40 mg. Absolut biotillgänglighet är ca 90%.

Distribution

Den apparaenta distributionsvolymen för solifenacin efter intravenös administrering är ca 600 l. Ungefär 98% av solifenacin är bundet till plasmaproteiner, främst α_1 -syrans glykoprotein.

Biotransformering

Solifenacin har en låg förstapassage-effekt och metaboliseras långsamt. Solifenacin genomgår omfattande metabolism i levern, främst via CYP3A4. Alternativa metabolismvägar finns dock, som kan bidra till metabolismen av solifenacin. Systemisk clearance för solifenacin är ca 9,5 l/h. Efter oral dosering har

förutom solifenacin en farmakologiskt aktiv (*4R*-hydroxisolifenacin) och tre inaktiva metaboliter (*N*-glukuroniden, *N*-oxiden och *4R*-hydroxyl-*N*-oxiden av solifenacin) identifierats i plasma.

Eliminering

Efter en enkel administrering av 10 mg [¹⁴C-märkt]-solifenacin, uppmättes ca 70% av radioaktiviteten i urin och 23% i feces under 26 dagar. I urin återfanns ca 11% av radioaktiviteten som oförändrad aktiv substans; ca 18% som *N*-oxidmetabolit, 9% som *4R*-hydroxi-*N*-oxidmetabolit och 8% som *4R*-hydroximetabolit (aktiv metabolit).

Tamsulosin

Absorption

För tamsulosin OCAS, uppnås t_{max} 4 till 6 timmar efter multipel dosering med 0,4 mg/dag. C_{max} och AUC ökar proportionerligt vid dos mellan 0,4 och 1,2 mg. Den absoluta biotillgängligheten beräknas vara ca 57%.

Distribution

Distributionsvolymen för tamsulosin efter intravenös administrering är ca 16 l. Ca 99% av tamsulosin är bundet till plasmaproteiner, främst α_1 -syrans glykoprotein.

Biotransformering

Tamsulosin har en låg förstapassage-effekt och metaboliseras långsamt. Tamsulosin metaboliseras i hög grad av levern, främst via CYP3A4 och CYP2D6. Systemisk clearance för tamsulosin är ca 2,9 l/h. Merparten tamsulosin förekommer i plasma i form av oförändrad aktiv substans. Ingen av metaboliterna var mer aktiv än moderssubstansen.

Eliminering

Efter en enkeldos om 0,2 mg [¹⁴C-märkt]-tamsulosin återfanns efter 1 vecka ca 76% av radioaktiviteten utsöndrad i urinen och 21% i feces. I urinen återfanns ca 9% av radioaktiviteten som oförändrat tamsulosin; ca 16% som sulfaten av o-deetylerat tamsulosin, och 8% som o-etoxyfenoxylätksyra.

Egenskaper hos särskilda patientgrupper

Äldre

I de kliniskt farmakologiska och biofarmaceutiska studierna, varierade åldern hos försökspersonerna mellan 19 och 79 år. Efter administrering av Urizia, sågs de högsta medelexponeringsvärdena hos de äldre försökspersonerna, det förekom dock en nästan fullständig överlappning av individuella värden från yngre försökspersoner. Detta bekräftades av populationsfarmakokinetisk analys av data från fas 2 och 3. Urizia kan användas av äldre patienter.

Nedsatt njurfunktion

Urizia

Urizia kan användas av patienter med lätt till måttlig njurfunktionsnedsättning, men bör användas med försiktighet av patienter med svår njurfunktionsnedsättning.

Farmakokinetiken för Urizia har inte studerats hos patienter med njurfunktionsnedsättning. Följande information finns tillgänglig för de enskilda komponenterna beträffande njurfunktionsnedsättning.

Solifenacin

AUC och C_{max} för solifenacin hos patienter med lätt eller måttlig njurfunktionsnedsättning var inte signifikant skilda från vad som sågs hos friska försökspersoner. Hos patienter med svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance \leq 30 ml/min), var exponeringen för solifenacin signifikant högre än hos kontrollgruppen, med ökningar i C_{max} om ca 30%, AUC om mer än 100% och $t_{1/2}$ om mer än 60%. Ett statistiskt signifikant förhållande sågs mellan kreatininclearance och solifenacinclearance. Farmakokinetik hos patienter som genomgick hemodialys har inte studerats.

Tamsulosin

Farmakokinetiken för tamsulosin har jämförts hos 6 försökspersoner med lätt till måttlig ($30 \leq \text{CrCl} < 70 \text{ ml/min}/1,73 \text{ m}^2$) eller svår ($\leq 30 \text{ ml/min}/1,73 \text{ m}^2$) njurfunktionsnedsättning och 6 friska försökspersoner ($\text{CrCl} > 90 \text{ ml/min}/1,73 \text{ m}^2$). Medan en ändring i den totala plasmakoncentrationen av tamsulosin sågs som ett result av ändrad bindning till α_1 -syrans glykoprotein, den obundna (aktiva) koncentrationen av tamsulosinhydroklorid, såväl som inre clearance, förblev relativt konstanta. Patienter med långt framskriden njursjukdom ($\text{CrCl} < 10 \text{ ml/min}/1,73 \text{ m}^2$) har inte studerats.

Leverfunktionsnedsättning

Urizia

Urizia kan användas av patienter med lätt till måttlig leverfunktionsnedsättning, men är kontraindicerat hos patienter med svår leverfunktionsnedsättning.

Farmakokinetiken för Urizia har inte studerats hos patienter med leverfunktionsnedsättning. Följande information finns tillgänglig för de enskilda komponenterna beträffande leverfunktionsnedsättning.

Solifenacin

Hos patienter med måttlig leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh score 7 till 9) var C_{\max} inte påverkat, AUC ökade med 60% och $t_{1/2}$ fördubblades. Farmakokinetiken för solifenacin hos patienter med svår leverfunktionsnedsättning har inte studerats.

Tamsulosin

Farmakokinetiken för tamsulosin har jämförts hos 8 försökspersoner med måttlig leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh score 7 till 9) och 8 friska försökspersoner. Medan en förändring i the total plasmakoncentration av tamsulosin sågs till följd av ändrad bindning till α_1 -syrans glykoprotein, ändrades inte koncentrationen av obundet (aktivt) tamsulosin signifikant med endast en ringa (32%) förändring i inre clearance för obundet tamsulosin. Tamsulosin har inte studerats hos patienter med svår leverfunktionsnedsättning.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke-kliniskastudier har inte utförts med Urizia. Solifenacin och tamsulosin har genomgått omfattande utvärderingar var för sig i djurtoxicitetsstudier och fynden överensstämde med de kända farmakologiska effekterna. Data från icke-kliniskastudier tyder inte på några särskilda risker för mänskliga baserat på konventionella studier avseende säkerhetsfarmakologi, toxicitet efter upprepad dosering, fertilitet, embryofetal utveckling, genotoxicitet och karcinogenetisk potential och ger inte upphov till oro för potentiering eller synergieffekter av biverkningar när solifenacin och tamsulosin kombineras.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpmänne

Mannitol (E421)

Maltos

Macrogol 7.000.000

Macrogol 8000

Magnesiumstearat (E470b)

Butylhydroxytoluen (E321)

Kolloidal kiseldioxid, vattenfri (E551)

Hypromellos (E464)

Järnoxid, röd (E172)

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Förpacknings typ och innehåll

Blisterförpackningar av aluminium innehållande 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 eller 200 tablett(er).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att tillhandahållas.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Astellas Pharma a/s
Arne Jacobsens Allé 15
2300 Köpenhamn S
Danmark

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

31656

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 29. januari 2014

Datum för den senaste förnyelsen: 06.05.2018

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

1.8.2021