

## Pakkauseloste: Tietoa käyttäjälle

### Echinaforce tipat, liuos

Kaunopunahatun versosta (tuore) valmistettu etanoliuute  
Kaunopunahatun juuresta (tuore) valmistettu etanoliuute

### PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE

**Lue tämä pakkauseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käytämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

Käytä tätä läkettä juuri siten kuin tässä pakkauselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkienkilokunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

- Säilytä tämä pakkauseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkienkilokunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkauselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 10 päivän jälkeen tai se huononee.

#### Tässä pakkauselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Echinaforce on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Echinaforce-tippoja
3. Miten Echinaforce-tippoja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Echinaforcen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### 1. Mitä Echinaforce on ja mihin sitä käytetään

Echinaforce on perinteinen kasvirohdosvalmiste nuhakuumeen tukihoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Valmiste sisältää tuoreen kaunopunahatun (*Echinacea purpurea* (L.) Moench) versosta ja juuresta valmistettuja etanoliuutteita. Tämän valmisten vaikutusmekanismia ei tunneta, vaan käyttö perustuu yksinomaan kaunopunahatturohdoksen traditionaaliseen eli pitkään jatkuneeseen käyttöön. Käännny lääkärin puoleen, ellet tunne olosi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi, kun olet käyttänyt valmistetta vilustumisoireiden hoitoon 10 päivän ajan.

#### 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Echinaforce-tippoja

##### Älä käytä Echinaforce-valmistetta

- jos olet allerginen punahatuille, mykerökkaisille *Asteraceae (Compositae)*-kasveille (esim. pujolle) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (luetteltu kohdassa 6).
- jos sinulla on jokin etenevä systeeminen sairaus (esim. tuberkuloosi tai jokin sidekudossairaus), autoimmuunisairaus (esim. MS-tauti), immuunipuutos (esim. HIV-infektio) tai verisairaus (esim. leukemia)

##### Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Echinaforce-tippoja, jos sinulla on jokin maksa- tai munuaissairaus, jos olet atoopikko tai olet herkkä saamaan allergisia reaktioita.

##### Lapset ja nuoret

Ei suositella alle 12-vuotiaiden lasten hoitoon.

## **Muut lääkevalmisteet ja Echinaforce**

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat ottaa muita lääkkeitä mukaan lukien kasvirohdosvalmisteet, sillä eri valmisteet saattavat vaikuttaa toistensa tehoon.

Yhteisvaikutuksia Echinaforcen ja muiden lääkevalmisteiden kanssa ei ole tutkittu.

## **Raskaus ja imetyksensä**

Echinaforce-tippojen käyttöä ei suositella raskauden eikä imetyksen aikana.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäristä neuvoa ennen tämän valmisten käyttöä.

## **Ajamineen ja koneiden käyttö**

Tutkimuksia valmisten vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Käytössä on huomioitava, että valmiste sisältää alkoholia.

On aina omalla vastuullasi arvioida, pystykö ajamaan autoa tai käyttämään koneita lääkehoidon aikana. Tämän perinteisen kasvirohdosvalmisten vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkauseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

## **Echinaforce sisältää alkoholia**

Echinaforce-tipat sisältävät 65 tilavuus-% etanolia (alkoholia), eli enimmillään 458 mg per 25 tipan enimmäisannos Echinaforce-valmistetta. Tämä vastaa noin 11,6 ml olutta tai 4,8 ml viiniä. Haitallinen nille, jotka kärsivät alkoholismista. Otettava huomioon raskaana olevilla ja imettävillä naisilla, lapsilla ja riskiryhmillä, kuten maksasairailulla ja epileptikoilla.

## **3. Miten Echinaforce -tippoja käytetään**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkauselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkienkilökunta tai sairaanhoitaja on määränyt. Tarkista ohjeet lääkäristä tai aptekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos vilustumisoireiden hoitoon aikuisille (myös iäkkäille) ja yli 12-vuotiaille nuorille on 20 - 25 tippaa veden kera 3 - 5 kertaa päivässä. Echinaforce-tippoja saa käyttää enintään 10 vrk:n ajan akuuttien vilustumisoireiden hoitoon. Ota yhteys lääkäriin, jos oireet eivät tässä ajassa mene ohi, tai jos ne pahenevat (saat korkean kuumeen, ilmenee hengitysvaikeuksia, paksua limaa tai verta ysköksissä).

Vilustumisoireiden ennaltaehkäisyssä suositusannos on 20 tippaa 3 kertaa päivässä. Ennaltaehkäisyä voi yhtäjaksoisesti käyttää enintään kahden kuukauden ajan.

Echinaforce-valmisten käyttöä ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

### **Jos otat enemmän Echinaforce -valmistetta kuin sinun pitäisi**

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisähjeden saamiseksi.

### **Jos unohtat ottaa Echinaforce -tippoja**

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen Echinaforce-tippoja.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan näйтää saa.

Yliherkkyyssreaktiot, kuten ihottumat, nokkosihottuma, keuhkoputkien supistelut, astma, angioedeema (eli esim. hulten, kasvojen, kielen tai nielun turvotus) ja äkilliset ns. anafylaktiset reaktiot (eli vaikeat, yleistyneet allergiset reaktiot), ovat mahdollisia. Echinaforce-valmisten käytön yhteydessä voi myös esiintyä Stevens-Johnsonin oireyhtymää, johon kuuluu iho- ja limakalvo-oireita sekä mm. ihmisen kuoriutumista.

Atoopikot ja yliherkkyyssreaktioihin taipuvaiset henkilöt ovat muita herkempiä saamaan allergisia reaktioita punahattu-uutteesta.

Edellä mainittujen haittavaikutusten yleisyyttä ei tunneta.

#### Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilokunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea.

## **5. Echinaforce-valmisten säilyttäminen**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Echinaforce-tipat on käytettävä 4 kk:n kuluessa pullon ensimmäisestä avaamisesta.

Älä käytä tästä lääketä etiketissä tai kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (vaikka avaamisesta olisikin vähemmän kuin 4 kk). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käytämättömien lääkkeiden hävittämistä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

#### **Mitä Echinaforce sisältää**

- Vaikuttavia aineita on kaksi: kaunopunahattu (*Echinacea purpurea* (L.) Moench) tuoreesta versosta valmistettu etanolijuute (1:12) 860 mg/ml ja tuoreesta juuresta valmistettu etanolijuutteita (1:11) 45 mg/ml ; uuttoliuotin molemmissa uutteissa 57,3% (m/m) etanolivedi – seos (1 ml = 28 tippaa)
- Muut aineet ovat etanoliliuotin (96 % V/V) ja puhdistettu vesi.

#### **Lääkevalmisten kuvaus ja pakauskoot**

Kirkas, oliivinvärisen liuos, jossa ominainen tuoksu ja hieman kitkerä ja puuduttava maku.

#### Pakkauuskoot:

50 ml ja 100 ml meripihkanväriset lasipullot, joissa valkoinen LDPE-tipputin ja PP-kierrekorkki.. Kaikkia pakkaukokoja ei välttämättä ole myynnissä.

#### **Rekisteröinnin haltija ja valmistaja**

#### Rekisteröinnin haltija:

A. Vogel Oy

Kumitehtaankatu 5

04260 Kerava

Valmistaja:  
Bioforce AG  
CH-9325 Roggwil TG  
Sveitsi

**Tämä pakkausseleoste on tarkistettu viimeksi 30.6.2015**

## Bipacksedel: Information till användaren

### Echinaforce droppar, lösning

Röd solhatt, etanolextrakt av (färska) skott  
Röd solhatt, etanolextrakt av (färska) rot

### TRADITIONELLT VÄXTBASERAT LÄKEMEDEL

#### Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

#### I denna bipackse del finns information om följande :

1. Vad Echinaforce är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Echinaforce
3. Hur du använder Echinaforce
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Echinaforce ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### 1. Vad Echinaforce är och vad det används för

Echinaforce är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för förebyggande och stödbehandling av förkylningssymtom. Preparatet innehåller etanolextrakt av färska skott och rötter av röd solhatt (*Echinacea purpurea* (L.) Moench). Verkningsmekanismen är okänd, och preparatets användning baserar sig därför enbart på den långa erfarenhet man har av traditionellt bruk av röd solhatt. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter att ha använt Echinaforce för behandling av akuta förkylningssymtom i 10 dagars tid.

#### 2. Vad du behöver veta innan du använder Echinaforce

##### Använd inte Echinaforce:

- om du är allergisk mot någon solhatt (växter ur rudbeckiasläktet), korgblommiga *Asteraceae* (*Compositae*)-växter (t.ex. gråbo) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har någon framskridande systemsjukdom (som tuberkulos eller någon bindvävssjukdom), någon autoimmun sjukdom (t.ex. MS), immunbristsjukdom (t.ex. HIV-infektion) eller någon blodsjukdom (t.ex. leukemi).

##### Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Echinaforce om du har någon njur- eller leversjukdom, om du är atopiker, eller om du har en tendens att få lätt få allergiska reaktioner.

##### Barn och ungdomar

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

## **Andra läkemedel och Echinaforce**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel inklusive växtbaserade läkemedel, eftersom de olika preparaten kan inverka på varandras effekt.

Inga studier gällande eventuella interaktioner mellan Echinaforce och andra läkemedel har utförts.

## **Graviditet och amning**

Bruk av Echinaforce rekommenderas inte i samband med graviditet eller amning.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta preparat.

## **Körförmåga och användning av maskiner**

Undersökningar gällande Echinaforces eventuella inverkan på körförmågan eller förmågan att använda maskiner har inte utförts. Vid bruk av Echinaforce bör observeras att preparatet innehåller alkohol.

Du är alltid själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av ovan nämnda effekter och biverkningar som gäller detta traditionella växtbaserade läkemedel finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

## **Echinaforce innehåller alkohol**

Echinaforce innehåller 65 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 458 mg per en maximal engångsdos på 25 droppar. Detta motsvarar ca 11,6 ml öl eller 4,8 ml vin. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksamas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

## **3. Hur du använder Echinaforce**

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för behandling av förkyllningssymtom hos vuxna (även äldre personer) och ungdomar över 12 år är 20-25 droppar i vatten 3-5 gånger dagligen. Vid behandling av akuta förkyllningssymtom får Echinaforce användas i högst 10 dagars tid. Om symtomen inte går över inom denna tidsperiod, eller om de förvärras (hög feber, andningssvårigheter, tjockt och segt slem eller blod i upphostningar), ska läkare kontaktas.

Den rekommenderade dosen för förebyggande av förkyllningssymtom är 20 droppar 3 gånger dagligen. I förebyggande syfte får Echinaforce användas högst 2 månader i sträck.

Echinaforce rekommenderas inte för behandling av barn under 12 år.

## **Om du har tagit för stor mängd av Echinaforce**

Om du fått i dig en alltför stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

## **Om du har glömt att ta Echinaforce**

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Överkänslighetsreaktioner som hudutslag, nässelutslag, sammandragningar i luftrören, astma, angioödem (t.ex. svullnad i läppar, ansikte, tunga eller svalg) och akuta s.k. anafylaktiska reaktioner kan förekomma. Stevens-Johnsons syndrom (med hud- och slemhinnesyntom samt bl.a. flagande hud) är också möjligt i samband med bruk av Echinaforce.

Dessa allergiska reaktioner är vanligare hos atopiker och personer med en ökad tendens till överkänslighetsreaktioner.

De ovan nämnda biverkningarnas frekvens är okänd (d.v.s. man känner inte till hur pass vanliga de är).

#### Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)  
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea  
Biverkningsregistret  
PB 55  
FI-00034 Fimea.

#### **5. Hur Echinaforce ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Innehållet i en Echinaforce-flaska ska användas inom 4 månader efter att flaskan öppnats för första gången.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

#### **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

##### **Innehållsdeklaration**

- Detta preparat innehåller två aktiva substanser, nämligen 860 mg/ml av ett etanolextrakt (1:12) ur färsk skott av röd solhatt och 45 mg/ml av ett etanolextrakt (1:11) ur rötter av röd solhatt. I bågge fallen har en etanol-vattenblandning på 57,3 % (m/m) använts för extraheringen av växtdelarna (1 ml = 28 droppar).
- Övriga innehållsämnen är etanol (96 % v/v) och renat vatten.

##### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Klar, olivfärgad lösning med karaktäristisk doft och en lätt bitter och bedövande smak.

##### **Förpackningsstorlekar:**

Bruna glasflaskor på 50 ml och 100 ml, som är försedda med en vit droppkork av LDPE och ett skruvlock av PP.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

##### **Innehavare av registreringen och tillverkare**

##### Innehavare av registreringen

A. Vogel Oy  
Kumitehtaankatu 5  
04260 Kervo

Tillverkare:  
Bioforce AG  
CH-9325 Roggwil TG  
Schweiz

**Den här bipacksedeln ändrades senast den 30.6.2015**