

## **PAKKAUSSELOSTE**

DOXYBACTIN VET. 10 mg/ml oraalisuspensio koiralle ja kissalle

### **1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI**

Myyntiluvan haltija:

Alfasan Nederland B.V., Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Alankomaat

Valmistaja:

Produlab Pharma B.V., Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer, Alankomaat

### **2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI**

DOXYBACTIN VET. 10 mg/ml oraalisuspensio koiralle ja kissalle.

Doksisykliini

### **3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET**

Vaikuttava aine: Doksisykliinihyklaatti vastaten doksisykliiniä 10,0 mg/ml.

Apuaineet: Kalsiumkloridiheksahydraatti, sorbitoli, nestemäinen (kiteytyvä), aluminiummagnesiumsilikaatti, povidoni, glyseroli, butyyliparahydroksibentsoaatti, propyyliparahydroksibentsoaatti (E216), sakkariininatrium, natriummetabisulfiitti, vadelmaaroami, omena-aromi, natriumhydroksidi, simetikoniemulsio ja puhdistettu vesi.

### **4. KÄYTTÖAIHEET**

Doksisykliinille herkkien mikrobiien aiheuttamat hengitystieinfektiot.

### **5. VASTA-AIHEET**

Tetrasykliiniryhmän antibiootit voivat aiheuttaa kehittyvien hampaiden värijäytymisen ja vaurioittaa hampaita pysyvästi. Vaikka doksisykliini sitoutuu kalsiumiin vähemmän kuin muut tetrasykliinit, sitäkään ei suositella käytettäväksi kasvaville pennuille eikä kantaville koirille ja kissoille.

Yliherkkyys tetrasykliineille.

### **6. HAITTAVAIKUTUKSET**

Ohimenevää pahoinvointia, oksentelua ja ripulia on esiintynyt joissakin tapauksissa annon jälkeen. Yliherkkyysreaktioita ja valoherkkyyttä voi esiintyä. Pitkääikainen käyttö voi aiheuttaa resistenttien kantojen ja/tai hiivan ylikasvua (superinfektio).

Jos havaitset vakavia vaiktuksia tai joitakin muita sellaisia vaiktuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

### **7. KOHDE-ELÄINLAJIT**

Koira ja kissa.

## **8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDEELÄINLAJEITTAIN**

Valmiste annetaan suun kautta.

Kissa: 5 mg/kg 2 kertaa vuorokaudessa 6 vuorokauden ajan.

Koira: 5-10 mg/kg 2 kertaa vuorokaudessa 6 vuorokauden ajan.

Koska doksisykliinihyklaatti voi ärsyttää ruokatorvea, lääke suositellaan annettavaksi ruoan seassa.

## **9. ANNOSTUSOHJEET**

Ravistettava ennen käyttöä.

Tetrasykliinille yliherkkien henkilöiden tulee välttää valmisten käsitteilyä.

Kädet tulee pestä annostelun jälkeen.

## **12. SÄILYTYSOLOSUHTEET**

Säilytä huoneenlämmössä (15-25 °C).

Valmistetta ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

## **13. ERITYISVAROITUKSET**

Käyttöä raskauden loppupuolella ja imetyksen aikana ei suositella, koska doksisykliini voi aiheuttaa kehittyvien hampaiden värjäytymisen.

## **14. ERITYiset VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTeen TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEksi**

Käyttämätön valmiste toimitetaan apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi.

## **15. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTty**

22.7.2021

## **16. MUUT TIEDOT**

Valmisten vaikuttava aine on doksisykliini, joka kuuluu tetrasykliinien ryhmään. Sen bakteerien lisääntymistä estävä vaikutus perustuu proteiinisynteesin estoon. Doksisykliini tehoaa moniin baktereihin sekä mykoplasmoihin.

Doksisykliini on hyvä vaihtoehto myös maksa- ja munuaisvikaisille eläimille, koska se ei näissä tilanteissa kerry elimistöön vaan erittyy ulosteeseen.

## BIPACKSEDE

DOXYBACTIN VET. 10 mg/ml oral suspension till hund och katt

### 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLika

Innehavare av godkännande för försäljning tillverkare:

Alfasan Nederland B.V., Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Nederländerna

Tillverkare:

Produlab Pharma B.V., Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer, Nederländerna

### 2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

DOXYBACTIN VET 10 mg/ml oral suspension till hund och katt

### 3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Verksamt ämne: Doxycyklinhyklat som motsvarar 10,0 mg/ml doxycyklin.

Hjälpsubstanser: Kalciumkloridhexahydrat, sorbitol, flytande (kristalliserande) aluminiummagnesiumsilikat, povidon, glycerol, butylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat (E216), sackarinnatrium, natriummetabisulfit, hallonarom, äppelarom, natriumhydroxid, cimetikoneemulsion och renat vatten.

### 4. INDIKATION(ER)

Infektioner i luftvägarna som förorsakas av bakterier känsliga mot doxycyklin.

### 5. KONTRAINDIKATIONER

Tetracyklingruppens antibiotika kan färga tänder som håller på att utvecklas och skada tänderna bestående. Fastän doxycyklin binder sig mindre till kalcium än andra tetracykliner, rekommenderas inte det heller att användas till växande valpar eller kattungar, och inte till dräktiga hundar eller kattor. Överkänslighet mot tetracykliner.

### 6. BIVERKNINGAR

Övergående illamående, kräkningar och diarré har förekommit i några fall efter dosering. Allergiska reaktioner och fotosensitivitet kan förekomma. Långvarigt bruk kan förorsaka övertillväxt av resistenta stammar och/eller jäst (superinfektion).

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

### 7. DJURSLAG

Hund och katt.

## **8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)**

Preparatet ges oralt.

Katt: 5 mg/kg 2 gånger i dygnet under 6 dygns tid.

Hund: 5-10 mg/kg 2 gånger i dygnet under 6 dygns tid.

Eftersom doxycyklinhyklat kan irritera matstrupen,  
rekommenderas att medicinen ges blandad i maten.

## **9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING**

Omskakas före användning.

Personer som är överkänsliga mot tetracykliner bör undvika att hantera preparatet.

Händerna bör tvättas efter doseringen.

## **12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR**

Förvara i rumstemperatur (15-25 °C).

Preparatet får inte användas efter utgångsdatumet som är märkt på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

## **13. SÄRSKILD(A) WARNING(AR)**

Användning under slutet av graviditeten eller under laktation rekommenderas inte, eftersom doxycyklin kan förorsaka färgning av tänder under utveckling.

## **14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL**

Oanvänt preparat förs till apoteket eller problemavfallscentralen för att förstöras.

## **15. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES**

22.7.2021

## **16. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

Preparatets verksamma ämne är doxycyklin, som hör till gruppen tetracykliner. Dess bakteriostatiska effekt grundar sig på hämmandet av proteinsyntesen. Doxycyklin är verksamt mot många bakterier samt mykoplasmer.

Doxycyklin är också ett bra alternativ för djur som lider av lever- eller njurfel, eftersom det inte i dessa situationer samlas i organismen utan utsöndras i avföringen.