

PAKKAUSSELOSTE

Exproline vet 2,5 mg/ml sumute iholle, liuos kissoille ja koirille

1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija ja erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Exproline vet 2,5 mg/ml sumute iholle, liuos kissoille ja koirille

Fiproniili

3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

1 ml kirkasta, väritöntä liuosta sisältää 2,5 mg fiproniilia

4. KÄYTTÖAIHEET

Koiran ja kissan kirpputartuntojen (*Ctenocephalides* spp.) ja puutiaistartuntojen (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) hoito.

Koiran väivetartuntojen (*Trichodectes canis*) ja kissan väivetartuntojen (*Felicola subrostratus*) hoito. Valmistetta voidaan käyttää osana kirppujen aiheuttaman allergisen ihotulehduksen (Flea Allergy Dermatitis, FAD) hoitoa.

Hyönteisiä tappava vaikutus uusiin aikuisten kirppujen aiheuttamiin tartuntoihin säilyy kissoilla enintään 2 kuukautta ja koirilla enintään 3 kuukautta, riippuen ympäristössä esiintyvien loisten määrästä.

Valmisteella on enintään 4 viikon puutiaisia tappava vaikutus, riippuen ympäristössä esiintyvien loisten määrästä.

5. VASTA-AIHEET

Ei saa käyttää sairaille (yleissairaudet, kuume) tai sairaudesta toipumassa oleville eläimille.

Ei saa käyttää kaneille, koska haittavaikutuksia, jopa kuolleisuutta, voi esiintyä.

Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.

6. HAITTAVAIKUTUKSET

Jos eläin nuolee itseään, syljeneritys voi olla runsasta jonkin aikaa, mikä pääasiassa johtuu kantaja-aineesta.

Hyvin harvinaisina epäiltyinä haittavaikutuksina on käytön jälkeen raportoitu ohimeneviä ihoreaktioita, kuten punoitusta, kutinaa tai karvan lähtöä. Runsasta syljeneritystä, ohimeneviä hermostollisia oireita (tuntoherkkyyttä, apeutta ja rauhattomuutta), oksentelua tai hengitystieoireita on poikkeustapauksissa havaittu käytön jälkeen.

Haittavaikutusten yleisyydet on määritetty seuraavasti:

- hyvin yleinen (haittavaikutus ilmenee yli 1 hoidetulla eläimestä 10:stä)
- yleinen (yli 1:llä mutta alle 10 hoidetulla eläimellä 100:sta)

- melko harvinainen (yli 1:llä mutta alle 10 hoidetulla eläimellä 1 000:sta)
- harvinainen (yli 1:llä mutta alle 10 hoidetulla eläimellä 10 000:sta)
- hyvin harvinainen (alle 1 hoidetulla eläimellä 10 000:sta, mukaan lukien yksittäiset raportit).

Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet sitä mieltä että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7. KOHDE-ELÄINLAJIT

Kissa ja koira

8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Antoreitti: mekaanisesti pumpattava sumute ulkoiseen käyttöön. Yksi pumppaus vastaa 0,5 ml sumutetta (100 ml:n pullo) tai 1,5 ml sumutetta (250 ml:n pullo) tai 3 ml sumutetta (500 ml:n pullo).

Antotapa:

Suihkuta eläimen koko ruumis noin 10–20 cm etäisyydeltä.

Suihkuta vastakarvaan ja varmista, että eläimen koko turkki kastuu. Turkkia hierotaan erityisesti pitkäkarvaisilla eläimillä, siten, että valmiste pääsee kosketukseen ihon kanssa.

Käsiteltäessä pään aluetta, tai jos kyseessä on nuori tai hermostunut eläin, valmiste voidaan levittää sumuttamalla sitä käsin suojattuun käteen ja hieromalla valmiste turkkiin. Turkin annetaan kuivua luonnollisesti eikä sitä kuivata pyyhkeellä.

Annostus:

Jotta turkki kastuisi ihoon saakka, annostellaan karvan pituudesta riippuen 3–6 ml painokiloa kohti (7,5–15 mg vaikuttavaa ainetta painokiloa kohti) eli 6–12 pumppausta painokiloa kohti 100 ml:n pakkauksesta, 2–4 pumppausta painokiloa kohti 250 ml:n pakkauksesta, tai 1–2 pumppaus(ta) painokiloa kohti 500 ml:n pakkauksesta.

Ominaisuudet:

Valmiste sisältää päällystysaineen, jonka muodostama kalvo tekee turkista kiiltävän.

Koiran- ja kissanpennut voidaan käsitellä turvallisesti 2 päivän iästä lähtien.

9. ANNOSTUSOHJEET

Pumpun suutin säädetään sumuteasentoon.

100 ml:n pakkaus riittää noin kahdeksaan hoitokertaan lyhytkarvaiselle keskikokoiselle kissalle (4 kg).

250 ml:n pakkaus riittää noin neljään hoitokertaan lyhytkarvaiselle keskikokoiselle koiralle (20 kg).

500 ml:n pakkaus riittää noin neljään hoitokertaan lyhytkarvaiselle isolle koiralle (40 kg).

Uusintakäsittelyä ei saa tehdä useammin kuin joka 4. viikko, koska lyhyemmistä hoitoväleistä ei ole tehty turvallisuustutkimuksia.

Optimaalisen kirppu- ja/tai puutiaistorjunnan varmistamiseksi hoitoaikataulun on perustuttava paikalliseen epidemiologiseen tilanteeseen.

Optimaalisen tehon saavuttamiseksi kylpyä tai shampoopesua ei suositella kahteen vuorokauteen ennen hoitoa tai sen jälkeen. On osoitettu, ettei korkeintaan neljä kertaa kahden kuukauden sisällä suoritettavalla kylvyllä tai shampoopesulla ole merkittävää vaikutusta valmisteen tehoon. Jos shampoopesu suoritetaan tätä useammin, on suositeltavaa hoitaa eläin kerran kuukaudessa.

10. VAROAIKA

Ei oleellinen.

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Säilytä alle 25 °C lämpötilassa.

Helposti syttyvää.

Säilytä suojassa suoralta auringonvalolta.

Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen, joka on ilmoitettu etiketissä. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avatun pakkauksen kesto aika ensimmäisen avaamisen jälkeen: 1 vuosi

12. ERITYISVAROITUKSET

Suositusannosta ei saa ylittää.

Käsiteltyjen eläinten on annettava kuivua hyvin ilmastoidussa tilassa.

Älä eristä eläimiä suljettuun tilaan tai kuljetuslaatikkoon ennen kuin turkki on täysin kuiva.

Valmistetta ei suositella muiden lajien kuin kissojen ja koirien hoitoon, sillä spesifisiä siedettävyyttä ja tehokkuutta koskevia tietoja ei ole saatavilla.

Optimaalisen kirpputorjunnan varmistamiseksi monieläintalouden kaikki kissat ja koirat on hoidettava sopivalla hyönteismyrkyllä.

Käytettäessä valmistetta osana kirppujen aiheuttaman allergisen ihotulehduksen hoitoa on suositeltavaa hoitaa sekä allerginen eläin että muut talouden kissat ja koirat kerran kuukaudessa.

Nukkumapaikkojen, mattojen ja sisustustekstiilien käsittely sopivalla hyönteismyrkyllä auttaa vähentämään ympäristössä esiintyvien loisten määrää ja pidentämään valmisteen uusintainfektioilta suojaavaa vaikutusta.

Valmiste ei sovellu suihkutettavaksi suoraan ympäristöön.

Varottava valmisteen joutumista eläimen silmiin. Jos eläinlääkevalmistetta joutuu silmiin, silmät on huuhdeltava välittömästi ja perusteellisesti vedellä. Jos silmien ärsytys jatkuu, on käännyttävä eläinlääkäriin puoleen.

Ei saa suihkuttaa suoraan vahingoittuneille ihoalueille.

On tärkeää varmistaa, etteivät eläimet nuole toisiaan hoidon jälkeen.

Fiproniili voi vaikuttaa haitallisesti vesielioihin. Koirien ei pidä uida vesistössä kahteen päivään käsittelyn jälkeen. Yksittäisiä puutiaisia saattaa kiinnittyä eläimeen. Tästä syystä puutiaisista siirtyviä infektioita ei voida täysin sulkea pois, jos olosuhteet ovat epäsuotuisat.

Pidä hoidetut eläimet poissa tulen tai muiden lämmönlähteiden, sekä alkoholisumutteen kanssa yhteensopimattomien pintojen ääreltä vähintään 30 minuutin ajan suihkuttamisesta ja kunnes turkki on täysin kuiva. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen.

Vain ulkoiseen käyttöön.

Laboratoriotutkimuksissa fiproniililla ei havaittu epämuodostumia aiheuttavia vaikutuksia rotilla tai kaneilla.

Koiranpennut, joiden emo on hoidettu imetyksen aikana, ovat sietäneet valmistetta erittäin hyvin.

Ei ole saatavilla tietoja koskien tiineiden tai imettävien naaraskissojen hoitoa.

Yliannostus voi lisätä haittavaikutusten (ks. kohta 6) todennäköisyyttä, joten eläin pitää aina hoitaa sen painon mukaisella annostuksella. Yliannostustapauksissa on aloitettava oireenmukainen hoito.

Varoitukset käyttäjälle

Valmiste saattaa ärsyttää limakalvoja ja silmiä, joten valmisteeseen joutumista suuhun tai silmiin on vältettävä. Jos valmistetta joutuu vahingossa silmiin, ne on huuhdeltava huolellisesti vedellä.

Henkilöiden, joilla on tunnettu yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai alkoholille, tai jotka sairastavat astmaa, tulee välttää kosketusta valmisteeseen kanssa. Vältä valmisteeseen joutumista sormiin. Mikäli näin tapahtuu, pese kädet saippualla ja vedellä.

Hoidettuja eläimiä ei pidä käsitellä ennen kuin turkki on kuivunut. Lasten ei saa antaa leikkiä hoidettujen eläinten kanssa ennen kuin turkki on kuivunut. Tästä syystä on suositeltavaa, ettei eläintä hoideta päivällä vaan alkuillasta, eikä juuri hoidettujen eläinten anneta nukkua omistajan, varsinkaan lapsen, kanssa.

Käsittele eläimet ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa.

Älä hengitä sumutetta. Käsitelyn aikana ei saa tupakoida, juoda tai syödä.

Eläimiä käsiteltäessä on käytettävä PVC- tai nitrilikäsineitä.

Vaatteiden suojaamiseksi on suositeltavaa käyttää vedenkestävää esiliinaa. Voimakkaasti kastuneet vaatteet on riisuttava ja pestävä ennen seuraavaa käyttöä.

Hävitä käsiin käytön jälkeen ja pese kädet saippualla ja vedellä.

Mahdolliset roiskeet on välittömästi pestävä pois iholta saippualla ja vedellä. Mikäli ärsytystä esiintyy, on otettava yhteyttä lääkäriin.

Henkilöt, joilla on tunnettu yliherkkyys tai astmaa sairastavat henkilöt voivat olla tavallista herkempiä valmisteelle. Älä käytä valmistetta, jos käyttö on aikaisemmin aiheuttanut sinulle reaktion.

Useiden eläinten käsittely: Hyvä ilmanvaihto on erityisen tärkeää, jos useampia eläimiä käsitellään samanaikaisesti. Jos eläimiä on useampia, ne on käsiteltävä ulkona, tai vaihtoehtoisesti höyryn kertymistä on vähennettävä poistamalla eläimet hoitotilasta alkoholin haihtuessa, sekä tuulettamalla hoitotila huolellisesti käsittelyiden välillä. Lisäksi on varmistettava, että kuivumistila on hyvin ilmastoitu, sekä vältettävä useiden äskettäin käsiteltyjen eläinten pitämistä samassa ilmatilassa.

13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jättemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Fiproniili voi vaikuttaa haitallisesti vesieläimiin. Tuotetta tai tyhjiä pakkauksia ei saa päästää lampiin, vesistöihin tai ojiin.

Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä eläinlääkäriltäsi. Nämä toimenpiteet on tarkoitettu ympäristön suojelemiseksi.

14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

21.2.2019

15. MUUT TIEDOT

Läpinäkymätön, valkoinen, korkeatiheysisestä polyeteenistä valmistettu 100 ml:n pullo, jossa on matalatiheysisestä polyeteenistä/polypropeenista valmistettu pumppu. Jokainen pumppaus suihkuttaa 0,5 ml nestettä.

Läpinäkymätön, valkoinen, korkeatiheysisestä polyeteenistä valmistettu 250 ml:n pullo, jossa on matalatiheysisestä polyeteenistä/polypropeenista valmistettu pumppu. Jokainen pumppaus suihkuttaa 1,5 ml nestettä.

Läpinäkymätön, valkoinen, korkeatiheysisestä polyeteenistä valmistettu 500 ml:n pullo, jossa on matalatiheysisestä polyeteenistä/polypropeenista valmistettu pumppu. Jokainen pumppaus suihkuttaa 3 ml nestettä.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

BIPACKSEDEL

Exproline vet 2,5 mg/ml kutan spray, lösning för katter och hundar

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningsats:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Exproline vet 2,5 mg/ml, kutan spray för katter och hundar

Fipronil

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml klar, färglös vätska innehåller 2,5 mg fipronil

4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE(N)

Behandling mot angrepp av loppor (*Ctenocephalides spp.*) och fästingar (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) hos hund och katt.

Behandling mot angrepp av pälsätande löss hos hund (*Trichodectes canis*) och katt (*Felicola subrostratus*).

Exproline vet kan användas som en del av behandlingsstrategin för loppallergidermatit (Flea Allergy Dermatitis, FAD).

Exproline vet har insekticid effekt mot nya angrepp av vuxna loppor i upp till 2 månader hos katter och 3 månader hos hundar beroende på rådande omständigheterna. Den akaricida effekten mot fästingar verkar i upp till 4 veckor beroende på rådande omständigheterna.

5. KONTRAIKATIONER

Skall inte användas på sjuka djur (systematiska sjukdomar eller feber) eller på djur under konvalescens.

Skall inte användas på kaniner då biverkningar inklusive dödsfall har rapporterats.

Skall inte användas vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

6. BIVERKNINGAR

Om det behandlade djuret slickar sig kan en kort period av hypersalivering observeras, vilket framför allt beror på bärarsubstansens egenskaper.

I mycket sällsynta fall har övergående lokala hudreaktioner, rodnad, klåda eller håravfall observerats efter behandling.

I undantagsfall har hypersalivering, reversibla neurologiska symptom (överkänslighet mot beröring, depression, oro), kräkningar eller respiratoriska symptom observerats efter behandling.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

- mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)
- vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)
- mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)
- sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)
- mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

7. DJURSLAG

Katt och hund

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Administreringsväg: mekanisk pumpspray för utvärtes bruk; pumpen avger 0,5 ml (100 ml förpackning) eller 1,5 ml (250 ml förpackning) eller 3 ml (500 ml förpackning) spray per pumpslag.

Administreringssätt:

Spraya hela kroppen på djuret från ca 10-20 cm avstånd.

Spraya mothårs och var uppmärksam på att hela pälsen blir fuktig. Gnid in sprayen i pälsen, speciellt på långhåriga djur så produkten kommer i kontakt med huden.

För behandling av huvudet och vid behandling av unga eller nervösa djur kan sprayen appliceras genom att spraya produkten i en handskbeklädd hand och sedan gnida in produkten i pälsen. Låt pälsen torka naturligt. Handdukstorka inte.

Dosering:

För att fukta hela pälsen ner till huden applicera mellan 3-6 ml per kg kroppsvikt beroende på längden på pälsen på djuret, (7,5-15 mg aktiv substans per kg kroppsvikt) d.v.s. 6-12 spraypumpar per kg kroppsvikt för 100 ml förpackningen, 2-4 spraypumpar för 250 ml förpackningen eller 1-2 spraypumpar för 500 ml förpackningen.

Egenskaper:

Formuleringen innehåller ett dragerande ämne vilket gör att ansamlingar av sprayen bildar en film som gör pälsen blir glansig.

Hundvalpar och kattungar kan behandlas med säkerhet från två dagars ålder.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Justera pumpspetsen till sprayläge.

100 ml förpackningen innehåller ca 8 behandlingar för korthåriga katter i mellanstorlek (4 kg).
250 ml förpackningen innehåller ca 4 behandlingar för korthåriga hundar i mellanstorlek (20 kg).
500 ml förpackningen innehåller ca 4 behandlingar för korthåriga stora hundar (40 kg).

På grund av avsaknad av säkerhetsstudier är det kortaste behandlingsintervallet 4 veckor. För optimal kontroll av lopp- och/eller fästingangrepp bör behandlingen baseras på den lokala epidemiologiska situationen.

För bäst effekt bör djuret inte bada eller tvättas på två dagar inför eller efter behandlingen med

Exproline vet. Bad eller tvättning upp till fyra gånger på två månader har inte påvisat någon signifikant effekt på den kvarvarande effekten av produkten. Vid mer frekvent förekommande bad eller tvättning rekommenderas månadsvis behandling.

10. KARENSTID

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Brandfarligt.

Skyddas mot direkt solljus.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet i öppnad förpackning: 1 år

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Överskrid inte den rekommenderade dosen.

Låt behandlade djur torka i välventilerade utrymmen.

Förvara inte djuret i slutna utrymmen eller i djurkorg innan pälsen torkat helt.

Då säkerhetsdata för andra djurslag saknas, rekommenderas inte Exproline vet för andra djur än hund och katt.

För optimal kontroll av loppangrepp i hushåll med flera sällskapsdjur ska alla hundar och katter i hushållet behandlas med lämpligt insektmedel.

Vid behandling av loppallergidermatit rekommenderas behandling en gång i månaden av det allergiska djuret samt andra hundar och katter i hemmet.

Behandling av sängkläder, mattor och möbler med lämpligt insektmedel minskar påverkan från yttre faktorer och maximerar varaktigheten av produktens skydd mot nya angrepp.

Exproline vet är inte lämplig att användas för direkt behandling av omgivningen.

Undvik att läkemedlet kommer i kontakt med djurets ögon. Vid oavsiktlig kontakt med ögon spola omedelbart ögat ordentligt med vatten. Om irritation i ögat kvarstår, uppsök veterinär för rådgivning. Spraya inte direkt på skadad hud.

Se till att djur inte slickar varandra efter behandling.

Fipronil kan vara skadligt för vattenlevande organismer. Hundar bör ej bada i vattendrag på två dagar efter behandlingen. Det är möjligt att enstaka fästingar biter sig fast på det behandlade djuret. Av denna anledning kan överföring av smittsamma sjukdomar inte uteslutas helt vid ofördelaktiga förhållandena.

Håll det behandlade djuret borta från eld och andra värmekällor och ytor som kan påverkas av alkoholsprayen under minst 30 minuter efter behandling tills pälsen torkat helt. Spraya inte på öppna lågor eller på glödande material.

Endast för externt bruk.

Laboratoriestudier på råtta och kanin visade inga fosterskadande effekter av fipronil.

Formuleringen är mycket väl tolererad av valpar efter behandling av digivande tik. Säkerhetsdata för behandling av dräktiga eller digivande katthonor saknas.

Risken för biverkningar (se avsnitt 6) kan öka vid överdosering och djur bör därför alltid behandlas

med korrekt dos baserat på deras kroppsvikt.
Lämplig symptomatisk behandling bör initieras vid överdosering.

Försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Produkten kan orsaka irritation i slemhinnor och ögon varför kontakt med mun och ögon bör undvikas. Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant och rikligt med rent vatten.

Personer som är överkänsliga för den aktiva substansen eller alkohol eller personer med astma skall undvika kontakt med läkemedlet.

Undvik kontakt med preparatet, tvätta med tvål och vatten vid spill på händerna.

Behandlade djur bör inte hanteras förrän pälsen torkat helt. Barn bör inte leka med behandlade djur förrän pälsen torkat. Det rekommenderas därför att djuren behandlas under kvällen och inte under dagtid och att nybehandlade djur inte tillåts att sova tillsammans med människor, speciellt inte med barn, tills dess att pälsen torkat.

Spraya djuret utomhus eller i välventilerade utrymmen.

Andas inte in sprayen. Ät, rök eller drick inte under appliceringen.

Använd PVC eller nitrilhandskar under behandlingen av djuren.

Även vattentäta förkläden rekommenderas för att skydda kläder. Om kläder blir blöta av produkten bör de tas av och tvättas innan de används igen.

Destruera handskarna efter användning och tvätta händerna med tvål och vatten.

Tvätta omedelbart bort stänk på huden med tvål och vatten. Om irritation uppstår bör läkarvård uppsökas.

Personer med känd känslighet eller astma kan vara extra känsliga mot produkten. Använd inte Exproline vet om du tidigare reagerat mot produkten.

Behandling av flera djur: Vid behandling av flera djur är bra ventilation extra viktigt. Behandling av flera djur ska ske utomhus eller minska ångbildning genom att avlägsna djuret från behandlingsrummet medan alkoholen dunstar och ventiler behandlingsrummet mellan varje behandling. Torkningsrummet ska även vara välventilerat och undvik att förvara flera behandlade djur i samma luftutrymme.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AVEJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Oanvänt veterinärläkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Fipronil kan påverka vattenlevande organismer. Kontaminera inte dammar, vattendrag eller diken med produkten eller tomma förpackningar.

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

21.2.2019

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ogenomskinlig, vit 100 ml högdensitetspolyetylen-flaska monterad med en lågdensitetspolyetylen/polypropylen spraypump vilken kan avge 0,5 ml per sprayning.

Ogenomskinlig, vit 250 ml högdensitetspolyetylen-flaska monterad med en lågdensitetspolyetylen/polypropylen spraypump vilken kan avge 1,5 ml per sprayning.

Ogenomskinlig, vit 500 ml högdensitetspolyetylen-flaska monterad med en lågdensitetspolyetylen/polypropylen spraypump vilken kan avge 3,0 ml per sprayning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.