

PAKKAUSSELOSTE

KLOXERATE retard vet **Intramammaarisuspensio umpeenpantavalle lehmälle**

KOOSTUMUS

Yksi intramammaari ruisku sisältää vaikuttavina aineina bentsatiinikloksasilliinia vastaten kloksasilliinia 500 mg ja ampisilliini trihydraattia vastaten ampisilliinia 250 mg.

Apuaineet: Alumiinimonostearaatti ja nestemäinen parafiini.

Lääkemuoto: Intramammaarisuspensio.

MYYNTILUVAN HALTIJA:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Irlanti

ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA:

Norbrook Laboratories Limited
Newry
Co. Down
Pohjois-Irlanti

Norbrook Manufacturing Ltd.
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Irlanti

KÄYTTÖTARKOITUS

Valmistetta käytetään utaretulehduksen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn umpeenpanon yhteydessä, kun aiheuttajana on kloksasilliini lle tai ampisilliini lle herkkä mikro-organismi .

Valmisteen vaikutus utareessa kestää noin 3 - 4 viikkoa ja sitä käytetään ainoastaan umpeenpanon yhteydessä.

Vaikuttavien aineiden teho on yhdessä käytettynä parempi kuin kummankaan aineen vaikutus yksinään. Valmiste tehoaa seuraaviin mastiitin aiheuttajiin: streptokokit, penisilliiniherkät ja -resistentit stafylokokit, *Corynebacterium* -lajit, *Arcanobacteriums pyogenes*, *E.coli* ja muut herkät gramnegatiiviset bakteerit.

VASTA-AIHEET KÄYTÖLLE

Valmistetta ei saa käyttää lypsykaudella.

KOHDE-ELÄIN

Nauta.

HAITTAVAIKUTUKSET

Ei tunneta.

KÄYTTÖ TIINEYDEN JA LAKTAATION AIKANA

Ei saa käyttää laktaation aikana.

ANNOSTUS JA ANTOTAPA

Umpeenpano: 1 ruiskullinen jokaiseen utareneljännekseen viimeisen lypsyn jälkeen.

VAROAJAT

Teurastus: 28 vrk.

Maito: 6 vrk poikimisesta. Jos ummessaoloaika on alle 49 vrk, on varoaika 55 vrk lääkkeen annostelusta.

Ei saa käyttää lehmillä, joilla on lyhyt ummessaoloaika.

Ei ole tarkoitettu käytettäväksi 49 päivän sisällä poikimisesta.

MAHDOLLISET VAROTOIMENPITEET, JOITA LÄÄKETTÄ ANTAVAN HENKILÖN ON NOUDATETTAVA

Ampisilliini ja kloksasilliini kuuluvat penisilliineihin, jotka voivat aiheuttaa yliherkkyysoireita tai injisoituina, hengitettynä, syötyinä tai ihokontaktilla. Joskus reaktiot voivat olla hengenvaarallisia. Jos olet yliherkkä penisilliineille, älä käsittele valmistetta. Jos saat sellaisia oireita, kuten ihottumaa, kasvojen, huulien tai kurkunpään turvotusta tai hengitysvaikeuksia, ota yhteyttä lääkäriin.

SÄILYTYS JA KESTOAIKA

Säilytä 15 - 25 °C.

Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen.

Käyttämätön valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

26.07.2019

BIPACKSEDEL

KLOXERATE retard vet **Intramammär suspension, sintidsbehandling**

SAMMANSÄTTNING

En intramammär spruta innehåller benzatinkloxacillin motsvarande 500 mg kloxacillin och ampicillintrihydrat motsvarande 250 mg ampicillin som verksamma ämnen.

Hjälpsubstanser: aluminiummonostearat och flytande paraffin.

Läkemedelsform: Intramammarium, suspension.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Irland

TILLVERKARE ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Norbrook Laboratories Limited

Newry

Co. Down

Nordirland

Norbrook Manufacturing Ltd.

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Irland

ANVÄNDNINGSSÄNDAMÅL

Preparatet används vid vård av juverinflammation och som profylax i samband med sinläggning, då förorsakaren är en mikroorganism som är känslig mot kloxacillin eller ampicillin. Preparatets verkan i juvren räcker ca. 3 - 4 veckor och används enbart i samband med sinläggning.

De verksamma ämnenas effekt är bättre, då de används tillsammans, än någotdera av ämnenas inverkan enskilt. Preparatet har effekt på följande förorsakare av mastit: streptokocker, penicillinkänsliga och -resistenta stafylokocker, *Corynebacterium* - arter, *Arcanobacterium pyogenes*, *E.coli* och övriga känsliga, gramnegativa bakterier.

KONTRAIKATIONER

Preparatet får inte användas under mjölkkningsperioden.

BIVERKNINGAR

Inte kända.

DJURART, FÖR VILKET LÄKEMEDLET ÄR AVSETT

Nötkreatur.

ANVÄNDNING UNDER DRÄKTIGHET OCH LAKTATION

Får inte användas under laktation.

DOSERING OCH ADMINISTRERING

Sinläggning: 1 spruta i varje juvers fjärdedel efter sista mjölkningen.

KARENSTID

Slakt: 28 dygn.

Mjolk: 6 dygn från kalvningen. Om sintidsperioden är under 49 dygn, är karenstiden 55 dygn från behandling.

Får inte användas hos kor med kort sintid.

Preparatet är inte avsett för användning inom 49 dygn efter kalvning.

MÖJLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, SOM PERSONEN SOM GER LÄKEMEDLET BÖR FÖLJA

Ampicillin och kloxacillin hör till de penicilliner, som kan förorsaka allergiska reaktioner då de injiceras, inandas, äts eller vid kontakt med huden. Ibland kan reaktionerna vara livsfarliga. Om du är allergisk mot penicillin, hantera inte preparatet. Om du får symptom som eksem, svullnad i ansiktet, läpparna eller struphuvudet eller andningssvårigheter, ta kontakt med läkare.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Förvaras vid 15 - 25 °C.

Sista användningsdatum är märkt på förpackningen.

Oanvänt preparat förs till apoteket för förstöring eller till problemavfallscentralen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

26.07.2019