

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Lamisil 1 % sumute iholle, liuos

terbinafiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Lamisil-sumute on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lamisil-sumutetta
3. Miten Lamisil-sumutetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Lamisil-sumutteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Lamisil-sumute on ja mihin sitä käytetään

Lamisil-sumute on sienilääke ihon sieni-infektion hoitoon. Se vaikuttaa tappamalla iho-oireita aiheuttavan sienen.

Lamisil-sumutetta käytetään seuraavien sieni-infektioiden hoitoon:

- jalkasilsa (*tinea pedis*)
- nivustaipeen silsa (*tinea cruris*)
- vartalosilsa (*tinea corporis*)
- *Pityriasis versicolor* -nimisen hiivasienen aiheuttama infektio (savipuoli).

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Lamisil-sumutetta

Älä käytä Lamisil-sumutetta

- jos olet allerginen terbinafiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos tämä koskee sinua äläkä käytä Lamisil-sumutetta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Lamisil-sumutetta.

- Käytä vain ulkoisesti. Älä käytä valmistetta suuhun tai niele sitä.
- Varo sumutteen joutumista kasvoille, silmiin tai vaurioituneelle iholle, missä alkoholi saattaa aiheuttaa ärsytystä. Jos sumuteliuosta joutuu silmiin, huuhtelee huolellisesti juoksevalla vedellä. Jos oireet pitkittyvät, ota yhteyttä lääkäriin.
- Älä hengitä sumuteliuosta.

- Lamisil-sumute sisältää alkoholia. Pidä poissa avotulen lähetyviltä.

Lapset ja nuoret

Lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten ei pidä käyttää Lamisil-sumutetta.

Muut lääkevalmisteet ja Lamisil-sumute

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Älä käytä hoidettavalla alueella muita lääkkeitä tai hoitoja (myöskään ilman reseptiä saatavia itsehoitovalmisteita) samaan aikaan Lamisil-sumutteen kanssa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lamisil-sumutetta ei saa käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi tarpeellista.

Lääkeainetta saattaa kulkeutua rintamaitoon. Jos imetät, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä päästä imeväisiä kosketukseen Lamisililla hoidetun ihoalueen kanssa, rintojen iho mukaan lukien.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lamisil-sumutteen käyttö ei vaikuta ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita.

Lamisil-sumute sisältää 96 %:sta etanolia

Tämä lääkevalmiste sisältää 250 mg/g 96 %:sta etanolia. Saattaa aiheuttaa polttelua vahingoittuneilla ihoalueilla.

Lamisil-sumute sisältää propyleeniglykolia

Tämä lääkevalmiste sisältää 50 mg/g propyleeniglykolia.

3. Miten Lamisil-sumutetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Sumuta Lamisil-sumutetta hoidettavalle ihoalueelle kerran tai kaksi kertaa päivässä viikon ajan seuraavasti.

Käyttöohjeet

Vain aikuiset

- Puhdista ja kuivaa hoidettava ja sitä ympäröivä ihoalue ja pese kädet.
- Poista sumutepullon korkki.
- Paina ennen ensimmäistä käyttökertaa sumutepullon pumppua muutaman kerran, jotta saat tasaisen sumutteen.
- Sumuta riittävästi liuosta, jotta hoidettava ihoalue ja sitä ympäröivä iho kostuvat kauttaaltaan. Voit pitää pulloa pystyasennossa tai ylösalaisin saadaksesi sumutteen helpommin hoidettavalle ihoalueelle.
- Kierrä korkki takaisin pulloon.
- Pese kädet liuksen sumuttamisen sen jälkeen, kun olet koskenut hoidettavaan ihoalueeseen, jotta et levitä tartuntaa itseesi tai muihin ihmisiin.

Jos hoidat ihopöimussa sijaitsevaa infektiota, voit peittää hoidetun alueen sideharsolla, etenkin yön ajaksi. Jos peität alueen sideharsolla, vaihda siihen uusi sideharso aina valmisteen levittämisen yhteydessä.

Miten usein ja kuinka kauan Lamisil-sumutetta käytetään

Sumuta sumutetta hoidettavalle ihoalueelle kerran tai kaksi kertaa päivässä, kuten alla on mainittu, ellei lääkäri ole antanut sinulle toisenlaisia ohjeita:

- **jalkasilsa:** kerran päivässä viikon ajan
- **nivus- ja vartalosilsa:** kerran päivässä viikon ajan
- **savipuoli** (*Pityriasis versicolor* -hiivasieni-infektio): kaksi kertaa päivässä viikon ajan.

Käytä valmistetta suositellun hoitjakson ajan, vaikka oireet häviäisivät muutamassa päivässä. Sieni-infektio näyttää paranevan muutaman päivän jälkeen, mutta saattaa uusiutua jos valmistetta ei käytetä säännöllisesti tai hoito lopetetaan liian aikaisin.

Valmisteen pitäisi alkaa helpottaa oireita muutamassa päivässä.

Jos et havaitse paranemista viikon kuluessa Lamisil-hoidon lopettamisen jälkeen, ota yhteyttä apteekkihenkilökuntaan varmistaaksesi että olet käyttänyt valmistetta oikein, tai lääkäriin oikean diagnoosin varmistamiseksi.

Hävitä jäljellä mahdollisesti oleva sumuteliuos 12 viikon kuluttua pullon ensimmäisen avaamisen jälkeen.

Hoitoa edistäviä tekijöitä

Pidä hoidettava ihoalue puhtaana pesemällä se säännöllisesti. Kuivaa ihoalue hyvin, mutta älä hankaa sitä vaan taputtele kevyesti. Vaikka iho saattaa kutista, yritä olla raapimatta sitä, koska siitä voi aiheutua lisähaittaa ja se voi hidastaa paranemista tai levittää infektiota.

Käytä omaa pyyhettä ja omia vaatteitasi äläkä anna toisten käyttää niitä, koska tällaiset infektiot voivat tarttua helposti. Pese vaatteesi ja pyyhkeesi usein välttyäksesi infektion uusiutumiselta.

Jos unohdat käyttää Lamisil-sumutetta

Jos unohdat sumuttaa liuosta, sumuta sitä iholle mahdollisimman pian ja jatka sitten hoitoa normaaliin tapaan. Jos muistat vasta, kun on aika sumuttaa seuraava annos iholle, sumuta liuosta tavanomainen määrä ja jatka hoitoa sitten tavanomaiseen tapaan. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen kerta-annoksen.

Käytä sumutetta käyttöohjeen mukaisesti. Tämä on tärkeää, koska hoitokertojen poisjääminen suurentaa infektion uusiutumiseriskii.

Jos vahingossa nielet valmistetta

Käännä heti lääkärin puoleen, jotta saat toimintaohjeet. Valmisteen sisältämä alkoholi tulee ottaa huomioon.

Jos valmistetta pääsee vahingossa silmiin

Huuhtelee silmät huolellisesti juoksevilla vedellä. Mene lääkäriin, jos epämiellyttävät tunteet silmissä jatkuvat.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkut henkilöt saattavat olla allergisia Lamisil-sumutteelle, mikä voi aiheuttaa turvotusta ja kipua, ihottumaa tai nokkosihottumaa. Näitä on raportoitu, mutta niiden *esiintymistaajuus on tuntematon (yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella)*.

Jos sinulla on näitä oireita, lopeta Lamisil-sumutteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin välittömästi,

Myös seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu

Yleiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä):

Hoidetun alueen ihon hilseily ja kutina.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta):

Ihovauriot, rupimuodostus, iho-oireet, ihon värin muutokset, punaisuus, polttelu, kipu tai ärsytys hoidetulla ihoalueella.

Harvinaiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä tuhannesta):

Ihon kuivuminen, ekseema, oireiden paheneminen, kosketusihottuma (eräänlainen ihotulehdus).

Jos Lamisil-sumutetta on vahingossa joutunut silmiin, silmien ärsytystä voi esiintyä.

Esiintymistaajuudeltaan tuntemattomat haittavaikutukset (yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella):

Ihottuma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Lamisil-sumutteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä

Kierrä pullon korkki kiinni käytön jälkeen. Hävitä jäljellä mahdollisesti oleva sumuteliuos 12 viikon kuluttua pullon ensimmäisestä avaamisesta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lamisil-sumute sisältää

- Vaikuttava aine on terbinafiinihydrokloridi. Yksi gramma Lamisil-sumutetta sisältää 10 mg terbinafiinihydrokloridia (1 % w/w).
- Muut aineet ovat puhdistettu vesi, etanoli 96 %, propyleeniglykoli (E 1520), makrogolisetostearyylieetteri.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Lamisil-sumute, liuos, on kirkas, väritön tai hieman kellertävä neste. Lamisil-sumutetta on saatavana 30 ml:n pulloissa, joissa on sumutepumppu. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Postboks 61, 2610 Rødovre, Tanska

Valmistaja

Glaxosmithkline Consumer Healthcare ApS
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand, Tanska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy
PL 24
02231 Espoo
Puh: 0800 77 40 80
S-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 01.05.2021

GSK-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu GSK-konsernille. ©2021 GSK-konserni tai sen lisenssinantaja.

Bipacksedel: Information till användaren

Lamisil 1 % kutan spray, lösning

terbinafinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande :

1. Vad Lamisil spray är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lamisil spray
3. Hur du använder Lamisil spray
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lamisil spray ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lamisil spray är och vad det används för

Lamisil spray är ett svampmedel som används på huden. Det verkar genom att döda svampen som orsakar hudproblemen.

Lamisil spray används för att behandla:

- fotsvamp (*tinea pedis*)
- hudsvamp (*tinea cruris*)
- ringorm (*tinea corporis*)
- en ytlig jästsvampsinfektion på huden orsakad av *Pityriasis versicolor*.

2. Vad du behöver veta innan du använder Lamisil spray

Använd inte Lamisil spray

- om du är allergisk mot terbinafin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- **Tala om för läkaren eller apotekspersonalen** om detta gäller dig och **använd inte Lamisil spray**.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lamisil spray.

- Endast avsett för utvärtes användning.
- Använd inte i munnen eller svälj inte sprayen
- Använd inte sprayen i ansiktet, i ögonen eller på skadad hud där alkohol kan irritera huden. Om du av misstag får sprayen i ögonen, skölj dem noga med rinnande vatten. Kontakta läkaren om symtomen fortsätter.
- Andas inte in sprayen.

- Lamisil spray innehåller alkohol. Får inte hanteras nära öppen eld.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år får inte använda Lamisil spray.

Andra läkemedel och Lamisil spray

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel

- Applicera inte andra mediciner eller behandlingar på det drabbade området (inklusive receptfria medel) samtidigt med Lamisil spray.

Graviditet och amning

- Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Lamisil spray ska inte användas under graviditet om det inte är oundvikligt.
- Detta läkemedel kan passera över i modersmjölk. Om du ammar, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Spädbarnet bör inte komma i kontakt med något behandlat område, inklusive bröstet.

Körförmåga och användning av maskiner

Användningen av Lamisil spray påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Lamisil spray innehåller etanol (96 %)

Detta läkemedel innehåller 250 mg/g etanol (96 %).

Det kan orsaka en brännande känsla på skadad hud.

Lamisil spray innehåller propylenglykol

Detta läkemedel innehåller 50 mg/g propylenglykol.

3. Hur du använder Lamisil spray

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är att använda sprayen en eller två gånger dagligen i en veckas tid enligt anvisningarna nedan.

Hur sprayen används

Endast vuxna

- Rengör och torka det drabbade hudområdet samt det omgivande hudområdet och tvätta sedan händerna.
- Avlägsna korken från sprayflaskan.
- Innan du använder första gången ska du pumpa några gånger så du får en jämn spray.
- Spraya tillräckligt lösning för grundligt fukta det drabbade hudområdet och den omgivande huden. Du kan hålla flaskan upprätt eller upp och ner för att nå de drabbade områdena bättre.
- Skruva korken tillbaka på flaskan.
- Tvätta händerna efter att du vidrört den infekterade huden, så du inte sprider infektionen till dig själv eller till andra människor.

Om du behandlar en infektion i hudveck kan du täcka det behandlade området med gasbinda, särskilt på natten. Om du gör det, byt och använd en ny ren gasremsa varje gång du applicerar produkten.

Hur ofta och hur länge ska Lamisil spray användas

Använd sprayen en eller två gånger dagligen på det drabbade området enligt anvisningarna nedan om inte läkaren har föreskrivit något annat:

- **fotsvamp:** använd en gång dagligen under en vecka
- **hudsvamp och ringorm:** använd en gång dagligen under en vecka
- **jästsvampinfektion (*Pityriasis versicolor*):** använd två gånger dagligen under en vecka.

Använd produkten under den rekommenderade behandlingsperioden, även om infektionen ser ut att bli bättre inom några dagar. Infektioner ser ofta ut att förbättras efter några dagar, men kan återkomma om produkten inte används regelbundet eller om behandlingen avbryts för tidigt.

Produkten bör börja förbättra din hud inom några dagar.

Om du inte märker några tecken på förbättring inom en vecka efter avslutad behandling med Lamisil spray, rådfråga apotekspersonal för att säkerställa att produkten använts på rätt sätt eller kontakta läkare för att bekräfta rätt diagnos.

Oanvänd spray ska kasseras senast 12 veckor efter första öppnandet.

För en lyckad behandling

Håll det drabbade hudområdet rent genom att tvätta det regelbundet. Klappa huden torr omsorgsfullt men utan att gnugga. Även om huden kan klia, försök låta bli att skrapa eftersom det kan orsaka mera skada och fördröja tillfriskningsprocessen eller sprida infektionen.

Använd separata handdukar och dina egna kläder och dela dem inte med andra eftersom infektionerna enkelt kan sprida sig. Tvätta dina kläder och handdukar ofta för att skydda dig själv mot att bli återsmittad.

Om du har glömt att använda Lamisil spray

Om du glömmet att använda sprayen, gör det då genast när du märker det och fortsätt sedan som normalt. Om du märker det vid tiden för ditt nästa behandlingstillfälle, spraya då en normal mängd och fortsätt behandlingen som vanligt. Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Använd sprayen enligt anvisningarna. Detta är viktigt, eftersom uteblivna behandlingstillfällen ökar risken för att infektionen återkommer.

Om du av misstag sväljer av produkten

Kontakta omedelbart en läkare som kan ge råd om vad du ska göra. Det är viktigt att beakta att produkten innehåller alkohol.

Om du av misstag får produkten i ögonen

Skölj ögonen omsorgsfullt med rinnande vatten. Uppsök läkare om du fortfarande har besvär efter det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vissa personer kan vara allergiska mot Lamisil spray, vilket kan orsaka svullnad och smärta, hudutslag eller nässelutslag. Detta har rapporterats, men *förekomstfrekvensen är okänd (kan inte beräknas från tillgängliga data)*.

Sluta använda Lamisil sprayen och kontakta läkare omedelbart om något av dessa symtom förekommer.

Också följande biverkningar har rapporterats:

Vanliga biverkningar (*kan förekomma högst hos en användare av 10*)

Hudfjällning och klåda vid appliceringsstället.

Mindre vanliga biverkningar (*kan förekomma högst hos en användare av 100*)

Skador på huden, skorv, hudsymtom, förändringar i hudens färg, hudrodnad, brännande känsla på huden, smärta eller irritation vid appliceringsstället.

Sällsynta biverkningar (*kan förekomma högst hos en användare av 1 000*)

Torr hud, eksem, försvårade symtom, kontakteksem (en typ av hudinflammation).

Om du av misstag får Lamisil spray i ögonen kan irritation inträffa.

Biverkningar med okänd förekomstfrekvens (*kan inte beräknas från tillgängliga data*)

Utslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea

5. Hur Lamisil spray ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter (Utg.dat.) Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Tillslut flaskan efter användning. Oanvänd spray ska kasseras senast 12 veckor efter första öppnandet.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är terbinafinhydroklorid. Ett gram Lamisil spray innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid (1 % w/w)
- Övriga innehållsämnen är renat vatten, etanol 96 %, propylenglykol (E 1520), makrogolcetostearyleter.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lamisil kutan spray, lösning är en klar, färglös eller svagt gulaktig lösning.

Lamisil spray, lösning finns tillgängligt i 30 ml flaska med spraypump.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Postboks 61

2610 Rødovre

Danmark

Tillverkare

Glaxosmithkline Consumer Healthcare ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand, Danmark

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy

PB 24

02231 Esbo

Tel: 0800 77 40 80

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com

Denna bipacksedel ändrades senast 01.05.2021

Varumärken ägs av eller licensieras till GSK-koncernen. ©2021 GSK-koncernen eller dess licensgivare.