

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Lidokain Aguettant 10 mg/ml injektioneste, liuos, esityytetty ruisku Lidokain Aguettant 20 mg/ml injektioneste, liuos, esityytetty ruisku lidokaiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin saat aloitaa lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävä, käännny lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Lidokain Aguettant on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Lidokain Aguettant -valmistetta
3. Miten Lidokain Aguettant annetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Lidokain Aguettant –valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Lidokain Aguettant on ja mihin sitä käytetään

Lidokain Aguettant sisältämä vaikuttava aine on lidokaiinihydrokloridi.

Lidokain Aguettant on paikallinen puudutusaine. Sitä käytetään leikkaustoimenpiteissä kehon osien puuduttamiseen. Valmiste estää väliaikaisesti kipuviestien välityksen puudutetun alueen hermoista aivoihin.

Lidokain Aguettant 10 mg/ml valmistetta voidaan käyttötarkoituksesta riippuen käyttää joko aikuisille ja yli 2 vuotiaille lapsille tai vain aikuisille.

Lidokain Aguettant 20 mg/ml valmistetta voidaan käyttää aikuisille.

Lidokaiinihydrokloridi, jota Lidokain Aguettant injektioneste, liuos, esityytetty ruisku sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Lidokain Aguettant -valmistetta

Sinulle ei saa antaa Lidokain Aguettant -valmistetta:

- jos olet allerginen lidokaiinille, amidityyppisille paikallispuudutusaineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin sinulle annetaan Lidokain Aguettant:

- jos sairastat epilepsiaa. Lääkärisi seuraa huolellisesti, esiintyykö sinulla oireita.
- jos sinulla on munuais- tai maksasairaus.
- jos sinulla on lihasheikkoutta aiheuttava tauti (myasthenia gravis).
- jos sinulla on sydänsairausrus, kuten johtumishäiriötä tai hidastus.
- jos sinulla on hengityslamaa (hengitysvaikeuksia, joissa hengitys on hidasta ja pinnallista).
- jos olet iäkäs tai sinulla on huono yleiskunto.
- jos sinulla on verenvuototauti tai sinua on hoidettu verenvuototaudin takia.

Lisäksi lääkärisi tietää, että tämän lääkkeen antaminen pistoksenä tulehtuneeseen kudokseen saattaa lisätä vaikuttavan aineen kertymistä verenkiertoon ja vaikuttavan aineen vaikutus elimistössäsi heikkenee.

Lääkärisi ottaa huomioon, että hermojärjestelmään kohdistuvien haittavaikutusten riski kasvaa, jos lääke annetaan pään ja kaulan alueelle.

Lapset ja nuoret

Lidokain Aguettant 10 mg/ml –valmistetta ei pidä käyttää alle kaksivuotiaiden lasten hoitoon.

Lidokain Aguettant 10 mg/ml – valmistetta voidaan käyttötarkoituksesta riippuen käyttää joko yli 2 vuotiaille lapsille tai vain aikuisille.

Lidokain Aguettant 20 mg/ml –valmistetta ei pidä käyttää lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja Lidokain Ague ttant

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkeitä. Lidokain Aguettant voi vaikuttaa muihin lääkeisiin, tai muut lääkeet voivat vaikuttaa siihen.

Kerro lääkärille erityisesti silloin, jos käytät jotakin seuraavista tuotteista:

- verenpaineen hoitoon tarkoitettut lääkeet, kuten diureetit (nesteenpoistolääkkeet);
- sydänsairauden (ml. epäsäännöllisen sykkeen) hoitoon tarkoitettut lääkeet, kuten beetasalpaajat (esimerkiksi metoprololi ja propranololi) tai kalsiuminestäjät (esimerkiksi amiodaroni);
- verisuonia supistavat lääkeet (vasokonstriktorit, kuten epinefriini, norepinefriini);
- yleisanestesiassa käytettävä lihaksia rentouttavat lääkeet (kuten suksametoni);
- unilääkeet ja tietoisuuden tasoa laskevat lääkeet (sedatiivit);
- lääkeet, jotka lisäävät kouristusten ja kohtausten riskiä (kuten tramadol, bupropioni);
- lääkeet, jotka vähentävät kohtausten ja kouristusten riskiä (kuten diatsepaami);
- simetidiini, näristylääke;
- viruslääkeet (kuten ritonaviiri), makrolidiantibiootit (kuten erytromysiini) tai sienilääkkeet (kuten ketokonatsoli, itrakonatsoli);
- siprofloksasiini (antibiootti);
- epilepsialääkeet (fenobarbitaali, fenytoiini, karbamatsepiini tai primidoni);
- fluovksamidi, mielisairauden hoitoon käytettävä lääke;
- silmänpainelääkeet (kuten asetsolamidi);
- muut puudutusaineet, ml. paikallispuidutteet.

Raskaus ja imetyks

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäristä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkärisi päättää, annetaanko sinulle tästä lääkettä.

Raskaus

Lääkärisi määräät tästä lääkettä sinulle raskautesi aikana vain, jos hän katsoo sen tarpeelliseksi. Annoksen tulee olla mahdollisimman pieni.

Imetyks

Lidokaiini siirtyy rintamaitoon pieninä määrinä. Lidokaiinin käyttö suositeltuna annoksina ei todennäköisesti vaikuta imetettävään lapseen. Imetystä voidaan siten jatkaa lidokaiinin käytön aikana.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Lidokain Aguettant saattaa vaikuttaa kykyysi ajaa tai käyttää koneita. Kysy lääkäristäsi, milloin ajaminen tai koneiden käyttäminen on turvallista.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioda, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Lidokain Aguettant sisältää natriumia

Lidokain Aguettant 10 mg/ml

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per 5 ml:n esityytetty ruisku eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Tämä lääkevalmiste sisältää 28 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per 10 ml:n esityytetty ruisku. Tämä on 1,4 % päivittäisestä ravinnosta saatavasta, aikuiselle suositellusta natriumin enimmäismäärästä.

Lidokain Aguettant 20 mg/ml

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per 5 ml:n tai 10 ml:n esityytetty ruisku eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten Lidocain Aguettant -valmistetta annetaan

Lääkkeen antaa hoitohenkilö, jolla on soveltuva koulutus ja kokemus.

Lääkäri määrittää sinulle sopivimman annoksen ikäsi, terveydentilasi, pistoskohdan, antomenetelmän ja vasteesi perusteella.

Käyttö lapsille ja nuorille

Lidokain Aguettant 10 mg/ml -valmistetta ei pidä käyttää alle kaksivuotiaiden lasten hoitoon. Lidokain Aguettant 10 mg/ml – valmistetta voidaan käyttötarkoituksesta riippuen käyttää joko yli 2 vuotiaalle lapsille tai vain aikuisille.

Lidokain Aguettant 20 mg/ml -valmistetta ei pidä käyttää lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoitoon.

Antotapa

Lidokain Aguettant annetaan pistoksen laskimoon tai ruiskutetaan ääreishermojen ympäristöön (ihon sisään, ihon alle tai limakalvon alle)..

Jos sinulle annetaan enemmän Lidocain Aguettant-valmistetta kuin sinun pitäisi

Koska koulutettu hoitohenkilö antaa tämän lääkkeen, on epätodennäköistä, että sinulle annetaan liikaa Lidokain Aguettant -valmistetta.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkystytokeskukseen (puh. 09 471 977 riskien arvioimiseksi ja lisähjeiden saamiseksi).

Yliannostusoireiden mahdollinen kehittyminen riippuu tämän lääkkeen määrästä veressäsi. Mitä enemmän lidokainia veressäsi on ja mitä nopeammin se annetaan, sitä useammin ja voimakkaammin saatat saada yliannostusoireita.

Pieni yliannostus vaikuttaa lähinnä keskushermostoosi. Useimmissa tapauksissa mahdolliset haittavaikutukset häviävät, kun lidokainin käyttö lopetetaan.

Kerro kuitenkin heti pistoksen antaneelle henkilölle, jos uskot saaneesi lääkettä liikaa tai alat tuntea pyörrytystä tai huimausta, kielen puutumista, korvien soimista, pahoinvointia tai puistatuksia.

Lääkäri tietää, miten näitä oireita hallitaan, ja hän antaa sinulle tarvittavan hoidon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkikenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkin haittavaikutukset voivat olla vakavia. Hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon, jos sinulla on allerginen reaktio, joka aiheuttaa jonkin seuraavista oireista:

- käsienviimeiset, jalkaterien, kasvojen, hulten, suun, kielen tai kurkun turpoaminen
- hengitysvaikeudet
- kutiseva ihottuma
- kuume
- verenpaineen lasku ja sokki.

Nämä haittavaikutukset ovat harvinaisia (voivat esiintyä enintään yhdellä henkilöllä tuhannesta).

Muita haittavaikutuksia voivat olla:

Hyvin yleinen (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä kymmenestä)

- pahoinvointi.

Yleinen (voi esiintyä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä)

- kutinan, kihelmöinnin, poltteen, pistelyn tai puutumisen tunne (parestesia)
- tajunnanmenetys
- pistosten aiheuttama kipu tai vapina
- hidas syke
- matala tai korkea verenpaine
- oksentelu.

Harvinainen (enintään yhdellä henkilöllä tuhannesta)

- muutokset aistituntemuksissa tai lihasheikkous (neuropatia)
- kouristukset (kohtaukset)
- osittainen halvaantuminen
- päänsärky, johon liittyy soiva tai naksahteleva ääni korvissa (tinnitus) ja epänormaali valonarkkuus (fotofobia)
- kuulon menetys (kuurous)
- aivohermojen vauriot
- silmäloumen tai -luomien laskeuma, johon liittyy pupillien pieneneminen ja joskus hikoilun väheneminen (Hornerin oireyhtymä). Sitä esiintyy, kun lääke annetaan pään/kaulan alueelle.
- rinnan yläosan, kaulan tai kasvojen epäsymmetrisen hikoilu ja punehduminen (harlekiinioireyhtymä)
- epäsäännöllinen syke
- sydämenpysähdyksessä
- kaksoiskuvat
- hengityksen hidastuminen tai pysähtyminen
- ihottuma tai nokkosihottuma.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

- ihmisen sinertävä väri, päänsäryt, hengenahdistus ja poikkeavasta veren methemoglobiiniinimäärästä (hemoglobiinin muoto, jonka kyky sitoa happea on heikentynyt) johtuva väsymys (methemoglobinemia).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkikenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Lidokain Ague ttant -valmisten säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Sinulle ei saa antaa tästä lääkettä ruiskun myyntipäällysmerkinnöissä, läpipainopakkauksessa ja pahvipakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Pidä esitetyt ruisku ennen käyttöä avaamattomana läpipainopakkauksessa. Ei saa jäätää. Lääke tulee käyttää välittömästi avaamisen jälkeen.

Lääkettä ei saa käyttää, jos sen ulkonäössä on näkyviä muutoksia.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin. Kysy käyttämättömen lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lidokain Ague ttant sisältää

Vaikuttava aine on lidokaïnihydrokloridi.

Lidokain Ague ttant 10 mg/ml:

- Yksi millilitra injektionestettä sisältää 10 mg lidokaïnihydrokloridia (lidokaïnihydrokloridimonohydraattina).
- Yksi 5 ml:n esitetyt ruisku sisältää 50 mg lidokaïnihydrokloridia (lidokaïnihydrokloridimonohydraattina).
- Yksi 10 ml:n esitetyt ruisku sisältää 100 mg lidokaïnihydrokloridia (lidokaïnihydrokloridimonohydraattina).

Lidokain Ague ttant 20 mg/ml:

- Yksi millilitra injektionestettä sisältää 20 mg lidokaïnihydrokloridia (lidokaïnihydrokloridimonohydraattina).
- Yksi 5 ml:n esitetyt ruisku sisältää 100 mg lidokaïnihydrokloridia (lidokaïnihydrokloridimonohydraattina).
- Yksi 10 ml:n esitetyt ruisku sisältää 200 mg lidokaïnihydrokloridia (lidokaïnihydrokloridimonohydraattina).

Muut aineet ovat: natriumkloridi, natriumhydroksidi ja väkevä kloorivetyhappo (pH:n säättämiseen) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkaukoko

Lidokain Ague ttant on kirkas, väritön injektioneste, liuos (injektio). Lidokain Ague ttant on saatavana 5 ml:n ja 10 ml:n esitetyissä polypropeeniruiskuissa, joissa on mitta-asteikko (tilavuusmerkinnät 0,5 ml:n välein välillä 0–5 ml tai 0–10 ml). Esitetyt ruiskut on yksittäispakattu repäispakkauksiin. Pahvipakkauksessa on 1 tai 10 esitetyt ruiskua. Kaikkia pakkaukokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Laboratoire Ague ttant

1 rue Alexander Fleming
69007 Lyon
Ranska

Valmistaja
Laboratoire Aguettant
1 rue Alexander Fleming
69007 Lyon
Ranska

Laboratoire Aguettant
Lieu-Dit Chantecaille
07340 Champagne
Ranska

Tämä pakkausse oloste on tarkistettu viimeksi 23.08.2024.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Valmistele esityytetty ruisku huolellisesti seuraavien ohjeiden mukaan.


Esityytetty ruisku on tarkoitettu vain yhden potilaan käyttöön. Hävitä esityytetty ruisku käytön jälkeen.
Älä käytä uudelleen.

Avaamaton tai ehjä läpipainopakkaus on steriili. Sen saa avata vasta juuri ennen käyttöä.
Lääke tulee tarkastaa visuaalisesti siinä näkyvien hiukkosten ja värimuutosten varalta ennen käyttöä.
Vain kirkasta, väritöntä liuosta, jossa ei näy hiukkasia tai saostumia, tulee käyttää.
Älä käytä läkettä, jos ruiskun turvasinetti on vahingoittunut.

Esityytetyn ruiskun ulkopinta on steriili ennen läpipainopakkauksen avaamista.


Aseptisesti käsitlety lääke voidaan asettaa steriilille alueelle.

1) Vedä esityytetty ruisku ulos steriilistä läpipainopakkauksesta.




2) Työnnä mäntää tulpan vapauttamiseksi. Sterilointi on saattanut aiheuttaa tulpan kiinnittymisen esityytetyn ruiskun seinämään.

3) Kierrä korkki irti sinetni rikkomiseksi. Älä koske esiin tulevaan luer-liittimeen, jotta se ei kontaminoidu.



4) Tarkista, että esitäytetyn ruiskun kärjen sinetti on irronnut kokonaan. Jos sinetti ei ole irronnut, pane suojuksen takaisin paikoilleen ja kierrä uudelleen.



5) Poista ruiskusta ilma painamalla mäntää ja poista tarvittaessa ylimääriäinen injektioneste ennen antoa.

6) Yhdistä esitäytetty ruisku siirtolaitteeseen tai neulaan. Työnnä mäntää hitaasti oikean tilavuuden injektoimiseksi.

Bipacksedel: Information till patienten

**Lidokain Aguettant 10 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta
Lidokain Aguettant 20 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta**
lidokainhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läke medel. Den inne håller information som är viktig för dig.

- Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I den här bipackse del finns information om följande:

1. Vad Lidokain Aguettant är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Lidokain Aguettant
3. Hur du tar Lidokain Aguettant
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lidokain Aguettant ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lidokain Aguettant är och vad det används för

Lidokain Aguettant innehåller den aktiva substansen lidokainhydroklorid.

Lidokain Aguettant är ett lokalbedövningsmedel. Det används för att bedöva delar av kroppen under kirurgiska procedurer. Det hindrar tillfälligt nerverna från att skicka smärtmeddelanden till hjärnan i området där det injiceras.

Lidokain Aguettant 10 mg/ml kan användas för vuxna och barn över 2 år eller endast för vuxna beroende på avsedd användning.

Lidokain Aguettant 20 mg/ml kan användas för vuxna.

Lidokainhydroklorid som finns i Lidokain Aguettant kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och fölж alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du får Lidokain Aguettant

Du ska inte ges Lidokain Aguettant:

- om du är allergisk mot lidokain, lokalbedövningsmedel av amidtyp eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Lidokain Aguettant:

- om du har epilepsi. Din läkare kommer att övervaka dig noggrant.
- om du har njur- eller leverjukdom.
- om du har en sjukdom som leder till muskelsvaghets (myasthenia gravis).
- om du har hjärtproblem, inklusive hjärtledningsstörning eller långsam hjärtfrekvens.
- om du har andningsdepression (andningssvårigheter med långsam och ytlig andning).
- om du är äldre eller har försämrat allmänt hälsotillstånd.
- om du har, eller behandlas för, blödningssjukdomar.

Dessutom vet din läkare att en injektion av detta läkemedel i inflammerad vävnad kan leda till ökat upptag av läkemedlet i cirkulationen och att effekten på din kropp kommer att försvagas.

Din läkare kommer att ta hänsyn till att det finns en ökad risk för biverkningar från nervsystemet om detta läkemedel ges i huvud- och halsområdet.

Barn och ungdomar

Lidokain Aguettant 10 mg/ml ska inte ges till barn under 2 år. Lidokain Aguettant 10 mg/ml kan användas för barn över 2 år eller endast för vuxna beroende på avsedd användning.

Lidokain Aguettant 20 mg/ml ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Lidokain Aguettant

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Lidokain Aguettant kan påverka eller påverkas av andra läkemedel.

Var särskilt noga med att meddela din läkare om du tar något/några av följande:

- läkemedel som används för att behandla högt blodtryck t.ex. diureтика (vätskedrivande läkemedel);
- läkemedel som används för att behandla hjärtsjukdomar inklusive oregelbundna hjärtslag, som betablockerare (t.ex. metoprolol, propranolol) eller kalciumflödeskämmare (t.ex. amiodaron);
- läkemedel som gör att dina blodkärl drar ihop sig och blir smalare (vasokonstriktorer, t.ex. adrenalin, noradrenalin);
- läkemedel som används för att få muskler att slappna av under allmän bedövning (t.ex. suxameton);
- sömnmedel och läkemedel som sänker din medvetandegrad (lgnande läkemedel);
- läkemedel som ökar risken för att få krampfall (t.ex. tramadol, bupropion);
- läkemedel som minskar risken att få krampfall (t.ex. diazepam);
- cimetidin, ett läkemedel som används för att behandla halsbränna;
- läkemedel mot virusinfektion (t.ex. ritonavir), makrolidantibiotika (t.ex. erytromycin) eller läkemedel mot svampinfektion (t.ex. ketokonazol, itrakonazol);
- ciprofloxacin (antibiotika);
- läkemedel som används för att behandla epilepsi (fenobarbital, fenytoin, karbamazepin eller primidon);
- fluvoxamin, ett läkemedel som används för att behandla psykisk sjukdom;
- läkemedel som används för att minska trycket inuti ögat (t.ex. acetazolamid);
- andra bedövningsmedel, inklusive lokalbedövningsmedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta läkemedel. Din läkare beslutar sedan om du ska få detta läkemedel.

Graviditet

Om du är gravid, kommer din läkare bara att ge dig detta läkemedel om han/hon anser att det är nödvändigt. Dosen ska vara så låg som möjligt.

Amning

Lidokain överförs till bröstmjölken i små mängder. Det är osannolikt att användning av lidokain vid rekommenderade doser påverkar det ammade barnet. Patienter kan därför fortsätta att amma när de får lidokain.

Körförmåga och användning av maskiner

Lidokain Aguettant kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Fråga din läkare när det är säkert att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lidokain Aguettant inne håller natrium

Lidokain Aguettant 10 mg/ml

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium i varje 5 ml förfylld spruta, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

Detta läkemedel innehåller 28 mg natrium (den huvudsakliga beståndsdelen i koksalt) i varje 10 ml förfylld spruta. Detta motsvarar 1,4 % av det rekommenderade maximala dagliga intaget av natrium för vuxna.

Lidokain Aguettant 20 mg/ml

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium i varje 5 ml eller 10 ml förfylld spruta, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

3. Hur du tar Lidokain Aguettant

Infektionen av Lidokain Aguettant utförs av sjukvårdspersonal med lämplig utbildning och relevant erfarenhet.

Din läkare avgör lämplig dos för dig beroende på din ålder och ditt medicinska tillstånd samt injektionsplats, ingrepets omfattning och hur du svarar på infektionen.

Användning för barn och ungdomar

Lidokain Aguettant 10 mg/ml ska inte ges till barn under 2 år. Lidokain Aguettant 10 mg/ml kan användas för barn över 2 år eller endast för vuxna beroende på avsedd användning.

Lidokain Aguettant 20 mg/ml ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

Administreringssätt

Lidokain Aguettant kommer att ges till dig som en intravenös infektion (intravenös användning) eller infiltrationsinfektion (intradermal(i huden), subkutan (under huden) eller submukosal (under slemhinna) användning) i närheten av perifera nerver.

Om du har fått för stor mängd av Lidokain Aguettant

Eftersom detta läkemedel ges till dig av utbildad sjukvårdspersonal är det inte sannolikt att du får för stor mängd av Lidokain Aguettant.

Om du utvecklar symptom på en överdos eller inte, beror på halten av läkemedlet i ditt blod. Ju mer lidokain du har i blodet, och ju snabbare du får läkemedlet, desto oftare och mer allvarliga kan symptomerna på överdosering vara.

En liten överdos påverkar huvudsakligen ditt centrala nervsystem. Biverkningar som uppträder kommer i de flesta fall att försvinna, när man slutar att ge dig bedövningsmedlet.

Om du trots detta tror att du har fått för mycket läkemedel, eller om du börjar känna dig yr eller svimfårdig, om tungan känns bedövad, det ringer i öronen, eller om du får kräkningar eller frossa, måste du omedelbart meddela personen som ger dig infektionen. Din läkare vet hur man hanterar dessa symptom och ger dig den behandling du behöver.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tel. 09 471 977 (i Finland) och tel. 112 (i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Sök vård omedelbart om du fått en allergisk reaktion med symtom som:

- svullnad av händer, fötter, ansikte, läppar, mun, tunga eller hals
- andningssvårigheter
- kliande utslag
- feber
- blodtrycksfall och chock.

Dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).

Andra förekommande biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

- illamående.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- kittlande, pirrande, brännande känsla, stickningar eller förlorad känsel (parestesi)
- medvetslöshet
- smärta eller frossa p.g.a. injektioner
- långsam hjärtfrekvens
- lågt blodtryck eller högt blodtryck
- kräkningar.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

- förändrad känsel eller muskelsvaghets (neuropati)
- krämper (krampfall)
- delvis förlamning
- huvudvärk åtföljt av ringande eller klickande ljud i öronen (tinnitus) och onormalt hög ljuskänslighet
- hörsel förlust (dövhets)
- skador på nerverna i hjärnan
- ett eller båda ögonlocken faller ner, kombinerat med avsmalnande pupiller och ibland minskad svettning (Horners syndrom). Detta inträffar efter injektion i huvudet/halsen.
- asymmetrisk svettning och rodnad på övre delen av bröstkorgen, hals och ansikte (Harlequin-syndrom)
- oregebundna hjärtslag
- hjärtstillestånd
- dubbelseende
- långsam eller avbruten andning
- hudutslag eller nässelfeber.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

- Blåaktig missfärgning av huden, huvudvärk, andfåddhet och trötthet på grund av onormala mängder av methemoglobin (en form av hemoglobin som har nedsatt förmåga att binda syre) i blodet (methemoglobinemi)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Fimea (i Finland) eller Läkemedelsverket (i Sverige).

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Lidokain Aguettant ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Du ska inte få detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på sprutans etikett, blisterförpackningen och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara den förfyllda sprutan i sin öppnade blisterförpackning fram till användningstillfället. Får ej frysas.

När förpackningen har öppnats måste läkemedlet användas omedelbart.

Detta läkemedel får inte användas om det finns tydliga tecken på försämring.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är lidokainhydroklorid.

Lidokain Aguettant 10 mg/ml:

- Varje ml injektionsvätska innehåller 10 mg lidokainhydroklorid (som lidokainhydrokloridmonohydrat).
- Varje 5 ml förfyllt spruta innehåller 50 mg lidokainhydroklorid (som lidokainhydrokloridmonohydrat).
- Varje 10 ml förfyllt spruta innehåller 100 mg lidokainhydroklorid (som lidokainhydrokloridmonohydrat).

Lidokain Aguettant 20 mg/ml:

- Varje ml injektionsvätska innehåller 20 mg lidokainhydroklorid (som lidokainhydrokloridmonohydrat).
- Varje 5 ml förfyllt spruta innehåller 100 mg lidokainhydroklorid (som lidokainhydrokloridmonohydrat).
- Varje 10 ml förfyllt spruta innehåller 200 mg lidokainhydroklorid (som lidokainhydrokloridmonohydrat).

Övriga innehållsämnen är: natriumklorid, natriumhydroxid, koncentrerad saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lidokain Aguettant är en genomskinlig, färglös lösning för injektion (injektionsvätska). Lidokain Aguettant finns tillgängligt i en 5 eller 10 ml förfyllt polypropenspruta, graderad i steg om 0,5 ml från 0 till 5 eller 10 ml, individuellt förpackade i en genomskinlig blisterförpackning.

Förpackningsstorlekar: Kartong med 1 eller 10 förfyllda sprutor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Laboratoire Aguettant

1 rue Alexander Fleming
69007 Lyon
Frankrike

Tillverkare
Laboratoire Aguettant
1 rue Alexander Fleming
69007 Lyon
Frankrike

Laboratoire Aguettant
Lieu-Dit Chantecaille
07340 Champagne
Frankrike

Denna bipacksedel ändrade s senast 23.08.2024.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Förbered den förfyllda sprutan noggrant enligt följande:

Den förfyllda sprutan är endast avsedd för engångsbruk till en enskild patient. Kassera den förfyllda sprutan efter användning. Återanvänt inte.


Innehållet i öppnade och oskadade blisterförpackningar är sterilt och förpackningen ska inte öppnas före användningstillfället.

Injectioslösningen ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Endast klar och färglös lösning, fri från partiklar eller utfällningar, ska användas. Läkemedlet ska inte användas om den plomberade förseglingen på sprutan är bruten.


Den förfyllda sprutans ytterta är steril tills blisterförpackningen öppnas.

Detta läkemedel kan placeras på en steril yta, om det hanteras med aseptisk metod.


1) Ta ut den förfyllda sprutan från den sterila blisterförpackningen.




2) Tryck på kolven för att frigöra spärren. Steriliseringsprocessen kan ha fått proppen att fastna vid den förfyllda sprutan.



3) Vrid av ändlocket för att bryta förseglingen. Vindrör inte den exponerade luerkopplingen, för att undvika kontaminering.



4) Kontrollera att förseglingen på den förfyllda sprutans spets är helt borttagen. Om inte, sätt tillbaka locket och vrid igen.



5) Tryck ut luften genom att försiktigt trycka på kolven och om nödvändigt, töm överskottsdosen före injektion.

6) Anslut den förfyllda sprutan till en överföringsenhet eller nål. Tryck långsamt på kolven för att injicera den erforderliga volymen.