

## Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

### Permethrin Aspire 50 mg/g emulsiovoide

permetriini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävästä, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

#### Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Permethrin Aspire on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Permethrin Aspire-emulsiovaidetta
3. Miten Permethrin Aspire-emulsiovaidetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Permethrin Aspire-emulsiovoiteen säilyttäminen
6. Pakauksen sisältö ja muuta tietoa

#### 1. Mitä Permethrin Aspire on ja mihin sitä käytetään

Permethrin Aspire-emulsiovoiteella hoidetaan syyhyä.

Permethrin Aspire-emulsiovoide on tarkoitettu vain syyhyn hoitoon aikuisille ja > 2 kuukauden ikäisille lapsille.

Permetriiniä, jota Permethrin Aspire-emulsiovoide sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

#### 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Permethrin Aspire-emulsiovaidetta

Lääkäri on voinut määritää emulsiovoiteen toiseen käyttöön tai toisella annostuksella kuin tässä pakkausselosteessa kerrotaan. Noudata aina lääkärin ohjeita ja lääkkeen toimittamisen yhteydessä siihen kiinnityssä ohjelipussa olevia ohjeita.

#### Älä käytä Permethrin Aspire-emulsiovaidetta

- jos olet allerginen permetriinille, muille pyretriineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

#### Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Permethrin Aspire-emulsiovaidetta:

- jos sinulla olevaa ihottumaa hoidetaan lisämunuaiskuoren hormoneilla (kortikosteroideilla), sillä siihen liittyy syyhyn pahenemisen riski
- jos sinun tiedetään olevan allerginen krysanteemeille tai muille *Compositae*-ryhmän kasveille (astereille); käytä tällöin Permethrin Aspire-emulsiovaidetta vasta keskusteltuasi lääkärin kanssa.

Vain ulkoisesti. Vältä emulsiovoiteen pääsyä kosketuksiin silmien kanssa. Jos näin kuitenkin käy, huuhtele silmät runsaalla vedellä. Permetriiniä käyttävien hoitajien on suositeltavaa käyttää suojakäsineitä.

### **Enintään 23 kuukauden ikäiset lapset**

Permethrin Aspire-emulsiovoidetta ei pidä käyttää vastasyntyneille eikä alle 2 kuukauden ikäisille vauvoille, ellei lääkäri niin kehota. Valmisten käytöstä vauvoille ja taaperoille ei ole riittävästi kokemusta. Enintään 23 kuukauden ikäisten lasten hoidon pitää tapahtua lääkärin tarkassa seurannassa.

### **Muut lääkevalmisteet ja Permetherin Aspire**

Kerro aina lääkärille tai apteekkichenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä.

### **Raskaus ja imetyks**

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunmittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäristä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Jos olet raskaana, voit käyttää Permetherin Aspire-emulsiovoidetta vain lääkärin kanssa keskusteltuasi.

Jos imetät, käytä Permetherin Aspire-emulsiovoidetta vain käytyäsi lääkärissä.

### **Ajamineen ja koneiden käyttö**

Permetherin Aspire ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajonevoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikuttuksia ja haittavaikuttuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausselosteksti opastuksekseen. Keskustele lääkärin tai apteekkichenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

### **Permetherin Aspire sisältää butylihydroksitolueenia (E321)**

Permetherin Aspire-emulsiovoide sisältää butylihydroksitolueenia (E321), joka saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) tai silmä- ja limakalvoärsytystä.

### **Permetherin Aspire -emulsiovoide sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia (E218) ja propyyliparahydroksibentsoaattia**

Permetherin Aspire-emulsiovoide sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia (E218) ja propyyliparahydroksibentsoaattia. Emulsiovoiteen nämä apuaineet saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

### **Permetherin Aspire -emulsiovoide sisältää lanoliinia ja setostearyylialkoholia**

Permetherin Aspire-emulsiovoide sisältää lanoliinia ja setostearyylialkoholia, jotka saattavat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

## **3. Miten Permetherin Aspire-emulsiovoidetta käytetään**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkichenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäristä tai apteekista, jos olet epävarma.

### **Suosittelutu annos on:**

Iäkkääät, aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret:	enintään koko tuubin sisältö.
6–12-vuotiaat lapset:	enintään puolet tuubin sisällöstä.
2 kuukauden – 5 vuoden ikäiset lapset:	enintään neljäsosa tuubin sisällöstä.

Jotkut aikuiset voivat tarvita koko vartalolle enemmän kuin yhden tuubin sisällön, mutta yhdellä käytökkerralla ei saa käyttää enempää kuin 2 tuubia.

## Käyttö lapsille

Permethrin Aspire-emulsiovaidetta voi käyttää alle 2-vuotiaalle lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan. Permethrin Aspire-emulsiovoiteen turvallisuutta ja tehoa alle 2 kuukauden ikäisille lapsille ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavissa.

## Antotapa

Sinetti on rikottava ennen käyttöä. Käännä kierrekorkki ylösalaisin ja paina se tuubin suuaukkoon.

Ihon pitää olla ennen hoitoa puhdas, kuiva ja viileä. Emulsiovaidetta ei pidä käyttää heti kuuman kylvyn tai suihkun jälkeen.

<i>Iäkkääät:</i>	Levitä emulsiovaidetta koko vartalolle, myös niskaan, kasvoihin, korviin ja hiuspohjaan. Silmien ympärysaluetta pitää välttää.
<i>Aikuiset ja yli 3-vuotiaat lapset:</i>	Levitä emulsiovaidetta huolellisesti koko vartalolle päättä lukuun ottamatta, paitsi jos huomaat ihottumaa näillä alueilla.
<i>Alle 3-vuotiaat lapset:</i>	Levitä emulsiovaidetta koko vartalolle, myös niskaan, kasvoihin, korviin ja hiuspohjaan. Silmien ympärysaluetta pitää välttää.

Muista levittää emulsiovaidetta kynsien alle, sormien ja varpaiden väliin, ranteisiin, käsivarsien alapintaan sekä kainaloihin, napaan, rintoihin ja myös nänniin ohuelle iholle, ulkoisiin sukupuolielimiin, nilkkoihin, ristiselän alueelle, pakaroihin ja peräaukon ympärille. Pyydä tarvittaessa apua emulsiovoiteen levittämiseen selkään. Aikuisten on tarpeen auttaa lapsia valmisteen levittämiseksi oikein. Estä lastasi nuolemasta emulsiovaidetta käsistään. Lasten on tarvittaessa käytettävä käsineitä.

Jos peset kädet ennen kuin on kulunut 8 tuntia, levitä emulsiovaidetta käsiin uudelleen. Pese emulsiovoide pois 12 tunnin kuluttua.

Jos Permethrin Aspire-emulsiovoiteen vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai heikko, keskustele asiasta lääkärin tai apteekkichenkilökunnan kanssa.

Syyhytartunta voi olla oireeton 3–4 viikon ajan ja tarttua toisiin ihokontaktissa. Kaikki samassa taloudessa asuvat ja lähikontaktit pitää siksi hoitaa samanaikaisesti, kuten edellä kuvataan, vaikka heillä ei olisi oireita.

Hoito on uusittava 7–14 päivän kuluttua ensimmäisestä hoitokerrasta.

Ihon kutina voi jatkua vielä 4 viikon ajan hoidon jälkeen. Kyse on tavallisesti syyhypunkkeista aiheutuvan allergisen reaktion jälkivaikutuksesta. Se ei siten välttämättä tarkoita hoidon epäonnistumista.

Sinun pitää noudattaa muita tarpeellisia desinfiointitoimenpiteitä, joita ovat mm. kaikkien vaatteiden ja vuodevaatteiden peseminen 60 °C:ssa tai niiden laittaminen suljettuun pussiin vähintään 3 päiväksi.

## Jos käytät enemmän Permethrin Aspire-emulsiovaidetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkystytietokesukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

- Jos olet käyttänyt enemmän emulsiovaidetta kuin tässä mainitaan tai enemmän kuin lääkäri on määäränyt ja voit huonosti, ota yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai apteekkichenkilökuntaan. Ota voidepakaus mukaasi.
- Liiallisen käytön oireena voi ilmetä yliherkkyysreaktioita.
- Valmisteen nielemisestä tai tahattomasta nielemisestä aiheutuneina oireina on raportoitu pahoinvointia, oksentelua, huimausta ja kramppeja.

Jos sinulla on kysyttävää tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan puoleen.

#### **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan nütä saa.

##### **Yleinen (saattaa ilmetä enintään 1 potilaalla kymmenestä):**

Poikkeavat tuntemukset ihossa (parestesiat), kuten kihelmöinti, pistely, kirvelyn tunne ihossa.

##### **Melko harvinainen (saattaa ilmetä enintään 1 potilaalla sadasta):**

Ekseema, ihottuma, punoitus.

##### **Harvinainen (saattaa ilmetä enintään 1 potilaalla tuhannesta):**

Ihon pistely.

##### **Hyvin harvinainen (saattaa ilmetä enintään 1 potilaalla kymmenestä tuhannesta):**

Nokkosihottuma, kutina.

##### **Tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):**

Kutina, kirvelyn tunne, nesteen kertyminen kehoon.

##### **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkienhenkilökunnalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

#### **5. Permethrin Aspire-emulsiovoiteen säilyttäminen**

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Älä säilytä kylmässä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

#### **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa**

##### **Mitä Permethrin Aspire-emulsiovoide sisältää**

Vaikuttava aine: permetriini. 1 g emulsiovaidetta sisältää 50 mg permetriiniä (25:75). Yksi tuubi (30 g) sisältää 1500 mg permetriiniä (25:75).

Muut aineet: butyylihydroksitolueeni (E321), karbomeerit, puhdistettu kookosöljy, glyseroli (E422), glyserolimonostearaatti 40-55, isopropyylimyristaatti, lanoliinialkoholi / nestemäinen parafiiniseos, makrogoli-(2)-setyylieetteri, makrogolisetostearyylieetteri, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), propyyliparahydroksibentsoaatti, natriumhydroksidi (E524) ja puhdistettu vesi.

**Lääkevalmisteen kuvaus ja pakauskoko (-koot)**

Permethrin Aspire on valkoinen tai luonnonvalkoinen, tasakoosteinen, homogeninen emulsiovoide.

Permethrin Aspire-emulsiovoide on 30 g:n kokoontaittuissa alumiiinituubeissa, joissa on valkoinen kartionmuotoinen polypropeenikorkki.

Pakauskoot: 30 g, 2 x 30 g, 4 x 30 g.

Kaikkia pakauskokoja ei välittämättä ole myynnissä.

**Myyntiluvan haltija**

Aspire Pharma (Malta) Limited  
Trident Park, Notabile Gardens  
No. 2, Level 3, Mdina Road,  
Central Business District  
Birkirkara CBD2010, Malta

**Valmistaja**

**PNR Pharma Services Ltd.**

Building No 2,  
The Green,  
Dublin Airport,  
Swords,  
K67 E2H3,  
Irlanti

**AND**

**Misom Labs Ltd.**

Malta Life Science Park,  
LS2.01.06,  
Industrial Estate,  
San Gwann,  
SGN 3000, Malta

**Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:**

Tanska - Permethrin Aspire

Saksa - Permethrin AL 5% Creme

Suomi - Permethrin Aspire 50 mg/g emulsiovoide

Norja - Permethrin Aspire

**Tämä pakausseloste on tarkistettu viimeksi 01.06.2024.**

## Bipacksedel: Information till användaren

### Permethrin Aspire 50 mg/g kräm

permetrin

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipackse del finns information om följande :**

1. Vad Permethrin Aspire är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Permethrin Aspire
3. Hur du använder Permethrin Aspire
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Permethrin Aspire ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Permethrin Aspire är och vad det används för**

Permethrin Aspire används mot skabb.

Permethrin Aspire ska endast användas för behandling av skabb hos vuxna och barn äldre än 2 månader.

Permetrin som finns i Permethrin Aspire kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och fölж alltid deras instruktion.

#### **2. Vad du behöver veta innan du använder Permethrin Aspire**

Läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Fölж alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

#### **Använd inte Permethrin Aspire**

- om du är allergisk mot permestrin, andra pyretriner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

#### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Permethrin Aspire:

- om du behandlas för utslag med binjurebarkshormoner (kortikosteroider). Det kan finnas risk för försämring av skabb.
- om du vet att du är allergisk mot krysantemum eller andra *Compositae* (växter som tillhör korgblommiga växter) ska du endast använda Permethrin Aspire efter att ha talat med din läkare.

Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögonen. Om det ändå sker, skölj med rikligt med vatten. Vårdare som applicerar permestrin tillråds att använda handskar.

## **Barn upp till 23 månaders ålder**

Permethrin Aspire ska inte användas hos nyfödda och spädbarn under 2 månaders ålder, såvida inte din läkare säger till dig att göra det. Det finns inte tillräcklig erfarenhet från spädbarn och småbarn. Behandling av barn upp till 23 månaders ålder ska endast ges under noggrann medicinsk övervakning.

## **Andra läkemedel och Permethyl Aspire**

Tala alltid om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel.

## **Graviditet och amning**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om du är gravid ska du endast använda Permethyl Aspire efter att du talat med din läkare.

Om du ammar, använd Permethyl Aspire först efter att du har rådgjort med din läkare.

## **Körförmåga och användning av maskiner**

Permethyl Aspire påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

## **Permethyl Aspire innehåller butylhydroxitoluen (E321)**

Permethyl Aspire kräm innehåller butylhydroxitoluen (E321) som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

## **Permethyl Aspire innehåller metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat**

Permethyl Aspire kräm innehåller metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat. Dessa hjälpmitten i krämen kan ge allergiska reaktioner (eventuellt födröjda).

## **Permethyl Aspire innehåller lanolin och cetostearylalkohol**

Permethyl Aspire kräm innehåller lanolin och cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

### **3. Hur du använder Permethyl Aspire**

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

#### **Rekommenderad dos är:**

Äldre, vuxna och undomar över 12 år:	Upp till en hel tub.
Barn 6–12 år:	Upp till en halv tub.
Barn 2 månader–5 år	Upp till en fjärdedels tub.

Vissa vuxna kan behöva använda en extra tub för att täcka hela kroppen, men använd inte mer än 2 tuber per appliceringstillfälle.

#### **Användning för barn**

Permethyl Aspire ska endast användas hos barn under 2 år enligt läkarordination. Säkerhet och effekt av Permethyl Aspire hos barn under 2 månader har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

## **Administreringssätt**

Före användning, gör hål på tubens förslutning genom att vända på skruvlocket och trycka det över tubens mynning.

Innan behandlingen påbörjas ska huden vara ren, torr och sval. Krämen ska inte användas direkt efter ett varmt bad eller en varm dusch.

<i>Äldre:</i>	Applicera krämen över hela kroppen, även på nacken, ansiktet, öron och hårbotten. Området kring ögonen ska undvikas.
<i>Vuxna och barn över 3 år:</i>	Applicera krämen noggrant över hela kroppen utom huvudet, förutom om du ser utslag i dessa områden.
<i>Barn under 3 år:</i>	Applicera krämen över hela kroppen, även på nacken, ansiktet, öron och hårbotten. Området kring ögonen ska undvikas.

Glöm inte att applicera krämen på huden under naglarna, mellan fingrar och tår, på handleder, under armar inklusive armhålor, navel, på bröst inklusive bröstvårtornas tunna hud, yttre könsorgan, vrister, kors- och svansbenområde, skinkor och runt ändtarmsmynningen. Få hjälp om det behövs för att applicera på ryggen. Barn behöver hjälp av vuxna för att säkerställa korrekt applicering. Hindra barnet från att slicka av krämen från händerna. Vid behov ska barn ha handskar på sig.

Om händerna tvättas inom 8 timmar ska händerna åter smörjas in. Tvätta bort krämen efter 12 timmar.

Om du tycker att effekten av Permethrin Aspire är för stark eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Den som smittats med skabb kan vara symptomfri i 3–4 veckor och kan infektera andra genom hudkontakt. Alla medlemmar i ett hushåll och andra närbolag bör därför behandlas samtidigt enligt anvisningarna ovan även om de inte har symptom.

Behandlingen ska upprepas 7–14 dagar efter den första behandlingen.

Klåda i huden kan kvarstå i upp till 4 veckor efter behandling och beror vanligtvis på en efterföljande effekt av den allergiska reaktionen mot kvalster. Således är detta nödvändigtvis inte ett tecken på misslyckad behandling.

Det rekommenderas att du följer andra nödvändiga rengöringsåtgärder, såsom att tvätta alla sängkläder och kläder i 60 °C eller lägga dem i en försluten påse i minst 3 dagar.

## **Om du använt för stor mängd av Permethrin Aspire**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

- Kontakta läkare, akutmottagning eller apotekspersonal om du har använt mer kräm än vad som anges här, eller mer än vad din läkare har ordinerat och du mår dåligt. Ta förpackningen med dig.
- Symtom på överdriven användning är överkänslighetsreaktioner.
- Symtom som rapporterats vid oavsiktligt intag eller intag är illamående, kräkningar, yrsel och krampar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

**Vanliga (*kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter*):**

Onormala hudförförningar (parestesier) såsom kittlande, stickande eller bränning känsla i huden.

**Mindre vanliga (*kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter*):**

Eksem, utslag, rodnad.

**Sällsynta (*kan förekomma hos upp till 1 av 1000 patienter*):**

Stickande i huden.

**Mycket sällsynta (*kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter*):**

Nässelutslag, klåda.

**Ingen känd frekvens (*kan inte beräknas från tillgängliga data*):**

Klåda, bränning känsla, ansamling av vätska i kroppen.

**Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

## 5. Hur Permethrin Aspire ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar. Förvaras i skydd mot kyla.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

**Vad Permethrin Aspire innehåller**

Aktiv substans: permelin. 1 g kräm innehåller 50 mg permelin (25:75). En tub (30 g) innehåller 1500 mg permelin (25:75).

Övriga innehållsämnen: butylhydroxitoluen (E321), karbomerer, raffinerad kokosolja, glycerol (E422), glycerolmonostearat 40-55, isopropylmyristat, lanolinalkohol/flytande paraffinblandning, makrogol-(2)-cetyleter, makrogolcetostearylter, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat, natriumhydroxid (E524) och renat vatten.

**Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek**

Permethrin Aspire är en vit till benvit, slät, homogen kräm.

Permethrin Aspire kräm är förpackad i 30 g hopvikbara aluminiumtuber försedda med ett vitt konformat lock av polypropen.

Förpackningsstorlekar: 30 g, 2 x 30 g, 4x 30 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

**Innehavare av godkännande för försäljning**

Aspire Pharma (Malta) Limited

Trident Park, Notabile Gardens

No. 2, Level 3, Mdina Road,

Central Business District

Birkirkara CBD2010, Malta

**Tillverkare**

**PNR Pharma Services Ltd.**

Building No 2,

The Green,

Dublin Airport,

Swords,

K67 E2H3,

Irland

**AND**

**Misom Labs Ltd.**

Malta Life Science Park,

LS2.01.06,

Industrial Estate,

San Gwann,

SGN 3000, Malta

**Detta läke medel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbe tsområdet under namnen:**

Danmark - Permethrin Aspire

Tyskland - Permethrin AL 5% Creme

Finland - Permethrin Aspire 50 mg/g emulsivoide

Norge - Permethrin Aspire

**Den na bipacksedel ändrades senast 01.06.2024.**