

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

Yli 30 tabletin pakkauskoot on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteamien allergisten oireiden hoitoon. Ilman lääkärin tekemiä tutkimuksia ja diagnoosia valmistetta ei tule käyttää pidempiä jaksoja. On tärkeää, että lääkäri varmistaa oikean diagnoosin ja pitkääikaisen loratadiinilääkityksen tarpeen. Näin vältetään muiden kuin allergisten oireiden turha hoito antihistamiinilääkkeellä.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tästä lääketä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkienhenkilökunta on neuvonut.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkienhenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännny lääkärin puoleen, ellei olosi parane viiden päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Loratadin ratiopharm on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Loratadin ratiopharmia
3. Miten Loratadin ratiopharmia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Loratadin ratiopharmin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Loratadin ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

Mitä Loratadin ratiopharm on

Loratadin ratiopharm sisältää vaikuttavana aineena loratadiinia, joka kuuluu antihistamiinien lääkeaineryhmään.

Miten Loratadin ratiopharm vaikuttaa

Loratadin ratiopharm lievittää allergiaoireita pysäytämällä kehon tuottaman histamiini-nimisen aineen vaikutukset allergisen reaktion yhteydessä.

Milloin Loratadin ratiopharmia käytetään

Loratadin ratiopharm lievittää allergisen nuhan (esimerkiksi heinänuhan) oireita, kuten aivastelua, nenän vuotamista tai kutinaa sekä silmien kirvelystä tai kutinaa aikuisilla sekä vähintään 12-vuotiailla lapsilla.

Loratadin ratiopharm -valmistetta voidaan myös käyttää vähentämään nokkosihottuman oireita (kutinaa, punoitusta sekä paukamien lukumäärää ja kokoa). Loratadin ratiopharmiin vaiketus kestää koko vuorokauden ajan, mikä auttaa sinua hoitamaan tavanomaiset toimesi sekä nukkumaan normaalisti.

Käännny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi viiden päivän jälkeen.

Loratadiinia, jota Loratadin ratiopharm sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäristä, apteekkienhenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tie dettäävä, ennen kuin käytät Loratadin ratiopharmia

Älä käytä Loratadin ratiopharmia

- jos olet allerginen loratadiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoituksset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Loratadin ratiopharmia, jos

- sinulla on maksasairaus
- olet menossa ihotesteihin allergiasi vuoksi. Älä otta Loratadin ratiopharmia kahteen päivään ennen testejä, sillä lääke voi vaikuttaa koetuloksiin.

Jos mikä tahansa yllä olevista pätee sinun kohdallasi (tai olet epävarma), keskustele lääkärin, apteekkienkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Loratadin ratiopharmia..

Lapset

Tätä lääkevalmistetta **ei** tule antaa

- alle 6-vuotiaalle lapsille tai lapsille, jotka painavat alle 30 kg
- itsehoidossa alle 12-vuotiaalle lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Loratadin ratiopharm

Loratadin ratiopharmin haittavaikutukset voivat lisääntyä, jos käytät valmistetta yhtä aikaa sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, jotka vaikuttavat lääkeainemetabolista vastaan entsyymien toimintaan maksassa. Klinisissä tutkimuksissa loratadiinin haittavaikutusten ei ole kuitenkaan havaittu lisääntyvän, kun sitä käytetään yhtä aikaa maksan entsyymien toimintaan vaikuttavien lääkevalmisteiden kanssa.

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös ilman reseptiä myytäviä lääkkeitä.

Loratadin ratiopharm alkoholin kanssa

Loratadin ratiopharmin ei ole todettu lisäävän alkoholin vaikutuksia.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai aptekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Varmuuden vuoksi Loratadin ratiopharmin käyttöä on suositeltava välttää raskauden aikana. Älä otta Loratadin ratiopharm -valmistetta, jos imetät. Loratadiini erittyy rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Loratadin ratiopharm saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta. Älä aja autoa tai käytä koneita, jos saat tällaisia haittavaikutuksia.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioda, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastuksekseen. Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Loratadin ratiopharm sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Loratadin ratiopharmia otetaan

Käytä tästä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määränyt tai apteekkienkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai aptekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille ja vähintään 12-vuotiaalle nuorille on:

1 tabletti kerran vuorokaudessa vesilasillisen kera, aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.

Alle 12-vuotiaat lapset sekä lapset, jotka painavat 30 kg tai vähemmän:

2–12-vuotiaalle lapsille vain lääkärin määräyksellä.

Loratadin ratiopharmia ei pidä antaa lapsille, jotka painavat 30 kg tai vähemmän.

Vaikeasta maksavaista kärsivät aikuiset ja lapset:

Yli 30 kg painavat aikuiset ja lapset

Yksi tabletti joka toinen päivä vesilasillisen kera, aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan. Keskustele kuitenkin lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin otat tätä lääkettä.

Hoidon kesto:

Hoidon kesto riippuu oireidesi luonteesta, kestosta ja etenemisestä. Kysy apteekista neuvoa.

Jos oireet eivät helpota viiden (5) päivän kuluessa lääkityksen aloittamisesta, ota yhteyttä lääkäriin.

Jos otat Loratadin ratiopharmia enemmän kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Saatat tuntea uneliaisuutta, nopeaa sydämen sykettä tai päänsärkyä.

Jos unohdat käyttää Loratadin ratiopharmia

Jos unohdat tabletin, ota se heti kun muistat. Jatka tämän jälkeen lääkitystäsi tavalliseen tapaan. Älä otta kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista vaikutuksista, lopeta lääkkeen käyttö **välittömästi** ja kerro lääkäriillesi tai mene lähipään terveyskeskukseen tai sairaalaan:

- allergisia reaktioita kuten hulten, kielen ja kasvojen turvotusta (Quincken edeema)
- hengitysvaikeuksia ja allergisia reaktioita (matalat, polttavat, kutisevat jäljet ihmalla, joihin liittyy turvotusta)
- angioedeema (ihon ja limakalvojen turpoaminen).

Nämä ovat hyvin vakavia haittavaikutuksia. Jos sinulla ilmenee näitä oireita, olet saattanut saada vakavan allergisen reaktion. Saat tarvita välitöntä lääkintää tai sairaalahoitoa.

Yleiset (esiintyvätkin enintään 1 käyttäjällä kymmenestä):

- uneliaisuus
- lääkärin määräyksellä toteutetussa hoidossa alle 12-vuotiailla lapsilla on myös todettu:
- päänsärky
- hermostuneisuus
- väsymystä.

Melko harvinaiset (esiintyvätkin enintään 1 käyttäjällä sadasta):

- päänsärky
- lisääntynyt ruokahalu
- univaikeudet.

Hyvin harvinainen t (esiintyvät enintään yhdellä käytäjällä 10 000:sta):

- huimaus
- kouristukset
- nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke
- pahoinvointi
- suun kuivuminen
- vatsavaivat
- maksavaivat
- hiustenlähtö
- ihottuma
- väsymys.

Yleisyyt tuntematon (esiintymistihetyttä ei pystytä arvioimaan saatavilla olevan tiedon perusteella):

- painonnousu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Loratadin ratiopharmin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä läkettä pakkaussessa ja läpipainolevyssä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä aptekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa

Mitä Loratadin ratiopharm sisältää

- Vaikuttava aine on loratadiini. Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys ja magnesiumstearaatti. Sisältää laktoosia (ks. kohta 2).

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkauskoot

Valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia tabletteja, joissa on toisella puolella jakouurre. Tabletti voidaan puolittaa yhtä suuriin osiin.

Tätä lääkevalmistetta on saatavilla itsehoitoon 7, 10, 14, 20, 20x1, 21, 28,30, 50, 100 ja 100x1 tabletin läpipainopakkauksissa. Kaikkia pakauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Saksa

Valmistaja

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, D-89143 Blaubeuren, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy

PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900

Tämä pakkauseloste on tarkistettu viimeksi 21.11.2023

Bipacksedel: Information till användaren

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletter loratadin

Förpackningsstorlekar med över 30 tablettar är avsedda för behandling av allergiska symtom som tidigare konstaterats av läkare. Utan läkarundersökningar och -diagnos får preparatet inte användas i långa perioder. Det är viktigt att en läkare fastställer rätt diagnos och behovet av en långvarig loratadinbehandling. På detta sätt undviks situationer där allergimediciner används i onödan för behandling av symtom som felaktigt antas bero på allergi.

Läs noga igenom den här bipacksedeln innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter fem dagar.

I den här bipackselet finns information om följande

1. Vad Loratadin ratiopharm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin ratiopharm
3. Hur du använder Loratadin ratiopharm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Loratadin ratiopharm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Loratadin ratiopharm är och vad det används för

Vad Loratadin ratiopharm är

Loratadin ratiopharm tablettar innehåller den aktiva substansen loratadin, vilken tillhör en grupp läkemedel som kallas抗histaminer.

Hur Loratadin ratiopharm verkar

Loratadin ratiopharm hjälper till att minska dina allergiska symtom genom att stoppa effekterna av ett ämne som kallas histamin, vilket bildas i kroppen om du är allergisk mot något.

När Loratadin ratiopharm ska tas

Loratadin ratiopharm lindrar symtom som hör samman med allergisk snuva (till exempel hösnuva), såsom nysningar, rinnande eller kliande näsa och sveda eller klåda i ögonen hos vuxna och barn från 12 år.

Loratadin ratiopharm kan även användas för att lindra symtom på nässelutslag (klåda, hudrodnad och antal och storlek på nässelutslag).

Effekten av Loratadin ratiopharm varar hela dygnet och kan hjälpa dig att fortsätta med dina normala dagliga aktiviteter och att sova.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter fem dagar.

Loratadin som finns i Loratadin ratiopharm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin ratiopharm

Använd inte Loratadin ratiopharm om du:

- är allergisk för loratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Loratadin ratiopharm

- om du har någon leversjukdom
- om du ska genomgå hudtester för allergi. Ta inte Loratadin ratiopharm två dagar innan dessa tester, eftersom testresultaten annars kan påverkas.

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Loratadin ratiopharm.

Barn

Detta preparat får **inte** ges

- åt barn under 6 år eller till barn som väger under 30 kg
- åt barn under 12 år utan läkarordination.

Andra läkemedel och Loratadin ratiopharm

Biverkningar orsakade av Loratadin ratiopharm kan öka vid samtidig användning av läkemedel som påverkar funktionen hos vissa leverenzymer som ansvarar för nedbrytningen av läkemedel i levern. Däremot har det i kliniska studier inte setts någon ökning av biverkningar av loratadin med läkemedel som påverkar funktionen av dessa enzymer.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller även läkemedel som kan köpas utan recept.

Loratadin ratiopharm med alkohol

Loratadin ratiopharm har inte visat sig öka effekten av alkohol.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Som en försiktighestsåtgärd, bör användning av Loratadin ratiopharm under pågående graviditet undvikas. Ta inte Loratadin ratiopharm om du ammar, eftersom loratadin utsöndras i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Loratadin ratiopharm kan orsaka dåsighet eller yrsel. Om du känner att du påverkas ska du inte köra bil eller hantera maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Loratadin ratiopharm innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. Hur du använder Loratadin ratiopharm

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar från 12 år är:

1 tablett 1 gång dagligen tillsammans med ett glas vatten, med eller utan mat.

Barn under 12 år och barn med en kroppsvekt på 30 kg eller mindre:

Till barn i åldern 2–12 år endast på ordination av läkare.

Loratadin ratiopharm ska inte ges till barn som väger 30 kg eller mindre.

Vuxna och barn med allvarliga leverproblem:

Vuxna och barn med en kroppsvekt över 30 kg

En tablett en gång varannan dag tillsammans med ett glas vatten, med eller utan mat. Diskutera ändå med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Behandlingstid:

Behandlingstiden beror på typ, varaktighet och orsak till dina besvär. Rådfråga apoteket.

Om symtomen inte förbättras inom fem (5) dagar från början av behandlingen, kontakta läkare.

Om du har använt för stor mängd av Loratadin ratiopharm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Du kan uppleva sömnighet, snabb hjärtfrekvens eller huvudvärk.

Om du har glömt använda Loratadin ratiopharm

Om du glömmer att ta tabletten, ta den genast när du kommer ihåg det. Fortsätt sedan med din medicinering som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om följande symptom förekommer, sluta **genast** använda denna medicin och kontakta läkare eller gå till närmaste vårdcentral eller sjukhus:

- allergiska reaktioner, såsom svullnad i läppar, tunga eller ansikte (Quincke's ödем)
- andningssvårigheter och allergiska reaktioner (låga, heta, kliande märken på huden med svullnad)
- angioödem (svullnad av huden och slemhinnorna).

Dessa är mycket allvarliga biverkningar. Om du får dessa symptom har du möjligen fått en allvarlig allergisk reaktion. Du kan omedelbart behöva medicinering eller sjukhusvård.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- dåsighet.

Vid behandling av barn under 12 år enligt läkarordination har även följande konstaterats:

- huvudvärk
- nervositet
- trötthet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- huvudvärk

- ökad aptit
- sömnsvårigheter.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- yrsel
- kramper
- snabb eller oregelbunden hjärtrytm
- illamående
- munorrhett
- magbesvär
- leverproblem
- hårväxtfall
- hudutslag
- trötthet.

Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):

- viktökning

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

webbplats: www.fimea.fi

5. Hur Loratadin ratiopharm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använts före utgångsdatumet som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är loratadin. En tablett innehåller 10 mg av loratadin.
- Övriga innehållsstoffen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse och magnesiumstearat. Innehåller laktos (se avsnitt 2).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, runda, bikonvexa tablett med brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora delar.

Detta läkemedel finns för egenvård i blisterförpackningar med 7, 10, 14, 20, 20x1, 21, 28, 30, 50, 100 och 100x1 tablett. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av försäljningsstillsånd

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland

Tillverkare

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

Teva Finland Oy

PB 67

02631 Esbo

Tel: 020 180 5900

Denna bipack sedel ändrades senast den 21.11.2023