

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Spironolactone Orion 25, 50 ja 100 mg tabletit

spironolaktoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Spironolactone Orion on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Spironolactone Orion -tabletteja
3. Miten Spironolactone Orion -tabletteja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Spironolactone Orion -tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Spironolactone Orion on ja mihin sitä käytetään

Tämän lääkkeen vaikuttava aine spironolaktoni vähentää ylimääräistä nestettä elimistöstä lisäämällä virtsaneritystä. Se poikkeaa monista muista nesteenpoistolääkkeistä siinä, ettei virtsan mukana menetetä kaliumia.

Tätä lääkettä käytetään:

- laskemaan kohonnutta verenpainetta tai sydämen vajaatoimintaan, lisähoitona potilaille, joille muu hoito ei ole riittävän tehokasta
- vähentämään turvotusta munuais-, maksa- tai muiden sairauksien yhteydessä, kun muut hoitomuodot eivät ole tehokkaita
- primäärisen aldosteronismin hoidossa (liiallinen aldosteronihormonin erittyminen lisämunuaisesta).

Spironolaktonia, jota Spironolactone Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

Tätä lääkettä saa käyttää lasten hoidossa vain lastenlääkärin ohjauksessa.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Spironolactone Orion -tabletteja

Älä ota Spironolactone Orion -tabletteja, jos:

- olet allerginen spironolaktonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- sairastat akuuttia tai kroonista munuaisten vajaatoimintaa
- virtsanerityksesi on pysähtynyt
- sinulla on todettu liian korkea veren kaliumpitoisuus
- sinulla on matala veren natriumpitoisuus
- sinulla on todettu lisämunuaiskuoren äkillinen vajaatoimintakohtaus (ns. Addisonin kriisi)

- sinulla on perinnöllinen verenpunan pigmentin, hemoglobiinin, toimintahäiriö joka aiheuttaa ihmän rakkuloita, vatsakipua ja keskushermoston oireita (porfyria).

Spironolactone Orion -tabletteja ei pidä käyttää lapsille, joilla on kohtalainen tai vaikea munuaissairaus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin otat Spironolactone Orion -tabletteja, jos:

- sairastat maksan tai munuaisten vajaatoimintaa
- sairastat diabetesta ja sinulla on lisäksi huonontunut munuaisten toiminta
- sinulla on maha- tai pohjukaissuolihaava.

Spironolactone Orionin samanaikainen anto tiettyjen lääkevalmisteiden, kaliumlisien ja runsaasti kaliumia sisältävien ruokien kanssa saattaa aiheuttaa vakavan hyperkalemian (kohonnut veren kaliumpitoisuus). Vakavan hyperkalemian oireita voivat olla lihaskouristukset, epäsäännöllinen sydämen syke, ripuli, pahoinvoindi, huimaus ja päänsärky.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Jos menet leikkaukseen

Mainitse tästä lääkkeestä lääkärille, jos olet menossa leikkaukseen lääkehoidon aikana.

Lapset

Hyperkalemian (kohonnut veren kaliumpitoisuus) riskin vuoksi varovaisuutta on noudatettava Spironolactone Orion -tablettien käytössä lapsille, joilla on korkea verenpaine ja lievä munuaisten vajaatoiminta.

Spironolactone Orion -tabletteja ei pidä käyttää lapsille, joilla on kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta ”Älä otta Spironolactone Orion -tableteja, jos”).

Muut lääkevalmisteet ja Spironolactone Orion

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Joidenkin lääkkeiden tai Spironolactone Orion -valmisteen teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti.

Hoitavan lääkärin on erityisen tärkeää tietää, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

- kohonneeseen verenpaineeseen, sydämen vajaatoimintaan ja munuaissairauksien hoitoon käytettävä lääkkeet, erityisesti ns. ACE:n estäjät (kuten enalapriili, kaptopriili, lisinopriili, perindopriili tai ramipriili) ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat (kuten irbesartaani, kandesartaani, losartaani, telmisartaani tai valsartaani)
- sydämen vajaatoiminnan hoidossa käytettävä digoksiini
- muut kaliumia säästäävät nesteenpoistolääkkeet (amiloridi tai triamtereeni)
- aldosteronin salpaajat
- hepariini tai pienimolekulaarinen hepariini (veritulppien estolääkkeet)
- samanaikainen kaliumlisä
- veren hyytymisenestolääke varfariini
- elinsiirron hylkimisenestolääke takrolimuusi
- tulehduskipulääkkeet (esim. asetyylialisyylihappo, ibuprofeeni tai ketoprofeeni) säännöllisesti ja pitkään käytettyinä
- mielialahäiriöiden hoidossa käytetty litium
- noradrenaliini
- tiettyt nukutuksissa käytetyt lääkkeet
- syöpälääke mitotaani
- trimetopriimi ja trimetopriimi-sulfametoksatsoli
- abirateronia eturauhassyövän hoitoon.

Spironolactone Orion ruuan ja juoman kanssa

Runsaasti kaliumia sisältävä ruokavalio ei ole suositeltavaa hyperkalemian riskin takia.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Eriyisesti hoidon alussa ja annoksia muutettaessa voi ilmetä huimausta, väsymystä tai muita haittavaikutuksia (ks. kohta 4). Nämä haittavaikutukset saattavat heikentää ajokykyä ja kykyä käyttää koneita. Vältä autolla ajoa ja koneiden käyttöä lääkityksen alussa tai annosta muutettaessa kunnes tiedät, miten tämä lääke vaikuttaa juuri sinuun.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioda, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastuksesesi. Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Spironolactone Orion sisältää laktoosia

Tabletit sisältävät laktoosia (monohydraattina) 57 mg (25 mg tabletti), 114 mg (50 mg tabletti) tai 228 mg (100 mg tabletti). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

3. Miten Spironolactone Orion -tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määränyt tai apteekkienkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Vuorokausiaan voidaan ottaa kerta-annoksenä tai kahteen annokseen jaettuna. Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin.

Tabletit pitää ottaa ruuan yhteydessä. Lääke imeytyy paremmin ruuan kanssa otettuna.

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Annostus on yksilöllinen, sairaudestasi ja yleisestä terveydentilastasi riippuvainen. Alla olevat annokset ovat yleisiä suositusannoksia.

Lääkäri mittaa säännöllisin väliajoin erilaisten yhdisteiden pitoisuudet elimistössäsi (esim. veren elektrolyytit ja kreatiinipitoisuudet) hoidon aikana.

Aikuiset:

Vaikea sydämen vajaatoiminta: Aloitusannos on yleensä 25 mg vuorokaudessa. Annosta voidaan tarvittaessa suurentaa 50 mg:aan vuorokaudessa tai pienentää 25 mg:aan joka toinen päivä.

Verenpainetaudin ja turvotustilojen hoito: Suositeltu annos on 25–100 mg vuorokaudessa.

Vaikeissa turvotustiloissa: 200–400 mg vuorokaudessa lyhyen aikaa.

Aldosteronin (lisämunuaisen erittämän hormonin) liikaerityksen hoito: 100–400 mg ennen leikkausta. Lääkäri sovittaa annoksen yksilöllisesti niin, että pienin tehoava annos on käytössä, jos leikkaushoito ei tule kyseeseen.

Läkkääät:

Annosten muuttaminen ei yleensä ole tarpeen ellei sinulla ole munuaisten tai maksan vajaatoimintaa.

Lapset:

Lääkäri määräää annoksen lapsen painon ja sairauden mukaan.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Munuaisten vajaatoiminta:

Lääkäri huomioi munuaisten vajaatoiminnan lääkkeen annostelussa ja hoidon seurannassa.

Tätä lääkettä ei pidä käyttää, jos lääkäri on kertonut, että sinulla on vaikea-asteinen munuaisten vajaatoiminta.

Jos otat enemmän Spironolactone Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisähjeden saamiseksi.

Yliannostuksen oireita voivat olla väsyneisyys, sekavuus, haparoivat liikkeet, oksentelu, huimaus, ihottuma ja ripuli.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohtdat ottaa Spironolactone Orion -tabletteja

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin. Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös Spironolactone Orion voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutuksia ilmenee herkemmin potilailla, jotka ovat huonokuntoisia ja joilla on useita sairauksia. Hermostoon kohdistuvia haittavaikutuksia kuten sekavuutta, päänsärkyä ja välinpitämättömyyttä (apatia) esiintyy lähinnä potilailla, joiden maksan toiminta on heikentynyt pitkääikaisen vaurion seurauksena (maksakirroosi).

Alla haittavaikutukset yleisyyden mukaan lueteltuna:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

- päänsärky
- ruuansulatuskanavan häiriöt
- pahoinvoiointi
- ripuli
- oksentelu
- ihmisen kuivuus
- uneliaisuus
- rintakudoksen kasvu miehillä
- rintarauhaston arkuus
- kuukautiskierron häiriöt
- impotenssi.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

- veren liian korkea kalium- tai liian matala natriumpitoisuus
- sekavuus
- harhatuntemukset
- ihottumat
- kutina
- nokkosrokko
- jalkojen krampit
- muutokset veren kreatiniini- tai reniinipitoisuksissa.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

- kuivuminen
- apatia (eli välinpitämättömyys, aloitekyvyttömyys)
- sukupuolisen kyvyn muutokset
- huimaus
- munuaisten vajaatoiminta
- verenvalkosolujen tai verihuutaleiden vähenneminen.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

- heikentynyt maksan toiminta
- hiustenlähtö
- karvoituksen lisääntyminen
- hyvänlatautiset rintakasvaimet.

Esiintymistihes tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

- toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN)
- Stevens–Johnsonin oireyhtymä
- yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä (DRESS)
- pemfigoidi (sairaus, jossa iholla esiintyy nesteen täyttämiä rakkuloita).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Spironolactone Orion -tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tästä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Nämä menetellään suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Spironolactone Orion -tabletit sisältävät

- Vaikuttava aine on spironolaktoni, jota on 25, 50 tai 100 mg yhdessä tabletissa.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, povidoni, polysorbaatti 80, piparminttuöljy, piidioksiidi (kolloidinen, vedetön), magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

25 mg tabletti: valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, Ø 7 mm, koodi ORN85.

50 mg tabletti: valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, Ø 9 mm, koodi ORN213.

100 mg tabletti: valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, hieman kupera, jakouurteellinen tabletti, Ø 11 mm, koodi ORN352.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Tabletit on pakattu HDPE-muovista valmistettuun kannelliseen muovitölkkiiin.

Pakkauskoot:

25 mg: 30, 50, 100 ja 250 tablettia.

50 mg ja 100 mg: 30, 50 ja 100 tablettia.

PVC-Al-läpipainopakkaus

25 mg: 30 tablettia.

50 mg ja 100 mg: 30 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.7.2024

Bipacksedel: Information till patienten

Spironolactone Orion 25, 50 och 100 mg tabletter

spironolakton

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Spironolactone Orion är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Spironolactone Orion
3. Hur du tar Spironolactone Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Spironolactone Orion ska förvaras
6. Förfäckningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Spironolactone Orion är och vad det används för

Den aktiva substansen i detta läkemedel, spironolakton minskar överdriven vätska i kroppen genom att öka urinutsöndringen. Den skiljer sig från många andra diureтика i och med att inget kalium förloras i urinen.

Detta läkemedel används för behandling av:

- högt blodtryck eller hjärtsvikt som tilläggsbehandling för patienter som inte svarar tillräckligt på andra behandlingar
- svullnader i samband med njur-, lever- eller andra sjukdomar då andra behandlingar inte har varit effektiva
- primär aldosteronism (överaktivitet av aldosteronutsöndring i binjurarna).

Spironolakton som finns i Spironolactone Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Barn ska endast behandlas av barnläkare.

2. Vad du behöver veta innan du tar Spironolactone Orion

Ta inte Spironolactone Orion:

- om du är allergisk (överkänslig) mot spironolakton eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har akut eller kronisk njurinsufficiens
- om din urinutsöndring har upphört
- om kaliumkoncentrationen i ditt blod har visat sig vara för hög
- om du har låg natriumhalt i blodet
- om det har visat sig att du lider av akut svikt av binjurebarksfunktionen (så kallad Addisonkris)
- om du har en ärflig sjukdom i det röda blodpigmentet, hemoglobin, som orsakar hudblåsor, buksmärta och nervsjukdom (porfyri).

Barn med måttlig till svår njursjukdom ska inte använda Spironolactone Orion.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Spironolactone Orion:

- om du har lever- eller njursvikt
- om du har diabetes och dessutom nedsatt njurfunktion
- om du har magsår eller tolvfingertarmsår.

Samtidig administrering av Spironolactone Orion med vissa läkemedel, kaliumtillskott och livsmedel med högt innehåll av kalium kan orsaka svår hyperkalemi (förhöjd kaliumnivå i blodet). Symtom på svår hyperkalemi kan innefatta muskelkramper, oregelbunden hjärtrytm, diarré, illamående, yrsel och huvudvärk.

Berätta även för din läkare om du har några andra sjukdomar eller allergier.

Om du behöver kirurgisk behandling

Om du behöver kirurgisk behandling medan du använder detta läkemedel, tala om för behandlande läkare att du använder detta läkemedel.

Barn

På grund av risken för hyperkalemi (förhöjda kaliumnivåer i blodet) ska Spironolactone Orion användas med försiktighet till barn med högt blodtryck som har mild njursvikt.

Barn med måttlig till svår njursvikt ska inte använda Spironolactone Orion (se avsnitt ”Ta inte Spironolactone Orion”).

Andra läkemedel och Spironolactone Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Samtidig användning av vissa läkemedel kan påverka deras effekt eller effekten av Spironolactone Orion eller orsaka biverkningar.

Det är mycket viktigt för behandlande läkare att veta om du använder något av följande läkemedel:

- läkemedel som används för behandling av högt blodtryck, hjärtsvikt och njursjukdomar, speciellt så kallade ACE-hämmare (såsom enalapril, kaptopril, lisinopril, perindopril eller ramipril) och angiotensin II-receptorblockerare (såsom irbesartan, kandesartan, losartan, telmisartan eller valsartan)
- digoxin för behandling av hjärtsvikt
- andra kaliumsparande diuretika (amilorid eller triamteren)
- aldosteronblockerare
- heparin eller lågmolekylärt heparin (läkemedel som används för att förebygga blodproppar)
- samtidig kaliumtillägg
- warfarin för hämning av blodkoagulationen
- takrolimus för minskning av avstötning efter transplantation
- antiinflammatoriska smärtstillande medel (t.ex. acetylsalicylsyra, ibuprofen eller ketoprofen) vid regelbunden och långvarig användning
- litium för behandling av förstämningsyssyndrom
- noradrenalin
- vissa bedövningsmedel
- mitotan för behandling av cancer
- trimetoprim och trimetoprim-sulfametoxazol
- abirateron för behandling av prostatacancer.

Spironolactone Orion med mat och dryck

Kalium-rik kost rekommenderas inte på grund av risken för hyperkalemi.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförstående och användning av maskiner

Yrsel, trötthet eller andra negativa effekter (se avsnitt 4) kan uppstå speciellt när behandlingen inleds eller vid dosjustering. Sådana effekter kan försämra förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Undvik att köra bil eller använda maskiner i början av denna medicinering och efter dosökning tills du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Spironolactone Orion innehåller laktos

Tabletterna innehåller laktos (i form av monohydrat) 57 mg (25 mg tablett), 114 mg (50 mg tablett) eller 228 mg (100 mg tablett). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. Hur du tar Spironolactone Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den dagliga dosen kan tas antingen som engångsdos eller uppdelad i två doser. Drick ett glas vatten eller annan vätska med tabletten.

Tabletterna bör tas med mat. Observera att läkemedlet absorberas bättre då det tas tillsammans med mat.

Ta alltid läkemedlet vid samma tidpunkt för att bibehålla en jämn läkemedelseffekt. Det är även det bästa sättet att komma ihåg att ta medicinen.

Doseringen av Spironolactone Orion är individuell, beroende på din sjukdom och allmänna hälsa. De doser som nämns enligt följande är de vanliga rekommenderade doserna.

Din läkare kommer att regelbundet övervaka nivåerna av olika kemikalier (t.ex. serumelektrolyter och kreatininkoncentrationer) i din kropp under behandlingen.

Vuxna

Svår hjärtsvikt: den initiala dosen är vanligen 25 mg per dag. Läkaren kan besluta att öka dosen till 50 mg om dagen eller minska den till 25 mg varannan dag vid behov.

Högt blodtryck och svullnader: rekommenderad dos är 25–100 mg per dag.

Svåra svullnader: 200–400 mg per dag under en kort tid.

Behandling av ökad utsöndring av aldosteron (ett hormon som utsöndras av binjure): 100–400 mg en dag innan operation. Läkaren bestämmer en individuell dos för varje patient så att den lägsta effektiva dosen används om kirurgisk behandling inte är lämplig.

Äldre

Dosjustering är oftast inte nödvändig om du inte har njur- eller leversvikt.

Barn

Läkaren förskriver dosen baserat på barnets kroppsvikt och sjukdom.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Njursvikt

Läkaren tar hänsyn till njursvikt vid fastställandet av dosen och vid uppföljning av behandlingen.

Använd inte detta läkemedel om läkaren har sagt till dig att du har svår njursvikt.

Om du har tagit för stor mängd av Spironolactone Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 0800 147 111 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning. Symptom på överdos är trötthet, förvirring, ostadighet, kräkningar, yrsel, hudutslag och diarré.

Ta med dig tabletburken, om du söker vård vid en läkarmottagning eller ett sjukhus.

Om du har glömt att ta Spironolactone Orion

Ta den missade dosen så snart som möjligt. Om det nästan är dags att ta nästa dos, ta inte den missade dosen. Ta aldrig en dubbel dos eller två doser i följd. Se till att du har tillräckligt med medicin tillgängligt innan du åker på semester eller reser.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Spironolactone Orion orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar är oftast mer sannolika hos patienter i dåligt skick och med flera sjukdomar. Neurologiska biverkningar, såsom förvirring, huvudvärk och brist på entusiasm (apati), förekommer främst hos patienter med nedsatt leverfunktion orsakat av lång tids skada (levercirros).

Biverkningarna har listats nedan efter frekvens:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- huvudvärk
- gastrointestinala besvär
- illamående
- diarré
- kräkningar
- torr hud
- sömnighet
- tillväxt av bröstvävnad hos män
- ömma bröst
- menstruationsrubbningar
- impotens.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- för hög kaliumkoncentration i blodet eller för låg natriumkoncentration i blodet
- förvirring
- onormal beröringsfornimmelse
- hudutslag
- klåda
- nässelfeber
- kramp i benen

- förändringar i blodkreatinin- eller reninkoncentrationer.

Sällsynta (*kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare*):

- uttorkning
- apati (dvs. omottaglighet, förlust av initiativ)
- förändrad sexualdrift
- yrsel
- njursvikt
- minskat antal vita blodkroppar eller blodplättar.

Mycket sällsynta (*kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare*):

- nedsatt leverfunktion
- hårvavfall
- ökad kroppsbehåring
- godartade brösttumörer.

Har rapporterats (*förekommer hos ett okänt antal användare*):

- toxisk epidermal nekrolys (TEN)
- Stevens–Johnsons syndrom
- läkemedelsbiverkning med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)
- pemfigoid (ett tillstånd som orsakar vätskefylda blåsor på huden).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Sverige

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Finland

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Spironolactone Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använts före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är spironolakton. Varje tablett innehåller 25, 50 eller 100 mg spironolakton.
- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon, polysorbat 80, pepparmyntolja, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri), magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

25 mg tablett: vit eller benvit, rund, platt tablett med fasad kant och brytskåra, med en diameter på 7 mm, präglad med ORN85.

50 mg tablett: vit eller benvit, rund, platt tablett med fasad kant och brytskåra, med en diameter på 9 mm, präglad med ORN213.

100 mg tablett: vit eller benvit, rund, svagt konvex och brytskåra, med en diameter på 11 mm, präglad med ORN352.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Tabletterna är förpackade i HDPE plastburk och förslutning.

Förpackningsstorlekar:

25 mg: 30, 50, 100 och 250 tablett(er).

50 mg och 100 mg: 30, 50 och 100 tablett(er).

PVC-Al-blister

25 mg: 30 tablett(er).

50 mg och 100 mg: 30 tablett(er).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Sverige: Orion Pharma AB, Danderyd, medinfo@orionpharma.com

Finland: Orion Pharma, +358 10 4261

Denna bipacksedel ändrades senast

i Sverige:

i Finland: 22.7.2024