

## **Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle**

### **Pyrvin 100 mg kalvopäällysteiset tabletit**

pyrviiniembonaatti

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

#### **Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Pyrvin on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pyrvin-tabletteja
3. Miten Pyrvin-tabletteja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Pyrvin-tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Pyrvin on ja mihin sitä käytetään**

Pyrvin on kihomatolääke, joka tehoaa kihomatoihin kerta-annoksena. Hoito uusitaan kahden viikon kuluttua. Tämä hävittää ensimmäisen annoksen jälkeen munista kuoriutuneet madot.

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Pyrvin-tabletteja**

##### **Älä ota Pyrvin-tabletteja**

- jos olet allerginen pyrviiniembonaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

##### **Varoitukset ja varotoimet**

Pyrvin-valmisteen vaikuttava aine on pyrviini, joka on voimakkaasti värjäävä aine. Se värjää ulosteen punaiseksi. Oksennuksesta saattaa jäädä pysyviä tahroja vaatteisiin ja huonekaluihin.

Hoidon onnistumisen kannalta ja uuden tartunnan estämiseksi on tärkeää huolehtia hyvin käsien ja kynnenalustojen puhtaudesta ja muutoinkin sekä henkilökohtaisesta hygieniasta että ympäristön hygieenisyydestä.

##### **Muut lääkevalmisteet ja Pyrvin**

Pyrvin-tableteilla ei tunneta yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa.

##### **Raskaus ja imetys**

Pyrviinin käyttöön raskauden tai imetyksen aikana ei tiedetä liittyvän riskejä.

## Ajaminen ja koneiden käyttö

Pyrvin-tabletilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö kuljettamaan moottoriajoneuvoa tai tekemään tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. Näistä tehtävistä suoriutumiseen voivat vaikuttaa mm. lääkeshoidon vaikutukset ja/tai haittavaikutukset, joita on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

### 3. Miten Pyrvin-tabletteja otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Pyrvin-tabletit otetaan kerta-annoksena. Hoito uusitaan kahden viikon kuluttua. Lääke annostellaan painon mukaan, 1 tabletti 10–15 kg kohti (ks. taulukko alla). Pyrvinin tehon ei ole todettu lisääntyvän 6 tablettia ylittävillä annoksilla.

Kaikki perheenjäsenet on hoidettava samanaikaisesti.

Paino	Kerta-annos
n. 10–15 kg	1 tabletti
n. 15–30 kg	2 tablettia
n. 30–45 kg	3 tablettia
n. 45–60 kg	4 tablettia
n. 60–70 kg	5 tablettia
Yli 70 kg	6 tablettia

Tabletit suositellaan nieltäväksi kokonaisuena riittävän nestemäärän (esimerkiksi lasillinen vettä) kanssa. Tablettien pilkkomista ei suositella, koska tabletit voivat pilkkottaessa värjätä esimerkiksi vaatteita. Pilkkominen on kuitenkin mahdollista, jos lääkkeen annostelu niin vaatii (esimerkiksi pienille lapsille).

#### Toimenpiteet uuden tartunnan välttämiseksi

- Huolellinen peseytyminen
  - Koska madonmunia on juuri peräaukon ympärillä, on erityisesti alapesu ja sen jälkeinen käsienspesu tärkeää.
  - Muistuta lapsia käsienspesusta. Kätet pestään huolellisesti ainakin WC-käynnin jälkeen ja ennen ruokailua.
- Pidä kynnet lyhyinä ja puhtaina.
- Vaihda hoidon yhteydessä alusvaatteet, yöpuku, pyyheliinat, tyynyliinat ja lakanat. Vältä niiden ravistelua ja laita ne heti pesuun.
- Tuuleta muut vuodevaatteet huolellisesti.
- Alushousut on syytä vaihtaa viikon ajan kahdesti päivässä, koska madon munat saattavat olla elinkykyisiä useita päiviä, jopa viikon hoidon jälkeen.
- Erityisesti makuuhuone kannattaa siivota perusteellisesti. Imuroi ja pyyhi lattiat ja muut pinnat. Puhdista myös ovenkahvat ja valokatkaisijat.
- Pese myös WC-tilojen pinnat, hanat ja vessanpöntön vetonuppi.
- Puhdista lelut ja poista pehmolelut käytöstä kuukauden ajaksi.
- Puhdista vauvan hoitopöytä ja laita likaiset vaipat suoraan roskiin.

## **Jos otat enemmän Pyrvin-tabletteja kuin sinun pitäisi**

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Pyrvin-tablettien yliannostus aiheuttaa yleensä pahoinvointia, oksentelua tai ripulia. Ensiavuksi voi antaa lääkehiiltä.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Pahoinvointi, oksentelu ja suoliston kouristelu ovat Pyrvin-valmisteen yleisiä haittavaikutuksia. Yliherkkyys Pyrvin-tableteille on harvinaista.

Pyrvin värjää ulosteet punaisiksi. Vaatteista väri yleensä lähtee tavallisilla pesuaineilla. Oksennuksesta saattaa kuitenkin jäädä pysyviä tahroja.

## **Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

## **5. Pyrvin-tablettien säilyttäminen**

Säilytä alle 25 °C. Pidä tölkki ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

### **Mitä Pyrvin sisältää**

- Vaikuttava aine on pyrviiniembonaatti, jota on 100 mg yhdessä tabletissa.
- Muut apuaineet ovat maissitärkkelys, liivate, mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, hypromelloosi ja makrogoli 300.

**Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot**

Punainen, pyöreä, kupera, kalvopäällysteinen tabletti; halkaisija noin 9 mm.

Pakkauskoot: 6, 20 ja 40 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

**Myyntiluvan haltija**

Orion Corporation  
Orionintie 1  
02200 Espoo

**Valmistaja**

Orion Corporation Orion Pharma  
Joensuunkatu 7  
24100 Salo

Orion Corporation Orion Pharma  
Orionintie 1  
02200 Espoo

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8.4.2022

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Pyrvin 100 mg filmdragerade tabletter**

pyrviniumembonat

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

**I denna bipacksedel finns information om följande :**

1. Vad Pyrvin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Pyrvin
3. Hur du tar Pyrvin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pyrvin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Pyrvin är och vad det används för**

Pyrvin är ett läkemedel mot springmask. Pyrvin är effektivt mot springmask som engångsdos. Behandlingen upprepas efter 2 veckor. Detta dödar de maskar som utvecklats ur ägg efter den första dosen.

#### **2. Vad du behöver veta innan du tar Pyrvin**

**Ta inte Pyrvin**

- om du är allergisk mot pyrviniumembonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

**Varningar och försiktighet**

Det verksamma ämnet i Pyrvin är pyrvinium, som är ett kraftigt färgämne och därför färgas avföringen röd av medicinen. Eventuella kräkningar kan ge bestående fläckar på kläder och möbler.

För att behandlingen skall lyckas och för att minska risken för att smittas igen är det viktigt att händerna hålls rena, också under naglarna, och att även i övrigt omsorgsfullt sköta hygien, såväl personlig som i omgivningen.

**Andra läkemedel och Pyrvin**

Man känner inte till att Pyrvin påverkar eller påverkas av användning av andra läkemedel.

**Graviditet och amning**

Det finns inga kända risker vid användning av pyrvinium under graviditet eller amning.

## Körförmåga och användning av maskiner

Pyrvin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### 3. Hur du tar Pyrvin

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pyrvin-tabletterna tas som en engångsdos. Behandlingen upprepas efter 2 veckor. Antalet beror på kroppsvikten, en tablett per 10–15 kg kroppsvikt (se tabellen nedan). Det har inte visats att effekten av Pyrvin skulle vara bättre vid en dos som överskrider 6 tabletter.

Alla familjemedlemmar bör behandlas samtidigt.

Vikt	Engångsdos
ca 10–15 kg	1 tablett
ca 15–30 kg	2 tabletter
ca 30–45 kg	3 tabletter
ca 45–60 kg	4 tabletter
ca 60–70 kg	5 tabletter
Över 70 kg	6 tabletter

Det rekommenderas att tabletterna sväljs hela med en tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten). Det rekommenderas att tabletterna inte delas, eftersom de då kan färga t.ex. kläderna. Det är dock möjligt att dela tablettens dosering om doseringen så kräver (t.ex. för små barn).

#### Åtgärder för att undvika återsmitta

- God hygien
  - Eftersom maskäggen finns runt ändtarmsmyrningen är det särskilt viktigt med omsorgsfull underlivshygien och handtvätt.
  - Påminn barnen om att tvätta händerna. Händerna skall tvättas noga åtminstone efter toalettbesök och före måltider.
- Håll naglarna korta och rena.
- I samband med behandlingen skall underkläder, pyjamas, handdukar, örngott och lakan bytas. Lägg tvätten direkt i tvättmaskinen och undvik att skaka plaggen.
- Vädra övriga sängkläder omsorgsfullt.
- Underkläder skall bytas två gånger per dag i en veckas tid, eftersom maskäggen kan hålla sig vid liv i flera dagar, t.o.m. upp till en vecka efter behandlingen.
- Framför allt sovrummet bör städas ordentligt. Dammsug och torka av golven och andra ytor. Rengör även dörrhandtag och strömbrytare.
- Tvätta hela toaletten, även vattenkranarna och knoppen på toalettstolen.
- Rengör alla leksaker och lägg undan mjuka leksaker under en månads tid.
- Rengör skötbordet och kasta använda blöjor direkt i soporna.

### **Om du har tagit för stor mängd av Pyrvin**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 0800 147 111 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdoserings av Pyrvin förorsakar i allmänhet illamående, kräkningar eller diarré. Som första hjälp kan medicinskt kol ges.

### **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Illamående, kräkningar och kramper i tarmen är vanliga biverkningar av Pyrvin. Överkänslighet mot Pyrvin är sällsynt.

Pyrvin färgar avföringen röd. Från kläder lossnar färgen i allmänhet med vanligt tvättmedel. Eventuella kräkningar kan dock ge bestående fläckar.

### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

#### **Sverige**

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

#### **Finland**

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

### **5. Hur Pyrvin ska förvaras**

Förvaras vid högst 25 °C. Förvara burken i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är pyrviniumembonat, varav det finns 100 mg i en tablett.
- Övriga hjälpämnen är majsstärkelse, gelatin, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos och makrogol 300.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Röd, rund, konvex, filmdragerad tablett; diameter cirka 9 mm.

Förpackningsstorlekar: 6, 20 och 40 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### **Innehavare av godkännande för försäljning**

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

### **Tillverkare**

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Sverige: Orion Pharma AB, Danderyd, [medinfo@orionpharma.com](mailto:medinfo@orionpharma.com)

Finland: Orion Pharma, +358 10 4261

**Denna bipacksedel ändrades senast**

**i Sverige:**

**i Finland: 8.4.2022**