

PAKKAUSSELOSTE

DIPENTUM 250 mg kapseli, kova olsalatsiinatrium

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käännä lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritty vain sinulle eikä sitä tulé antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Dipentum on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Dipentum-kapseleita
3. Miten Dipentum-kapseleita otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Dipentum-kapseleiden säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ DIPENTUM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Dipentum-kapseleilla on tulehdusta estävä vaikutus haavaisen paksusuolitulehduksen (paksusuolen tulehduksellinen sairaus, joka voi aiheuttaa vaikeaa ripulia) hoidossa. Dipentum vaikuttaa paikallisesti suolen limakalvoon.

Dipentumia käytetään haavaisen paksusuolitulehduksen (colitis ulcerosa) hoitoon.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT DIPENTUM-KAPSELEITA

Älä käytä Dipentum-kapseleita

- jos olet allerginen (ylherkkä) olsalatsiinatriumille, muulle salisylaatteille (tietty kuume- ja särkylääkeet sisältävät salisylaatteja) tai Dipentum-kapseleiden jollekin muulle aineelle.

Ole erityisen varovainen Dipentum-kapseleiden suhteen, jos

- sinulla on munuaisten toiminnan häiriö
- sinulla on maksan toiminnan häiriö
- sinulla on vaikea allergia
- sinulla on astma
- käytät jotain seuraavista lääkeistä: 6-merkaptopuriinia tai tioguaninia (syöpälääkeitä), varfariinia tai hepariineja (verenohennuslääkeitä)
- olet äskettäin saanut vesirokkorokotteen.

Keskustele tällöin lääkärin kanssa ennen Dipentum-hoidon aloittamista.

Ota välittömästi yhteyttä hoitavaan lääkäriin, jos sinulla ilmenee kuumetta, kurkkukipua, suun haavaumia, mustelmia tai verenvuotoa. Nämä oireet voivat olla merkkejä verenmyrkyksestä, joka vaatii välitöntä hoitoa.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkeitä, myös lääkeitä, joita lääkäri ei ole määrennyt.

Erityisen tärkeää on keskustella lääkärin kanssa ennen Dipentum-hoidon aloittamista, jos käytät jotain seuraavista lääkeistä:

- varfariinia tai hepariineja (veren hyytymistä estäviä lääkeitä)
- 6-merkaptopuriinia tai tioguaninia (syöpälääkeitä)
- tai jos olet äskettäin saanut vesirokkorokotteen.

Raskaus ja imetyks

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Dipentum-valmisten käytöstä raskauden aikana on rajoitetusti kokemusta. Keskustele siksi lääkärin kanssa ennen kuin alat käyttää Dipentum-valmistetta raskausaikana.

Dipentum kulkeutuu äidinmaitoon. Keskustele siksi lääkärin kanssa, ennen kuin alat käyttää Dipentum-valmistetta imetysaikana.

Ajamineen ja koneiden käyttö

Dipentum-kapseleilla ei ole vaikutusta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

3. MITEN DIPENTUM-KAPSELEITA OTETAAN

Ota Dipentum-kapseleita juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkärimäärää annostuksen ja sovittaa sen sinulle yksilöllisesti. Ota Dipentum-kapselit säännöllisesti heti aterian jälkeen. Niele kapselit kokonaисina.

Tavanomainen annos aikuisille: 2 kapselia 2 kertaa vuorokaudessa. Hoidon alussa annos on usein kuitenkin pienempi.

Jos otat enemmän Dipentum-kapseleita kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren annoksen lääkettä, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkyystietokeskukseen (puhelin (09) 471 977).

Jos unohdat ottaa Dipentum-kapselin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen, vaan jatka lääkkeen käyttöä ottamalla seuraava annos sen normaalina ottoajankohtana.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Dipentum-kapselitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisin haittavaiketus on ripuli, joka on yleensä ohimenevä. Jos ripuli kestää pitkään tai on vaikeaa, ota yhteys lääkäriin.

Lisäksi voi ilmetä seuraavia yleisiä haittavaikutuksia (esiintyy useammin kuin yhdellä sadasta käyttäjästä):

- *Yleisoiheet ja antopaikassa todettavat haitat:* päänsärky
- *Ruoansulatuselimistö:* ripuli, pahoinvoindi
- *Iho ja ihonalainen kudos:* hottuma
- *Luusto, lihakset ja sidekudos:* nivelsärky

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyy harvemmin kuin yhdellä sadasta käyttäjästä) ovat:

- *Yleisoiheet ja antopaikassa todettavat haitat:* kuume
- *Veri ja imukudos:* verihautaleiden niukkuus (trombosytopenia)
- *Ruoansulatuselimistö:* oksentelu, ruoansulatushäiriöt
- *Maksaja sappi:* suurentuneet maksaeentsyymiärvot
- *Iho ja ihonalainen kudos:* kutina, hiustenlähtö, valoherkkyyssreaktio, nokkosihottuma
- *Sydän:* sydämen tilheälyöntisyys
- *Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina:* hengenahdistus
- *Luusto, lihakset ja sidekudos:* lihassärky
- *Hermosto:* huimaus, tuntoharhat
- *Psyykkiset häiriöt:* masennus

Esiintymistihettä ei tunneta (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

- *Veri ja imukudos*: aplastinen anemia, eosinofilia, hemolyttinen anemia, valkosolujen niukkuus (leukopenia), verisolujen niukkuus (neutropenia, pansytopenia, trombosytopenia)
- *Ruoansulatuselimistö*: ylävatsakipu, haimatulehdus
- *Maksa ja sappi*: maksatulehdus, bilirubiinin kohoaaminen
- *Iho ja ihonalainen kudos*: angioneuroottinen edeema (kasvojen, kielen ja henkitorven turvotus, mikä voi aiheuttaa merkittäviä hengitysvaikeuksia)
- *Sydän*: sydänlihastulehdus, sydämentykytys, sydänpuissitulehdus
- *Munuaiset ja virtsatiet*: munuaistulehdus
- *Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina*: interstitiaalinen keuhkosairaus
- *Hermosto*: perifeerinen neuropatia
- *Silmät*: näön hämärtyminen

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkikenkilökunnalle.

5. DIPENTUM-KAPSELEIDEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytetä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämääränsä jälkeen (Käyt. viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Nämä menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Dipentum sisältää

- Vaikuttava aine on olsalatsiininatrium. Yksi kapseli sisältää 250 mg olsalatsiininatriumia.
- Muut aineet ovat:
Kapseliydin: magnesiumstearaatti
Kapselikuori: liivate, sokerikulööri (väriaine E150), titaanidioksidi (väriaine E171) ja painomuste (sellakka, musta rautaoksidi E172).

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkaukoko

Dipentum-kapseli on vaaleanruskea, läpikuultamaton, kova liivatekapseli, joka sisältää keltaista jauhetta.

Kapselissa on merkintä 'DIPENTUM 250 mg'.

100 kapselin muovipurkki.

Myyntiluvan haltija

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108, 5.tv

DK-2300 København S, Tanska

Edustaja

Atnahs Pharma Nordics A/S, Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108, 5.tv

DK-2300 København S, Tanska.

Valmistaja

Coripharma ehf

Reykjavíkurvegur 78

IS-220 Hafnarfjörður

Islanti

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 21.06.2023

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

DIPENTUM 250 mg kapsel, hård olsalazinnatrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läke medel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipackse del finner du information om:

1. Vad Dipentum är och vad det används för
2. Innan du använder Dipentum
3. Hur du tar Dipentum
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dipentum ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD DIPENTUM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Dipentum har en inflammationshämmande (anti-inflammatorisk) effekt vid behandling av sårig tjocktarmsinflammation (inflammatorisk sjukdom i tjocktarmen som kan ge svår diarré). Dipentum verkar lokalt på tarmslemhinnan.

Dipentum används vid behandling av sårig tjocktarmsinflammation (ulcerös kolit).

2. INNAN DU ANVÄNDER DIPENTUM

Använd inte Dipentum

- om du är allergisk (överkänslig) mot olsalazinnatrium, andra salicylater (ingår bl.a. i vissa läkemedel mot feber och värv) eller mot något av de övriga innehållsämnen i Dipentum.

Var särskilt försiktig med Dipentum om

- du har störningar av njurarnas funktion
- du har störningar av leverns funktion
- du har svår allergi
- du har astma
- du tar någon av de följande läkemedlen: 6-merkaptopurin eller tioguanin (cancermediciner), warfarin eller heparin (förhindrar blodets levring)
- du har nyligen fått vaccin mot vattkopper.

Rådgör i dessa fall med läkaren innan du påbörjar behandlingen med Dipentum.

Kontakta omedelbart ansvarig läkare om du får feber, halsont, sår i munnen, blåmärken eller blödningar. Symtomen kan vara tecken på blodförgiftning som kräver omedelbar medicinsk vård.

Användning av andra läke medel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att du rådgör med läkaren innan du påbörjar Dipentum medicineringen om du använder något av följande läkemedel:

- warfarin eller heparin (förhindrar blodets levring)
- 6-merkaptopurin eller tioguanin (cancermediciner).
- eller om du har nyligen fått vaccin mot vattkopper.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Det finns begränsad erfarenhet av användning av Dipentum under graviditet. Rådgör därför med läkaren innan du börjar använda Dipentum under graviditeten.

Dipentum utsöndras i modersmjölk. Rådgör därför med läkaren innan du börjar använda Dipentum under amningstiden.

Körförmåga och användning av maskiner

Dipentum har ingen verkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

3. HUR DU TAR DIPENTUM

Ta alltid Dipentum kapslarna enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Ta Dipentum kapslarna på regelbundna tider omedelbart efter en måltid. Svälj kapslarna hela.

Vanlig dos för vuxna: 2 kapslar 2 gånger per dygn. I behandlingens början är dosen dock ofta lägre.

Om du har tagit för stor mängd av Dipentum

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta *alltid* läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon (09) 471 977).

Om du har glömt att ta Dipentum

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos utan fortsätt ta nästa dos som normalt på dess utsatta tillfälle. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom **alla** läkemedel kan Dipentum orsaka biverkningar men **alla** användare behöver **inte** få dem.

Den vanligaste biverkningen är diarré som vanligen är övergående. Vid långvariga eller besvärliga diarréer bör läkare kontaktas.

Dessutom kan följande vanliga biverkningar förekomma (förekommer hos fler än en av hundra användare):

- *Allmänna symptom och/eller symptom vid administreringsstället:* huvudvärk
- *Magtarmkanalen:* diarré, illamående
- *Hud och subkutan vävnad:* hudutslag
- *Muskuloskeletal systemet och bindväv:* ledvärk

Mindre vanliga biverkningar är (förekommer hos färre än en av hundra användare):

- *Allmänna symptom och/eller symptom vid administreringsstället:* feber
- *Blodet och lymfssystemet:* minskning av antalet blodplättar (trombocytopeni)
- *Magtarmkanalen:* kräkningar, matsmältningsbesvär
- *Lever och gallvägar:* förhöjda leverenzymvärden
- *Hud och subkutan vävnad:* klåda, hårlössning, ljuskänslighetsreaktion, nässelfeber
- *Hjärta:* snabb puls
- *Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:* andnöd
- *Muskuloskeletal systemet och bindväv:* muskelvärk
- *Nervsystemet:* yrsel, myrkrypningar
- *Psykiska störningar:* depression

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data):

- *Blodet och lymfssystemet:* aplastisk anemi, eosinofili, hemolytisk anemi, för låga nivåer av vita blodkroppar (leukopeni), för låga nivåer av blodkroppar (neutropeni, pancytopeni, trombocytopeni)
- *Magtarmkanalen:* smärta iövre buken, bukspottskörtelinflammation
- *Lever och gallvägar:* leverinflammation, förhöjt bilirubin

- *Hud och subkutan vävnad*: angioneurotiskt ödem (svullnad av ansiktet, tungan och svalget vilket kan orsaka betydande andningssvårigheter)
- *Hjärtat*: hjärtmuskelinflammation, hjärtklappning, hjärtsäcksinflammation
- *Njurar och urinvägar*: njurinfektion
- *Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum*: interstitiell lungsjukdom
- *Nervsystemet*: periferneuropati
- *Ögon*: fördunklad syn

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR DIPENTUM SKA FÖRVARAS

Förvaras i rumstemperatur (15–25 °C).

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (efter Utg. dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är olsalazinnatrium. En kapsel innehåller 250 mg olsalazinnatrium.
- Övriga innehållsstoffer är:
Kapselkärna: magnesiumstearat
Kapselskal: gelatin, sockerkulör (färgämne E150), titandioxid (färgämne E171) och trycksvärta (shellack, svart järnoxid E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dipentum kapseln är en ljusbrun, ogenomskinlig, hård gelatinkapsel fyld med gult pulver. Kapseln är märkt 'DIPENTUM 250 mg'.

Plastburk med 100 kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Copenhagen Towers,
Ørestads Boulevard 108, 5.tv
DK-2300 København S
Danmark

Representativa

Atnahs Pharma Nordics A/S, Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108,5 tv
DK-2300 København S, Danmark.

Tillverkare

Coripharma ehf
Reykjavíkurvegur 78
IS-220 Hafnarfjörður
Island

Denna bipack edel godkändes senast 21.06.2023