

## Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

### Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Aikuisille ja vähintään 6-vuotiaille lapsille  
levosetiritsiinidihydrokloridi

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävä, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

**Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Levocetirizin ratiopharm on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Levocetirizin ratiopharmia
3. Miten Levocetirizin ratiopharmia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Levocetirizin ratiopharmin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### 1. Mitä Levocetirizin ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

Levocetirizin ratiopharm -tablettien vaikuttava aine on levosetiritsiinidihydrokloridi.

Levocetirizin ratiopharm on allergialääke (ns. systeeminen antihistamiini).

Levocetirizin ratiopharm -lääkettä käytetään mm. seuraavien allergiasairauksien liittyvien oireiden hoitoon:

- allerginen nuha (nenän ja silmien limakalvojen allerginen tulehdus), myös pitkääikainen allerginen nuha
- nokkosilhottuma (urtikaria).

Antihistamiinit, kuten Levocetirizin ratiopharm, lievittävät edellä mainittuihin sairauksiin liittyviä epämiellyttäviä oireita ja tuntemuksia, kuten aivastelua, nenän ärsytystä, vuotamista ja tukkoisuutta, silmien kutinaa, punoitusta ja vuotamista sekä ihottumia.

Levosetiritsiimi, jota Levocetirizin ratiopharm sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

#### 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Levocetirizin ratiopharmia

**Älä käytä Levocetirizin ratiopharmia**

- jos olet allerginen levosetiritsiinidihydrokloridille, setiritsiinille, hydroksitsiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on joskus ollut jostakin toisesta antihistamiinista (samanaikaisesti lääkeryhmän lääkkeestä) johtuva allergia- eli yliherkkyyssreaktio
- jos sinulla on vaikea dialysisihoitoa vaativaa munuaisa sairaus.

**Varoitukset ja varotoimet**

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Levocetirizin ratiopharmia.

Jos sinulla on vaikeuksia tyhjentää virtsarakkosi (selkäydinvamman tai eturauhasen liikakasvun takia), kysy neuvoa lääkäriltä.

Jos sinulla on epilepsia tai kouristusten riski, kysy neuvoa lääkäriltä, sillä Levocetirizin ratiopharm -tablettien käyttö voi vaikuttaa kouristuskohtauksia.

Jos olet menossa allergiatesteihin, kysy lääkäriltäsi, pitäisikö sinun lopettaa Levocetirizin ratiopharm -tablettien ottaminen useita päiviä ennen testejä. Tämä lääke saattaa vaikuttaa allergiatestiesi tuloksiin.

### Lapsset

Levocetirizin ratiopharmin käyttöä ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska kalvopäällysteisiä tabletteja käytettäessä annosta ei voida muuttaa heille sopivaksi.

### Muut lääkevalmisteet ja Levocetirizin ratiopharm

Kerro lääkärille tai apteekkikenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

### Levocetirizin ratiopharm ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Varovaisuus on tarpeen, jos Levocetirizin ratiopharmia käytetään samanaikaisesti alkoholin tai muiden aivojen toimintaan vaikuttavien aineiden kanssa.

Herkillä potilailla Levocetirizin ratiopharm -tablettien ja alkoholin tai muiden aivojen toimintaan vaikuttavien aineiden samanaikainen käyttö saattaa heikentää tarkkaavaisuutta ja suorituskykyä entisestään.

Levocetirizin ratiopharm -tabletit voidaan ottaa aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.

### Raskaus ja imetyks

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

### Ajaminen ja koneiden käyttö

Joillakin potilailla saattaa esiintyä Levocetirizin ratiopharm -hoidon aikana uneliaisuutta / tokkuraisuutta, väsymystä ja uupumusta. Aja autoa tai käytä koneita varoen, kunnes tiedät miten lääke vaikuttaa sinuun. Erityissä kokeissa ei kuitenkaan nähty viittitää siitä, että lääke heikentäisi terveiden koehenkilöiden psyykkistä valppautta, reaktiokykyä tai ajamiskykyä, kun kokeissa käytettiin levosetiritsiiniin suositusannosta.

### Levocetirizin ratiopharm sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisten ottamista.

## 3. Miten Levocetirizin ratiopharmia käytetään

Ota tästä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkikenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

### Aikuiset ja vähintään 6-vuotiaat lapsset

Aikuisten ja vähintään 6-vuotiaiden lasten suositeltu annos on yksi tabletti vuorokaudessa.

### Käyttö alle 6-vuotiaille lapsille

Levocetirizin ratiopharm -tabletteja ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille

### Annostusohjeet erityisryhmille

## *Munuaisten ja maksan vajaatoiminta*

Potilaille, joilla on munuaisten vajaatoiminta, voidaan antaa tavallista pienempi annos munuaissairauden vakavuuden mukaan. Lapsille annos valitaan kehonpainon perusteella. Lääkäri määräe annoksen.

Potilaiden, joilla on vaikea dialyysihoitoa vaativa munuaissairaus, ei tule käyttää Levocetirizin ratiopharmia.

Potilaiden, joilla on vain maksan vajaatoiminta, tulee käyttää tavallista suositusannosta.

Potilaille, joilla on sekä maksan että munuaisten vajaatoiminta, voidaan antaa pienempi annos munuaissairauden vakavuuden mukaan. Lapsille annos valitaan kehonpainon perusteella. Lääkäri määräe annoksen.

### *Jäkkäät potilaat (vähintään 65 vuotiaat)*

Annoksen muuttamista ei tarvita iäkkäille ihmisille, jos heidän munuaistensa toiminta on normaali.

### **Miten ja milloin Levocetirizin ratiopharm -tabletteja otetaan?**

Ainoastaan suun kautta.

Tabletit niellään kokonaисina veden kera ja ne voi ottaa sekä ruokailun yhteydessä, että ilman ateriaa.

### **Miten kauan Levocetirizin ratiopharm -hoitoa jatketaan?**

Lääkäri arvioi hoidon sopivan keston sairauden tyypin, keston ja kulun perusteella.

### **Jos otat enemmän Levocetirizin ratiopharmia kuin sinun pitäisi**

Jos aikuisen henkilö ottaa enemmän Levocetirizin ratiopharmia kuin hänen pitäisi, tämä voi aiheuttaa tokkuraisuutta.

Lapsilla saattaa aluksi esiintyä kiihtymystä ja levottomuutta, ja sen jälkeen uneliaisuutta.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

### **Jos unohtdat ottaa Levocetirizin ratiopharmia**

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen, vaan jatka hoitoa ottamalla seuraava annos normaaliiin aikaan.

### **Jos lopetat Levocetirizin ratiopharmin käytön**

Hoidon lopettamisesta ei pitäisi aiheutua haitallisia vaikutuksia. Joissakin harvinaisissa tapauksissa voi kuitenkin ilmetä (voimakasta) kutinaa Levocetirizin ratiopharm -hoidon lopettamisen jälkeen, vaikka tällaista oireita ei olisi ollutkaan ennen hoidon aloittamista.

Oireet saattavat hävitää itsestään. Joissakin tapauksissa ne voivat kuitenkin olla voimakkaita ja saattavat vaatia hoidon uudelleen aloittamisen. Oireiden pitäisi hävitää, kun hoito aloitetaan uudelleen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käännny lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan puoleen.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulle ilmaantuu oireita **yliherkkyysreaktiosta**, lopeta heti Levocetirizin ratiopharm -tablettien käyttö ja ota yhteys lääkäriin. Yliherkkyysreaktion oireita voivat olla esim. suun, kielen, kasvojen ja/tai nielun turvotus, hengitys- tai nielemisvaikeudet (puristava tunne rinnassa tai hengityksen vinkuminen), nakkosihottuma, äkillinen verenpaineen lasku, mikä voi johtaa pyörtymiseen tai sokkiin ja joka voi olla kuolemaan johtava.

**Yleiset haittavaikutukset** (esiintyvät enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä):

- suun kuivuminen
- päänsärky
- väsymys
- uneliaisuus/tokkuraisuus.

**Melko harvinaiset haittavaikutukset** (esiintyvät enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 100:sta):

- uupumus
- vatsakipu.

**Haittavaikutukset, joiden yleisyttä ei tunneta** (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

- lisääntynyt ruokahalu
- vihamielinen tai kiihtynyt käytös, aistiharhat, masennus, unettomuuks, toistuvat tai vakavat itsetuhoajatukset, painajaisunet
- kouristelut, pistelyt ja puutumiset, huimaus, pyörtyminen, vapina, makuaistimusten muutokset (dysgeusia)
- ympäristön pyörimisen tai heilumisen tunne
- näköhäiriöt, näön hämärtyminen, okulogyraatio (silmien hallitsemattomat kiertoliikkeet)
- sydämentykytys, nopea syke
- hengenahdistus
- pahoinvointi, oksentelu, ripuli
- maksatulehdus, poikkeavat arvot maksan toimintakokeissa
- kipu virtsatessa tai virtsaamisvaikeudet, kyyvittömyys tyhjentää rakko kokonaan
- lääkkeen aiheuttama toistopunoittuma, kutina, ihottuma, nokkosihottuma (ihon turvotusta, punoitusta ja kutinaa)
- (voimakasta) kutinaa lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen
- lihaskivut, nivelkivut
- turvotus
- painonnuosu.

#### Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)  
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea  
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri  
PL 55  
00034 FIMEA

## 5. Levocetirizin ratiopharmin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tästä läkettä ulkopakkauksessa ja läpipainolevyssä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim./EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Nän menetellen suojelet luontoa.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

### **Mitä Levocetirizin ratiopharm sisältää**

Vaikuttava aine on levosetiritsiinidihydrokloridi. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg levosetiritsiinidihydrokloridia (joka vastaa 4,2 mg levosetiritsiiniä).

Muut aineet

- tabletin ytimessä ovat: mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti; kolloidinen, vedetön piidioksidi ja magnesiumstearaatti.
- tabletin päälysteessä ovat: hypromelloosi, titaanidioksidi (E 171) ja makrogoli 400.

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot**

Kalvopäällysteiset tabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia ja soikeita. Niiden toisella puolella on kaiverrus "LC5", toinen puoli tableteista on sileää.

Levocetirizin ratiopharm -tabletteja on saatavilla 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 tai 100 kalvopäällysteistä tablettia sisältävinä läpipainopakkauksina.

Kaikkia pakkauskokoja ei vältämättä ole myynnissä.

### **Myyntiluvan haltija ja valmistajat**

*Myyntiluvan haltija:*

ratiopharm GmbH, Ulm Saksa

*Valmistajat:*

Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa

Teva Pharmaceutical Works Co Ltd, Debrecen, Unkari

Pharmachemie B.V., Haarlem, Alankomaat

*Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:*

Teva Finland Oy

PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900

**Tämä pakausseloste on tarkistettu viimeksi 15.10.2024**

## Bipacksedel: Information till patienten

### Levocabetirizin ratiopharm 5 mg filmdrage rad tablet

För vuxna och barn minst 6 år  
levocabetirizindihydroklorid

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Levocabetirizin ratiopharm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Levocabetirizin ratiopharm
3. Hur du tar Levocabetirizin ratiopharm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Levocabetirizin ratiopharm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Levocabetirizin ratiopharm är och vad det används för**

Den aktiva substansen i Levocabetirizin ratiopharm heter levocabetirizindihydroklorid. Levocabetirizin ratiopharm är en allergimedicin (ett s.k. systemiskt antihistamin).

Levocabetirizin ratiopharm används bl.a. för behandling av symptom på följande allergiska sjukdomar:

- allergisk snuva (allergisk inflammation i näsans och ögonens slemhinnor), även kontinuerlig allergisk snuva
- nässelutslag (urtikaria).

Antihistaminer såsom Levocabetirizin ratiopharm lindrar obehagliga symptom och känslor i samband med ovan nämnda tillstånd, som t.ex. nysningar, irriterad, rinnande och täppt näsa, kliande, röda och rinnande ögon samt hudutslag.

Levocabetirizin som finns i Levocabetirizin ratiopharm kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

#### **2. Vad du behöver veta innan du tar Levocabetirizin ratiopharm**

##### **Ta inte Levocabetirizin ratiopharm**

- om du är allergisk mot levocabetirizindihydroklorid, cetirizin, hydroxyzin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har haft allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner) mot andra antihistaminer (mediciner ur samma läkemedelsgrupp)
- om du har en svår njursjukdom som kräver dialysbehandling.

##### **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Levocabetirizin ratiopharm.

Om du har problem att tömma urinblåsan (på grund av ryggmärgsskada eller prostataförstoring) ska du fråga råd av läkare.

Om du har epilepsi eller risk för kramper, rådfråga läkare eftersom användning av Levocetirizin ratiopharm tabletter kan förvärra krampenfall.

Om du ska genomgå något allergitest, ska du fråga läkaren om du ska sluta använda Levocetirizin ratiopharm-tabletterna redan flera dagar före testet. Detta läkemedel kan nämligen påverka resultatet av allergitester.

## Barn

Levocetirizin ratiopharm rekommenderas inte till barn under 6 år, eftersom dosen inte kan anpassas till dem med dessa filmdragerade tabletter.

## Andra läkemedel och Levocetirizin ratiopharm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

### Levocetirizin ratiopharm med mat, dryck och alkohol

Försiktighet bör iakttas om Levocetirizin ratiopharm tas samtidigt med alkohol eller andra ämnen som påverkar hjärnfunctionen.

Hos känsliga patienter kan en samtidig användning av levocetirizin och alkohol eller andra ämnen som inverkar på hjärnans funktion ytterligare försämra uppmärksamheten och prestationsförmågan.

Levocetirizin ratiopharm tabletterna kan tas med eller utan föda.

### Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

### Körförstånd och användning av maskiner

En del patienter kan under behandlingen med Levocetirizin ratiopharm drabbas av sömnighet/dåsighet, trötthet och utmattning. Var försiktig då du kör bil eller använder maskiner tills du vet hur läkemedlet inverkar på dig. Speciella tester har emellertid inte påvisat någon försämring av den mentala uppmärksamheten, reaktionsförmågan eller körförståndet hos friska försökspersoner sedan de tagit levocetirizin i rekommenderad dos.

### Levocetirizin ratiopharm innehåller laktos.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

## 3. Hur du tar Levocetirizin ratiopharm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### Vuxna och barn minst 6 år

Rekommenderad dos för vuxna och barn som fyllt 6 år är en tablett dagligen.

### Användning för barn under 6 år

Levocetirizin ratiopharm tabletter rekommenderas inte till barn under 6 år

### Doseringasanvisningar för specialgrupper

*Njursvikt och lever svikt*

Patienter som har nedsatt njurfunktion kan ges en lägre dos beroende på njursjukdomens svårighetsgrad. Dosen för barn väljs på basen av kroppsvikten, och dosen bestäms alltid av läkare.

Patienter med en svår njursjukdom som kräver dialysbehandling ska inte använda Levocetirizin ratiopharm.

Patienter som endast har nedsatt leverfunktion ska ta den vanliga rekommenderade dosen.

För patienter som har både nedsatt lever- och njurfunktion kan ges en lägre dos beroende på allvarlighetsgrad av njursjukdom. För barn dosen väljs på basis av kroppsvikten. Dosen bestäms av läkare.

#### *Äldre patienter (minst 65 år)*

Dosjustering för äldre personer behövs inte om deras njurfunktion är normal.

#### **Hur och när ska man ta Levocetirizin ratiopharm?**

Endast för oral användning (via munnen).

Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med vatten, och de kan tas såväl i samband med måltid som utan föda.

#### **Hur länge ska man ta Levocetirizin ratiopharm?**

Behandlingens längd beror på symptomens typ, varaktighet och hur de utvecklas. Läkaren avgör behandlingens längd.

#### **Om du har tagit för stor mängd av Levocetirizin ratiopharm**

För många Levocetirizin ratiopharm tabletter kan orsaka dåsighet hos vuxna.

Barn kan först bli upphetsade och rastlösa och därefter sömniga.

Om du fått i dig en alltför stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

#### **Om du har glömt att ta Levocetirizin ratiopharm**

Om du har glömt att ta Levocetirizin ratiopharm ska du inte ta dubbel dos för att kompensera för glömd dos, utan helt enkelt vänta tills det är dags för nästa dos och ta den som vanligt.

#### **Om du slutar att ta Levocetirizin ratiopharm**

Ett avbrytande av behandlingen bör inte ha några negativa effekter. I sällsynta fall kan det dock uppstå (kraftig) klåda efter avslutad behandling med Levocetirizin ratiopharm, även om detta symptom inte skulle ha förekommit före behandlingsstart.

Symtomen kan försvinna av sig själv, men ibland kan de vara kraftiga och kräva att behandlingen upptas på nytt. Symtomen bör avta då behandlingen påbörjas på nytt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du får symptom på **överkänslighetsreaktioner**, ska du sluta använda Levocetirizin ratiopharm och omedelbart kontakta läkare. Symtom på överkänslighetsreaktioner kan vara t.ex. svullnad i mun, tunga, ansikte och/eller svalg, andnings- eller sväljningssvårigheter (en åtstramande känsla i bröstet eller pipande andning), nässelutslag, plötsligt blodtrycksfall som kan leda till swimming eller chock, vilket kan leda till döden.

**Vanliga biverkningar** (förekommer hos högst 1 användare av 10):

- muntorrhet
- huvudvärk
- trötthet
- sömnighet/dåsighet.

**Mindre vanliga biverkningar** (förekommer hos högst 1 användare av 100):

- utmattning
- buksmärtor.

**Biverkningar utan känd frekvens** (förekomst kan inte beräknas från tillgängliga data):

- ökad aptit
- aggressivt eller upphetsat beteende, hallucinationer, depression, sömnlöshet, återkommande eller allvarliga tankar på självmord, mardrömmar
- kramper, stickningar och domningar, yrsel, svimning, skakningar, störningar i smaksinnet (dysgeusi)
- känsla av att omgivningen snurrar eller gungar
- synstörningar, dimsyn, okulogyration (ögonen har okontrollerade cirkulerande rörelser)
- hjärtklappning, ökad puls
- andfåddhet
- illamående, kräkningar, diarré
- leverinflammation, avvikande resultat på leverfunktionstest
- smärta eller svårigheter vid urinering, oförmåga att tömma urinblåsan helt och hållit
- läkemedelsutlöst, återkommande hudutslag, klåda, hudutslag, nässelutslag (svullnad, rodnad och klåda i huden)
- (intensiv) klåda då behandlingen avslutas
- muskelsmärtor, ledsmärtor
- svullnad (ödem)
- viktökning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)  
 Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea  
 Biverkningsregistret  
 PB 55  
 00034 FIMEA

## 5. Hur Levocetirizin ratiopharm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.  
 Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använts före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterskivan efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

Den aktiva substansen är levocetirizindihydroklorid. En filmdragerad tablett innehåller 5 mg levocetirizindihydroklorid (motsvarande 4,2 mg levocetirizin).

Övriga innehållsämnen

- i tablettkärnan är: mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat; kolloidal, vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat
- i tabletternas drägering är: hypromellos, titandioxid (E171) och makrogol 400.

### **Läke medlets utseende och förpackningsstorlekar**

De filmdragerade tabletterna är vita eller naturvita och ovala, samt försedda med ingraveringen "LC5" på den ena sidan. Den andra sidan av tabletterna är slät.

Levocabetirizin ratiopharm finns i blisterförpackningar på 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 och 100 filmdragerade tablettar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### **Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare**

*Innehavare av godkännande för försäljning:*

ratiopharm GmbH, Ulm Tyskland

*Tillverkare:*

Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland

Teva Pharmaceutical Works Co Ltd, Debrecen, Ungern

Pharmachemie B.V., Haarlem, Nederländerna

*Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:*

Teva Finland Oy

P.O. Box 67

02631 Esbo

Tel: 020 180 5900

**Denna bipack sedel ändrades senast den 15.10.2024**