

Diclozil[®]

kapseli, kova 500 mg

Lääkäri voi määrätä Diclocilia muuhun käyttötarkoitukseen ja/tai muulla annostuksella kuin tässä pakkausselosteessa on annettu. Noudattakaa aina lääkärin määräystä, jonka apteekki on lisännyt pakkaukseen.

Mitä Diclozil sisältää?

Kapselit sisältävät vaikuttavana aineena dikloksasilliinia 500 mg. Muut aineet ovat magnesiumstearaatti, piidioksidi, liivate, titaanioksidi (E171) ja musta rautaoksidi (E172). Kapselit ovat valkoisia ja niissä on merkintä 7658.

Miten Diclozil vaikuttaa?

Diclozil on penisilliinityyppinen antibiootti. Se estää bakteereita muodostamasta uutta soluseinämää ja siten sillä on bakteereita tappava vaikutus.

Myyntiluvan haltija

Bristol-Myers Squibb AB
Box 15200
SE-167 15 Bromma, Ruotsi

Valmistaja

Bristol-Myers Squibb S.r.l.
Via del Murillo, Km 2,800
04010 Sermoneta
Latina, Italia

Lisätietoa antaa

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab
Metsänneidonkuja 8
FIN-02130 Espoo

Käyttötarkoitukset

Diclozilia käytetään ns. stafylokokkien aiheuttamien infektioiden hoitoon mm. iho- ja pehmytkudos-, nivel- ja luustoinfektioissa.

Milloin Diclocilia ei pidä käyttää?

Diclozilia ei pidä käyttää, jos olette allerginen penisilliinille tai jollekin valmisteen sisältämälle aineelle.

Mitä tulee ottaa huomioon ennen valmisteen käyttöä ja sen aikana.

Jos olette allerginen muille antibiooteille, tulee teidän ilmoittaa siitä lääkärienne ennen Diclozilin käyttöä. Muille antibiooteille allerginen henkilö saattaa reagoida myös Diclozilille.

Raskaus

Valmisteella ei ole todettu epäsuotuisia vaikutuksia sikiöön, mutta neuvotelkaa lääkärinne kanssa ennen valmisteen raskaudenaikaista käyttöä.

Imety

Diclozil kulkeutuu äidinmaitoon, ja siksi Diclozilin käytöstä imetyksen aikana tulee neuvotella lääkärin kanssa.

Mitä tulee välttää Diclocilia käytettäessä?

Hoitotohoon saattaa vaikuttaa, jos tätä valmistetta otetaan samanaikaisesti eräiden muiden lääkevalmisteiden kanssa. Hoitavalle lääkärille tulee siksi kertoa kaikesta muusta

samanaikaisesta lääkityksestä, myös e-pillereiden käytöstä.

Annostusohjeet

Annoksen määrää lääkäri, joka sovittaa sen yksilöllisesti. Annoksen suuruus riippuu henkilön iästä ja painosta sekä infektion tyypistä ja vaikeusasteesta.

Diclozil otetaan vähintään 1 tunti ennen ateriaa tai 2 tuntia sen jälkeen. Kapselit niellään kokonaisina ja nautitaan runsaan nesteen kera. Kapselia ei saa ottaa makuuasennossa tai juuri ennen nukkumaanmenoa. Hoitoa on jatkettava niin kauan kuin apteekin lisäämässä ohjeessa on ilmoitettu, vaikka olo tuntuisikin hyvältä. Älkää keskeyttäkö hoitoalijan aikaisin, koska on olemassa vaara, että infektio uusiutuu.

Yliannostus

Jos olette ottanut vahingossa valmistetta liian suuren määrään tai jos lapsi on nauttinut vahingossa valmistetta, ottakaa aina yhteys lääkäriin tai sairaalaan (tai Myrkytystietokeskukseen 09-4711).

Haittavaikutukset

Tavallisimmat haittavaikutukset ovat vatsavaivat, kuten pahoinvointi, oksentelu, ilmavaivat ja ripuli sekä ihon punoitus. Harvinaisia tai erittäin harvinaisia ovat vatsakivut, paksunsuolen tulehdus ja allergiset reaktiot, kuten ihottuma, kutina, hengitysteiden kouristukset, turvotus tai verenpaineen lasku. Sienten liikakasvu voi aiheuttaa oireita alavatsassa. Kuumetta, nivel- ja lihaskipua, vaikutusta verenkuvaan, maksaan tai munuaisiin on myös raportoitu.

Erittäin harvoin on tapahtunut, että kapseli ei nieltäessä ole kulkeutunut täysin alas, vaan on aiheuttanut kipua ja haavanmuodostusta ruokatorvessa. Jos yhtäkkiä ilmaantuu ihottumaa tai kuumetta ja/tai kasvojen turvotusta, on hoito keskeytettävä ja otettava yhteyttä sairaalaan tai hoitavaan lääkäriin. Jos teille ilmaantuu kiusallista ripulia tai muita haittavaikutuksia kuin edellä mainittuja, on aina otettava yhteys lääkäriin.

Säilytys ja kestoaika

Diclozil kapselit on säilytettävä alle 25°C. Valmiste on käytettävä ennen pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivämäärää. Ei lasten ulottuville.

Pakkausseloste on laadittu 2003-01-21

Diclocil[®]

500 mg kapslar, hårda

Observera att läkaren kan ordinera läkemedlet för annat användningsområde och/eller i annan dosering än angivet i denna bipacksedel. Följ alltid läkarens ordination, som anges på apoteketiketten på förpackningen

Vad innehåller Diclocil?

Kapslarna innehåller som verksamt ämne dikloxacillin 500 mg. Övriga ämnen är magnesiumstearat, kiseldioxid, gelatin, titandioxid (E 171) och svart järnoxid (E 172). Kapslarna är vita och märkta 7658.

Hur verkar Diclocil?

Diclocil är ett antibiotikum av penicillintyp. Det hindrar bakterierna att bilda ny cellvägg och har därigenom en bakteriedödande effekt.

Innehavare av försäljningsstillstånd

Bristol-Myers Squibb AB
Box 15200
SE-167 15 Bromma, Sverige

Tillverkare

Bristol-Myers Squibb S.r.l.
Via del Murillo, Km 2.800
04010 Sermoneta
Latina, Italien

Information lämnas av

Sverige: Bristol-Myers Squibb AB (se ovan)
Finland: Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab
Metsänneidonkuja 8, FIN - 02130 Espoo

Användningsområde

Diclocil används vid infektioner, orsakade av s.k. stafylokokker i bland annat hud och mjukdelar, leder och skelett.

När skall Diclocil inte användas?

Använd inte Diclocil om du är allergisk mot penicillin eller mot något av innehållsämnen.

Att tänka på före och under användning

Om du är allergisk mot andra antibiotika, bör du rådgöra med läkaren innan du tar Diclocil. Det förekommer att personer allergiska mot andra antibiotika också reagerar mot Diclocil.

Graviditet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats, men du bör ändå rådfråga din läkare innan användning under graviditet.

Amning

Diclocil går över i modersmjölk. Försiktighet rekommenderas, så rådgör med din läkare före användning under amning.

Vad skall du undvika när du använder Diclocil?

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare ska därför upplysas om all samtidig medicinering, inklusive användning av p-piller.

Doseringsanvisning

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på din ålder och kroppsvikt samt infektionens typ och svårighetsgrad. Diclocil bör tas minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid. Kapslarna sväljs hela och sköljs ned med rikligt med vätska. De skall inte intas liggande eller omedelbart före sänggåendet. Behandlingen skall fortsätta så länge som anges på apoteketiketten, även om man känner sig

bra. Avbryt behandlingen för tidigt finns risk att infektionen återkommer.

Vad skall man göra om man tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om ett barn av misstag fått i sig läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel Sverige: 112, tel Finland: 09-4711)

Biverkningar

Vanligast är magbesvär såsom illamående, kräkningar, gasbildning och diarré samt hudrodnad.

Mindre vanliga eller sällsynta biverkningar är magsmärtor, inflammation i tjocktarmen och allergiska reaktioner som utslag, klåda, kramp i andningsvägarna, svullnad eller blodtrycksfall.

Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt. Feber, led- och muskelsmärtor, påverkan på blodbild, lever eller njurar har också rapporterats.

I sällsynta fall har det inträffat att kapseln inte svalts ner ordentligt utan orsakat smärta och sårbildning i matstrupen.

Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller behandlande läkare kontaktas och behandlingen avbrytas. Vid besvärlig diarré eller andra biverkningar än de ovan nämnda bör man kontakta läkare.

Förvaring och hållbarhet

Diclocil kapslar skall förvaras vid högst 25°C. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Bipacksedeln reviderad 2003-01-21