

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Recipect oraaliliuos

kodeiinifosfaattihemihydraatti ja guaifenesiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännä lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän kuluessa tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Recipect on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Recipectiä
3. Miten Recipectiä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Recipectin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Recipect on ja mihin sitä käytetään

Recipect-yskänlääkkeen vaikuttavista aineista kodeiini on tehokas yskänäräytystä hillitsevä lääkeaine. Se vaikuttaa keskushermostossa sijaitsevaan yskänäräytyskeskukseen ja vaimentaa täten yskänrefleksiä. Guaifenesiini muuttaa sitkeän liman juoksevammaksi ja siten helpommin irtoavaksi. Lisäksi guaifenesiini lisää limaneritystä.

Recipect-yskänlääkettä käytetään tilapäisesti ilman lääkärin määräystä yskänäräytyksen hoitoon. Mikäli saat Recipectiä lääkärin määräyksestä, lääkärisi kertoo sinulle, mihin tarkoitukseen hän on lääkkeen määrännyt.

Käännä lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Recipectiä

Älä käytä Recipectiä

- jos olet allerginen kodeiinille, guaifenesiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on synnynnäinen fruktoosi-intoleranssi
- jos olet alle 12-vuotias
- jos tiedät, että elimistösi muuntaa kodeiinia morfiiniksi erittäin nopeasti
- jos imetät.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Recipectiä:

- jos sairastat astmaa, keuhkolaajentumaa eli emfyseemaa tai muuta hengityksen vajaatoimintaa
- jos saat herkästi sappivaivoja

- jos sinulle on hiljattain tehty vatsan- tai rinnanalueen leikkaus (kodeiinin aiheuttama yskänrefleksin lamaantuminen saattaa lisätä liman ja muun eritteen jäämistä hengitysteihin)
- jos sairastat akuuttia porfyriaa
- jos sairastat kroonista, astmaattista tai runsaasti limaa erittävää yskää. Käytä tällöin Recipectiä vain lääkärin määräyksellä.

Kerro lääkärille, jos jokin yllä mainituista koskee tai on koskenut sinua.

Kodeiini muuttuu maksassa morfiiniksi entsyymien vaikutuksesta. Morfiini on aine, joka saa aikaan kodeiinin vaikutukset. Joillakin ihmisillä on tämän entsyymien muunnos, mikä voi vaikuttaa ihmisiin eri tavoin. Joidenkin ihmisten elimistö ei tuota morfiinia tai sitä muodostuu erittäin pieniä määriä, jotka eivät riitä vaikuttamaan yskän oireisiin. Toiset puolestaan saavat vakavia haittavaikutuksia todennäköisemmin kuin muut, koska heidän elimistönsä muodostaa erittäin suuria määriä morfiinia. Jos huomaat minkä tahansa seuraavista haittavaikutuksista, lopeta tämän lääkkeen käyttö ja käänny välittömästi lääkäriin puoleen: hidas tai pinnallinen hengitys, sekavuus, uneliaisuus, pienet pupillit, pahoinvointi tai oksentelu, ummetus, ruokahaluttomuus.

Yli 12-vuotiaat nuoret

Recipect-valmistetta ei suositella nuorille, joiden hengitystoiminta on heikentynyt, yskän oireiden hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja Recipect

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Recipect-valmisteen ja rauhoittavien lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien ja vastaavanlaisten lääkkeiden samanaikainen käyttö lisää uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä, ja se voi olla henkeä uhkaavaa. Sen vuoksi samanaikaista käyttöä voidaan harkita vain, jos muut hoitovaihtoehdot eivät ole mahdollisia.

Jos lääkäri määrää sinulle Recipect-valmistetta samanaikaisesti rauhoittavien lääkkeiden kanssa, annosta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava.

Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi rauhoittavista lääkkeistä, ja noudata huolellisesti lääkäriltä saamiasi annostussuosituksia. Voi olla hyödyllistä kertoa läheisille yllä kuvatuista rauhoittavien lääkkeiden kanssa samanaikaiseen käyttöön liittyvistä oireista ja merkeistä. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu tällaisia oireita.

Recipect-yskänlääkettä ei suositella käytettäväksi samanaikaisesti tiettyjen masennuslääkkeiden, kuten trisyklisten masennuslääkkeiden tai ns. MAO:n estäjien (monoamiinioksidaasin estäjät) kanssa.

Tämän lääkevalmisteen sisältämä alkoholi saattaa muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta.

Recipect alkoholin kanssa

Recipectiä ei pidä käyttää yhtäaikaaisesti alkoholin kanssa.

Raskaus ja imetys

Recipect-oraaliliuosta ei pidä käyttää raskauden aikana.

Älä käytä Recipect-valmistetta, kun imetät. Kodeiini ja morfiini erittyvät rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Recipectin sisältämä kodeiini voi hidastaa reaktiokykyä ja näin heikentää suorituskkyä liikenteessä ja erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Vältä autolla ajoa ja koneidenkäyttöä, jos tunnet väsymystä tai huimausta.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Recipect sisältää sorbitolia, etanolia, metyyli parahydroksibentsoaattia, propyyli parahydroksibentsoaattia ja poltettua sokeria

Tämä lääke sisältää sorbitolia 500 mg/ml. Annosteluohjeen mukainen kerta-annos (10–15 ml lääkettä) sisältää 5,0–7,5 g sorbitolia. Sorbitoli on fruktoosin lähde. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi tai jos sinulla on diagnosoitu perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei pysty hajottamaan fruktoosia, kerro asiasta lääkärille ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä. Voi aiheuttaa vatsavaivoja ja olla lievästi laksatiivinen. Energiasisältö 2,6 kcal/g sorbitolia.

Tämä lääkevalmiste sisältää 7,5 tilavuusprosenttia etanolia (alkoholia), eli 900 mg per 15 ml:n annos, mikä vastaa noin 23 ml:aa olutta tai 9 ml:aa viiniä. Alkoholimäärä 10 ml:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa noin 15 ml:aa olutta ja 6 ml:aa viiniä. Tämän lääkevalmisteen sisältämällä alkoholimäärällä ei todennäköisesti ole vaikutusta aikuisiin tai nuoriin, eivätkä vaikutukset lapsiin todennäköisesti ole havaittavia. Jos olet riippuvainen alkoholista, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tämä lääke sisältää säilytysaineena metyyli parahydroksibentsoaattia ja propyyli parahydroksibentsoaattia. Voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Lääke sisältää poltettua sokeria 5 mg/ml (50–75 mg/annos). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten Recipectiä käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset (vähintään 18-vuotiaat):

15 ml 3–4 kertaa päivässä.

Käyttö lapsille ja nuorille

Alle 12-vuotiaat lapset:

Recipect-valmistetta ei saa käyttää alle 12 vuoden ikäisten lasten hoidossa.

12–15-vuotiaat nuoret:

10 ml 3–4 kertaa päivässä.

16–17-vuotiaat nuoret:

15 ml 3–4 kertaa päivässä.

Recipect-valmisteen käyttöä ei suositella 12–18 vuoden ikäisille nuorille, joiden hengitystoiminta on heikentynyt.

Noudata näitä ohjeita, ellei lääkäri toisin määrää.

Recipect annostellaan lääkemitan avulla.

Ravista ennen käyttöä.

Tärkeää

Ilman reseptiä saatava Recipect-yskänlääke on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, yleensä enintään viikon ajaksi, ellei lääkäri ole määrännyt pitempää käyttöä.

Yskänlääkkeen vaikutus tehostuu, kun muistat juoda runsaasti nestettä. Hoidon alkaessa limantulo ja yskimisen tarve saattavat lisääntyä, kun lima alkaa irrota.

Jos käytät enemmän Recipectiä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

- päänsärky, pahoinvointi, huimaus
- oksentelu, ummetus
- väsymys.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

- sydämentykytyks
- kutina.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

- yliherkkyysoireet
- kiihtymys
- hikoilu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

5. Recipectin säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Recipect sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat kodeiinifosfaattihemihydraatti, jota on 0,958 mg yhdessä millilitrassa liuosta, ja guaifenesiini, jota on 20 mg yhdessä millilitrassa liuosta.
- Muut aineet ovat sorbitoli (E420), sakkariinatrium, ammoniumkloridi, timjamin nesteuute, etanoli ja puhdistettu vesi. Lääke sisältää säilöntäaineina metyyli- ja propyyli parahydroksibentsoaattia (E218 ja E216), aromiaineena lakritsiaromia ja väriaineena poltettua sokeria (E150).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Recipect on hieman samea, ruskea liuos.

Pakkauskoko: 150 ml

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma
Volltikatu 8
70700 Kuopio

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.6.2022

Bipacksedel: Information till användaren

Recipect oral lösning

kodeinfosfathemihydrat och guaifenesin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande :

1. Vad Recipect är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Recipect
3. Hur du använder Recipect
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Recipect ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Recipect är och vad det används för

Av de aktiva substanserna i Recipect är kodein ett läkemedel som effektivt lindrar hostretning. Kodein verkar på hostretningscentret i det centrala nervsystemet och hämmar därmed hostreflexen. Guaifenesin gör segt slem mera lättflytande och därmed lättare att hosta bort. Därtill ökar guaifenesin utsöndringen av slem.

Recipect används tillfälligt utan läkarordination mot hostretning. Om du får Recipect på ordination av läkare, informerar läkaren för vilket ändamål läkemedlet är ordinerat.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Recipect

Använd inte Recipect

- om du är allergisk mot kodein, guaifenesin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- om du har medfödd fruktosintolerans
- om du är under 12 år
- om du vet att du mycket snabbt omvandlar kodein till morfin
- om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Recipect:

- om du lider av astma, lungemfysem eller annan nedsatt andningsfunktion
- om du lätt får gallbesvär
- om du har nyligen genomgått en operation i mag- eller bröstområdet (hämmningen av hostreflexen, som förorsakas av kodein, kan leda till att slem och annat sekret blir kvar i luftvägarna)

- om du lider av akut porfyri
- om du lider av kronisk, astmatisk eller rikligt slemavsöndrande hosta. Använd i så fall Recipect endast på ordination av läkare.

Tala om för läkaren om något av de ovan nämnda gäller eller har gällt dig.

Kodein omvandlas till morfin i levern av ett enzym. Ämnet som producerar kodeinets effekter är morfin. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Hos vissa människor produceras inget eller nästan inget morfin vilket gör att deras hosta inte lindras. Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar eftersom de kan bilda en mycket stor mängd morfin. Om du får någon av följande biverkningar måste du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring, sömnhet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.

Ungdomar över 12 år

Recipect rekommenderas inte till ungdomar med nedsatt andningsfunktion vid behandling av hosta.

Andra läkemedel och Recipect

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Samtidig användning av Recipect och lugnande läkemedel såsom bensodiazepiner och liknande läkemedel ökar risken för sömnhet, andningssvårigheter (andningsdepression) och koma vilket kan vara livshotande. På grund av detta bör samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om läkaren förskriver Recipect samtidigt med lugnande, bör dosen och behandlingstiden begränsas.

Berätta för läkaren om du tar lugnande läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om riskerna som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du får dessa symtom.

Det rekommenderas att Recipect inte används samtidigt med vissa depressionsmediciner, såsom tricykliska antidepressiva läkemedel eller sk. MAO-hämmare (monoaminoxidas-inhibitorer).

Alkoholen i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel.

Recipect med alkohol

Recipect bör inte användas samtidigt med alkohol.

Graviditet och amning

Recipect oral lösning bör inte användas under graviditet.

Använd inte Recipect om du ammar. Kodein och morfin passerar över till bröstmjolk.

Körförmåga och användning av maskiner

Kodeinet i Recipect kan göra reaktionsförmågan långsammare och på detta sätt försämra prestationsförmågan i trafiken och i annat precisionsbetonat arbete. Undvik att köra bil eller att hantera maskiner om du känner dig trött eller om du upplever yrsel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Recipect innehåller sorbitol, etanol, metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat och sockerkulör

Detta läkemedel innehåller sorbitol 500 mg/ml. En engångsdos enligt doseringsanvisningarna (10–15 ml läkemedlet) innehåller 5,0–7,5 g sorbitol. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du inte tål vissa sockerarter eller om du har diagnostiserats med arvetäritär fruktosintolerans, en sällsynt, ärtflig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel. Kan ge obehag i mage/tarm och ha en mild laxerande effekt. Kalorivärde 2,6 kcal/g sorbitol.

Detta läkemedel innehåller 7,5 volymprocent etanol (alkohol) d.v.s. 900 mg per en 15 ml dos, motsvarande ca. 23 ml öl eller 9 ml vin. Mängden i 10 ml av detta läkemedel motsvarar ca. 15 ml öl eller 6 ml vin. Mängden alkohol i detta läkemedel ger troligtvis inga effekter hos vuxna och ungdomar och dess effekt hos barn är troligtvis inte märkbar. Om du är eller har varit beroende av alkohol rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller som konserveringsmedel metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat. Kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Läkemedlet innehåller sockerkulör 5 mg/ml (50–75 mg/dos). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

Övriga innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3. Hur du använder Recipect

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna (18 år och äldre):
15 ml 3–4 gånger dagligen.

Användning för barn och ungdomar

Barn under 12 år:

Recipect får inte användas för behandling av barn under 12 år.

Ungdomar mellan 12 och 15 år:

10 ml 3–4 gånger dagligen.

Ungdomar mellan 16 och 17 år:

15 ml 3–4 gånger dagligen.

Recipect rekommenderas inte till ungdomar mellan 12 och 18 år med nedsatt andningsfunktion.

Följ dessa anvisningar om inte läkaren ordinerat annat.

Recipect doseras med hjälp av ett medicinmått.

Skaka före användning.

Viktigt

Recipect kan köpas utan recept och är avsedd för tillfälligt bruk. I allmänhet används läkemedlet högst i en vecka, om läkaren inte ordinerat annat.

Hostmedicinens verkan förbättras då du kommer ihåg att dricka rikligt med vätska. Då behandlingen påbörjas kan slemutsöndringen tillta och behovet att hosta öka då slemmet börjar lossna.

Om du har använt för stor mängd av Recipect

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- huvudvärk, illamående, yrsel
- kräkningar, förstoppning
- trötthet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- hjärtklappning
- klåda.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- överkänslighetsreaktioner
- upprördhet
- svettning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Recipect ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är kodeinfosfathemihydrat, varav det finns 0,958 mg i en milliliter lösning och guaifenesin, varav det finns 20 mg i en milliliter lösning.
- Övriga innehållsämnen är sorbitol (E420), sackarinnatrium, ammoniumklorid, flytande timjanextrakt, etanol och renat vatten. Läkemedlet innehåller metyl- och propylparahydroxibensoat (E218 och E216) som konserveringsmedel, lakritsrom som aromämne och sockerkulör (E150) som färgämne.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Recipect är en aning grumlig, brun lösning.

Förpackningsstorlek: 150 ml

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation
Orionvägen 1
FI-02200 Esbo
Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma
Volltikatu 8
FI-70700 Kuopio
Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 9.6.2022