

## **Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle**

### **Strepsils Hunaja & Sitruuna imeskelytabletti**

2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.

#### **Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Strepsils Hunaja & Sitruuna on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Strepsils Hunaja & Sitruunaa
3. Miten Strepsils Hunaja & Sitruunaa otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Strepsils Hunaja & Sitruunan säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

#### **1. Mitä Strepsils Hunaja & Sitruuna on ja mihin sitä käytetään**

Strepsils Hunaja & Sitruunaa käytetään suu- ja nielutulehdusten oireiden lievittämiseen. Sen vaikuttavat aineet, 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli, ovat antiseptisiä aineita, joilla on bakteereja, sieniä ja viruksia tuhoavia sekä niiden lisääntymistä estäviä ominaisuuksia.

#### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Strepsils Hunaja & Sitruunaa**

##### **Älä ota Strepsils Hunaja & Sitruunaa**

- jos olet allerginen 2,4-diklooribentsyylialkoholille tai amyylimetakresolille, tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

##### **Varoitukset ja varotoimet**

Ole erityisen varovainen Strepsils Hunaja & Sitruunan suhteen,

- jos olet diabeetikko, koska Strepsils Hunaja & Sitruuna sisältää glukoosia ja sakkaroosia (ks. kohta ”Strepsils Hunaja & Sitruuna sisältää sakkaroosia ja glukoosia”).

##### **Muut lääkevalmisteet ja Strepsils Hunaja & Sitruuna**

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt, tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa ei kuitenkaan ole todettu.

##### **Raskaus, imetys ja hedelmällisyys**

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Strepsils Hunaja & Sitruuna -imeskelytablettien turvallisuutta raskauden ja imetyksen aikana ei ole täysin vahvistettu, mutta ei ole odotettavissa, että käytöstä aiheutuisi vaaraa. Kuten kaikkien muidenkin lääkkeiden käytössä, varovaisuutta tulee kuitenkin noudattaa raskauden ja imetyksen aikana. Tietoja siitä, voiko Strepsils Hunaja & Sitruuna mahdollisesti vaikuttaa hedelmällisyyteen, ei ole saatavilla.

### **Ajaminen ja koneiden käyttö**

Strepsils Hunaja & Sitruunan käytöllä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

### **Strepsils Hunaja & Sitruuna sisältää sakkaroosia ja glukoosia**

Yhdessä imeskelytablettissa on 1,4 g sakkaroosia (sokeria), 0,98 g glukoosia ja 0,038 g fruktoosia (hunajasta). Tämä tulee ottaa huomioon potilailla, joilla on diabetes. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

## **3. Miten Strepsils Hunaja & Sitruunaa otetaan**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Oireiden lievittämiseen tulee käyttää mahdollisimman pientä annostusta mahdollisimman lyhyen aikaa. Jos oireet eivät lieydy 3 päivässä, tai jos ne pahenevat, ota yhteys lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen.

### Suosittelut annokset ovat:

#### *Aikuiset ja yli 6-vuotiaat lapset*

1 imeskelytabletti joka toinen tai joka kolmas tunti tarvittaessa. Tabletin annetaan hitaasti liueta suussa. Enintään 12 tablettia vuorokaudessa.

#### *Iäkkäät*

Sama annos kuin aikuisille. Annosta ei tarvitse sovittaa.

#### *Alle 6-vuotiaat lapset*

Ei alle 6-vuotiaille lapsille.

### **Jos otat enemmän Strepsils Hunaja & Sitruunaa kuin sinun pitäisi**

Älä ylitä suositeltua annosta.

Liian monen Strepsils Hunaja & Sitruunan ottaminen voi aiheuttaa mahaoireita.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Alla olevassa taulukossa on ilmoitettu tämän valmisteen vaikuttavien aineiden yhdistelmällä ilmoitetut haittavaikutukset elinryhmittäin. Haittavaikutusten yleisyys on tuntematon, sillä saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin.

<i><b>Elinryhmä</b></i>	<i><b>Haittavaikutus</b></i>
Immuunijärjestelmä	Yliherkkyys
Ruoansulatuselimistö	Vatsakivut, pahoinvointi, epämukava tunne suussa <sup>1</sup>
Iho ja ihonalainen kudos	Ihottuma

<sup>1</sup> Tähän sisältyy polttava tai pistelevä tunne suussa tai nielussa sekä suun tai nielun turvotus.

#### Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

## **5. Strepsils Hunaja & Sitruunan säilyttäminen**

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (ulkopakkauksessa ”Käyt.viim.”, läpipainopakkauksessa ”EXP”). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tuubiin pakatut imeskelytabletit on käytettävä 3 kuukauden kuluessa tuubin avaamisesta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## **6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa**

### **Mitä Strepsils Hunaja & Sitruuna sisältää**

- Vaikuttavat aineet ovat 1,2 mg 2,4-diklooribentsyylialkoholia ja 0,6 mg amyylimetakresolia.
- Muut aineet ovat viinihappo, hunaja, piparminttuöljy, sitruunaöljy, sakkaroosi, glukoosi sekä väriaine kinoliininkeltainen (E 104).

### **Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot**

*Lääkevalmisteen kuvaus:* Keltainen pyöreä imeskelytabletti, joka maistuu hunajalle ja sitruunalle. Halkaisija on n. 18 mm ja imeskelytabletin molemmilla puolilla on S-logo.

*Pakkauskoot:* 10 (tuubissa) sekä 24 ja 36 (läpipainopakkauksissa) imeskelytablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

**Myyntiluvan haltija**

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S  
Vandtårnsvej 83A  
DK-2860 Søborg  
Tanska  
Puhelin +358 0 290 009200

**Valmistaja**

RB NL Brands B.V.  
WTC Schiphol Airport,  
Schiphol Boulevard 207,  
1118 BH Schiphol,  
Alankomaat

**Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 31.12.2018**

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Strepsils Hunaja & Sitruuna sugtablett**

2,4-diklorobensylalkohol och amylmetakresol

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Strepsils Hunaja & Sitruuna är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Strepsils Hunaja & Sitruuna
3. Hur du tar Strepsils Hunaja & Sitruuna
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Strepsils Hunaja & Sitruuna ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Strepsils Hunaja & Sitruuna är och vad det används för**

Strepsils Hunaja & Sitruuna används för att lindra symtom vid mun- och svalginfektioner. De verksamma ämnena, 2,4-diklorobensylalkohol och amylmetakresol, är antiseptiska ämnen som både hämmar tillväxten av bakterier, svampar och virus och förstör dem.

#### **2. Vad du behöver veta innan du tar Strepsils Hunaja & Sitruuna**

**Ta inte Strepsils Hunaja & Sitruuna**

- om du är allergisk mot 2,4-diklorobensylalkohol eller amylmetakresol, eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

**Varningar och försiktighet**

Var särskilt försiktig med Strepsils Hunaja & Sitruuna

- om du är diabetiker, eftersom Strepsils Hunaja & Sitruuna innehåller glukos och sackaros (se avsnitt "Strepsils Hunaja & Sitruuna innehåller sackaros och glukos").

**Andra läkemedel och Strepsils Hunaja & Sitruuna**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Interaktioner med andra läkemedel har dock inte konstaterats.

**Graviditet, amning och fertilitet**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Strepsils Hunaja & Sitruuna sugtabletternas säkerhet vid graviditet och amning har inte fullt bekräftats, men någon fara vid användning anses inte sannolik. Liksom med alla andra läkemedel ska försiktighet ändå iaktas under graviditet och amning. Information gällande eventuell inverkan på fertilitet saknas.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Strepsils Hunaja & Sitruuna har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

### **Strepsils Hunaja & Sitruuna innehåller sackaros och glukos**

En sugtablett innehåller 1,4 g sackaros (socker), 0,98 g glukos och 0,038 g fruktos (ingår i honungen). Detta bör beaktas av patienter med diabetes mellitus. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

## **3. Hur du tar Strepsils Hunaja & Sitruuna**

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Minsta möjliga dosering och kortast möjliga behandlingstid ska användas för att lindra symtomen vid mun- och svalginfektioner. Kontakta läkare eller annan hälsovårdspersonal om symtomen inte lindras inom 3 dagar eller om de blir värre.

### Rekommenderad dosering:

#### *Vuxna och barn över 6 år*

1 sugtablett varannan eller var tredje timme vid behov. Sugtablettens får långsamt smälta i munnen. Högst 12 sugtabletter per dygn.

#### *Äldre*

Samma dos som för vuxna. Ingen dosjustering är nödvändig.

#### *Barn under 6 år*

Ej för barn under 6 år.

### **Om du har tagit för stor mängd av Strepsils Hunaja & Sitruuna**

Överskrid inte den rekommenderade dosen.

En överdos av Strepsils Hunaja & Sitruuna kan ge upphov till magbesvär.

Om du fått i dig en alltför stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tabellen nedan visar de biverkningar som rapporterats med den kombination av aktiva substanser som ingår i detta läkemedel. Biverkningarna presenteras grupperade per organsystem, och förekomsten av dessa biverkningar är okänd (d.v.s. förekomsten kan inte beräknas från tillgängliga data).

<b>Organsystem</b>	<b>Biverkning</b>
Immunsystemet	Överkänslighet
Magtarmkanalen	Magont, illamående, känsla av obehag i munnen <sup>1</sup>
Hud och subkutan vävnad	Hudutslag

<sup>1</sup> Innefattar en brännande eller stickande känsla i munnen eller svalget, och svullnad i mun eller svalg.

### Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

## **5. Hur Strepsils Hunaja & Sitruuna ska förvaras**

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (på yttre förpackningen "Utg.dat.", på blisterskivan "EXP"). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Produkt som lagras i tub ska användas inom tre månader efter det första öppnandet.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

- De aktiva substanserna är 1,2 mg 2,4-diklorobensylalkohol och 0,6 mg amylmetakresol.
- Övriga innehållsämnen är vinsyra, honung, pepparmyntsolja, citronolja, sackaros och glukos samt färgämnet kinolingult (E104).

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

*Läkemedlets utseende:* Gul, rund sugtablett med smak av honung och citron. Tabletten har en diameter på 18 mm och logon S på bägge sidor av tabletten.

*Förpackningsstorlekar:* 10 (i tub) samt 24 och 36 (i blisterförpackningar) sugtabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

### **Innehavare av godkännande för försäljning**

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Danmark

Telefon +358 0 290 009200

### **Tillverkare**

RB NL Brands B.V.

WTC Schiphol Airport,  
Schiphol Boulevard 207,  
1118 BH Schiphol,  
Nederländerna

**Denna bipacksedel ändrades senast den 31.12.2018**