

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Corsodyl 2 mg/ml liuos suuonteloon

klooriheksidiiniglukonaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Corsodyl on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Corsodyliä
3. Miten Corsodyliä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Corsodylin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Corsodyl on ja mihin sitä käytetään

Corsodyl on antibakteerinen valmiste suun hoitoon.

Corsodyl-liuosta käytetään tilapäisesti hammasproteesin aiheuttamiin suutulehduksiin. Lisäksi Corsodyl-liuosta voidaan käyttää tilapäisesti silloin, kun suun ja hampaiden mekaaninen puhdistaminen on vaikeutunut, esim. onnettomuuksien yhteydessä, sekä monimutkaisten, kiinteiden oikomislaitteiden käytön yhteydessä.

Hammaslääkärin tai lääkärin määräyksestä Corsodyl-liuosta voidaan käyttää antibakteerisena aineena ennen suuhun tai hampaan vieruskudokseen liittyviä kirurgisia toimenpiteitä, tai niiden jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Corsodyliä

Älä käytä Corsodyliä

- jos olet allerginen klooriheksidiiniglukonaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Corsodyl-valmistetta.

Valmiste on tarkoitettu käytettäväksi suuhun.

Valmistetta ei saa niellä.

Vältä liuoksen joutumista silmiin tai korviin. Jos liuosta joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi ja huolellisesti vedellä.

Lopeta liuoksen käyttö ja kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta, jos saat ihottumaa, turvotusta

huulissa, kielessä, nielussa tai kasvoissa tai hengitysvaikeuksia.

Lopeta liuksen käyttö ja kerro hammaslääkärille, jos sinulla ilmenee suun aristusta tai ärsytystä.

Kielen tai hampaiden ohimenevää värjäytymistä saattaa esiintyä. Värjäytymät eivät ole pysyviä ja niitä voidaan estää vähentämällä värjäävien ruokien/juomien, kuten teen, kahvin tai punaviinin nauttimista. Värjäytymiä voidaan hallita hampaiden harjaamisella, mutta joissakin tapauksissa ammattilaisen antama puhdistus voi olla tarpeen.

Jotkin hammastahnat voivat estää Corsodylin vaikutuksen. Huuhtelee suu perusteellisesti vedellä hampaiden harjaamisen jälkeen ja odota 5 minuuttia ennen kuin käytät Corsodyliä. Voit myös käyttää Corsodyliä johonkin muuhun aikaan päivästä.

Corsodyl-hoidon alussa voi ilmetä ohimeneviä häiriöitä makuaistissa, kihelmöintiä tai polttavaa tunnetta. Nämä vaikutukset yleensä vähenevät hoidon aikana. Mikäli tila on jatkuvaa, kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta.

Ei pitkäaikaiskäyttöön ilman hammaslääkärin ohjetta.

Muut lääkevalmisteet ja Corsodyl

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Klooriheksidiini on yhteensopimaton anionisten aineiden kanssa, joita esiintyy yleensä tavallisissa hammastahnoissa. Sen vuoksi hammastahnaa tulisi käyttää ennen klooriheksidiiniliuosta (suu huuhdellaan käyttökertojen välillä), tai eri aikaan päivästä.

Hypokloriittia sisältävät valkaisuaineet saattavat aiheuttaa tahroja tekstiileihin, jotka ovat olleet kosketuksissa klooriheksidiiniliuksen kanssa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Corsodyl ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3. Miten Corsodyliä käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ellei hammaslääkäri tai lääkäri toisin määrää, annostus on seuraava:

Suu huuhdellaan 2 kertaa vuorokaudessa n. 10 ml:lla liuosta n. minuutin ajan. Huuhtomisen jälkeen liuos syljetään pois.

Suukirurgian yhteydessä Corsodyl-liuosta käytetään ennen toimenpidettä.

Hampaan vieruskudokseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä liuosta käytetään 1- 3 viikon ajan toimenpiteen jälkeen.

Ientulehduksessa suositellaan korkeintaan noin 1 kuukauden käyttöä.

Hammasproteesin aiheuttamaa suutulehdusta voidaan hoitaa puhdistamalla proteesi ja liottamalla sitä Corsodyl-liuoksessa 15 minuutin ajan kahdesti vuorokaudessa.

Ilmoitettua annosta ei saa ylittää.

Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos oireet jatkuvat.

Käyttö lapsille

Alle 12-vuotiaille lapsille vain terveydenhuollon ammattilaisen ohjeen mukaan.

Jos käytät enemmän Corsodyliä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Allergiset reaktiot

Lopeta lääkkeen käyttö ja ota yhteys lääkäriin:

- jos saat ihottumaa, turvotusta huulissa, kielessä, nielussa tai kasvoissa
- jos saat hengitysvaikeuksia.

Nämä voivat olla oireita vakavasta allergisesta reaktiosta.

Haittavaikutukset ovat yleensä vähäisiä ja luonteeltaan paikallisia.

Hyvin yleiset haittavaikutukset

Näitä voi ilmetä yli 1 potilaalla kymmenestä:

- katteinen kieli.

Yleiset haittavaikutukset

Näitä voi ilmetä alle 1 potilaalla kymmenestä:

- suun kuivuminen
- makuaistin menetys/makuhäiriö, kielikipu, suupolte, kipeä suu ja suun tuntoharha/tuntoaistin heikentyminen.

Yksittäisiä raportteja on saatu kielen tai hampaiden värjäytymisestä, suun ärsytyksestä, suun limakalvojen hilseilystä/kuoriutumuksesta ja limakalvojen turvotuksesta ja korvasylkirauhasen turvotuksesta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Corsodylin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Corsodyl sisältää

- Vaikuttava aine on klooriheksidiiniglukonaatti 2 mg/ml.
- Muut aineet ovat glyseroli, makrogoliglyserolihydroksistearaatti, kiteytymätön 70 % sorbitoliliuos, aromi (piparminttu) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkaus koko

Kirkas, väritön liuos.

300 ml:n ruskea muovipullo.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Postboks 61
2610 Rødovre
Tanska

Valmistaja

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG, Benzstr. 25, 71083 Herrenberg, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy
PL 24
02231 Espoo
Puh: 0800 77 40 80
S-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com

Tämä pakkauseloste on tarkistettu viimeksi 16.04.2020

Bipacksedel: Information till användaren

Corsodyl 2 mg/ml munhålelösning

klorhexidinglukonat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande :

1. Vad Corsodyl är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Corsodyl
3. Hur du använder Corsodyl
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Corsodyl ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Corsodyl är och vad det används för

Corsodyl är bakteriedödande munvårdsmedel.

Corsodyl lösningen används tillfälligt vid infektioner i munhålan hos protesbärare. Vidare används Corsodyl lösningen tillfälligt då mekanisk rengöring av munhålan och tänder är försvårad såsom vid olycksfall och vid komplicerad, fast ortodontisk apparatur.

Enligt tandläkarens eller läkarens föreskrift används Corsodyl lösningen som bakteriedödande medel före och efter operationer i munhålan eller i vävnaderna runt tänderna.

2. Vad du behöver veta innan du använder Corsodyl

Använd inte Corsodyl

- om du är allergisk mot klorhexidinglukonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Corsodyl.

Produkten är avsedd för oral användning.

Preparatet ska inte sväljas.

Undvik kontakt med ögon och öron. Om Corsodyl av misstag kommer i ögonen, skölj omgående och noggrant med vatten.

Sluta använda lösningen och fråga hälsovårdspersonal om råd om du får utslag, svullnad i läppar, tunga, svalg eller ansikte eller andningssvårigheter.

Sluta använda lösningen och berätta för tandläkare om du upplever ömhet eller irritation i munnen.

Lösningen kan missfärga tunga och tänder övergående. Missfärgningen är inte permanent och kan förebyggas genom att minska på intaget av färgande livsmedel/drycker såsom te, kaffe eller rödvin. Missfärgningarna kan hanteras genom att borsta tänderna, men i vissa fall kan en rengöring utförd av fackpersonal vara nödvändigt.

Endel tandkrämer kan hindra Corsodyl från att verka. Skölj munnen grundligt med vatten efter borstningen och vänta 5 minuter innan du använder Corsodyl. Du kan också använda Corsodyl någon annan tid på dygnet.

I början av Corsodyl-behandlingen kan det förekomma övergående störningar i smaksinnet eller känsla av pirrande eller brännande. Dessa verkningar minskar vanligen under behandlingen. Rådfråga hälsovårdspersonal om biverkningarna pågår länge.

För långvarigt bruk endast enligt tandläkares föreskrift.

Andra läkemedel och Corsodyl

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Klorhexidin är inkompatibelt med anjoner, som vanligtvis förekommer i vanliga tandkrämer. Därför bör tandkräm användas före klorhexidin lösningen (munnen sköljs mellan användningar), eller en annan tid på dygnet.

Blekmedel som innehåller hypoklorit kan orsaka fläckar på textilier som har varit i kontakt med klorhexidin lösning.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Preparatet kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Corsodyl påverkar inte förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

3. Hur du använder Corsodyl

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering om inte tandläkare eller läkare ordinerat annat:

Munnen sköljs 2 gånger dagligen med ca 10 ml lösning under ungefär 1 minut. Lösningen ska därefter spottas ut.

Vid oral kirurgi används Corsodyl lösning före operationen.

Vid parodontal kirurgi används Corsodyl lösning postoperativt 1- 3 veckor.

Vid tandkötinflammation rekommenderas det att lösningen används högst en månad.

Vid inflammation i munslemhinnan p.g.a. tandprotes, rekommenderas att protesens rengörs och blötläggs i Corsodyl lösning 2 gånger dagligen under 15 minuter.

Den angivna dosen får inte överskridas.

Rådfråga hälsovårdspersonal om symtomen fortsätter.

Användning för barn

För barn under 12 år endast enligt hälsovårdspersonalens föreskrift.

Om du har använt för stor mängd av Corsodyl

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allergiska reaktioner

Sluta använda Corsodyl och kontakta läkare:

- om du får hudutslag, svullnad i läppar, tunga, svalg eller ansiktet
- om du får andningssvårigheter.

Dessa kan vara symtom på en allvarlig allergisk reaktion.

Biverkningar är vanligtvis lindriga små och lokala.

Mycket vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos fler än 1 patient av tio:

- grå tunga.

Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 patient av tio:

- muntorrhet
- förlust av smaksinne/smakstörningar, smärta i tungan, brännande känsla eller ömhet i munnen, störningar i munnens förmåelser/försvagad känsel i munnen.

Enstaka rapporter om färgad tunga/tänder, munirritation, fjällning/avskalning och svullnad av munnens slemhinna samt svullnad av öronspåttkörteln har inkommit.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Corsodyl ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är klorhexidinglukonat 2 mg/ml.
- Övriga innehållsämnen är glycerol, makrogolglycerolhydroxistearat, icke-kristalliserande sorbitol 70 %, arom (pepparmint) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, färglös lösning.

300 ml brun plastflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Postboks 61
2610 Rødovre
Danmark

Tillverkare

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG, Benzstr. 25, 71083 Herrenberg, Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy

PB 24

02231 Esbo

Tel.: 0800 77 40 80

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com

Denna bipacksedel ändrades senast 16.04.2020